
ROYAL BOTANIC GARDENS
RETURNED
-9 SEP 1964
FROM BINDERS
KEW


SOIT QUI MAL Y PE
DIEU ET MON DROIT



INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM SECUNDUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCXCVI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCCC COMPLECTENS

DUCTU ET CONSILIO W. T. THISELTON-DYER

CONFECERUNT

HERBARII HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES

OXONII

E PRELO CLARENDONIANO

MDCCCCIV

LONDINI ET NOVI EBORACI



APUD HENRICUM FROWDE, A.M.

OXONII: EXCUDEBAT HORATIUS HART, A.M., TYPOGRAPHUS ACADEMICUS

MONITUM

QUUM anno 1895 Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum usque ad annum 1885 editarum sumptu beati CAROLI DARWIN, auxilio Preli Clarendoniani, studio virorum apud Hortum Kewensem ipsum in rebus botanicis versatorum, necnon adiumento cl. J. D. HOOKER et B. D. JACKSON esset confectus et in usum publicum editus, visum est superesse ut nomina plantarum de die in diem vulgata Indici adderentur; quod consensu omnium facilius fieri posset, si ederentur supplementa quinquennalia. Laboribus cl. B. D. JACKSON et Th. DURAND Bruxellensis supplementum 1um, pro hac vice decennale, usque ad annum 1895 prolatum simili modo atque Index ipse iam impressum est.

Supplementa posteriora curatoribus Herbarii Kewensis curae erunt. Iuvat nos supplementi annorum 1895–1900 partem priorem lectoribus benevolis commendare.

Si quid falsi in opere tam laborioso repertum erit, si quid addendum sit, veniam posco, nec frustra, ut opinor, ab iis certe quibus labor noster laborem leviorem fecerit.

W. T. THISELTON-DYER

Scribebam in Horto Regio Botanico Kewensi mense Sept. a. 1904.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM SECUNDUM

NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS M.DCCC.XCVI—M.DCCCC EDITA

COMPLECTENS

ABAMA, Adans. = **Narthecium**, Moehr. (Liliac.).
californica, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = N. californicum.

ABDRA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 205. *CRUCIFERAE.*
brachycarpa, *Greene, l. c.* 207 (= *Draba brachycarpa*). —Am. bor.

ABEREMOA, Aubl. = **Duguetia**, St. Hil. (Anonac.).
argentea, R. Fries, in Svensk. Vet. Akad. Handl. xxxiv. (1900) no. 5. 23.—Peruv.
bracteosa, R. Fries, l. c. 22 = D. bracteosa.
dioica, Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 7 (= *Anona dioica*).—Bras.
lepidota, R. Fries, in Svensk. Vet. Akad. Handl. xxxiv. no. 5. 20 (= *Anona lepidota*).—Guiana.
marcgraviana, R. Fries, l. c. = D. marcgraviana.
microphylla, R. Fries, l. c. 23.—Bras.
peruviana, R. Fries, l. c. 22.—Peruv.
quitarensis, R. Fries, l. c. 20 = D. quitarensis.
rhizantha, R. Fries, l. c. 24 (= *Anona rhizantha*).—Bras.
Sanctae-crucis, R. Fries, l. c. 22 = D. Sanctae-crucis.
spixiana, R. Fries, l. c. = D. spixiana.

ABIES, Tourn. (Conif.).
arizonica, *Merriam, in Proc. Biol. Soc. Washington*, x. 116.—Am. bor.
brachytyla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 258.—China.
chinensis, *Franch. l. c.* 259.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 255.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 256.—China.
likiangensis, *Franch. l. c.* 257.—China.
Semenovii, *Fedtsch. in Bot. Centralbl.* lxxiii. 210.—As. cent.
shastensis, *Lemmon, in Gard. & For.* 1897, 184.—Am. bor.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 258.—China.

ABOLBODA, Humb. & Bonpl. (Xyrid.).
longifolia, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxii. no. 2 (1897) 20.—Bras.

ABRONIA, Juss. (Nyctag.).
alba, *Eastwood, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 97.—Am. bor.
alpina, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 456.—Am. bor.
ammophila, *Greene, Pittonia*, iv. 226.—Am. bor.
angulata, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 39.—Am. bor.
angustifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 344.—Am. bor.
arenaria, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 137 = ammophila.
carnea, *Greene, Pittonia*, iii. 343.—Am. bor.
elliptica, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 7.—Am. bor.

ABUTILON, Tourn. (Malvac.).
amplissimum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 17 (= *Sida hernandioides*).—Am. trop.
bakerianum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. (1897) 133.—Mexic.

ABUTILON :—
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 16.—Afr. trop.
cubanum, *Millsp. Field Columb. Mus. Bot.* ii. 70.—Ind. occ.
eetveldeanum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 17.—Afr. trop.
Goldmani, *Baker f. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 170.—Mexic.
hirsutum, *Reiche, Fl. Chile*, i. 219 (non K. Schum.).—Chili.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 134.—Am. cent.
reticulatum, *Baker f. & Rose, ex Rose, l. c.* 171.—Mexic.
stellatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 18 (= *Wissadula rostrata*).—Cosmop. trop.
tacuaremboense, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (*Fl. Urug.*) 133.—Urug.
Vidali, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 499 (= *Cristaria Vidali*).—Patag.

ACACIA, Tourn. (Legum.).
amboensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 105.—Afr. trop.
andongensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 314.—Afr. trop.
angustissima, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 47 = filicina.
arenaria, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 105.—Afr. trop.
arundelliana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 515.—Austral.
aurisparsa, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1303.—Madag.
bellula, *Drake, l. c.* 1302.—Madag.
Brosigii, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 194.—Afr. trop.
campoptila, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 208.—Arab.
Chisholmi, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 47.—Austral.
cowleana, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. 81, nomen; *et in Rep. Horn Exped.* iii. 187.—Austral.
Cuthbertsoni, *Luehmann, in Vict. Natural.* xiii. 117.—Austral.
Dawsoni, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 153.—Austral.
difformis, *R. T. Baker, l. c.* 154.—Austral.
dolichocephala, *Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 86.—Afr. trop.
Englerii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 107.—Afr. trop.
flava, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 214 = ehrenbergiana.
Fleckii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 108.—Afr. trop.
frumentacea, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. 81, nomen; *et in Rep. Horn Exped.* iii. 187.—Austral.
gansbergensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 108.—Afr. trop.
Georginae, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 9.—Austral.

ACACIA :—
glandulicarpa, *F. M. Reader, in Vict. Natural.* xiii. 146.—Austral.
glandulifera, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 111.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. (1900) 395.—Afr. trop.
inopinata, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 507.—Ind. or.
kalachariensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 114 (non S. Wats.).—Afr. trop.
Kingii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 506.—Ind. or.
longepetiolata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 114.—Afr. trop.
macrothyrsa, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 396.—Afr. trop.
Michelii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 28.—Bolivia.
minutifolia, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1303 (non F. Muell.).—Madag.
Nefasia, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 209 = verugera.
nossibiensis, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1302. —Madag.
Orfota, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 213 = nubica.
palustris, *Luehmann, in Vict. Natural.* xiii. 117.—Austral.
Perieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1304.—Madag.
Perrottii, *Warb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 249. —Afr. trop.
polypyrigenes, *Greenman, ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 419.—Cuba.
pumila, *Maiden & R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xx. 385.—Austral.
rehmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 525.—Afr. austr.
Rothii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vi. 39.—Austral.
sibirica, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 189.—Austral.
subangulata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 194.—Mexic.
Trentiniani, *A. Chevall. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot.* 1900, 272.—Afr. trop.
Tysoni, *Luehmann, in Vict. Natural.* xiii. 112.—Austral.
ulugurensis, *Taub. ex Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 396.—Afr. trop.

ACAENA, Linn. (Rosac.).
denudata, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 232.—Chili.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 74.—Reg. Argent.
hirta, *Citerne, in Rev. Sci. Ouest*, vii. 43.—Chili.
insularis, *Citerne, l. c.*—Ins. St. Paul.
nudicaulis, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 367.—Reg. Magell.
Philippi, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 167.—Reg. Magell.
pinnata, *Citerne, in Rev. Sci. Ouest*, vii. 42.—Bolivia.

ACAENA :—
platyacantha, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 515.—Patag.
pulvinata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 75.—Am. austr.
sericea, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. 621 (non Jacq.) = Philippi.
tenera, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 367.—Reg. Magell.

ACALYPHA, Linn. (Euphorb.).
acapulcensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 87.—Mexic.
Argomuelleri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 229.—Peruv.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
controversa, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 348 (= *Ricinocarpus controversus*).—Bolivia.
depressinervia, *K. Schum. l. c.* (= *Ricinocarpus depressinervius*).—Afr. austr.
Dewevrei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 24.—Afr. trop.
Eggersii, *Pax, l. c.* xxvi. 505.—Ecuad.
flabellifera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 119.—Bolivia.
Giraldii, *Pax, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 429.—China.
godseffiana, *Masters, in Gard. Chron.* 1898, I. 241.—Hab. ?
lehmanniana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 505.—N. Granat.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
nematorhachis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 402.—N. Guin.
psilostachyoides, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 183.—Afr. trop.
Rehmanni, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 733.—Afr. austr.
Sanderi, N. E. Br. in Gard. Chron. 1896, II. 392 = hispida.
Schinzii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 734.—Afr. austr.
similis, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
umbrosa, *Brandegee, in Erythea*, vii. (1899) 7.—Mexic.
yucatanense, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 371.—Mexic.

ACAMPE, Lindl. (Orchid.).
pachyglossa, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 76 = Saccolabium pachyglossum.
penangiana, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 358.—Penins. Mal.

ACAMPTOPAPPUS, A. Gray = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
microcephalus, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 33.—Am. bor.

ACANTHOCLADUS, Klotzsch (Polygal.).
Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 595.—Patag.
tehuelchum, *Speg. l. c.* 496.—Patag.

ACANTHODIUM, Delile = **Blepharis**, Juss. (Acanth.).
grossum, Wight, Ic. tt. 1535–6 = B. linariaefolia.
hirtum, Nees, in DC. Prod. xi. 274 = B. linariaefolia.
serrulatum, Nees, l. c. 275 = B. serrulata.
spicatum, Acerbi, ex Nees, l. c. 67 = Nelsonia campestris.

ACANTHOLIMON, Boiss. (Plumbag.).
Fominii, *Kusn. in Delect. Pl. Jurjev.* 1900, 50.—Ross.

ACANTHOPALE, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 62 (1899). *ACANTHACEAE.*
albosetulosa, *C. B. Clarke, l. c.* 64.—Afr. trop.
azaleoides, *C. B. Clarke, l. c.* 63.—Afr. trop.
Buchholzii, *C. B. Clarke, l. c.* 64.—Afr. trop.
confertiflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
decempedalis, *C. B. Clarke, l. c.* 63.—Afr. trop.
laxiflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
pubescens, *C. B. Clarke, l. c.* 64.—Afr. trop.

ACANTHOPANAX, Miq. (Aral.).
cissifolius, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 50 (= *Aralia cissifolia*).—Reg. Himal.
evodiaefolius, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 306.—China.
Henryi, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 50 (= *Eleutherococcus Henryi*).—China.

ACANTHOPANAX :—
hypoleucum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. (1898) 18.—Japon.
leucorrhizus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 50 (= *Eleutherococcus leucorrhizus*).—China.
senticosus, *Harms, l. c.* (= *Eleutherococcus senticosus*).—China.
setchuensis, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 488.—China.
sieboldianum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. (1898) 10.—Japon.

ACANTHOPHIPPIUM, Blume (Orchid.).
eburneum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 266.—Hab. ?
mantinianum, *L. Lind. & Cogn. in Journ. des Orch.* vii. 138.—Ins. Philipp.
splendidum, *J. J. Sm. in Tijdschr. Ned. Ind.* lviii. fide *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 463.—Celebes.

ACANTHOSCYPHUS, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, xxv. (1898) 53. *POLYGONACEAE.*
Parishii, *Small, l. c.* (= *Oxytheca Parishii*).—Am. bor.

ACANTHUS, Tourn. (Acanth.).
Dusenii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 108.—Afr. trop.
eminens, *C. B. Clarke, l. c.* 107.—Afr. trop.
Kirkii, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 37 = Sclerochiton Kirkii.
latisepalus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 108.—Afr. trop.
nitidus, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 232 = Sclerochiton nitidum.
tetragonus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxv = Blepharis edulis.

ACER, Tourn. (Sapind.).
Papilio, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 115.—Reg. Himal.
radujaensis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 344.—Eur.

ACERAS, R. Br. (Orchid.).
bolleana, *Siehe, in Gard. Chron.* 1898, I. 365.—As. Min.

ACERATES, Ell. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclep.).
Pringlei, Greenman, in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 570.—Mexic.
Rusbyi, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 37 — Am. bor.

ACETOSELLA, Rupp. = **Rumex**, Linn. (Geraniac.).
longissima, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 31 = Oxalis longissima.
yapacaniensis, Kuntze, l. c. = Oxalis yapacaniensis.

ACHILLEA, Linn. (Compos.).
anthemiformis, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 626.—Hab. ?
anthemoides, Freyn & Sint. l. c. iii. 346 (non Willd.) = praec.
californica, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 369.—Am. bor.
cheilanthifolia, *Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 229.—Reg. Caucas.
getica, *Grecescu, Consp. Fl. Roman.* 310.—Eur.
gigantea, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 370.—Am. bor.
macedonica, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 134.—Eur.
magnifolia, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 172.—Eur.
millefoliata, *Grecescu, Consp. Fl. Roman.* 312.—Eur.
Pecten-Veneris, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 371.—Am. bor.
striata, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 296.—Eur.
Urumoffii, *Halacsy, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 143.—Bulgaria.

ACHIMENES, P. Br. (Gesner.).
albescens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 94.—Bolivia.
flaccida, *Rusby, l. c.* 95.—Bolivia.
gracilis, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 27 (non Warcsz.).—Am. austr.
heppielloides, *Fritsch, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 151.—Bolivia.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 95.—Bolivia.

ACHNERIA, Munro (Gramin.).
ampla, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 836.—Afr. austr.
assimilis, Th. Dur. & Schinz, l. c. = Ecklonii.
aurea, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.
capensis, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.
capillaris, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2604.—Afr. austr.
curvifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 458.—Afr. austr.
Ecklonii, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 836.—Afr. austr.
hirsuta, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 462.—Afr. austr.
microphylla, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 836.—Afr. austr.
setifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 461.—Afr. austr.
tuberculata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 836 = setifolia.

ACHYRANTHES, Linn. (Amarant.).
breviflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 280.—Afr. trop.
Carsoni, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
conferta, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 420 (non Ruiz).—Afr. trop.
pedicellata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 56.—Afr. trop.
rubro-lutea, *Lopr. l. c.* 57.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 421.—Afr. trop.
viridis, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 55.—Afr. trop.

ACHYRONIA, Royen = **Aspalathus**, Linn. (Legum.).
latibracteata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 48 = A. latibracteatus.

ACHYROPHORUS, Adans. = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).
leucanthus, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 545.—Patag.

ACHYROSPERMUM, Blume (Labiat.).
africanum, *Hook. f. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 465.—Afr. trop.
cryptanthum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 162.—Afr. trop.
laterale, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 464.—Afr. trop.
nyasanum, *Baker, l. c.* 465.—Afr. trop.
oblongifolium, *Baker, l. c.* 464.—Afr. trop.
Schlechteri, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 311, nomen.—Afr. trop.

ACICARPHA, Juss. (Calycer.).
rosulata, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2636 B.—Patag.

ACIDANTHERA, Hochst. (Irid.).
brevicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 132.—Afr. austr.
Gunnisi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 31.—Afr. trop.
sabulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 101.—Afr. austr.
ukambanensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 359.—Afr. trop.

ACINODENDRUM, Kuntze = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melast.).
Kuntzei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 93 = M. Kuntzei.

ACIOA, Aubl. = **Couepia**, Aubl. (Rosac.).
Barteri, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 382 (= *Griffonia Barteri*).—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 19.—Afr. trop.
Dinklagei, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 381.—Afr. trop.
lanceolata, Engl. l. c. 382.—Afr. trop.
Lehmbachii, Engl. l. c. 379.—Afr. trop.
Mannii, Engl. l.c. 381 (= *Griffonia Mannii*).—Afr. trop.
parvifolia, Engl. l. c. 380.—Afr. trop.
scabrifolia, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. 328 (reimpr. ex Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x.).—Afr. trop.
Staudtii, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 379.—Afr. trop.
tenuiflora, Dinkl. & Engl. ex Engl. l. c. 382.—Afr. trop.

ACIPHYLLA, Forst. (Umbellif.).
Dieffenbachii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 211 (= *Angelica Dieffenbachii*).—N. Zel.
Hookeri, *T. Kirk, l. c.* 209.—N. Zel.

ACISANTHERA, P. Br. (Melastom.).
boliviensis, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 94.—Bolivia.
rosulans, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 509.—Bras.

ACMADENIA, Bartl. & Wendl. (Rutac.).
diosmoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 439.—Afr. austr.

ACMANTHERA, Griseb. (Malpigh.).
Radlkoferi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 27.—Bolivia.

ACONITUM, Tourn. (Ranunc.).
balcanicum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 9.—Bulgaria.
bulbiferum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 25.—Am. bor.
cymbulatum, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis,* iv. 213.—Reg. Caucas.
hemsleyanum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 329.—China.
Henryi, *E. Pritz. l. c.*—China.
pantocsekianum, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 241.—Eur.
ramosum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 8.—Am. bor.
vaginatum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 328.—China.

ACRATHERUM, Link = **Arundinella**, Raddi (Gramin.).
miliaceum, Link, Hort. Berol. i. 230 = A. brasiliensis.
pumilum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 414 = A. tenella.

ACRIDOCARPUS, Guill. & Perr. (Malpigh.).
rudis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 28.—Afr. trop.
socotranus, *Oliv. in Hook. Ic. Pl.* t. 2433.—Socotra.

ACRIOPSIS, Reinw. (Orchid.).
nelsoniana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 160.—N. Guin.
papuana, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 250, nomen.—N. Guin.
sumatrana, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 249.—Sumatra.

ACROCEPHALUS, Benth. (Labiat.).
centratheroides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
dissitifolius, *Baker, l. c.* 362.—Afr. trop.
divaricatus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 76.—Afr. trop.
galeopsifolius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 471.—Afr. trop.
Hensii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 77.—Afr. trop.
hyptoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 362.—Afr. trop.
Laurentii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 79.—Afr. trop.
lippioides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 361.—Afr. trop.
masuianus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 80.—Afr. trop.
monocephalus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
oligocephalus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
polytrichus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 358.—Afr. trop.
porphyrophyllus, *Baker, l. c.* 357.—Afr. trop.
succisaefolius, *Baker, l. c.* 356.—Afr. trop.
venosus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.

ACROCOMIA, Mart. (Palmae).
Mokayayba, *Barb. Rodr. in Plant. Nov. Rio,* v. 11.—Bras.
odorata, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 48.—Bras.

ACROELYTRUM, Steud. = **Lophatherum**, Brongn. (Gramin.).
japonicum, Steud. in Flora, 1846, 21 = L. gracile.

ACROLOPHIA, Pfitzer (Orchid.).
fimbriata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 340.—Afr. austr.

ACRONYCHIA, Forst. (Rutac.).
Andrewsi, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 174.—Ins. Christmas.
haplophylla, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 180 = tetrandra.
Scortechinii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.

ACROSEPALUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 22. *TILIACEAE.*
klaineanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

ACROTOME, Benth. (Labiat.).
Belckii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 549.—Afr. austr.

ACTAEA, Linn. (Ranunc.).
eburnea, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 153.—Am. bor.

ACTEPHILA, Blume (Euphorb.).
africana, *Pax, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 210.—Afr. occ.
flaviflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 388.—N. Guin.
gigantifolia, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.
Minahassae, *Koord. l. c.*—Celebes.
reticulata, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 326 (= *Amanoa reticulata*).—Afr. trop.

ACTINEA, Juss. = **Cephalophora**, Cav. (Compos.).
doniana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 128 = C. doniana.
haenkeana, Kuntze, l. c. = Hymenoxys haenkeana.
insularis, Kuntze, l. c. = C. insularis.
scaposa, Kuntze, l. c. = C. scaposa.
Tweedii, Kuntze, l. c. = Hymenoxys Tweediei.

ACTINELLA, Nutt. (Compos.).
glabra, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyom.* 136.—Am. bor.

ACTINOLEPIS, DC. (Compos.).
nubigena, *Greene, Fl. Francisc.* 442 (= *Eriophyllum nubigenum*).—Am. bor.
Pringlei, *Greene, l. c.* 441 (= *Eriophyllum Pringlei*).—Am. bor.

ACTINOSPERMUM, Ell. = **Baldwinia**, Nutt. (Compos.).
uniflorum, Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 411 = B. uniflora.

ACTINOSTEMMA, Griff. (Cucurb.).
biglandulosa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2622, 2645.—China.

ACUAN, Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legum.).
Fendleri, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5.—Am. bor.
glandulosa, A. A. Heller, l. c. (= *Mimosa glandulosa*).—Am. bor.
obtusa, A. A. Heller, l. c. ed. I. 4 = D. obtusus.

ADANSONIA, Linn. (Malv.).
sphaerocarpa, *A. Chevall. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot.* 1900, 271.—Afr. trop.

ADENANDRA, Willd. (Rutac.).
acuta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 162.—Afr. austr.
Bodkinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 315.—Afr. austr.

ADENANTHERA, Royen (Legum.).
tamarindifolia, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 392 A.—Cochinch.

ADENIA, Forst. = **Modecca**, Linn. (Passifl.).
aspidophylla, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 235.—Afr. trop.
cissampeloides, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 255 (= *Ophiocaulon cissampeloides*).—Afr. trop.
cladosepala, Harms, l. c. 256 = M. cladosepala.
cynanchifolia, Harms, l. c. 255 (= *Ophiocaulon cynanchifolius*).—Afr. trop.
densiflora, Harms, l. c. 256 = M. densiflora.
gracilis, Harms, l. c. 255; et in Engl. Jahrb. xxvi. 236.—Afr. trop.
gummifera, Harms, l. c. 255 (= *Ophiocaulon gummifer*).—Afr. trop.
mukengensis, Harms, l. c. (= *Ophiocaulon lanceolatum*).—Afr. trop.
oblongifolia, Harms, l. c.; et in Engl. Jahrb. xxiv. 236.—Afr. trop.
Pechuelii, Harms, l. c. 255 (= *Echinothamnus Pechuelii*).—Afr. trop.
Rowlandi, Harms, l. c. (= *Ophiocaulon Rowlandi*).—Afr. trop.
Staudtii, Harms, l. c.; et in Engl. Jahrb. xxvi. 237.—Afr. trop.
stenophylla, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 238.—Afr. austr.
Wilmsii, Harms, l. c.—Afr. austr.

ADENIUM, Roem. & Schult. (Apocyn.).
arabicum, *Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb.* xxxi. 161.—Arab.

ADENOCALYMNA, Mart. (Bignon.).
Ackermannii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 98.—Bras.
asperulum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 113.—Bras.
croceum, *S. Moore, ex Bureau & K. Schum. l. c.* 103.—Bras.
Cymbalum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 112 (= *Bignonia Cymbalum*).—Bras.
hirtum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 100.—Bras.
hypostictum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 99.—Bras.
kerere, Bureau & K. Schum. l. c. 119 = stridula.
laevigatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 113.—Bras.
multiglandulosum, *Benth. ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 72, nomen.—Bolivia.
nervosum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 95.—Bras.
pachypus, *Bureau & K. Schum. l. c.* 110 (= *Anemopaegma pachypus*).—Bras.
pleiadenium, *Bureau & K. Schum. l. c.* 107.—Bras.
pohlianum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 114.—Bras.
Sagotii, *Bureau & K. Schum. l. c.* 110.—Guiana.
splendens, *Bureau & K. Schum. l. c.* 115.—Bras.
ternatum, *De Mello, ex Bureau & K. Schum. l. c.* 104.—Bras.

ADENOGONUM, Welw. ex Hiern, in Journ. Bot. 1898, 290. *COMPOSITAE.*
decumbens, *Welw. l. c.* 291.—Afr. austr.

ADENONCOS, Blume = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.)
major, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 350.—Penins. Mal.
parviflora, Ridley, l. c.—Penins. Mal.

ADENOSACME, Wall. (Rubiac.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 492, nomen.—Celebes.

ADENOSMA, Nees (Acanth.).
africana, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 21 = Synnemia africanum.

ADESMIA, DC. (Legum.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 507.—Patag.
calopogon, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* ii. 123.—Chili.
carnosa, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 159.—Reg. Magell.
colinensis, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* ii. 139.—Chili.
Dessaueri, *Phil. l. c.* 130.—Chili.
divaricata, *Phil. l. c.* 129.—Chili.
Godoyae, *Phil. l. c.* 161.—Chili.
intricata, *Phil. l. c.* 124.—Chili.
Izquierdi, *Phil. l. c.* 164.—Chili.
latistipula, *Phil. l. c.* 157.—Chili.
macrostachya, *Phil. l. c.* 140.—Chili.
maulina, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 353 (= *Patagonium maulinum*).—Chili.
melanocarpa, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* ii. 158.—Chili.
Morenonis, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 70.—Patag.
Negeri, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 161.—Reg. Magell.
pampeana, *Speg. Fl. Vent.* 21.—Reg. Argent.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 508.—Patag.
Peraltae, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* ii. 132.—Chili.
racemosa, *Phil. l. c.* 161.—Chili.
renjifoana, *Phil. l. c.* 124.—Chili.
resinosa, *Phil. l. c.* 166.—Chili.
venosa, *Phil. l. c.*—Chili.
Villanuevae, *Phil. l. c.* 127.—Chili.

ADHATODA, Tourn. (Acanth.).
acuminata, Nees, in DC. Prod. xi. 400 = Justicia palustris.
anselliana, Nees, l. c. 403 = J. anselliana.
engleriana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 222.—Afr. trop.
fasciata, Nees, in DC. Prod. xi. 402 = J. flava.
flava, Nees, l. c. 401 = J. flava.
Hypericum, Solms-Laub. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 102 = J. odora.
Kotschyi, Benth. in Hook. Niger Fl. 483 = J. calcarata.

ADHATODA:—
maculata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 223.—Afr. trop.
major, Nees, in DC. Prod. xi. 397 = J. flava.
microphylla, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 217 = J. microphylla.
minor, Nees, in DC. Prod. xi. 400 = J. flava.
odora, Nees, l. c. 399 = J. odora.
orbicularis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 222.—Afr. trop.
palustris, Nees, in DC. Prod. xi. 402 = J. flava.
paniculata, Benth. in Hook. Niger Fl. 482 = J. laxa.
plicata, Nees, in DC. Prod. xi. 401 = J. flava.
robusta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 223. —Afr. trop.
Rostellaria, Nees, in DC. Prod. xi. 397 = J. calcarata.
striata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 216 = J. melampyrum.
suaveolens, Nees, in DC. Prod. xi. 401 = J. flava.

ADICEA, Rafin. = **Urtica**, Tourn. (Urtic.).
mooreana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 991.—Afr. trop.

ADINA, Salisb. (Rubiac.).
multifolia, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 45.—Ins. Philipp.
oligocephala, *Havil. l. c.* 46.—Ind. or.

ADINANDRA, Jack (Ternstroem.).
bockiana, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 477.—China.
Brefeldii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 642.—Celebes.
celebica, *Koord. l. c.*—Celebes.

ADORIUM, Rafin. = **Seseli**, Linn. (Umbellif.).
Hookeri, Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 501 = Musenium divaricatum.

ADRORHIZON, Hook. f. in Trimen, Fl. Ceylon, iv. 161 (1898). *ORCHIDEAE.*
purpurascens, *Hook. f. l. c.* (= *Dendrobium purpurascens*).—Ind. or.

AECHMEA, Ruiz & Pav. (Bromel.).
ampullacea, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 257.—Reg. Argent.
Eggersii, *Mez, l. c.* 238.—Ecuador.
humilis, *Mez, l. c.* 216.—Guiana.
kuntzeana, *Mez, l. c.* 208.—Bolivia.
pitcairnioides, *Mez, l. c.* 258.—Bras.
Pittieri, *Mez, l. c.* 231.—Am. cent.
remotiflora, Mez, l. c. 219 = Streptocalyx laxiflora.
rubiginosa, Mez, l. c. 285 = A. Fernandae.
serrata, Mez, l. c. 243 = martinicensis.
Smithiorum, *Mez, l. c.* 246.—Ins. St. Vincent.
Sprucei, Mez, l. c. 226 = paniculifera.
tomentosa, *Mez, l. c.* 229.—Bras.

AEDESIA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 321 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 468. *COMPOSITAE.*
Baumannii, *O. Hoffm. ll. cc.*—Afr. trop.
glabra, *O. Hoffm. ll. cc.* (= *Bojeria glabra*).—Afr. trop

AEGIALOPHILA, Boiss. & Heldr. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
longispina, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 146. —Lesbos.

AEGILOPS, Linn. = **Triticum**, Linn. (Gramin.).
turcica, Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 177.—Turcia.

AEGIPHILA, Jacq. (Verben.).
densiflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 107.—Bolivia.
oblongifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 81.—Bolivia.
odontophylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 157.—Am. cent.
pacifica, *Greenman, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 485.—Mexic.

AEGOPODIUM, Knaut (Umbellif.).
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 497.—China.

AELUROPUS, Trin. (Gramin.).
arabicus, Steud. Nom. ed. II. i. 30 = villosus.
brevifolius, Nees, ex Steud. l. c. = Eleusine brevifolia.
brevifolius, Wall. Cat. n. 8897 = villosus.

AELUROPUS:—
concinnus, Figar. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 257 = villosus.
laevis, Trin. Fund. Agrost. 143 = Eleusine brevifolia.
lagopodioides, Trin. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 374 = villosus.
littoralis, Parl. Fl. Ital. i. 461 = villosus.
mucronatus, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 297 = villosus.
niliacus, Steud. Nom. ed. II. i. 30 = villosus.
niloticus, Edgw. in Journ. Linn. Soc. vi. 196 = villosus.
pubescens, Trin. ex Steud. Non. ed. II. i. 30 = villosus.
pungens, C. Koch, in Linnaea, xxi. 408 = villosus.
sinaicus, Figar. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 257 = villosus.

AEOLANTHUS, Mart. (Labiat.).
Cameronii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 273. —Austral.
conglomeratus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 397. —Afr. trop.
cryptanthus, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
cuneifolius, *Baker, l. c.* 392.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 467.—Afr. trop.
linearis, *Hua & Briq. ex Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 68 (= *Icomum lineare*).—Afr. trop.
Medusa, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 396.—Afr. trop.
myrianthus, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
nodosus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 868.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
petasutus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 62.—Afr. trop.
prittwitzianus, *Guerke, in Goetzen, Durch. Afr.* repr. 8. —Afr. trop.
Rehmannii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 819.—Afr. austr.
rivularis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 869.—Afr. trop.
salicifolius, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 161.—Afr. trop.
sedoides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 870.—Afr. trop.
serpiculoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 395.—Afr. trop.
Stormsii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 820.—Afr. trop.
subacaulis, *Hua & Briq. ex Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 68 (= *Icomum subacaule*). —Afr. trop.
tuberosus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 870.—Afr. trop.

AEONIUM, Webb & Berth. = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).
complanatum, Lem. Pl. Grasses, 12 = S. complanatum.
Paivae, Lem. l. c. 14 = S. Paivae.

AERACHNE, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1897) 295, sphalm. = ACRACHNE, Wight & Arn. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).

AERANGIS, Reichb. f. = **Angraecum**, Thou. (Orchid.).
flabellifolia, Reichb. f. in Flora, 1865, 191 = A. flabellifolium.

AERANTHUS, Reichb. f. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).
distichus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 901 = M. distichum.
erythropollinius, Reichb. f. in Flora, 1865, 190 = M. xanthopollinium.
muscicola, Reichb. f. l. c. = Listrostachys muscicola.
rutilus, Reichb. f. l. c. 1885, 382 = M. rutilum.
xanthopollinius, Reichb. f. l. c. 1865, 190 = M. xanthopollinium.

AERIDES, Lour. (Orchid.).
siamense, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 134.—Siam.

AEROPSIS, Aschers. & Graebner, Mittel-Eur. Fl. ii. 298 = **Airopsis**, Desv. (Gram.).
tenella, Aschers. & Graebner, l. c. = A. globosa.

AERVA, Forsk. (Amarant.).
Ruspolii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 57.—Afr. trop.

AESCHYNANTHUS, Jack (Gesner.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 627. —Celebes.
dasycalyx, *Hallier f. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lvi. 342.—Borneo.

AESCHYNANTHUS:—
ellipticus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 541.—N. Guin.
perakensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 499.—Penins. Mal.
pusilla, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 299.—Ind. or.
Rhododendron, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 500.—Penins. Mal.

AESCHYNOMENE, Linn. (Legum.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 191.—Mexic.
compacta, *Rose, l. c.*—Mexic.
dissitiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
fruticosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 192.—Mexic.
glutinosa, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 190.—Afr. trop.
lateritia, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 292.—Afr. trop.
nilotica, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 189.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
nyassana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 190.—Afr. trop.
Palmeri, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 192.—Mexic.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 325.—Ind. occ.
ruspoliana, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 94.—Afr. trop.
saxicola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 189.—Afr. trop.
simulans, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 192.—Mexic.
sparsiflora, *Baker, in Kew. Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.

AETANTHUS, Engl. (Loranth.).
andreanus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 136 (= *Phyllostephanus andreanus*).—Ecuad.
Engelsii, *Engl. l. c.* (= *Phyllostephanus Engelsii*).—Am. trop.
Holtonii, *Engl. l. c.* (= *Psittacanthus Holtoni*).—N. Granat.
nodosus, *Engl. l. c.* (= *Loranthus nodosus*).—Am. trop.

AETHEILEMA, R. Br. = **Phaylopsis**, Willd. (Acanth.).
imbricatum, R. Br. Prod. 478 = P. parviflora.
micranthum, Benth. in Hook. Niger Fl. 480 = P. micrantha.

AFRAFZELIA, Pierre, Fl. Cochinch. (1899) sub t. 388. *LEGUMINOSAE.*
africana, *Pierre, l. c.* (= *Afzelia africana*).—Afr. trop.
attenuata, *Pierre, l. c.* (= *A. attenuata*).—Afr. trop.
bracteata, *Pierre, l. c.* (= *A. bracteata*).—Afr. trop.
cuanzensis, *Pierre, l. c.* (= *A. cuanzensis*).—Afr. trop.
petersiana, *Pierre, l. c.* (= *A. petersiana*).—Afr. trop.

AFRIDIA, Duthie, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xi. (1898) 696. *LABIATAE.*
nepetaeformis, *Duthie, l. c.* (= *Nepeta suavis*).—Afghan.

AFROMENDONCIA, Gilg (Acanth.).
floribunda, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 6.—Afr. trop.

AFZELIA, Sm. (Legum.).
australis, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 468.—Austral.

AFZELIELLA, Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl. ii. 4, 1898. *MELASTOMACEAE.*
ciliata, *Gilg, l. c.* 5 (= *Guyonia ciliata*).—Afr. trop.

AGAPANTHUS, L'Hérit. (Liliac.).
ensifolius, Willd. Sp. Pl. ii. 48 = Polyxena pygmaea.

AGAPETES, G. Don (Vaccin.).
costata, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 102.—N. Guin.
Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 296. —Ind. or.

AGASTACHE, Clayt. = **Lophanthus**, Benth. (Labiat.).
anethiodora, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 85 = L. anisatus.
urticifolia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 339 = L. urticifolius.

AGASYLLIS, Spreng. = **Siler**, Scop. (Umbellif.).
chymsydia, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 221 (= *Chymsydia agasylloides*).—Oriens.

AGATEA, A. Gray = **Agation**, Brongn. (Violac.).
macrobotrys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 453.—N. Guin.

AGATHOSMA, Willd. (Rutac.).
adenandriflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 160.—Afr. austr.
aemula, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
alpina, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 25.—Afr. austr.
filamentosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 439.—Afr. austr.
lactea, *Schlechter, l. c.* xxvii. 161.—Afr. austr.
taxifolia, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

AGAVE, Linn. (Amaryll.).
Bakeri, *Ross, Ic. Pl. Hort. Panorm.* t. 2.—Hab. ?
collina, *Greenman, in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 296.—Mexic.
expatriata, *Rose, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 82.—Hab. ?
grandibracteata, *Ross, Ic. Pl. Hort. Panorm.* t. 1.—Hab. ?
intrepida, *Greenman, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 567.—Am. cent.
laxifolia, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7477.—Mexic.
Ragusae, *Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 162.—Hab. ?
washingtonensis, *Baker & Rose, ex Rose, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 121.—Mexic. ?
Woodrowi, *W. Watson, in Gard. Chron.* 1899, II. 430.—Hort.

AGELAEA, Soland. (Connar.).
brevipaniculata, *Cummins, in Kew Bull.* 1898, 73.—Afr. trop.
cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 376 A.—Cochinch.
Demeusei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 61.—Afr. trop.
densiflora, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 376 B.—Cochinch.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 190.—Afr. trop.
Duchesnei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* xxxix. 59.—Afr. trop.
fragrans, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 209.—Afr. trop.
Hullettii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 19.—Penins. Mal.
pinnata, *King, l. c.* 18.—Perak.
Preussii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 210.—Afr. trop.

AGERATINA, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 503. *COMPOSITAE*.
goetzeana, *O. Hoffm. l. c.* 504.—Afr. trop.
polyphylla, *O. Hoffm. l. c.* (= *Ageratum polyphyllum*).—Afr. trop.

AGERATUM, Linn. (Compos.).
polyphyllum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.

AGLAIA, Lour. (Meliac.).
acida, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 143.—Java.
aquatica, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 300 (= *Hearnia aquatica*).—Malaya.
Bamleri, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 385.—N. Guin.
barbatula, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 167.—Java.
beccariana, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 298 = Hearnia beccariana.
canariifolia, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.
cauliflora, *Koord. l. c.*—Celebes.
celebica, *Koord. l. c.* 634.—Celebes.
chaudocensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 339 B.—Cochinch.
duperreana, *Pierre, l. c.* 341 B.—Cochinch.
Dyeri, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 634.—Celebes.
dysoxylifolia, *Koord. l. c.*—Celebes.
dysoxyloides, Koord. l. c. = praec.
dysoxylonoides, Koord. l. c. 380 = praec.
euphorioides, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 338 B.—Cochinch.
Eusideroxylon, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 128.—Java.
Helmsleyi, Koord. l. c. 383 = seq.
Hemsleyi, *Koord. l. c.* xix. 635.—Celebes.
heptandra, *Koord. & Valet. l. c.* xvi. 132.—Java.
Hiernii, *Koord. & Valet. ex Koord. l. c.* xix. 381, nomen (non King).—Celebes.
indica, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 300 (= *Beddomea indica*).—Ind. or.
javanica, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 381, nomen.—Celebes.

AGLAIA:—
lancifolia, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 298 = Hearnia lancifolia.
menadonensis, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
Maiae, *Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 350.—Ind. or.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
Montrouzieri, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 340 A (= *Lepidaglaia Montrouzieri*).—Cochinch.
oblonga, *Pierre, l. c.* t. 339 A.—Cochinch.
pleuropteris, *Pierre, l. c.* t. 341 A.—Cochinch.
quocensis, *Pierre, l. c.* t. 337 B.—Cochinch.
ramuensis, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386.—N. Guin.
repoeuensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 340 B.—Cochinch.
Rodatzii, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386.—N. Guin.
sapindina, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 298 (= *Hearnia sapindina*).—Austral.
simplicifolia, *Harms, l. c.* 300 (= *Beddomea simplicifolia*).—Ind. or.
simplicifolia, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386, non alibi.—N. Guin.
Smithii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
splendens, *Koord. & Valet. in Ic. Bogor.* t. 14.—Java.
Stapfii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
tetrapetala, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 337 A (= *Lepidaglaia tetrapetala*).—Cochinch.
unifoliolata, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.

AGLAONEMA, Schott (Arac.).
novoguineense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 22.—N. Guin.
ovatum, *Engl. l. c.* 21.—Cochinch.
philippinense, *Engl. l. c.*—Ins. Philipp.
Treubii, *Engl. l. c.* 22.—Celebes.

AGOSERIS, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).
altissima, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 458.—Am. bor.
carnea, Rydb. l. c.—Am. bor.
dasycarpa, Greene, Pittonia, iii. 26.—Am. bor.
graminifolia, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 124.—Am. bor.
Greenei, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 459.—Am. bor.
Leontodon, Rydb. l. c. 457.—Am. bor.
montana, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 507.—Am. bor.
monticola, Greene, Pittonia, iv. 37.—Am. bor.
pumila, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 457 = T. glaucum.
villosa, Rydb. l. c. 458.—Am. bor.

AGRETTA, Eckl. = **Tritonia**, Ker-Gawl. (Irid.).
grandiflora, Eckl. Verz. 23, nomen = Ixia micrandra.
stricta, Eckl. l. c. = T. scillaris.

AGRIMONIA, Tourn. (Rosac.).
brittoniana, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 510.—Am. bor.
hirsuta, Bickn. l. c. 509 = A. Eupatoria.
orbiculata, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 359.—Eur.

AGROPYRON, J. Gaertn. (Gramin.).
albicans, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 32.—Am. bor.
arizonicum, *Scribn. & J. G. Sm. l. c.* 27.—Am. bor.
brevifolium, *Scribn. l. c.* xi. 55.—Am. bor.
dentatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 370.—Ind. or.
Elmeri, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 54.—Am. bor.
elymoides, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 232.—Reg. Magell.
Gmelini, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 30.—Am. bor.
Jacquemontii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 369.—Ind. or.
lanceolatum, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 34.—Am. bor.
magellanicum, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 331 (= *Triticum magellanicum*).—Reg. Magell.
molle, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 65.—Am. bor.

AGROPYRON:—
Novae-Angliae, *Scribn. in Brain, L. R. Jones & Eggl. Fl. Vermont, fide Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 55.—Am. bor.
Parishii, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 28.—Am. bor.
pseudorepens, *Scribn. & J. G. Sm. l. c.* 34.—Am. bor.
riparium, *Scribn. & J. G. Sm. l. c.* 35.—Am. bor.
sanctum, *Hack. ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 157.—Eur.
Smithii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 64.—Am. bor.
spicatum, Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 33 = Triticum missouricum.
striatum, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 346.—Ind. or.
tetrastachys, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 32.—Am. bor.
Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 370.—Ind. or.
Vaseyi, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 27.—Am. bor.

AGROSTIS, Linn. (Gramin.).
abnormis, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 268 = Deyeuxia abnormis.
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 14.—Chili.
aristulifera, Rendle, in Journ. Bot. 1899, 381 = bergiana.
barbuligera, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 548.—Afr. austr.
bicuspidata, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 264 = Calamagrostis pilosula.
bottnica, *Murb. in Bot. Notiser*, 1898, 13.—Scandinav.
brachiata, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
capensis, Willd. Sp. Pl. i. 372 = Sporobolus indicus.
ciliata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. II. 373 = Calamagrostis pilosula.
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 257.—Ind. or.
continuata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. trop.
curvifolia, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 384 = Achneria curvifolia.
Delfini, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 15.—Chili.
dregeana, Steud. Syn. Pl. Gram. 173 = lachnantha.
Ecklonis, Trin. Agrost. 364 = bergiana.
ericetorum, *Préaub. & Bouv. in Bull. Soc. Sci. Anvers*, n. s. xviii. 86.—Eur.
fertilis, Steud. Syn. Pl. Gram. 170 = Sporobolus indicus.
filiformis, Koen. ex Kunth, Enum. Pl. i. 261 = Cynodon Dactylon.
filipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
fissa, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 289.—Afr. trop.
flaccida, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 649.—Japon.
fuegiana, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 220.—Reg. Magell.
fusca, Heyne, in Wall. Cat. n. 8668 = Arundinella Metzii.
gracilis, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 713.—N. Granat.
griquensis, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. austr.
hookeriana, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
idahoensis, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 42.—Am. bor.
imberbis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 11.—Chili.
kufuim, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 82.—Reg. Magell.
lenta, Ait. Hort. Kew. i. 96 = Digitaria tenuifolia.
macrathera, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 10.—Chili.
melanthes, *R. Phil. l. c.* 17.—Chili.
miliacea, Linn. Sp. Pl. 61 = Oryzopsis miliacea.
monostachya, Poir. Encycl. Suppl. i. 256 = Panicum Myurus.
Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 627.—Patag.
myriantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 257.—Ind. or.
natalensis, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. austr.
Neesii, Trin. Agrost. 361 = lachnantha.
nigritella, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 713.—Ecuador.
oligoclada, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 15.—Chili.
orientalis, Nees, Agrost. Bras. 393 = Sporobolus orientalis.
paludosa, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 49.—Am. bor.
peninsularis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 255.—Ind. or.
phalaroides, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 26.—Afr. austr.

AGROSTIS:—
pilosula, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. II. 372 = Calamagrostis pilosula.
plumosa, Ten. Prod. i. 59 = Tricholaena Teneriffae.
poeppigiana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 13.—Chili.
polypogonoides, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 549.—Afr. austr.
Pringlei, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 156.—Am. bor.
pyrogea, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 83.—Reg. Magell.
rinihuensis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 14.—Chili.
Rosei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 21.—Mexic.
royleana, Trin. Agrost. ii. 125 = alba.
Roylei, Trin. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 264 = Calamagrostis pilosula.
Rura, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3764 B = Sporobolus coromandelianus.
Schlechteri, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 380.—Afr. austr.
scoparia, Koen. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = Arundinella nervosa.
scotantha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 16.—Chili.
Serranoi, *R. Phil. Reconoc. Rio Palena*, 128, *ex Anal. Univ. Chil.* xciv. 12.—Chili.
spicata, Thunb. Prod. 19 = Sporobolus indicus.
stenophylla, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 10.—Chili.
Stuebeli, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 714.—N. Granat.
sylvatica, Torr. Fl. N. Am. i. 87 = Muehlenbergia sylvatica.
tenacissima, Linn. f. Suppl. 107 = Sporobolus orientalis.
triracemosa, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18 = Digitaria tenuiflora.
vaginata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 15.—Chili.
variabilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 32.—Am. bor.
vestita, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 401 = lachnantha.
Volckensii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 289.—Afr. trop.
wallichiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 174 = Calamagrostis pilosula.
Williamsi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 12.—Chili.

AGROSTISTACHYS, Dalz. (Euphorb.).
comorensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 523.—Ins. Comor.

AGROSTOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
brevipes, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 156.—Ind. or.
myrianthum, *King & Pantl. l. c.* 155.—Ind. or.
saccatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 286.—Borneo.

AINSWORTHIA, Boiss. = **Tordylium**, Linn. (Umbellif.).
byzantina, Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 170.—Eur.

AIRA, Linn. (Gramin.).
altaica, Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 8 = Poa persica.
aurea, Steud. in Flora, 1829, 470 = Achneria aurea.
benghalensis, Gmel. Syst. i. 174 = Arundo Donax.
capensis, Steud. in Flora, 1829, 469 = Koeleria cristata.
chinensis, Retz. Obs. iii. 10 = Tricholaena Wightii.
filiformis, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. i. 328 = Leptochloa filiformis.
glauca, Spreng. Nachtr. Bot. Gart. Halle, i. 10 = Koeleria cristata.
indica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 94 = Panicum indicum.
ischoemoides, Koen. ex Kunth, Enum. Pl. i. 127 = Isachne australis.
malatrina, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8675 D = Tragus racemosus.
micans, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 273 = Deschampsia caespitosa.
repens, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8743 A = Panicum trigonum.
triaristata, E. D. Clarke, Trav. ii. 452 = caryophyllea.
spicata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 95 (non ed. I) = Avena subspicata.
subspicata, Linn. Syst. ed. X. 873 = Avena subspicata.
viatica, *Griff. Notul.* iii. 54 (= *Axonopus semialatus*).—Ind. or.

AIROCHLOA, Link = **Koeleria**, Pers. (Gramin.).
Alopecurus, Nees, Fl. Afr. Austr. 424 = K. cristata.
parviflora, Nees, l. c. 425 = K. cristata.
vallesiaca, Link, Hort. Berol. i. 127 = K. cristata.

AIROPSIS, Desv. (Gramin.).
ampla, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 45 = Achneria ampla.
aurea, Nees, in Linnaea, vii. 317 = Achneria aurea.
Steudelii, Nees, l. c. 318 = Achneria capensis.

AIROSPERMA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 1900, 565. *RUBIACEAE.*
psychotrioides, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
ramuensis, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 566.—N. Guin.

AIZOON, Linn. (Ficoid.).
asbestinum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 280.—Afr. austr.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 523.—Afr. austr.

AJUGA, Linn. (Labiat.).
halacsyana, *Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 447.—Eur.
Piskoi, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 414.—Albania.

AKEBIA, Decne. (Berberid.).
longeracemosa, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 18.—Formosa.

ALAFIA, Thou. (Apocyn.).
major, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
microstylis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 230.—Afr. trop.
orientalis, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

ALANGIUM, Lam. (Cornac.).
bussyanum, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= *Marlea bussyana*).—N. Caled.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
Griffithii, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= *Marlea Griffithii*).—Malaya.
kingianum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 294.—Ind. or.
nobile, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= *Marlea nobilis*).—Malaya.
platanifolium, *Harms, l. c.* 261 (= *Marlea platanifolia*).—As. or.

ALBIZZIA, Durazz. (Legum.).
cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 397 A.—Cochinch.
Gamblei, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 513.—Ind. or.
Kalkora, *Prain, l. c.* 511 (= *Mimosa Kalkora*).—As. or.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 417.—Celebes.
Passargei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 253.—Afr. trop.
Pospischilii, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 183.—Afr. trop.
Thorelii, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 399.—Cochinch.
vialeana, *Pierre, l. c.* t. 399 A.—Cochinch.

ALBUCA, Linn. (Liliac.).
Adlami, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
affinis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 251.—Afr. austr.
Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 459.—Afr. austr.
coarctata, Dryand. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. 1784, 295 = minor.
collina, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 461.—Afr. austr.
crinifolia, *Baker, l. c.* 457.—Afr. austr.
Donaldsoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 131.—Afr. trop.
Elliotii, Baker, in Journ. Bot. 1891, 71 = trichophylla.
exuviata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 456.—Afr. austr.
Fleckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 40.—Afr. trop.
hereroensis, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
Lugardi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 533.—Afr. trop.
Macowani, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 461.—Afr. austr.
Melleri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 532.—Afr. trop.

ALBUCA:—
minima, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 455.—Afr. austr.
namaquensis, *Baker, l. c.* 456.—Afr. austr.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
pachychlamys, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 458.—Afr. austr.
polyphylla, Baker, in Journ. Bot. 1874, 367 = Macowani.
prolifera, *Wilson, in Gard. Chron.* 1898, I. 396.—Afr. austr.
Schinzii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 534.—Afr. trop.
tortuosa, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 460.—Afr. austr.

ALCEA, Tourn. = **Althaea**, Tourn. (Malvac.).
thessala, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 197.—Eur.

ALCHEMILLA, Linn. (Rosac.).
acutata, *Buser, in Allg. Bot. Zeitschr.* vi. 57.—Eur.
amphisericea, *Dorfl. ex Schube & Dalla Torre in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. *Gen. Heft* 30.—Eur.
caucasica, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 757.—Rossia.
minutiflora, *Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 141.—Eur.
ocreata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 7.—Am. cent.
retinervis, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 760.—Rossia.
rigida, *Buser, l. c.* 756.—Rossia.
tredecimloba, *Buser, l. c.* 759.—Rossia.
ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 375.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. l. c.*—Afr. austr.
Woodii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 75.—Afr. austr.

ALCHORNEOPSIS, Muell. Arg. (Euphorb.).
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 337.—Ind. occ.

ALDENELLA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 212. *CAPPARIDACEAE.*
tenuifolia, *Greene, l. c.* (= *Polanisia tenuifolia*).—Mexic.

ALECTOROLOPHUS, Hall. = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.).
asperulus, Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 41.—Eur.
borealis, Sterneck, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 25.—Am. bor.
cryptostomus, Borb. in Jahrescat. Wien. Bot. Tauschanst. 1899, 105.—Eur.
patulus, Sterneck, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 433.—Eur.
Sterneckii, Wettst. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 357.—Eur.

ALEPIDA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 110, sphalm. = **Alepidea**, La Roche (Umbellif.).

ALEPIDEA, La Roche (Umbellif.).
aquatica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 110.—Afr. austr.
Baurii, *Kuntze, l. c.* 111.—Afr. austr.
cathcartensis, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
lanceolata, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
moltenensis, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
natalensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 255.—Afr. austr.
setifera, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 161.—Afr. austr.

ALETES, Coult. & Rose (Umbellif.).
Davidsoni, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 107.—Am. bor.
humilis, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.
Macdougali, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.
tenuifolia, *Coult. & Rose, l. c.* 108.—Am. bor.

ALETRIS, Linn. (Haemodor.).
lactiflora, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 200.—China.
lutea, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 278.—Am. bor.
luteo-viridis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 201 (= *Metanarthecium luteo-viride*).—Japon.
pumila, Ait. Hort. Kew. i. 464 = Kniphofia pumila.
revoluta, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 202.—China.
sarmentosa, Andr. Bot. Rep. t. 54 = Kniphofia alooides.
spicata, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 199 (= *Hypoxis spicata*).—As. or.
stenoloba, *Franch. l. c.* 203.—China.

ALGUELAGUEN, Feuill. = **Sphacele**, Benth. (Labiat.).
affine, Auct. in Bull. Herb. Boiss. iv. 957 = S. heteromorpha.

ALGUELAGUEN:—
auriferum, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 108.—Bolivia.
cochabambanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 807 = S. cochabambana.
confusum, Briq. l. c. 806 = S. confusa.
Gaudichaudii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 182 = S. Gaudichaudii.
heteromorpha, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 847 = S. heteromorpha.
Hieronymi, Briq. l. c. 804 = S. Hieronymi.
inflatum, Briq. l. c. 848 = S. inflata.
Jamesonii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 179 = S. Jamesonii.
kuntzeanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 805 = S. kuntzeana.
lindenianum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 180 = S. lindeniana.
mandonianum, Briq. l. c. 176 = S. mandoniana.
Sprucei, Briq. l. c. 178 = S. Sprucei.
Urbani, Briq. l. c. 182 = S. Urbani.

ALIGERA, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. (1897) 145. *VALERIANACEAE.*
ciliosa, *Suksd. l. c.* 146 (= *Valerianella ciliosa*).—Am. bor.
eichleriana, *Suksd. l. c.* 147.—Am. bor.
Grayi, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
insignis, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
Jepsonii, *Suksd. in Erythea*, vi. 24.—Am. bor.
macrocera, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 146 (= *Valerianella macrocera*).—Am. bor.
macroptera, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
mamillata, *Suksd. l. c.* 147.—Am. bor.
minor, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = macrocera.
ostiolatata, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 147.—Am. bor.
rubens, *Suksd. l. c.* 146.—Am. bor.

ALISMA, Dill. (Alism.).
brevipes, *Greene, Pittonia*, iv. 158.—Am. bor.
validum, *Greene, l. c.* iii. 115.—Am. bor.

ALKANNA, Tausch (Borag.).
Shattuckia, *Post, Fl. Syria*, 545.—Syria.

ALLANBLACKIA, Oliver (Guttif.).
Sacleuxii, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 155.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 249.—Afr. trop.
ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 435.—Afr. trop.

ALLEXIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 25. *VIOLACEAE.*
cauliflora, *Pierre, l. c.* (= *Alsodeia cauliflora*).—Afr. trop.

ALLIONIA, Loefl. (Nyctag.).
Bandurriae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 274.—Chili.
diffusa, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud.* ii. 33.—N. Mexic.
violacea, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 296 (= *Oxybaphus violaceus*).—N. Granat.

ALLIUM, Tourn. (Liliac.).
aegaeum, *Heldr. & Halacsy, ex Halacsy in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 195.—Graecia.
aestivale, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 143.—Eur.
allegheniense, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 279.—Am. bor.
arenicola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 506 (non Small).—Am. bor.
arenicola, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 276.—Am. bor.
aristatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 141.—Lesbos.
baissunense, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 140.—As. cent.
Barsczewskii, *Lipsky, l. c.* 114.—As. cent.
Chauveli, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 290.—Lycia.
compactum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 141 (non Thuill.).—Lesbos.
crenulatum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 135.—Am. bor.
dregeanum, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 382.—Afr. austr.
eginense, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 34.—As. Min.

ALLIUM:—
fastigiatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 142.—Lesbos.
fibrosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 188 (non Regel).—Am. bor.
hirtovaginum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 142.—Lesbos.
inutile, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 104.—Japon.
involucratum, *Welw. ex Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 98.—Afr. trop.
janthinum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 191.—As. Min.
Komarowi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 129.—As. cent.
lalesaricum, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 31.—Persia.
ledschanense, *Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 190.—As. Min.
macrantherum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 313.—Parag.
neo-mexicanum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 541.—Am. bor.
ochraceum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 148.—Eur.
peroninianum, *Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 175.—Turcia.
pruinosum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 140.—Lesbos.
recurvatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 94.—Am. bor.
Rouyi, *G. Gautier, in Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 247.—Eur.
rubrum, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 506.—Am. bor.
Schmitzi, *Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 103.—Afr. trop.
simillimum, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 355.—Am. bor.
spathaceum, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 330.—Afr. trop.
Tubergeni, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 32.—As. Min.

ALLOCARYA, Greene = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).
Hendersoni, A. Nelson, in Erythea, vii. 69.—Am. bor.
leptoclada, Greene, Pittonia, iii. 109.—Am. bor.
nitens, Greene, l. c. 108.—Am. bor.
salsa, Brandegee, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 452.—Am. bor.
tenera, Greene, Pittonia, iii. 109.—Am. bor.

ALLOMORPHIA, Blume (Melast.).
alata, *Scort. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 12.—Penins. Mal.
sertulifera, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. 465 = Pomastoma sertuliferum.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 12.—Malaya.

ALLOPHYLUS, Linn. (Sapind.).
acutatus, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 475.—Bras.
Antunesii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 289.—Afr. trop.
calophyllus, *Gilg, l. c.* 291.—Afr. trop.
chrysoneurus, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 479.—Bras.
cinnamomeus, *Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 336.—Bolivia.
congolanus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 294.—Afr. trop.
dasystachys, *Gilg, l. c.* 293.—Afr. trop.
divaricatus, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 493.—Am. austr.
Fischeri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 292.—Afr. trop.
fulvo-tomentosus, *Gilg, l. c.* 293.—Afr. trop.
goetzeanus, *Gilg, l. c.* xxviii. 423.—Afr. trop.
griseo-tomentosus, *Gilg, l. c.* xxiv. 290.—Afr. trop.
hylophilus, *Gilg, l. c.* 294.—Afr. trop.
leptocaulos, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 17.—Afr. trop.
leptostachys, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 489.—Bras.
leucoclados, *Radlk. l. c.* 473.—Bras.
leucophloeus, *Radlk. l. c.* 478.—Bras.
longipetiolatus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 286.—Afr. trop.
macrobotrys, *Gilg, l. c.* 288.—Afr. trop.
macrurus, *Gilg, l. c.* 287.—Afr. trop.
melanophloeus, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 478.—Bras.
membranifolius, *Radlk. l. c.* 492.—Bras.
oreophilus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 289.—Afr. trop.

ALLOPHYLUS:—
peruvianus, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 488.—Peruv.
schirensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 289.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Gilg, l. c.* 286.—Afr. trop.
stachyanthus, *Gilg, l. c.* 292.—Afr. trop.
timboensis, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 326.—Afr. trop.
Volkensii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 290.—Afr. trop.
Welwitschii, *Gilg, l. c.* 287.—Afr. trop.

ALLOPLECTUS, Mart. (Gesner.).
ambiguus, *Urb. Symb. Antill.* i. 408.—Ind. occ.
calochlamys, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 437.—Am. cent.
grandifolius, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 30.—Am. austr.
stenophyllus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 153.—Am. cent.
ventricosus, *Donn. Sm. l. c.* 154.—Am. cent.

ALLOSPONDIAS, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2667 (1900). *ANACARDIACEAE.*
lakonensis, *Stapf, l. c.*—Malaya.

ALNUS, Tourn. (Cupul.).
cremastogyne, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 499.—China.
sinuata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 190.—Am. bor.

ALOCASIA, Neck. (Aroid.).
acuta, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 605 (= *Schizocaesia acuta*).—Malaya.
celebica, *Engl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 299.—Celebes.
cuspidata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 25.—Borneo.
Dahlii, *Engl. l. c.* 24.—N. Brit.
Hollrungii, *Engl. l. c.*—N. Guin.
magnifica, *Engl. l. c.* 23.—N. Guin.
manilensis, *Engl. l. c.*—Ins. Philipp.
Warburgii, *Engl. l. c.* 25.—Ins. Philipp.
wavriniana, *Mast. in Gard. Chron.* 1898, I. 241.—Celebes.

ALOE, Tourn. (Liliac.).
Atherstonei, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. 170 = pluridens.
Bolusii, Baker, l. c. 179 = africana.
borziana, *Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 67.—Afr. trop.
cascadensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 313.—Afr. austr.
claviflora, Burch. Trav. i. 272 = Ecklonis.
concinna, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 461.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 61.—Afr. trop.
depressa, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. 16 = brevifolia.
desmetiana, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 329.—Afr. austr.
elegans, Tod. Ind. Sem. Panorm. 37 = abyssinica.
fulgens, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* ii. 40.—Hort.
macrosiphon, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 459.—Afr. trop.
Marshalli, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 353.—Afr. austr.
megalacantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 469.—Afr. trop.
Menyharthi, *Baker, l. c.* 459.—Afr. trop.
montana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 39.—Afr. trop.
Nuttii, *Baker, in Hook. Ic. Pl.* t. 2513.—Afr. trop.
otallensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 458.—Afr. trop.
Paxii, *Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 68.—Hab. ?
percrassa, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* i. 81.—Afr. trop.
postgenita, Schult. f. Syst. vii. 1714 = brevifolia.
Rivae, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 465.—Afr. trop.
rubro-lutea, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 39.—Afr. trop.
rupestris, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 327.—Afr. austr.
ruspoliana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 460.—Afr. trop.
Schinzii, *Baker, l. c.* 459.—Afr. trop.
somaliensis, *C. H. Wright, ex W. Wats. in Gard. Chron.* 1899, II. 430.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 457.—Afr. trop.

ALOE:—
subferox, Spreng. Syst. ii. 73 = ferox.
subinermis, *Lem. Pl. Grasses*, 24.—Hort.
transvalensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 314.—Transvaal.
Ucriae, *Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 161. —Hort.
virescens, Schult. f. Syst. vii. 637 = albicans.
vittata, Schult. f. l. c. 662 = nigricans.
vituensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 458.—Afr. trop.

ALOMIA, H. B. & K. (Compos.).
Regnellii, *Malme, in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 32.—Bras.

ALOPECURUS, Linn. (Gramin.).
bracteatus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 6.—Chili.
capensis, Thunb. Prod. 19 = Koeleria cristata.
echinatus, Thunb. l. c. = Lasiochloa ciliaris.
elatior, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 238 = arundinaceus.
fulvus, Sm. Engl. Bot. t. 1467 = aristulatus.
himalaicus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 238.—Ind. or.
indicus, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 92 = Pennisetum typhoideum.
navicularis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3780 A = nepalensis.
otiporensis, Griff. Notul. iii. 94 = Phalaris minor.
paludosus, Beauv. ex Mert. & Koch, in Roehl. Deutsch. Fl. i. 481 = aristulatus.
ramosus, Poir. Encyc. viii. 776 = geniculatus.
rubicundus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8646 B = Pennisetum parviflorum.
subaristatus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 66 = aristulatus.
typhoides, Burm. f. Fl. Ind. 27 = Pennisetum typhoideum.

ALOPHIA, Herb. = **Herbertia**, Sweet (Irid.).
brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 305 = H. brasiliensis.
Hauthalii, Kuntze, l. c. 304.—Parag.
pulchella, Kuntze, l. c. = H. pulchella.
unguiculata, Kuntze, l. c. 305 = H. unguiculata.

ALPHONSEA, Hook. f. (Anonac.).
Teysmannii, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 113.—Malaya.

ALPINIA, Linn. (Scitamin.).
Albertisii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 279.—N. Guin.
angustifolia, *K. Schum. l. c.*—Borneo.
arfakensis, *K. Schum. l. c.* 296.—N. Guin.
assimilis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 166. —Penins. Mal.
Blumei, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 282 = alata.
brachypoda, *K. Schum. l. c.* 298.—Borneo.
calycodes, *K. Schum. l. c.* 295.—N. Guin.
cannaefolium, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 174.—Penins. Mal.
chaunocolea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 292.— N. Guin.
chrysorachis, *K. Schum. l. c.* 283.—Celebes.
coeruleo-viridis, *K. Schum. l. c.* 293.—Celebes.
colossea, *K. Schum. l. c.* 289.—N. Guin.
comosa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 170 (non Jacq.).—Penins. Mal.
compta, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 277.—N. Guin.
corallina, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 225.—N. Guin.
crocydocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 281.— Borneo.
cylindrocephala, *K. Schum. l. c.* 297.—Celebes.
cylindrostachys, *K. Schum. l. c.* 299.—Borneo.
densiflora, *K. Schum. l. c.* 292.—N. Guin.
elegans, K. Schum. l. c. 288 = gracilis.
engleriana, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 102.—N. Brit.
eremochlamys, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 288.— Celebes.
euastra, *K. Schum. l. c.* 296.—N. Guin.
eubractea, *K. Schum. l. c.* 289.—Celebes.
eustales, *K. Schum. l. c.* 288.—N. Guin.
flexistamen, *K. Schum. l. c.* 281.—Borneo.
formosana, *K. Schum. l. c.* 283.—Formosa.
glabra, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 168. —Borneo.
grandis, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 103.—N. Brit.
hemisphaerica, D. Dietr. Syn. Pl. i. 13 = Amomum hemisphaericum.

ALPINIA:—
latilabris, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 168.—Penins. Mal.
ligulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 275.— Borneo.
macroscaphis, *K. Schum. l. c.* 284.—Ins. Philipp.
macrostemon, *K. Schum. l. c.* 297.—Sumatra.
macrostephanus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 175 (= *Amomum macrostephanum*).—Penins. Mal.
melanocarpa, *Ridley, l. c.* 163 (= *Hellenia melanocarpa*).—Penins. Mal.
monopleura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 287.— Celebes.
myriocratera, *K. Schum. l. c.* 290.—Ins. Mollucc.
nobilis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 169.—Penins. Mal.
Novae-Pommeraniae, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 285.—N. Brit.
oceanica, *Burkill, in Proc. Camb. Phil. Soc.* ix. II. 93.—N. Brit.
orchioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 278.— N. Guin.
orthostachys, *K. Schum. l. c.* 281.—Celebes.
pelecystyla, *K. Schum. l. c.* 277.—N. Guin.
plectophylla, *K. Schum. l. c.* 273.—N. Guin.
polycarpa, *K. Schum. l. c.* 298.—Borneo.
ptychanthera, *K. Schum. l. c.* 280.—Borneo.
pulchella, *K. Schum. l. c.* 276 (= *Globba pulchella*). —N. Guin.
rosella, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 164.— Penins. Mal.
rubricaulis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 281.— Celebes.
rufa, *K. Schum. l. c.* 293 (= *Hellenia rufa*).—Ins. Philipp.
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 597.—Ins. Samoa.
secundiflora, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 165.—Penins. Mal.
sericiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 294.— Ins. Aru.
stenostachys, *K. Schum. l. c.* 289.—N. Guin.
strobilacea, *K. Schum. l. c.* 295.—N. Guin.
strobilifera, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 225 (non Poepp. & Endl.).—Borneo.
submutica, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 280.— Java.
sumatrana, *K. Schum. l. c.* 291 (= *Strobidia sumatrana*).—Sumatra.
tephrochlamys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 226.—N. Guin.
versicolor, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 280.— Celebes.
vitellina, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 173 (= *Amomum vitellinum*).—Penins. Mal.
Warburgii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 281.— Celebes.

ALSEODAPHNE, Nees (Laurac.).
canescens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 137 (= *Euphoebe canescens*).—Sumatra.
chartacea, *Boerl. l. c.* (= *E. chartacea*).—Java.
cuneata, *Boerl. l. c.* (= *E. cuneata*).—Ins. Malay.
falcata, *Boerl. l. c.* (= *E. falcata*).—Sumatra.
macrophylla, *Boerl. l. c.* (= *E. macrophylla*).—Ins. Malay.
spathulata, *Boerl. l. c.* (= *Nothaphoebe spathulata*). —Java.
superba, *Boerl. l. c.* (= *Euphoebe superba*).—Ins. Malay.

ALSINE, Scop. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.).
americana, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 144.— Am. bor.
brachypetala, Howell, Fl. N. W. Amer. 82 = Stellaria borealis.
calycantha, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 244 = Stellaria borealis.
cymifera, Rouy & Foucaud, Fl. Fr. iii. 275.—Eur.
decumbens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = Stellaria decumbens.
dicranoides, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = Stellaria dicranoides.
filifolia, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 175 = Schimperi.
Hookeri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = Stellaria decipiens.
jamesiana, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Jamesii.

ALSINE:—
laeta, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 144 = Stellaria longipes.
obtusa, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 569 = Stellaria obtusa.
oxyphylla, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Stellaria oxyphylla.
prostrata, A. A. Heller, l. c. ed. I. 3 = Stellaria prostrata.
rupicola, Hiern, in Journ. Bot. 1899, 318 = Spergularia rupestris.
serbica, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 94.—Eur.
serrulata, Form. l. c. xxxiv. 335.—Eur.
Simcoei, Howell, Fl. N. W. Amer. 83.—Am. bor.
uniflora, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. I. 3 = Stellaria uniflora.
washingtoniana, A. A. Heller, l. c. ed. II. 4 = Stellaria washingtoniana.

ALSODEIA, Thou. (Violac.).
Astrolabes, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 451.—N. Guin.
engleriana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 172.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.

ALSODEIOPSIS, Oliver (Olacac.).
oblongifolia, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 226, nomen; *et in Engl. Jahrb.* xxiv. 480. —Afr. trop.
Rowlandii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 479.—Afr. trop.
Schumannii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 226.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 479.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 226, nomen; *et in Engl. Jahrb.* xxiv. 478.—Afr. trop.

ALSOMITRA, M. Roem. (Cucurb.).
pubigera, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 292.— Ind. or.
trifoliolata, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 155 = Hookeri.

ALSTONIA, R. Br. (Apocyn.).
Godeffroyi, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 667.—Ins. Samoa.
somersetensis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.

ALSTROEMERIA, Linn. (Amaryll.).
graminea, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 161.— Chili.
modesta, *R. Phil. l. c.*—Chili.
patagonica, *R. Phil. l. c.* 160.—Chili.
polyphylla, *R. Phil. l. c.*—Chili.
sotoana, *R. Phil. l. c.* 159.—Chili.

ALTERNANTHERA, Forsk. (Amarant.).
asterotricha, *Uline, in Field Columb. Mus. Bot.* i. 419.—Am. cent.
culebrasensis, *Uline, l. c.* 420.—Ind. occ.
Lorentzii, *Uline, l. c.* 421.—Urug.
Morongii, *Uline, l. c.* 418.—Am. austr.
obovata, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 360 = Telanthera obovata.
Reineckii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 151.—Bras.

ALTHOFFIA, K. Schum. (Tiliac.).
pleiostigma, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 435.—N. Guin.
tripyxis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.*— N. Guin.

ALUS, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 236 = **Coris**, Tourn. (Primul.).
mediterranea, Bub. l. c. 237 = C. monspeliensis.

ALVORDIA, Brandegee (Compos.).
fruticosa, *Brandegee, in Erythea*, vii. 5.—Mexic.

ALYSSUM, Tourn. (Crucif.).
arabicum, *Th. Dur. & Schinz, Conspect. Fl. Afr.* i. II. 86 (= *Koniga arabica*).—Aegypt.; Arab.
Arduini, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 253.—Eur.
corymbosoides, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 329.—Eur.
Doerfleri, *Degen, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien*, lxiv. 708.—Eur.

ALYSSUM :—
euboeum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 93.—Graecia.
gracile, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 196.—Eur.
intermedium, *Th. Dur. & Schinz, Conspect. Fl. Afr.* i. II. 87 (= *Lobularia intermedia*).—Ins. Canar.
marginatum, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 88 (= *Koniga marginata*).—Afr. bor. et Ins. Canar.
midzorense, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvi. 89.—Eur.
rhodopense, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 20.—Bulgaria.
rubrivirescens, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 195.—Eur.
taygeteum, *Heldr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlviii. 703.—Eur.
tenium, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 93 (= *Odontarrhena diffusa*).—Eur.
thessalum, *Halacsy, l. c.* 95.—Graecia.
virescens, *Halacsy, l. c.* 94.—Graecia.
xiphocarpum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 153.—Lesbos.

ALYXIA, Banks (Apocyn.).
macrocarpa, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 622.—Celebes.
torulosa, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 12.—Arch. Mal.

AMALOCALYX, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 28. *APOCYNACEAE.*

AMANOA, Aubl. (Euphorb.).
caribaea, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 326.—Ind. occ.

AMARACUS, Gleditsch. = **Origanum**, Linn. (Labiat.).
ciliatus, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III. A. 306 = O. ciliatum.
Haussknechtii, Briq. l. c. = O. Haussknechtii.
leptocladus, Briq. l. c. = O. leptocladum.
libanoticus, Briq. l. c. 305 = O. libanoticum.
pulchellus, Briq. l. c. = O. pulchellum.
pulcher, Briq. l. c. 306 = O. pulchrum.
rotundifolius, Briq. l. c. = O. rotundifolium.
scaber, Briq. l. c. = O. scabrum.
sipyleus, Briq. l. c. 305 = O. sipyleum.
Vetteri, Briq. l. c. 306 = O. Vetteri.

AMARANTHUS, Linn. (Amarant.).
Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 15.—Afr. trop.
Dussii, *Sprenger, in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* 1896, 178.—Ind. occ.
glomeratus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 375.—Austria.
viscidulus, *Greene, Pittonia,* iii. 344.—Am. bor.

AMARYLLIS, Linn. (Amaryll.).
Hallii, Hort. ex Baker, in Bot. Mag. t. 7547 = Lycoris squamigera.

AMBERBOA, Less. = **Volutarella**, Cass. (Compos.).
tubuliflora, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12. (1897) 105 = V. Lippii.

AMBLYANTHUS, A. DC. (Myrsin.).
polyantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 491.—N. Guin.

AMBLYGONOCARPUS, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. (1897) 255. *LEGUMINOSAE.*
Schweinfurthii, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

AMEGHINOA, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 539. *COMPOSITAE.*
patagonica, *Speg. l. c.*—Patag.

AMELANCHIER, Medic. (Rosac.).
Bakeri, *Greene, Pittonia,* iv. 128.—Am. bor.
crenata, *Greene, l. c.* 127.—Am. bor.
cuneata, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 392.—Am. bor.
Cusickii, *Fernald, in Erythea,* 1899, 121.—Am. bor.
Gormanii, *Greene, Pittonia,* iv. 129.—Am. bor.
polycarpa, *Greene, l. c.* 127.—Am. bor.
prunifolia, *Greene, l. c.* 21.—Am. bor.
rubescens, *Greene, l. c.* 128.—Am. bor.
venulosa, *Greene, l. c.*—Am. bor.

AMERIMNON, P. Br. = **Dalbergia**, Linn. (Legum.).
oxyphyllum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 48 = D. oxyphylla.

AMICIA, H. B. & K. (Legum.).
fimbriata, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 49.—Bolivia.
micrantha, *Harms, l. c.*—Bolivia.
parvula, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 23.—Bolivia.

AMMI, Tourn. (Umbellif.).
seubertianum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897, 115.—Ins. Azor.
thracicum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 132.—Bulgaria.
trifoliatum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897, 116.—Ins. Azor.

AMMOCHLOA, Boiss. (Gramin.).
involucrata, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1. (1900) 11.—Marocco.

AMMODENIA, Patrin. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.).
major, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4.—Am. bor.

AMMOSELINUM, Torr. & Gray (Umbell.).
giganteum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 89.—Am. bor.

AMOMUM, Linn. (Scitamin.).
albo-rubellum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 230.—N. Guin.
album, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 318 (= *Elettaria alba*).—Java.
anthoidioides, *Koord. l. c.* (= *Elettaria anthoidioides*).—Java.
apiculatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 315.—Sumatra.
brachychilus, *K. Schum. l. c.* 318, nomen.—Celebes.
brachypodanthum, *K. Schum. l. c.* 316.—Celebes.
calophrys, *K. Schum. l. c.* 314.—Celebes.
chrysocalyx, *K. Schum. l. c.* 308.—Sumatra.
chrysogynium, *K. Schum. l. c.* 322.—Celebes.
cylindraceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 136.—Penins. Mal.
deuteramomum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 313.—Ins. Philipp.
dictyocoleum, *K. Schum. l. c.* 312.—Borneo.
echinosphaera, *K. Schum. l. c.* 322.—Tonkin.
Elliotii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 309.—Afr. trop.
elongatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 303.—Java.
fimbriobractea, *K. Schum. l. c.* 317.—Borneo.
flavo-rubellum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 229.—N. Guin.
flavum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 133.—Penins. Mal.
grandiligulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 308.—Sumatra.
gymnopodum, *K. Schum. l. c.* 320.—Celebes.
hastilabium, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 137.—Penins. Mal.
Havilandii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 303.—Borneo.
heliconiifolium, *K. Schum. l. c.* 319.—Celebes.
hemisphaericum, K. Schum. l. c. 307 = Alpinia hemisphaerica.
kandariense, *K. Schum. l. c.* 323.—Celebes.
lappaceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 134.—Penins. Mal.
Laurentii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 136.—Afr. trop.
laxesquamosum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 315.—Borneo.
longifolium, *K. Schum. l. c.* 318.—N. Guin.
macroglossa, *K. Schum. l. c.* 314.—Borneo.
masuianum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 138.—Afr. trop.
melichroum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 322.—Celebes.
micranthum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 138.—Penins. Mal.
minus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 305 (= *Elettaria minor*).—Java.
nasutum, *K. Schum. l. c.* 320.—Borneo.
ochreum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 135.—Penins. Mal.

AMOMUM :—
oliganthum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 321.—Borneo.
padangense, *K. Schum. l. c.* 318.—Sumatra.
paludosum, *K. Schum. l. c.* 305 (= *Elettaria paludosa*).—Java.
pausodipsus, *K. Schum. l. c.* 313, nomen.—Celebes.
penicellatum, *K. Schum. l. c.* 304.—Celebes.
perakense, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 135.—Penins. Mal.
phaeochranum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 304.—Borneo.
polycarpum, *K. Schum. l. c.* 312.—Celebes.
pyramidosphaera, *K. Schum. l. c.* 306.—Borneo.
reticulatum, *K. Schum. l. c.* 303.—Borneo.
rubrum, *K. Schum. l. c.* 317 (= *Alpinia rubra*).—Malaya.
sarasinorum, *K. Schum. l. c.* 316.—Celebes.
sarawacense, *K. Schum. l. c.* 304.—Borneo.
solare, *K. Schum. l. c.* 308 (= *Elettaria solaris*).—Java.
stenophyllum, *K. Schum. l. c.* 319.—Celebes.
stenosiphon, *K. Schum. l. c.* 320.—Borneo.
stoloniflorum, *K. Schum. l. c.* 322.—Borneo.
surculosum, *K. Schum. l. c.* 323.—Borneo.
testaceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 135.—Penins. Mal.
trachycarpum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 316.—N. Guin.
trianthemum, *K. Schum. l. c.* 321.—Celebes.
validum, *K. Schum. l. c.* 314.—Sumatra.
vestitum, *K. Schum. l. c.* 319.—Sumatra.
warburgianum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 230.—N. Guin.
zambesiacum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 309.—Afr. trop.

AMOORA, Roxb. (Meliac.).
gigantea, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 343 A.—Cochinch.
oligosperma, *Pierre, l. c.* t. 345 A.—Cochinch.
trichanthera, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 123.—Java.

AMPELOPSIS, Rich. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).
Graebneri, Bolle, in Wittm. Gartenfl. t. 1462.—Hort.
megalophylla, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. 466.—China.
mirabilis, Diels & Gilg, l. c. 465.—China.

AMPHIBLEMMA, Naud. (Melastom.).
wildemannianum, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. 22.—Afr. trop.

AMPHIDONAX, Nees = **Arundo**, Linn. & **Zenkeria**, Trin. (Gramin.).
bifaria, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 410 = A. Donax.
Heynii, Nees, in Wight, Cat. n. 1747 = Z. elegans.
obtusiflora, Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 370 = Z. obtusiflora.
tenella, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 97 = Z. elegans.

AMPHIDOXA, DC. (Compos.).
glandulosa, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 832.—Afr. austr.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.).
Blanchetii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 210 (= *Aplolophium Blanchetii*).—Bras.
pannosum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 209 (= *Bignonia pannosa*).—Bras.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.).
humilis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8905 D = Gracilea royleana.

AMPHISTELMA, Griseb. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).
ephedroides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 174 = Metastelma ephedroides.
graminifolium, Griseb. l. c. = Metastelma bonplandianum.

AMPHITHALEA, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
sericea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 440.—Afr. austr.
speciosa, *Schlechter, l. c.* 441.—Afr. austr.
villosa, *Schlechter, l. c.* xxvii. 142.—Afr. austr.

AMPHORCHIS, Thou. Orch. Iles Afr. Tabl. Synopt. 1822. *ORCHIDEAE.*
occidentalis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 139.—Afr. trop.

AMSINCKIA, Lehm. (Borag.).
arenaria, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
carnosa, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 35.—Am. bor.
hispidissima, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
maritima, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 110.—Am. bor.
micrantha, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 134.—Am. bor.
retrorsa, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
St. Nicolai, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 109.—Am. bor.

AMYRIS, P. Br. (Burser.).
Humboldtii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 607.—Am. trop.
trimera, *Krug & Urb. l. c.* 610.—N. Granat.

ANACARDIUM, Linn. (Anacard.).
corymbosum, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 10.—Bras.

ANACOLOSA, Blume (Olacin.).
arborea, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 9.—Java.
celebica, *Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 391.—Celebes.

ANACYCLUS, Linn. (Compos.).
Freyni, *Porta & Rgo. ex Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto*, Ser. III. ii. (1896) 213.—Eur.

ANAGALLIDASTRUM, Mich. = **Centunculus**, Linn. (Primul.).
exiguum, Bub. Fl. Pyren. i. 238 = C. minimus.

ANAGALLIS, Tourn. (Primul.).
hispanica, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 58.—Eur.
longicaulis, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 166.—Eur.

ANAPHALIS, DC. (Compos.).
subalpina, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 415.—Am. bor.

ANARRHINUM, Desf. (Scrophul.).
demnatense, *Coss. Illustr. Fl. Atlant.* t. 152.—Marocco.

ANARTHROPHYLLUM, Benth. (Legum.).
Beaufilsii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 50.—Patag.
Morenonis, *Kuntze, l. c.*—Patag.
Toninii, *Kuntze, l. c.*—Patag.

ANASTRAPHIA, D. Don (Compos.).
northropiana, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, vii. 435.—Cuba.

ANATHERUM, Beauv. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
parviflorum, Spreng. Syst. i. 290 = A. micranthus.

ANAXAGOREA, St. Hil. (Anonac.).
ramiflora, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 110.—Borneo.

ANCHOMANES, Schott (Aroid.).
giganteus, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 419.—Afr. trop.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 88.—Afr. trop.

ANCHUSA, Linn. (Borag.).
macedonica, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 197.—Bulgaria.
ottomanum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 176.—Eur.

ANCISTRANTHUS, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 225. *ACANTHACEAE.*
harpochiloides, *Lindau, l. c.* 226 (= *Jacobinia harpochiloides*).—Cuba.

ANCISTROCHILUS, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 44 (1897). *ORCHIDEAE.*
thomsonianus, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.

ANCYLOBOTHRYS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 91. *APOCYNACEAE.*
amoena, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 186.—Afr. trop.
mammosa, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 92.—Afr. trop.

ANCYLOBOTHRYS:—
petersiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 91 (= *Landolphia petersiana*).—Afr. trop.
pyriformis, *Pierre, l. c.* 126, *fide K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 519.—Afr. trop.
robusta, *Pierre, l. c.* 92.—Afr. trop.
robusta, *Pierre, l. c.* 128 (*non Pierre l. c.* 92), *fide K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 519.—Afr. trop.
rotundifolia, *Pierre, l. c.* 92.—Afr. trop.

ANCYLOCLADUS, Wall. = **Willughbeia**, Roxb. (Apocyn.).
Beccarii, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 98.—Malaya.
cochinchinensis, Pierre, l. c. 97 = W. cochinchinensis.
curtisianus, Pierre, l. c. 96.—Malaya.
glaucinus, Pierre, l. c. 98.—Malaya.
minutiflorus, Pierre, l. c. 95.—Malaya.
nodosus, Pierre, l. c. 96.—Malaya.
sarawhaensis, Pierre, l. c.—Malaya.
vriesianus, Pierre, l. c. 95.—Java.

ANDREA, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. (1896) 114. *BROMELIACEAE.*
sellowiana, *Mez, l. c.* 115 (= *Quesnelia selloana*).—Bras.

ANDROCYMBIUM, Willd. (Liliac.).
albomarginatum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 415.—Afr. austr.
crispum, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
latifolium, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
natalense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 519.—Afr. austr.
striatum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 336 = melanthioides.
subulatum, Baker, in Journ. Bot. 1874, 245 = melanthioides.

ANDROLEPIS, Brongn. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
Donnell-Smithii, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 161—A. Donnell-Smithii.

ANDROPOGON, Linn. (Gramin.).
acicularis, Willd. Sp. Pl. iv. 906 = aciculatus.
aciculatus, *Retz. Obs.* v. 22.—As. trop.; Austral.; Polynes.
adscendens, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8906 = Garnotia stricta.
Allioni, DC. Fl. Fr. iii. 97 = contortus.
alternans, J. Presl, Rel. Haenk. i. 342 = micranthus.
altissimus, Hochst. in Flora, 1841, 277 = rufus.
aristulatus, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = wightianus.
armatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 197.—Ind. or.
Arriani, Hook. f. l. c. 203 = Ariani.
arundinaceus, Scop. Fl. Carn. ed. II. 274 = halepensis.
ascinodis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. 87 = apricus.
asper, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 189.—Ind. or.
assimilis, *Steud. in Zoll. Syst. Verz.* 58; *Syn. Pl. Gram.* 397.—As. or.
asthenos, Steud. Syn. Pl. Gram. 376 = Ischaemum timorense.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 77.—Oriens; Afr. trop.
auctus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 357.—Afr. austr.
avenaceus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 189 = halepensis.
axilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 166, sphalm. = exilis.
Bakeri, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 39.—Am. bor.
Beckettii, Thwaites, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 244 = Garnottia Fergussonii.
Bellardi, Bub. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. 317 = contortus.
besukiensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = contortus.
binatus, Retz. Obs. vi. 21 = Ischaemum augustifolium.
bootanensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 166.—Ind. or.
Brandisii, Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. II. 4 = Coelarthron Brandisii.
breviaristatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = wightianus.
brunneus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 109 = Pollinia articulata.
brunneus, Heyne, l. c. 112 = Pollinia phaeothrix.
Buchananii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 362.—Afr. austr.
campyloracheus, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.

ANDROPOGON:—
capillaceus, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 179 = assimilis.
capillaris, Heyne, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 116 = Arundinella mutica.
capillipes, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.
cernuus, Roxb. Fl. Ind. i. 270 = A. Sorghum.
Chrysopogon, Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 157 = Cymbopogon Welwitschii.
ciliolatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = monticola.
circinnatus, Hochst. & Steud. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 387 = A. Iwarancusa.
coerulescens, Kunth, Rev. Gram. i. 504 = micranthus.
coeruleus, Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = monticola.
coloratus, Nees, ex Wight, Cat. n. 1703 = A. Nardus.
commutatus, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. 191 = A. Iwarancusa.
compressus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 172.—Ind. or.
concanensis, *Hook. f. l. c.* 174.—Ind. or.
contortus, *Linn. Sp. Pl.* ii. 1045.—Reg. calid.
controversus, Steud. Syn. Pl. Gram. 391 = halepensis.
cotulifer, Thunb. Fl. Jap. 41 = Spodiopogon cotulifer.
crinitum, Thunb. l. c. 40 = Pogonatherum crinitum.
curvatus, Russ. ex Wall. Cat. n. 8809 A = caricosus.
cuspidatus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 456 = Arthraxon ciliare.
demissus, Steud. Syn. Pl. Gram. 388 = pumilus.
distans, *Nees, ex Steud. l. c.* 387.—Ind. or.
distichophyllus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 191.—Ind. or.
diversifolius, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 148.—Afr. trop.
dregeanus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 112.—Afr. austr.
dubitatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 394 = halepensis.
echinatus, Steud. l. c. 395 = A. Gryllus.
ensiformis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 175.—Ind. or.
epiphyllus, Wall. Cat. n. 8667 A = Arundinella brasiliensis.
eriocoleus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 329.—Afr. trop.
eriophorus, Willd. Sp. Pl. iv. 90 = A. Iwarancusa.
fasciculatus, Linn. Sp. Pl. 1047 = Pollinia ciliare.
festucaeformis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 145.—Afr. trop.
filiculmis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 181.—Ind. or.
filipendulinus, Steud. Syn. Pl. Gram. 389 = filipendulus.
finitimus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 465 = filipendulus.
floridanus, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 145.—Am. bor.
Foulkesii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 174.—Ind. or.
gangeticus, Hack. in DC. Phan. vi. Monogr. 539 = fasciculatus.
geminatus, Russ. ex Wall. Cat. n. 8798 C = pumilus.
glabratus, Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = A. Gryllus.
glaucopsis, Steud. l. c. 397 = assimilis.
glaucus, Retz. Obs. v. 20 = Apluda varia.
Grayia, Steud. Nom. ed. II. i. 91 = Sphaerocaryum elegans.
Griffithii, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 209 = filipendulus.
Gryllus, *Linn. Cent. Pl.* ii. 33.—Reg. calid.
guineensis, *Beauv. & Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 99.—Afr. trop.
gyrans, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* 1898, 113.—Am. bor.
Hackelii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 194.—Ind. or.
halepensis, *Brot. Fl. Lusit.* i. 89.—Reg. calid.
Hamiltoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 190.—Ind. or.
heteroclitus, Nees, Fl. Afr. Austr. 115 = Pseudanthistiria heteroclita.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 146.—Afr. trop.
increscens, Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = monticola.
intonsus, Nees, Fl. Afr. Austr. 114 = A. Cymbarius.
involutus, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum augustifolium.
ischynanthus, Steud. l. c. 367 = triticeus.
Iwarancusa, *Jones, in Asiat. Research.* iv. 109.—Oriens; Afr. bor.
javanicus, Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = aciculatus.
Kelleri, *Hack. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 6.—Afr. trop.
lancearius, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 190.—Ind. or.
lanceolatus, Baker, Fl. Maurit. 144 = Arthraxon ciliare.
laniger, Desf. Fl. Atlant. ii. 379 = A. Iwarancusa.
Lawsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 187.—Ind. or.
laxus, Roxb. Fl. Ind. i. 271 = halepensis.
Lehmannii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 24.—N. Granat.

ANDROPOGON:—
lepidus, Nees, Fl. Afr. Austr. 113 = A. Cymbarius.
leptostachyus, Benth. in Hook. Niger Fl. 571 = hirtiflorus.
liananthus, Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = triticeus.
Lindmani, *Hack. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 6.—Bras.
linnaeanus, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 40.—Am. bor.
lopollensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 143.—Afr. trop.
marginatus, Steud. in Flora, 1829, 472 = A. Nardus.
melanocarpus, *Ell. Sketch*, i. 146.—Reg. calid.
messanensis, Biv. ex Parl. Fl. Ital. i. 148 = contortus.
micans, Steud. Syn. Pl. Gram. 382 = Arthraxon ciliare.
micranthus, *Kunth, Rev. Gram.* i. 165.—Geront. trop.
microtheca, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 208.—Ind. or.
miliaceus, Roxb. Fl. Ind. i. 272 = halepensis.
miliformis, Schult. Mant. ii. 448 = halepensis.
minutissimus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 147 = Arthraxon sp.
mississippiensis, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 40.—Am. bor.
monomeros, Hochst. in Hohen. Pl. Ind. Or. n. 183 = Pseudanthistiria heteroclita.
montanus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 267.—Ind. or.
monticola, *Schult. Mant.* iii. 665.—Geront. subtrop.
muralis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8828 = Arthraxon microphyllus.
neomexicanus, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 83.—Am. bor.
nigrum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8777 E = serratus.
nitidulus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 199.—Ind. or.
nodulibarbis, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = zeylanicus.
notopogon, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum angustifolium.
obscurus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 330.—Afr. trop.
obvallatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum angustifolium.
Olivieri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 76 = A. Iwarancusa.
oryzetorum, Hack. in DC. Monogr. Phan. vi. 477 = pseudoischaemum.
pachyarthrus, Hack. l. c. 449 = pumilus.
pallidus, Kunth, Rev. Gram. i. 165 = A. Gryllus.
paniculatus, Lam. Fl. Fr. ed. II. iii. 633 = A. Gryllus.
parvispica, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = micranthus.
pectinatus, Steud. l. c. 369 = Eremochloa muricata.
peninsulae, Steud. l. c. 396 = zeylanicus.
pentastachyus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8815 A = pseudoischaemum.
petiolaris, Steud. Syn. Pl. Gram. 398 = Ischaemum petiolare.
petiolatus, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 303 = Ischaemum petiolare?
pilifer, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum pilosum.
pilosus, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iv. 920 = Ischaemum pilosum.
piptatherus, Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. II. 4 = cordylotrichus.
pleiarthron, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 364.—Afr. austr.
plurinodis, *Stapf, l. c.* 353.—Afr. austr.
polyphyllus, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 194.—Ind. or.
polystachyos, *Roxb. Fl. Ind.* i. 261.—Ind. or.
polystichus, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 369 = melanocarpus.
Pospischilii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 328.—Afr. trop.
Pringlei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 7.—Mexic.
pseudograya, Steud. Syn. Pl. Gram. 365 = hirtiflorus.
pseudohirtus, Steud. in Flora, 1829, 471 = A. Nardus.
pubescens, Visiani, in Flora, 1829, I. Erg. 3 = hirtus.
quinqueflorus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 172 = pseudoischaemum.
Ritchiei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 201.—Ind. or.
royleanus, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = A. Gryllus.
rupestris, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 327.—Afr. trop.
saccharatus, Roxb. Fl. Ind. i. 271 = A. Sorghum.
Schmidii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 180.—Ind. or.
scribnerianus, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 432.—Am. bor.
scrobiculatus, Kunth, Enum. Pl. i. 507 = melanocarpus.
segaensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = melanocarpus.
semiberbis, Kunth, Enum. Pl. i. 489 = hirtiflorus.

ANDROPOGON:—
serratifolius, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8771 B = Anthistiria Cymbaria.
serratus, Miq. Prol. Fl. Jap. i. 192 = micranthus.
Sorghum, *Brot. Fl. Lusit.* i. 88.—Reg. calid.
spectabilis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 328.—Afr. trop.
Sprengelii, Kunth, Rev. Gram. i. 166 = monticola.
squarrosus, Linn. Herb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 62 = Chamaeraphis spinescens.
Stapfii, *Hook. f. l. c.* 184.—Ind. or.
subrepens, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = assimilis.
subulatus, Presl, Rel. Haenk. i. 341 = aciculatus.
textilis, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 144.—Afr. trop.
Thwaitesii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 243.—Zeylan.
thymiodorus, Steud. Syn. Pl. Gram. 365 = Elionurus argenteus.
timorensis, Steud. l. c. 376 = Ischaemum timorense.
tolimensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 23.—N. Granat.
Tracyi, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 433.—Am. bor.
transvaalensis, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 363.—Afr. austr.
trichopus, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 287.—Afr. trop.
tridentatus, Roxb. Fl. Ind. i. 261 = Lophopogon tridentatum.
Trinii, Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = monticola.
triticeus, *R. Br. Prod.* 201.—Malaya; Austral.
umbrosus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 467 = A. Cymbarius.
undatus, Jacq. Coll. iii. 237 = Oplismenus compositus.
Usorum, Steud. Syn. Pl. Gram. 392 = A. Sorghum.
velutinus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 194.—Ind. or.
verticillatus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 263.—Ind. or.
villosulus, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = micranthus.
wightianus, *Steud. l. c.* 395.—Ind. or.
Woodrovii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 173.—Ind. or.
zeylanicus, Arn. ex Benth. Fl. Hongk. 423 = hirtiflorus.
zeylanicus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 397.—Ind. or.

ANDROSACE, Tourn. (Primul.).
arguta, *Greene, Pittonia*, iv. 148.—Am. bor.
asprella, *Greene, l. c.* 150.—Am. bor.
capillaris, *Greene, l. c.* 148.—Am. bor.
diffusa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 318.—Am. bor.
fragilis, *Duthie, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 675.—Ind. or.
Gormanii, *Greene, Pittonia*, iv. 149.—Am. bor.
Harrissii, *Duthie, in Rec. Bot. Surv. India*, i. 161.—Ind. or.
pinetorum, *Greene, Pittonia*, iv. 149.—Am. bor.
subumbellata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 319.—Am. bor.

ANDROSCEPIA, Brongn. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).
glabrata, Anderss. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 216 = A. Hookeri.
mutica, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. 243 = A. gigantea.

ANDRYALA, Linn. (Compos.).
Chevallieri, *Barratti, ex L. Chevall. in Mém Herb. Boiss.* no. 7. 10.—Afr. bor.

ANEILEMA, R. Br. (Commelin.).
acutifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 217.—N. Guin.
fasciatum, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 218.—N. Guin.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. 63.—Afr. trop.
protensum, *Wall. Cat.* n. 5218.—Zeylan.

ANEMAGROSTIS, Trin. = **Apera**, Adans. (Gramin.).
neesiana, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = Arundinella nervosa.

ANEMONE, Linn. (Ranunc.).
Barneoudia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 1 (= *Barneoudia chilensis*).—Chili.
californica, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 423.—Am. bor.
Kostyczewi, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. IV. 87.—Turkestan.
nigricans, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 218 = pratensis.

ANEMONE:—
riparia, *Fernald, in Rhodora*, 1899, 51.—Am. bor.
sarracenensis, *Deysson & Cassat, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1899, 195.—Gallia.
seravschanica, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 49.—Turkestan.
soyensis, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 590.—Japon.

ANEMOPAEGMA, Mart. (Bignon.).
bifarium, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 124 = brevipes.
brachycalyx, *Bureau & K. Schum. l. c.* 145 (= *Bignonia brachycalyx*).—Bras.
carrerense, *Armit. in Journ. Bot.* 1898, 188.—Ind. occ.
Chaimberlaynii, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 128 = racemosum.
cupulatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 146 (= *Bignonia cupulata*).—Guiana.
foetidum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 143.—Bras.
goyazense, *K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 407.—Bras.
gracile, *Bureau & K. Schum. l. c.* 132.—Bras.
hilarianum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 124.—Bras.
jucundum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 144 (= *Petastoma jucundum*).—Guiana.
Karstenii, *Bureau & K. Schum. l. c.* 130.—Venez.
microcalyx, *Bureau & K. Schum. l. c.* 134 (= *Bignonia microcalyx*).—Guiana.
nigrescens, *Bureau & K. Schum. l. c.* 125.—Bras.
pachyphyllum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 126.—Bras.
paraense, *Bureau & K. Schum. l. c.* 131.—Bras.
robustum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 123 (= *Bignonia robusta*).—Guiana.
subundulatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 133.—Bras.

ANERINCLEISTUS, Korth. (Melast.).
floribundus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* n. s. lxix. II. 17.—Penins. Mal.
glomeratus, *King, l. c.* 18.—Borneo.
macranthus, *King, l. c.* 15.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 16.—Penins. Mal.
sublepidotus, *King, l. c.* 17.—Penins. Mal.

ANGELICA, Riv. (Umbellif.).
ampla, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 375.—Am. bor.
dissoluta, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 499.—China.
Grayi, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 154 (= *Selinum Grayi*).—Am. bor.
involucellata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 501.—China.
Kingii, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 158 (= *Selinum Kingii*).—Am. bor.
laxifoliata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 499.—China.
megaphylla, *Diels, l. c.* 500.—China.
polycarpa, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 148.—Am. cent.
roseana, *Hend. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 201.—Am. bor.
trifoliata, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 425 (= *Ligusticum trifoliolatum*).—N. Zel.
valida, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 501.—China.

ANGELONIA, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).
linarioides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 451.—Bras.

ANGELOPOGON, Poepp. = **Myzodendron**, Banks & Soland. (Santal.).
linearifolium, Poepp. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 558 = M. linearifolium.

ANGOPHORA, Cav. (Myrtac.).
melanoxylon, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 85.—Austral.

ANGRAECOPSIS, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 171. *ORCHIDEAE.*
tenerrima, *Kraenzl. l. c.*—Afr. trop.

ANGRAECUM, Bory (Orchid.).
affine, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
anocentrum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 342.—Afr. trop.
apiculatum, Hook. Bot. Mag. t. 4159 = bilobum.
arcuatum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 136 = Listrostachys chailluana.
ashantense, Lindl. Bot. Reg. 1843, Misc. 56 = Listrostachys ashantensis.

ANGRAECUM:—
Batesii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 139.—Afr. trop.
caespitosum, *Rolfe, l. c.* 150.—Afr. trop.
calanthum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 283, nomen.—Afr. trop.
capitatum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 137 = Listrostachys capitata.
caudatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1844 = Listrostachys caudata.
chailluanum, Hook. f. Bot. Mag. t. 5589 = Listrostachys chailluana.
clandestinum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 206 = Listrostachys clandestina.
clavatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop.
cornigerum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 418.—Bourbon.
curvipes, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 283, nomen.—Afr. trop.
Dives, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 142.—Afr. trop.
distichum, Lindl. Bot. Reg. t. 1781 = Mystacidium distichum.
eichlerianum, *Kraenzl. in Berl. Gart. Zeit.* i. (1882) 434.—Afr. trop.
exile, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 418.—Bourbon.
filifolium, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 284, nomen.—Afr. trop.
filipes, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.
flabelliforme, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 135.—Afr. trop.
Flanagani, *Bolus, Orchid. S. Afr.* t. 52.—Afr. austr.
flexuosum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 139.—Afr. trop.
Fournierae, *André, in Rev. Hortic.* 1896, 256.—Madag.
glomeratum, Ridl. in Gard. Chron. 1885, II. 678 = Listrostachys glomerata.
Grantii, *Batem. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. 153.—Afr. trop.
ichneumoneum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 136 = Listrostachys ichneumonea.
infundibulare, Lindl. l. c. = Mystacidium infundibulare.
Kirkii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 136.—Afr. trop.
kotschyanum, *Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1864, 338.—Afr. trop.
Kotschyi, Reichb. f. in Gard. Chron. 1880, II. 456 = kotschyanum.
lagosense, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop.
marcrorhynchum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 284, nomen.—Afr. trop.
micropetalum, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.
Moloneyi, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop.
mombasense, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
monodon, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. 102 = Listrostachys monodon.
occidentale, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 142.—Afr. trop.
pachyurum, *Rolfe, l. c.* 138.—Afr. trop.
pellucidum, Lindl. Bot. Reg. 1844, t. 2 = Listrostachys pellucida.
penicillatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 417.—Bourbon.
pertusum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 205 = Listrostachys pertusa.
plehnianum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 285, nomen.—Afr. trop.
rhipsalisocium, Reichb. f. in Flora, 1865, 189 = Listrostachys rhipsalisocia.
rhodostictum, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 154.—Afr. trop.
rohlfsianum, *Kraenzl. in Berl. Gart. Zeit.* i. (1882) 341.—Afr. trop.
scandens, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 285, nomen.—Afr. trop.
subulatum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 206 = Listrostachys subulata.
Thomsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 143.—Afr. trop.
trachyrrhizum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 343.—Afr. trop.
tridens, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 135 = Mystacidium tridens.
vagans, Lindl. l. c. = Listrostachys vagans.
vesicatum, Lindl. Bot. Reg. 1843, Misc. 6 = Listrostachys vesicatum.
Wakefieldii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 146.—Afr. trop.

ANGRAECUM:—
woodianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 343.—Afr. trop.

ANGYLOCALYX, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 172. *LEGUMINOSAE.*
ramiflorus, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
schumannianus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 278.—Afr. trop.

ANILA, Ludw. = **Indigofera**, Linn. (Legum.).
Kuntzei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 51 = I. Kuntzei.
Kurtzii, Kuntze, l. c. = I. Kurtzii.
pretoriana, Kuntze, l. c. 52 = I. pretoriana.
tinctoria, Kuntze, l. c. 51 = I. Anil.

ANISACANTHUS, Nees (Acanth.).
Malmei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 662.—Parag.
Pohlii, *Lindau, l. c.* 663.—Bras.

ANISEIA, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
syringifolia, Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 38.—Bras.

ANISOCARPUS, Nutt. = **Madia**, Molina (Compos.).
radiatus, Greene, Fl. Francisc. 416 = M. radiata.
Rammii, Greene, l. c. 415 = M. Rammii.
yosemitanus, Greene, l. c. 416 = M. y semitana.

ANISOCHILUS, Wall. (Labiat.).
Engleri, Briq. in Engl. Jahrb. xix. 190 = africanus.

ANISOPHYLLEA, R. Br. (Rhizophor.).
apetala, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 323.—Perak.
Cabole, *Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xvii. 85.—Afr. trop.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 326.—Penang.
quangensis, *Engl. ex Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xvi. 76.—Afr. trop.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 325.—Perak.
Sororia, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1230.—Afr. trop.

ANISOSTIGMA, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) App. III. 79. *FICOIDEAE.*
Schenckii, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.

ANISOTES, Nees (Acanth.).
sessiliflorus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 226.—Afr. trop.
Zenkeri, *C. B. Clarke, l. c.* 227.—Afr. trop.

ANISOTHRIX, O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 129 (1898). *COMPOSITAE.*
Kuntzei, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. austr.

ANNESLIA, Salisb. = **Calliandra**, Benth. (Legum.).
brevipes, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 7. 50 = C. brevipes.
Chapadae, Lindm. l. c. 51 = C. Chapadae.
myriophylla, Lindm. l. c. = C. myriophylla.
turbinata, Lindm. l. c. 50 = C. turbinata.
Tweediei, Lindm. l. c. 51 = C. Tweediei.

ANOECTOCHILUS, Blume (Orchid.).
Elwesii, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 297 (= *Odontochilus Elwesii*).—Ind. or.
geniculata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 406.—Penins. Mal.
sikkimensis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 124.—Reg. Himal.
tortus, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 298 (= *Odontochilus tortus*).—Ind. or.

ANOGRA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
Buffumi, Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 267.—Am. bor.
californica, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 176 = O. californica.
deltoidea, Small, l. c. 174 = O. deltoidea.
gypsophylla, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 8.—Am. bor.
neomexicana, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 176.—Am. bor.
rhizomata, Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 240.—Am. bor.
simplex, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 175 = O. ambigua.
trichocalyx, Small, l. c. 174 = O. trichocalyx.
xylocarpa, Small, l. c. = O. xylocarpa.

ANOMATHECA, Ker-Gawl. = **Lapeyrousia**, Pourr. (Irid.).
angolensis, Baker, in Journ. Bot. 1876, 337 = L. Monteiroi.
cruenta, Lindl. Bot. Reg. t. 1369 = L. cruenta.
grandiflora, Baker, in Journ. Bot. 1876, 337 = L. grandiflora.

ANOMOTASSA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 730. *ASCLEPIADACEAE.*
macrantha, *K. Schum. l. c.*—Ecuador.

ANONA, Linn. (Anonac.).
aurantiaca, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 5.—Bras.
cearaensis, *Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 3.—Bras.
cuyabaensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 3.—Bras.
geraensis, *Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 1.—Bras.
Heinsenii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 300.—Afr. trop.
Laurentii, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
macrocarpa, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 1.—Bras.
malmeana, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5. 44.—Bras.
Pittieri, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 389.—Am. cent.
Prestoei, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2519–20.—Am. trop
Zenkeri, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 300.—Afr. trop.

ANONIDIUM, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 56. *ANONACEAE.*
Laurentii, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Anona Laurentii*).—Afr. trop.
Mannii, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Anona Mannii*).—Afr. trop.

ANOPYXIS, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. II. (1900) 49. *RHIZOPHORACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* (= *Macarisia klaineana*).—Afr. trop.

ANPLECTRUM, A. Gray (Melast.).
anomalum, *King & Stapf, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. II. 58.—Penins. Mal.
lepidotosetosum, *King, l. c.* 56.—Penins. Mal.

ANTENNARIA, Gaertn. (Compos.).
aizoides, *Greene, Pittonia*, iii. 283.—Am. bor.
alsinoides, *Greene, l. c.* iv. 83.—Am. bor.
ambigens, *Fernald, in Rhodora*, i. 150.—Am. bor.
anaphaloides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 409.—Am. bor.
angustata, *Greene, Pittonia*, iii. 284.—Am. bor.
angustifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 546.—Am. bor.
aprica, *Greene, Pittonia*, iii. 282.—Am. bor.
arida, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 210.—Am. bor.
arnoglossa, *Greene, Pittonia*, iii. 318.—Am. bor.
borealis, *Greene, l. c.* iv. 85.—Am. bor.
bracteosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 413.—Am. bor.
Brainerdii, *Fernald, in Rhodora*, i. 153.—Am. bor.
calophylla, *Greene, Pittonia*, iii. 347.—Am. bor.
campestris, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor.
canadensis, *Greene, Pittonia*, iii. 275.—Am. bor.
confinis, *Greene, l. c.* iv. 40.—Am. bor.
corymbosa, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 212.—Am. bor.
decipiens, *Greene, Pittonia*, iii. 278.—Am. bor.
exilis, *Greene, l. c.* 288.—Am. bor.
fallax, *Greene, l. c.* 321.—Am. bor.
Farwellii, *Greene, l. c.*—Am. bor.
flavescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 411.—Am. bor.
foliacea, *Greene, Pittonia*, iii. 279.—Am. bor.
fusca, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 121.—Am. bor.
glabrata, *Greene, Pittonia*, iii. 285.—Am. bor.
Holmii, *Greene, l. c.* iv. 81.—Am. bor.
Howellii, *Greene, l. c.* iii. 174.—Am. bor.
imbricata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 211.—Am. bor.
insularis, *Greene, Pittonia*, iii. 276.—Am. bor.
lanata, *Greene, l. c.* 288.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* 276.—Am. bor.
marginata, *Greene, l. c.* 290.—Am. bor.

ANTENNARIA:—
media, *Greene, Pittonia*, iii. 282.—Am. bor.
microphylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 303.—Am. bor.
monocephala, *Greene, Pittonia*, iii. 176.—Am. bor.
mucronata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 209. —Am. bor.
nardinae, *Greene, Pittonia*, iv. 82.—Am. bor.
neglecta, *Greene, l. c.* iii. 173.—Am. bor.
nemoralis, *Greene, l. c.* iv. 41.—Am. bor.
neodioica, *Greene, l. c.* iii. 184.—Am. bor.
nitida, *Greene, l. c.* 283.—Am. bor.
oblanceolata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 409.—Am. bor.
oblancifolia, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 121.—Am. bor.
obovata, *E. Nelson, l. c.* xxvii. 213.—Am. bor.
occidentalis, *Greene, Pittonia*, iii. 322.—Am. bor.
Parlinii, *Fernald, in Gard. & For.* x. 284.—Am. bor.
pedicellata, *Greene, Pittonia*, iii. 175.—Am. bor.
petaloidea, *Fernald, in Rhodora*, 1899, 73.—Am. bor.
Petasites, *Greene, Pittonia*, iii. 277.—Am. bor.
propinqua, *Greene, l. c.* iv. 83.—Am. bor.
pulcherrima, *Greene, l. c.* iii. 176.—Am. bor.
pulvinata, *Greene, l. c.* 287.—Am. bor.
recurva, *Greene, l. c.* 290.—Am. bor.
reflexa, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 208.—Am. bor.
rosea, *Greene, Pittonia*, iii. 281.—Am. bor.
rosulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 300.—Am. bor.
rupicola, *Fernald, in Rhodora*, 1899, 74.—Am. bor.
scariosa, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 210.—Am. bor.
solitaria, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor.
sordida, *Greene, Pittonia*, iv. 81.—Am. bor.
suffrutescens, *Greene, l. c.* iii. 277.—Am. bor.
umbrinella, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 302. —Am. bor.

ANTHAENANTIA, Beauv. (Gramin.).
columbiensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Panicum columbiense*).—N. Granat.
gigantea, *K. Schum. l. c.* (= *Panicum giganteum*).—Bolivia.
hagenbeckiana, *K. Schum. l. c.* (= *Panicum hagenbeckianum*).—Am. austr.

ANTHAGATHIS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 195 (1897). *LEGUMINOSAE.*
monadelphia, *Harms, l. c.* 196.—Afr. trop.

ANTHEMIS, Mich. (Compos.).
Gaudium-solis, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 150.—Bulgaria.
grangeoides, *Vatke & Hoepfner, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 465.—Afr. trop.
Halacsyi, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 55.—Eur.
rouana, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 164.—Eur.
Stribrnyi, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxxvii. 6.—Eur.

ANTHEPHORA, Schreb. (Gramin.).
cristata, *Hack. ex Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. i. 60.—Afr. trop.
pubescens, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 74.—Afr. austr.
undulatifolia, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 12.—Afr. austr.

ANTHERICUM, Linn. (Liliac.).
Bachmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 315.—Afr. austr.
Bolusii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 385.—Afr. austr.
brachypodum, *Baker, l. c.* 389.—Afr. austr.
Buchanani, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 486.—Afr. trop.
Cameroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 314 = triflorum.
capitatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
carnosum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 296 = Bulbinella carnosa.
chlamydophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 389.—Afr. austr.
ciliatum, Spreng. Syst. ii. 84 = Sprengeli.
congolense, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. 60.—Afr. trop.
contortum, Linn. f. Suppl. 202 = Caesia Thunbergii.
dregeanum, Baker, in Journ. Bot. 1872, 139 = Caesia dregeana.
Drimiopsis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 301 = Dasystachys Drimiopsis.

ANTHERICUM:—
elongatum, *Willd. Sp. Pl.* ii. 136.—Afr. austr.
flavoviride, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 490.—Afr. trop.
flexifolium, Jacq. Coll. Suppl. 93 = elongatum.
Galpini, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 385.—Afr. austr.
jacquinianum, Roem. & Schult. Syst. vii. 462 = elongatum.
Jamesii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 490.—Afr. trop.
kemoense, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 19 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.).—Afr. trop.
Kunthii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 392.—Afr. austr.
malosanum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
matabelense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 484. —Afr. trop.
multisetosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 386.—Afr. austr.
nataglencoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 314.—Natal.
nervosum, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 18 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.).—Afr. trop.
nudicaule, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
papillosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 360.—Afr. trop.
Pappei, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 388.—Afr. austr.
patulum, *Baker, l. c.* 386.—Afr. austr.
pilosum, *Baker, l. c.* 395 (non Jacq.).—Afr. austr.
polyphyllum, *Baker, l. c.* 383.—Afr. austr.
platyphyllum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 473.—Mexic.
pumilum, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 20 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.).—Afr. trop.
robustum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 386.—Afr. austr.
Saundersiae, *Baker, l. c.* 384.—Afr. austr.
serpentinum, *Baker, l. c.* 387.—Afr. austr.
Sprengeli, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 127.—Bolivia.
subcontortum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 390.—Afr. austr.
tabulare, *Baker, l. c.* 391.—Afr. austr.
tortifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 315.—Afr. austr.
transvaalense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
trichophlebium, *Baker, l. c.* 382.—Afr. austr.
triphyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 485.—Afr. trop.
ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 360.—Afr. trop.
usseramense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 486.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
Zeyheri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 298 = Caesia eckloniana.

ANTHISTIRIA, Linn. (Gramin.).
arguta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 401 = Iseilema arguta.
heteroclita, Roxb. Fl. Ind. i. 249 = Pseudanthistiria heteroclita.
Hookeri, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 91.—Reg. Himal.
latifolia, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. ii. 562 = Andropogon Cymbarius.
laxa, *Anderss. in Nov. Act. Upsal.* Ser. III. ii. 243.—Ind. or.
linneana, Steud. Syn. Pl. Gram. 401 = Iseilema Wightii.
prostrata, Willd. Sp. Pl. iv. 901 = Iseilema Wightii.
semiberbis, Nees, Fl. Afr. Austr. 125 = ciliata.
strigosa, *Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 214.—Ind. or.
Thwaitesii, *Hook. f. l. c.* 215.—Ind. or.
Wightii, Nees, in Steud. Syn. Pl. Gram. 400 = Iseilema Wightii.

ANTHOBEMBIX, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 567. *MONIMIACEAE.*
hospitans, *Perkins, l. c.* (= *Kibara hospitans*).—N. Guin.
oligantha, *Perkins, l. c.* 568.—N. Guin.

ANTHOCARAPA, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 343 (1896). *MELIACEAE.*
balansana, *Pierre, l. c.* (= *Amoora balansana*).—Cochinch.
Vieillardi, *Pierre, l. c.* (= *Amoora Vieillardi*).—Cochinch.

ANTHOCEPHALUS, A. Rich. (Rubiac.).
macrophyllus, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 23 (= *Nauclea macrophylla*).—Arch. Mal.

ANTHOCHLOA, Nees & Meyen (Gramin.).
colusana, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 221 (= *Neostapfia colusana*).—Am. bor.

ANTHOCHORTUS, Endl. = **Antochortus**, Nees (Restiac.).

ANTHOCLEISTA, Afzel. (Logan.).
kamerunensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 125.—Afr. trop.
lanceolata, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 96.—Afr. trop.
Zenkeri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 124.—Afr. trop.

ANTHOLYZA, Linn. (Irid.).
Duftii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 13.—Afr. austr.
pulchrum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 531.—Afr. austr.
spectabilis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 13.—Afr. trop.
watsonioides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 376. —Afr. trop.

ANTHOSPERMUM, Linn. (Rubiac.).
ericifolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 117 = A. Lichtensteinii.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 342.—Afr. austr.
ternatum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 499.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, l. c.* 500.—Afr. trop.

ANTHOXANTHUM, Linn. (Gramin.).
dregeanum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 466.—Afr. austr.
Ecklonii, *Stapf, l. c.*—Afr. austr.
madagascariense, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 287.—Madag.
Tongo, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 466.—Afr. austr.

ANTHRISCUS, Bernh. (Umbellif.).
hispanicus, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 183.—Eur.

ANTHURIUM, Schott (Arac.).
acutangulum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 371.—Am. cent.
acutifolium, *Engl. l. c.* 365.—Am. cent.
acutissimum, *Engl. l. c.* 398.—Ecuador.
andinum, *Engl. l. c.* 405.—Ecuador.
angosturense, *Engl. l. c.* 378.—N. Granat.
angustilaminatum, *Engl. l. c.* 411.—Ecuador.
angustisectum, *Engl. l. c.* 391.—N. Granat.
aureum, *Engl. l. c.* 414.—N. Granat.
barbadosense, *Engl. l. c.* 404.—Ind. occ.
Buenaventurae, *Engl. l. c.* 363.—N. Granat.
buganum, *Engl. l. c.* 425.—N. Granat.
bulaoanum, *Engl. l. c.* 432.—Ecuador.
calense, *Engl. l. c.* 440.—N. Granat.
Caramantae, *Engl. l. c.* 424.—N. Granat.
coerulescens, *Engl. l. c.* 446.—Ecuador.
columbianum, *Engl. l. c.* 379.—N. Granat.
cordatum, Engl. l. c. 368 = cordifolium.
costaricense, *Engl. l. c.* 398.—Am. cent.
crassipes, *Engl. l. c.* 400.—Bras.
crassivenium, *Engl. l. c.* 390.—N. Granat.
cubense, *Engl. l. c.* 364.—Ind. occ.
cuenzanum, *Engl l. c.* 449.—Ecuador.
cundinamarcense, *Engl. l. c.* 446.—N. Granat.
daguense, *Engl. l. c.* 422.—N. Granat.
deflexum, *Engl. l. c.* 397.—N. Granat.
densinervium, *Engl. l. c.* 386.—Am. cent.
Donnell-Smithii, *Engl. l. c.* 389.—Am. cent.
Durandii, *Engl. l. c.* 401.—Am. cent.
Dussii, *Engl. l. c.* 403.—Ind. occ.
ecuadorense, *Engl. l. c.* 408.—Ecuador.
Eggersii, *Engl. l. c.* 405.—Ecuador.
Eichleri, *Engl. l. c.* 396.—Bras.
eximium, *Engl. l. c.* 412.—Am. cent.
filiforme, *Engl. l. c.* 376.—N. Granat.
firmum, *Engl. l. c.* 460.—Am. cent.
flavoviride, *Engl. l. c.* 447.—N. Granat.
fortinense, *Engl. l. c.* 366.—Mexic.
funiferum, *Klotzsch & Karst. ex Engl. l. c.* 381.—N. Granat.
giganteum, *Engl. l. c.* 448.—Ecuador.
gracile, Engl. l. c. 370 = rudgeanum.
gracillimum, *Engl. l. c.* 371.—N. Granat.
gualeanum, *Engl. l. c.* 424.—Ecuador.
guanacense, *Engl. l. c.* 444.—N. Granat.
guayaquilense, *Engl. l. c.* 373.—Ecuador.
hacumense, *Engl. l. c.* 363.—Am. cent.

ANTHURIUM:—
Hieronymi, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 386.—Ecuador.
incurvatum, *Engl. l. c.* 445.—Ecuador.
incurvum, *Engl. l. c.* 433.—N. Granat.?
insculptum, *Engl. l. c.* 413.—Bras.
inzanum, *Engl. l. c.* 450.—N. Granat.
karstenianum, *Engl. l. c.* 383.—N. Granat.
Lehmannii, *Engl. l. c.* 429.—N. Granat.
Lievenii, *Regel, ex Engl. l. c.* 388.—Hab.
lindmannianum, *Engl. l. c.* 367.—Bras.
linearifolium, *Engl. l. c.* 370.—N. Granat.
littorale, *Engl. l. c.* 405.—Am. cent.
longegeniculatum, *Engl. l. c.* 379.—N. Granat.
longicaudatum, *Engl. l. c.* 388.—Ecuador.
longicuspidatum, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
longilaminatum, *Engl. l. c.* 399.—Bras.
longipetiolatum, *Engl. l. c.* 400.—Bras.
longistamineum, *Engl. l. c.* 439.—N. Granat.
Mendonçai, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
monticolum, *Engl. l. c.* 387.—N. Granat.
Mourai, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
multinervium, *Engl. l. c.* 389.—N. Granat.
napaeum, *Engl. l. c.* 407.—Ecuador.
nicolasianum, *Engl. l. c.* 433.—Ecuador.
nigrescens, *Engl. l. c.* 441.—N. Granat.
nitidulum, *Engl. l. c.* 397.—Bras.
nobile, *Engl. l. c.* 366.—Bras.
obtegens, *Engl. l. c.* 443.—N. Granat.
ochraceum, *Engl. l. c.* 438.—N. Granat.
organense, *Engl. l. c.* 415.—Bras.
orteganum, *Engl. l. c.* 387.—N. Granat.
ovatifolium, *Engl. l. c.* 437.—Ecuador.
pallatangense, *Engl. l. c.* 385.—Ecuador.
pallidiflorum, *Engl. l. c.* 395.—Ecuador.
paludosum, *Engl. l. c.* 401.—N. Granat.
paraguayense, *Engl. l. c.* 361.—Parag.
pergamentaceum, *Engl. l. c.* 442.—N. Granat.
peripense, *Engl. l. c.* 412.—Ecuador.
Pichinchae, *Engl. l. c.* 426.—Ecuador.
Pittieri, *Engl. l. c.* 372.—Am. cent.
pulchrum, *Engl. l. c.* 449.—Ecuador.
punctatum, *Engl. l. c.* 404.—Ecuador.
ranchoanum, *Engl. l. c.* 421.—Am. cent.
rigidifolium, *Engl. l. c.* 444.—Ecuador.
rivulorum, *Engl. l. c.* 443.—N. Granat.
rubriflorum, *Engl. l. c.* 399.—Bras.
sarmentosum, *Engl. l. c.* 375.—Ecuador.
Seleri, *Engl. l. c.* 459.—Am. cent.
silvicolum, *Engl. l. c.* 402.—N. Granat.
sodiroanum, *Engl. l. c.* 412.—Ecuador.
Stuebelii, *Engl. l. c.* 391.—N. Granat.
subandinum, *Engl. l. c.* 377.—Ecuador.
subcaudatum, *Engl. l. c.* 427.—N. Granat.
subcoerulescens, *Engl. l. c.* 391.—Ecuador.
subdeltoideum, *Engl. l. c.* 451.—Ecuador.
sulcatum, *Engl. l. c.* 402.—Am. cent.
supianum, *Engl. l. c.* 438.—N. Granat.
Talamancae, *Engl. l. c.* 386.—Am. cent.
tenerum, *Engl. l. c.* 377.—N. Granat.
tenuicaule, *Engl. l. c.* 381.—Ecuador.
tenuifolium, *Engl. l. c.* 413.—Ecuador.
theresipolitanum, *Engl. l. c.* 415.—Bras.
Tonduzii, *Engl. l. c.* 376.—Am. cent.
torresianum, *Engl. l. c.* 428.—Am. cent.
triangulum, *Engl. l. c.* 383.—Am. cent.
truncicolum, *Engl. l. c.* 452.—Ecuador.
tsakianum, *Engl. l. c.* 423.—Am. cent.
Tuerckheimii, *Engl. l. c.* 380.—Guatem.
turrialbense, *Engl. l. c.* 406.—Am. cent.
umbricolum, *Engl. l. c.* 407.—N. Granat.
velutinum, *Engl. l. c.* 433.—N. Granat.?
viridescens, *Engl. l. c.* 423.—N. Granat.
Wullschlaegelii, *Engl. l. c.* 434.—Ind. occ.
yarumalense, *Engl. l. c.* 441.—N. Granat.

ANTIARIS, Lesch. (Urtic.).
zeylanica, Seem. in Bonplandia, x. (1862) 4, in nota = toxicaria.

ANTIDAPHNE, Poepp. & Endl. (Loranth.).
Fendleri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 138 (= *Stachyphyllum Fendleri*).—Venez.

ANTIDESMA, Burm. (Euphorb.).
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.
polyanthum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 392.—N. Guin.
Staudtii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 327.—Afr. trop.

ANTIRRHINUM, Tourn. (Scrophul.).
arvense, Bub. Fl. Pyren. i. 324 = A. Orontium.
pulverulentum, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 164.—Eur.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. i. 324 = majus.

ANTIRRHOEA, Comm. (Rubiac.).
acutata, Urb. Symb. Antill. i. 439 = viscosa.
coriacea, *Urb. l. c.* 436 (= *Guettarda coriacea*).—Ind. occ.
jamaicensis, Urb. l. c. 435 = bifurcata.
mucronata, *Urb. l. c.* 440.—Ind. occ.
obtusifolia, *Urb. l. c.* 435.—Ind. occ.
radiata, *Urb. l. c.* (= *Stenostemon radiatum*).—Ind. occ.
Sintenisii, *Urb. l. c.* 438.—Ind. occ.
tenuiflora, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

ANTOCHORTUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 451 (1836). *RESTIACEAE.*
Ecklonii, *Nees, l. c.*—Afr. austr.

ANTROCARYON, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 23. *ANACARDIACEAE.*
klaineanum, *Pierre, l. c.* 24.—Afr. trop.

ANUBIAS, Schott (Aroid.).
auriculata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 423.—Afr. trop.
nana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

APALATOA, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legum.).
chrysantha, Pierre, Fl. Cochinch. t. 384.—Cochinch.
delagoensis, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 10. 39.—Afr. austr.

APHANIA, Blume = **Sapindus**, Linn. (Sapind.).
golungensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 170.—Afr. trop.

APHANOMIXIS, Blume = **Amoora**, Roxb. (Meliac.).
amboinensis, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 296 = A. amboinensis.
borneensis, Harms, l. c. = A. borneensis.
cochinchinensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 343 B.—Cochinch.
cumingiana, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 296 = A. cumingiana.
Lauterbachii, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 383.—N. Guin.
macrocalyx, Harms, l. c. 384.—N. Guin.
myrmecophila, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 296 = A. myrmecophila.

APHANOMYRTUS, Miq. (Laurac.).
camphorata, *Valet. in Ann. Jard. Buitenz. Suppl.* II. 149.—Java.
octandra, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 5.—Java.

APHANOPAPPUS, Endl. = **Lipochaeta**, DC. (Compos.).
micranthus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 914 = L. micrantha.

APHANOPLEURA, Boiss. (Umbellif.).
capillifolia, *Lipsky, in Bull. Acad. Sci. Pétersb.* Sér. V. iv. 379.—As. cent.
leptoclada, *Lipsky, l. c.* 377.—As. cent.

APHANOSTYLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 89. *APOCYNACEAE.*
exserens, *Pierre, l. c.* 90 (= *Carpodinus exserens*).—Afr. trop.
flavidiflora, *Pierre, l. c.* (= *Carpodinus flavidiflora*).—Afr. trop.
laxiflora, *Pierre, l. c.* (= *Carpodinus laxiflora*).—Afr. trop.
leptantha, *Pierre, l. c.* 89 (= *Carpodinus leptantha*).—Afr. trop.
Mannii, *Pierre, l. c.* (= *Clitandra Mannii*).—Afr. trop.
pyramidata, *Pierre, l. c.*—Hab.?

APHELANDRA, R. Br. (Acanth.).
Blandii, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 656.—N. Granat.
castanaefolia, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 76.—Bolivia.
dolichantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 438.—Am. cent.
impressa, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 657.—Venez.
kolobantha, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 39.—Bolivia.
Rusbyi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 77.—Bolivia.

APHYLLORCHIS, Blume (Orchid.).
alpina, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 261.—Ind. or.
parviflora, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 128.—Reg. Himal.

APINELLA, Neck. = **Trinia**, Hoffm. (Umbellif.).
glauca, Druce, Fl. Berks. 235 = T. vulgaris.

APIOS, Moench (Legum.).
priceana, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 451.—Am. cent.

APIUM, Tourn. (Umbellif.).
dissectum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 185 (= *Petroselinum dissectum*).—N. Granat.
fernandezianum, *Johow, Estud. Fl. Juan Fernandez*, 101.—Ins. Juan Fernandez.
Ikenoi, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 185 (= *Apodicarpum Ikenoi*).—Japon.
Lingula, *Drude, l. c.* (= *Oreosciadium Lingula*).—N. Granat.
seubertianum, Koehne, in Just, Jahresb. xxv. II. 454, sphalm. = Ammi seubertianum.
trifoliatum, Koehne, l. c. sphalm. = Ammi trifoliatum.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 344 = graveolens.

APLOPAPPUS, Cass. (Compos.).
insecticruris, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 346.—Am. bor.
laceratus, *Hend. l. c.* 347.—Am. bor.
MacLeanii, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 448.—Am. bor.

APLUDA, Linn. (Gramin.).
aristata, Linn. Cent. ii. 7 = varia.
ciliata, Anderss. in Oefver. Vet. Acad. Stockh. 1855, 177 = varia.
communis, Nees & Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 194 = varia.
geniculata, Roxb. Fl. Ind. i. 327 = varia.
gigantea, Spreng. Syst. i. 290 = varia.
Gryllus, Beauv. Agrost. 133 = varia.
microstachya, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 194 = varia.
mutica, Linn. Sp. Pl. 82 = varia.
rostrata, Arn. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 194 = varia.
rugosa, Russ. ex Wall. Cat. n. 8864 A = Ischaemum rugosum.
scabra, Anderss. in Oefver. Vet. Acad. Stockh. 1855, 179 = varia.
villosa, Schreb. Graes. ii. 92 = varia.

APOCOPIS, Nees (Gramin.).
pallida, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 143.—Ind. or.

APOCYNUM, Tourn. (Apocyn.).
album, *Greene, Pittonia*, iii. 230.—Am. bor.
medium, *Greene, l. c.* 229.—Am. bor.
nemorale, *G. S. Mill. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 87.—Am. bor.
speciosum, *G. S. Mill. l. c.* 83.—Am. bor.
urceolifer, *G. S. Mill. l. c.* 85.—Am. bor.

APODYTES, E. Mey. (Olacin.).
javanica, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 3.—Java.

APONOGETON, Linn. f. (Naiad.).
desertorum, Zeyher, ex Steud. Nom. ed. II. i. 114 = kraussianum.
kraussianum, *Hochst. ex Krauss, in Flora*, 1845, 343.—Afr. austr.
leptostachyum, E. Meyer, ex Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. 158 = kraussianum.
Loriae, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iii. 472.—N. Guin.

APOROSA, Blume (Euphorb.).
Minabassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.

APORRHIZA, Radlk. (Sapind.).
multijuga, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 306.—Afr. trop.
urophylla, *Gilg, l. c.* 305.—Afr. trop.

APPENDICULA, Blume (Orchid.).
calcarata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 302.—Borneo.
complanata, *Ridley, l. c.* xxxii. 389.—Penins. Mal.

APPENDICULA :—
frutex, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 302.—Malaya.
longipedunculata, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 132.—Celebes.
lucida, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 392.—Penins. Mal.
rupestris, *Ridley, l. c.* 391.—Penins. Mal.
uncata, *Ridley, l. c.* 390.—Penins. Mal.

APTANDRA, Miers (Olacin.).
Zenkeri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 147.—Afr. trop.

APTERANTHES, Miq. = **Boucerosia**, Wight & Arn. (Asclep.).
europaea, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiv. Afd. II. no. 7. (1898) 2 = B. Gussoniana.

APTOSIMUM, Burch. (Scrophul.).
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 171.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 755.—Afr. trop.

AQUILARIA, Lam. (Thymel.).
tomentosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 145.—N. Guin.

AQUILEGIA, Tourn. (Ranunc.).
akitensis, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1090.—Japon.
australis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 466.—Am. bor.
coccinea, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 280.—Am. bor.
Darwazi, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* ix. 401.—Turkestan.
depauperata, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 1.—Am. bor.
elegantula, *Greene, Pittonia*, iv. 14.—Am. bor.
lamariensis, *Nelson, First Rep. Fl. Wyom.* 78.—Am. bor.
saximontana, *Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 481.—Ins. Union.

ARABIS, Linn. (Crucif.).
albertina, *Greene, Pittonia*, iv. 196.—Am. bor.
arenicola, *Gelert, in Bot. Tidsskr.* 1898, 290 (= *Parrya arenicola*).—Am. arct.
arida, *Greene, Pittonia*, iv. 190.—Am. bor.
atriflora, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 211.—Am. bor.
Bourgovii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 186.—Am. bor.
brebneriana, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 373.—Am. bor.
campyloloba, *Greene, Pittonia*, iv. 192.—Am. bor.
carnulosa, *Tscherning, in Delect. Pl. Jurjev.* 1900, 42.—Austria.
connexa, *Greene, Pittonia*, iv. 197.—Am. bor.
consanguinea, *Greene, l. c.* 190.—Am. bor.
Crandallii, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 135.—Am. bor.
densicaulis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 190.—Am. bor.
dispar, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 41.—Am. bor.
divaricarpa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 193.—Am. bor.
Doerfleri, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 51.—Graecia.
drepanoloba, *Greene, Pittonia*, iii. 306.—Am. bor.
duriuscula, *Greene, l. c.* iv. 191.—Am. bor.
elegans, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 192.—Am. bor.
eremophila, *Greene, Pittonia*, iv. 194.—Am. bor.
exilis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 123.—Am. bor.
Fauriei, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 787.—Japon.
Fendleri, *Greene, Pittonia*, iii. 156.—Am. bor.
formosa, *Greene, l. c.* iv. 198.—Am. bor.
fruticosa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 190.—Am. bor.
glauca, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 786.—Japon.
glaucovalvula, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 40.—Am. bor.
gracilenta, *Greene, Pittonia*, iv. 194.—Am. bor.
graciliceps, *Greene, l. c.* 193.—Am. bor.
karategina, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 5.—As. cent.
Koehleri, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 44.—Am. bor.
lignifera, *Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 123.—Am. bor.

ARABIS :—
lignipes, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 191.—Am. bor.
magellanica, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 177 (= *Sisymbrium magellanicum*).—Reg. Magell.
maxima, *Greene, Pittonia*, iv. 192.—Am. bor.
oxylobula, *Greene, l. c.* 195.—Am. bor.
oxyphylla, *Greene, l. c.* 196.—Am. bor.
pendulocarpa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 192.—Am. bor.
platyloba, *Greene, Pittonia*, iv. 198.—Am. bor.
pseudoauriculata, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 787.—Japon.
recondita, *Greene, Pittonia*, iv. 195.—Am. bor.
rectissima, *Greene, l. c.* 191.—Am. bor.
rhodantha, *Greene, l. c.* iii. 155.—Am. bor.
sogdiana, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 89.—Turkestan.
Suksdorfii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 43.—Am. bor.
tenuis, *Greene, Pittonia*, iv. 189.—Am. bor.

ARACHIS, Linn. (Legum.).
Hagenbeckii, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 52.—Parag.

ARAGALLUS, Neck. Elem. Bot. iii. 12 = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
acutirostris, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = A. acutirostris.
albiflorus, A. Nelson, in Erythea, 1899, 62.—Am. bor.
alpicola, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 252.—Am. bor.
arcticus, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis arctica*).—Geront. arct.
argophyllus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 255.—Am. bor.
Bellii, Greene, Pittonia, iii. 212 (= *Spiesia Bellii*).—Am. bor.
Besseyi, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 250.—Am. bor.
Bigelovii, Greene, Pittonia, iii. 212.—Am. bor.
Blankinshipii, A. Nelson, in Erythea, 1899, 58.—Am. bor.
campestris, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis campestris*).—Reg. bor. temp. et arct.
caudatus, Greene, l. c. iv. 69.—Am. bor.
collinus, A. Nelson, in Erythea, 1899, 57.—Am. bor.
deflexus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 (= *Oxytropis deflexa*).—Reg. bor. temp. et arct.
dispar, A. Nelson, in Erythea, 1899, 61.—Am. bor.
foetidus, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis foetida*).—Eur.
foliolosus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 256 (= *Oxytropis foliolosa*).—Am. bor.
gracilis, A. Nelson, in Erythea, 1899, 60.—Am. bor.
grandiflorus, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis grandiflora*).—As. bor.
inflatus, A. Nelson, in Erythea, 1899, 59 (= *Oxytropis podocarpa*).—Am. bor.
involutus, A. Nelson, l. c. 64.—Am. bor.
johannensis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7.—Am. bor.
Lagopus, Greene, Pittonia, iii. 212 (= *Oxytropis Lagopus*).—Am. bor.
Lamberti, Greene, l. c. (= *Oxytropis Lambertii*).—Am. bor.
leucanthus, Greene, l. c. 211 (= *Oxytropis leucantha*).—As. bor.
mertensianus, Greene, l. c. (= *Oxytropis mertensiana*). Fret. Behring.
montanus, Greene, l. c. 210 (= *Oxytropis montana*).—Eur.
monticola, Greene, l. c. 212 (= *Oxytropis monticola*).—Am. bor.
multiceps, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 (= *Oxytropis multiceps*).—Am. bor.
nanus, Greene, Pittonia, iii. 212 (= *Oxytropis nana*).—Am. bor.
nigrescens, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 (= *Oxytropis nigrescens*).—Reg. bor.
nothoxys, A. A. Heller, l. c. (= *A. nothoxys*).—Am. bor.
oreophilus, A. Nelson, in Erythea, 1899, 59 (= *Oxytropis oreophila*).—Am. bor.
Parryi, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis Parryi*).—Mexic.
pinetorum, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 548.—Am. bor.

ARAGALLUS :—
Richardsonii, Greene, Pittonia, iv. 69.—Am. bor.
saximontanus, A. Nelson, in Erythea, 1900, 190 = albiflorus.
sericeus, Greene, Pittonia, iii. 212 (= *Oxytropis sericea*).—Am. bor.
songaricus, Greene, l. c. 211 (= *Oxytropis songarica*).—As. bor.
splendens, Greene, l. c. (= *Oxytropis splendens*).—Am. bor.
spicatus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 251 = albiflorus.
uralensis, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis uralensis*).—Eur. et As. bor.
verticillaris, Greene, l. c. (= *Oxytropis verticillaris*).—As. bor.
viscidulus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 253.—Am. bor.
viscidus, Greene, Pittonia, iii. 211 (= *Oxytropis viscida*).—Reg. bor. temp. et arct.

ARALIA, Tourn. (Aral.).
atropurpurea, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 301.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 302.—China.
glabra, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 17.—Japon.
Henryi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 12 (15 Sept. 1896).—China.
pilosa, Franch. in Journ. de Bot. 1896, 302 (16 Sept. 1896) = Henryi.
stipulata, *Franch. l. c.* 304.—China.
tomentella, *Franch. l. c.*—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 303—China.

ARALIOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 175. *RUTACEAE*.
Soyauxii, *Engl. l. c.* 177.—Afr. trop.

ARBUTUS, Tourn. (Ericac.).
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 7 = A. Unedo.

ARCEUTHOBIUM, Bieb. (Loranth.).
Juniperi, Bub. Fl. Pyren. i. 131 = A. Oxycedri.

ARCHIDENDRON, F. Muell. (Legum.).
chrysocarpum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 344.—N. Guin.
glabrum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 343 (= *Hansemannia glabra*).—N. Guin.
incurvatum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 344.—N. Guin.
kubaryanum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* (= *Pithecolobium kubaryanum*).—N. Guin.

ARCHIPHYLLUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 557. *SANTALACEAE*.
brachystachyum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron brachystachyum*).—Reg. Magell.
macrophyllum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron macrophyllum*).—Chili.
oblongifolium, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron oblongifolium*).—Chili.

ARCHONTOPHOENIX, H. Wendl. & Drude (Palm.).
Jardinei, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 129.—Austral.

ARCION, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 123 = **Arctium**, Linn. (Compos.).
majus, Bub. l. c. 124 = A. majus.
minus, Bub. l. c. 125 = A. minus.
tomentosum, Bub. l. c. 124 = A. majus.

ARCTERANTHIS, Greene, Pittonia, iii. (1897) 190. *RANUNCULACEAE*.
Cooleyae, *Greene, l. c.* (= *Ranunculus Cooleyae*).—Am. sept.

ARCTOSTAPHYLOS, Adans. (Ericac.).
canescens, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 84.—Am. bor.
glandulosa, *Eastw. l. c.* 82.—Am. bor.
montana, *Eastw. l. c.* 83.—Am. bor.

ARCTOTIS, Linn. (Compos.).
parvifolia, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 218.—Afr. austr.

ARCYTOPHYLLUM, Willd. = **Mallostoma**, Karst. (Rubiac.).
lavarum, K. Schum. ex Donn. Sm. Pl. Guatem. v. 36 = M. lavarum.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.).
arborea, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 5.—Java.
auriculata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 395.—Am. cent.
brachybotrys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 488.—N. Guin.
brevicaulis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 519.—China.
diversifolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 249.—Java.
glaucifolia, *Urb. Symb. Antill.* i. 382.—Ind. occ.
hospitans, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 490.—N. Guin.
melanosticta, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 489.—N. Guin.
palmana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 434.—Am. cent.
pendula, *Urb. Symb. Antill.* i. 383.—Ind. occ.
pleurobotrya, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 148.—Am. cent.
purpurascens, *Urb. Symb. Antill.* i. 384.—Ind. occ.
Schlechteri, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 303, nomen.—Afr. trop.
Sintenisii, *Urb. Symb. Antill.* i. 381.—Ind. occ.
spicigera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 434.—Am. cent.
stenophylla, *Donn. Sm. l. c.* xxiv. 395.—Am. cent.
subanceps, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 489.—N. Guin.
yunquensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 383.—Ind. occ.

ARDUINA, Mill. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).
Campenoni, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1222.—Madag.

ARECHAVALETAIA, Speg. in Anal. Soc. Ci. Argent. xlvii. (1898) 9. *SAMYDACEAE.*
uruguayensis, *Speg. l. c.* 10.—Urug.

AREGELIA, Kuntze = **Karatas**, Plum. (Bromel.).
ampullacea, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. 64 = K. ampullacea.
Binoti, Mez, l. c. 82 = K. Binoti.
carcharodon, Mez, l. c. 78 = K. carcharodon.
Carolinae, Mez, l. c. 74 = K. Carolinae.
chlorosticta, Mez, l. c. 65 = K. chlorosticta.
compacta, Mez, l. c. 73 (= *Nidularium compactum*).—Bras.
concentrica, Mez, l. c. 81 = K. acanthocrater.
coriacea, Mez, l. c. 77 = K. coriacea.
cruenta, Mez, l. c. 71 = K. cruenta.
cyanea, Mez, l. c. 67 = K. denticulata.
elegans, Mez, l. c. 69 = K. cyanea.
Johannis, Mez, l. c. 84 = K. Johannis.
Laurentii, Mez, l. c. 80 = K. Laurentii.
leucophaea, Mez, l. c. 77 = K. leucophaea.
longebracteata, Mez, l. c. 79.—Bras.
marmorata, Mez, l. c. 76 = K. marmorata.
morreniana, Mez, l. c. 72 = K. morreniana.
princeps, Mez, l. c. 75 = K. princeps.
sarmentosa, Mez, l. c. 66 = K. sarmentosa.
spectabilis, Mez, l. c. 70 = K. spectabilis.
tristis, Mez, l. c. 68 = K. tristis.

ARENARIA, Rupp. (Caryoph.).
acutisepala, *Hausskn. ex Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 395.—As. Min.
Baldaccii, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 237.—Eur.
Benthamii, Edgew. in Hook. f. Fl. Br. Ind. i. 242 = glandulosa.
Bertolonii, *Fiori & Paol. Fl. Ital.* i. 346.—Italy.
boliviana, *Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 425.—Am. trop.
Burkei, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 85.—Am. bor.
conferta, Wedd. in Ann. Sci. Nat. Sér. V. i. 293 = boliviana.
ferruginea, *Duthie, ex Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 410.—Reg. Himal.
gayana, *Williams, l. c.* 422.—Corsica.
Littledalei, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 209.—Tibet.
megalantha, *Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 379.—Mexic.; Reg. Argent.
pinetorum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 350.—Am. bor.
pumicola, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xi. 169.—Am. bor.
quadridentata, *Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 432 (= *Lepyrodiclis quadridentata*).—China.
salmonensis, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 343.—Am. bor.

ARENARIA:—
subcongesta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 244.—Am. bor.
szechuensis, *Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 437.—China.
texana, *Britton, Fl. N. U. S.* ii. 34.—Am. bor.
uintahensis, *Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 7.—Am. bor.

ARENGA, Labill. (Palm.).
gracilicaulis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 203.—N. Guin.

ARETHUSANTHA, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 179. *ORCHIDEAE.*
bletioides, *Finet, l. c.*—Hab. ?

ARETIA, Hall. = **Androsace**, Linn. (Primul.).
carnea, Bub. Fl. Pyren. i. 217 = A. carnea.
elongata, Bub. l. c. 218 = A. elongata.
maxima, Bub. l. c. 219 = A. maxima.
villosa, Bub. l. c. 217 = A. villosa.

ARGEMONE, Tourn. (Papaver.).
bipinnatifida, *Greene, Pittonia*, iii. 346.—Am. bor.
gracilenta, *Greene, l. c.*—Am. bor.
leiocarpa, *Greene, l. c.* 345.—Am. bor.
sanguinea, *Greene, l. c.* iv. 68.—Am. bor.
squarrosa, *Greene, l. c.*—Am. bor.

ARGENTINA, Lam. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
Anserina, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 159 = P. Anserina.
Egedii, Rydb. l. c. 158 = P. Egedii.

ARGITHAMNIA, Sw. (Euphorb.).
Stahlii, *Urb. Symb. Antill.* i. 336.—Ind. occ.
tinctoria, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 302.—Mexic.

ARGOPHYLLUM, Forst. (Saxifr.).
nullumense, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 439.—Austral.

ARGOSTEMMA, Wall. (Rubiac.).
africanum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 423.—Afr. trop.

ARGUSSIERA, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 123 = **Hippophaë**, Linn. (Elaeag.).
rhamnoides, Bub. l. c. = H. rhamnoides.

ARGYREIA, Lour. (Convolv.).
adpressa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 513 (= *Lettsomia adpressa*).—Malaya.
Hieronymi, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 382 (= *Murucoa Hieronymi*).—Reg. Argent.
Juramenti, *K. Schum. l. c.* (= *Murucoa Juramenti*).—Reg. Argent.
Kurzii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 513 (= *Lettsomia Kurzii*).—Malaya.
penangiana, *Boerl. l. c.* (= *Lettsomia penangiana*).—Malaya.
Peteri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 382 = Murucoa Peteri.
rubicunda, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 513 (= *Lettsomia rubicunda*).—Malaya.
sumatrana, *Boerl. l. c.* (= *Lettsomia sumatrana*).—Sumatra.

ARGYROCALYMNA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 336 (1900). *SAXIFRAGACEAE.*
arboreum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 337.—N. Guin.

ARGYROLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
deflexiflorum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 253.—Afr. trop.
dimidiatum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 34.—Afr. austr.
leucophyllum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 253.—Afr. trop.
longipes, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 254.—Afr. austr.
pachyphyllum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 441.—Afr. austr.
transvaalense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 33.—Afr. austr.
Wilmsii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 283.—Afr. austr.

ARIOCARPUS, Scheidw. = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).
fissuratus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 550 = M. fissurata.

ARIOCARPUS:—
furfuraceus, H. C. Thomps. in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 130 = M. furfuracea.
kotchubeyanus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 259 = M. sulcata.
pulvilligeris, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 550 = M. pulvilligera.
trigonus, K. Schum. l. c. = M. trigona.

ARISAEMA, Mart. (Aroid.).
abbreviatum, Schott, Prodr. Syst. Aroid. 40 = flavum.
Bockii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxix. 235.—China.
davidianum, *Engl. l. c.* xxv. 27.—China.
Harmandi, *Engl. l. c.* 27.—Cochinch.

ARISTARIA, Jungh. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).
mutica, Hassk. in Tijdschr. Nat. Gesch. x. 117 = A. gigantea.

ARISTEA, Soland. (Irid.).
Cooperi, Baker, Handb. Irid. 143 = majubensis.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 364.—Afr. trop.
longifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
melaleuca, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. 236 = Cleanthe bicolor.
montana, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 49.—Afr. austr.
nandiensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 347.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 281.—Afr. trop.
palustris, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 96.—Afr. austr.
polycephala, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 365.—Afr. trop.
umbellata, Spreng. Syst. i. 158 = Moraea edulis.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. trop.

ARISTIDA, Linn. (Gramin.).
abyssinica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 134 = Adscensionis.
adscendens, Trim. Cat. Ceyl. Pl. 108 = setacea.
angustata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 556.—Afr. austr.
articulata, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 209 = mutabilis.
brachypoda, Tausch, in Flora, xix. 506 = plumosa.
bromoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 121 = Adscensionis.
Burkei, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 557.—Afr. austr.
chaetophylla, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = Adscensionis.
circinalis, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 13.—Bras.
coarctata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 122 = Adscensionis.
cognata, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 127 = Adscensionis.
Combsii, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 43.—Am. bor.
curvata, Nees, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 392 = Adscensionis.
decorata, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = hirtigluma.
delicatula, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 393 = cumingiana.
dispersa, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 127 = Adscensionis.
divaricata, Jacq. Eclog. 7. t. 6 = Adscensionis.
Ehrenbergii, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 136 = Adscensionis.
elatior, Cav. Ic. vi. 65 = Adscensionis.
festucoides, Poir. Encyc. Suppl. i. 453 = Adscensionis.
foenicularis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 160 = funiculata.
funicularis, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 131 = funiculata.
Heymannii, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. 649 = Adscensionis.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 203.—Afr. trop.
humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 121 = Adscensionis.
hystricula, *Edgew. in Journ. Linn. Soc.* vi. 208.—As. austr.
Hystrix, Thunb. Prod. 19 = vestita.
intermedia, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 44.—Am. bor.
jacquiniana, Tausch, in Flora, xix. 508 = Adscensionis.
Kelleri, *Hack. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 10.—Afr. austr.
kunthiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1849) 151 = mutabilis.

ARISTIDA:—
linarifolia, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 300 = Dichaetaria Wightii.
macrochloa, Hochst. in Flora, 1855, 200 = Adscensionis.
mallica, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 209 = funiculata.
maritima, Steud. Syn. Pl. Gram. 137 = Adscensionis.
meccana, Hochst. ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 152 = mutabilis.
modatica, Steud. Syn. Pl. Gram. 139 = Adscensionis.
Mohrii, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 436.—Am. bor.
montana, Rottl. ex Wall. Cat. n. 8912 B = Garnotia scoparia.
nana, Steud. Syn. Pl. Gram. 138 = Adscensionis.
nigrescens, Presl, Reliq. Haenk. i. 223 = Adscensionis.
oligophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 711.—Ecuador.
pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 62.—Reg. Argent.
paniculata, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 25 = Adscensionis.
paradisea, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. II. 1219 = hirtigluma.
paraguayensis, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 14.—Parag.
piligera, Burch. ex Schult. Mant. ii. 478 = ciliata.
pogonoptila, Boiss. Fl. Orient. v. 496 = hirtigluma.
pusilla, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 140 = Adscensionis.
quinqueseta, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = setacea.
raddiana, Savi, in Mem. Moden. (1837) 198 = plumosa.
royleana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 160 = paniculata.
Schimperi, Hochst. & Steud. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 143 = hirtigluma.
Schweinfurthii, Boiss. Fl. Orient. v. 493 = mutabilis.
sciurus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 557.—Afr. austr.
simplicissima, Steud. Syn. Pl. Gram. 139 = Adscensionis.
spicata, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 226 = mutabilis.
spicigera, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 136 = Adscensionis.
swartziana, Steud. Syn. Pl. Gram. 137 = Adscensionis.
tenella, Kurz, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 224 = cumingiana.
Teneriffae, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = Adscensionis.
tenuiflora, Steud. l. c. 139 = Adscensionis.
tenuis, Hochst. in Flora, xxviii. 200 = mutabilis.
trichodes, Walp. Ann. iii. 753 = cumingiana.
vulpioides, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. 251 = Adscensionis.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 202.—Afr. trop.
Zeyheri, Steud. Nom. ed. II. i. 132 = capensis.

ARISTOLOCHIA, Tourn. (Aristoloch.).
Balansae, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 311.—Tonkin.
boliviensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 271.—Bolivia.
bongoensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 488.—Afr. trop.
calceiformis, *Urb. Symb. Antill.* i. 300.—Ind. occ.
ceresensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 271.—Reg. Argent.
Cobra, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 61.—Mexic.
convolvulacea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 335.—Am. bor.
cortinata, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 629.—Ins. Samoa.
Curtisii, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 161.—Penang.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 315.—China.
densivenia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 489.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 46.—Afr. trop.
echinata, *Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, v. 9.—Bras.
Esperanzae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 272.—Parag.
gentilis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 314.—China.
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 61.—Mexic.
melanoglossa, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 83.—Reg. Argent.
polyrrhiza, Bub. Fl. Pyren. i. 119 = A. Pistolochia.
Preussii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 492.—Afr. trop.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 426.—Bras.
Schweinfurthii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 492.—Afr. trop.

ARISTOLOCHIA:—
setchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 312.—China.
Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 491.—Afr. trop.
stenocarpa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 271.—Bolivia.
Stuckerti, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 84.—Reg. Argent.
thibetica, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 313.—China.
Ulei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 426.—Bras.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 313.—China.
Zenkeri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 490.—Afr. trop.

ARJONA, Comm. (Santal.).
tandilensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 283.—Reg. Argent.

ARJONAEA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 283 (1898) = **Arjona**, Comm. (Santal.).

ARMARINTEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 415 (1900) = **Cachrys**, Linn. (Umbellif.).
Morisonii, Bub. l. c. = C. laevigata.

ARMERIA, Linn. (Plumbagin.).
bella, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 385.—Fuegia.
dalmatica, *R. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xiii. I. 16.—Eur.
lacmonica, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xi. 55.—Eur.

ARNICA, Rupp. (Compos.).
amplexifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 434.—Am. bor.
arnoglossa, *Greene, Pittonia*, iv. 166.—Am. bor.
attenuata, *Greene, l. c.* 170.—Am. bor.
bernardina, *Greene, l. c.*—Am. bor.
betonicaefolia, *Greene, l. c.* 163.—Am. bor.
caespitosa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 203.—Am. bor.
chionophila, *Greene, Pittonia*, iv. 171.—Am. bor.
columbiana, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 200.—Am. bor.
columbiana, *Greene, Pittonia*, iv. 159.—Am. bor.
crocea, *Greene, l. c.*—Am. bor.
denudata, *Greene, l. c.* iii. 105.—Am. bor.
diversifolia, *Greene, l. c.* iv. 171.—Am. bor.
eradiata, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = Parryi.
exigua, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 202.—Am. bor.
gracilis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 297.—Am. bor.
grandifolia, *Greene, Pittonia*, iv. 172.—Am. bor.
incana, *Greene, l. c.* 169.—Am. bor.
Lessingii, *Greene, l. c.* 167.—Am. bor.
lonchophylla, *Greene, l. c.* 164.—Am. bor.
macilenta, *Greene, l. c.* 161.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* 160.—Am. bor.
Merriami, *Greene, l. c.* 36.—Am. bor.
monocephala, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 435.—Am. bor.
multiflora, *Greene, Pittonia*, iv. 162.—Am. bor.
ocreata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 201.—Am. bor.
ovalifolia, *Greene, Pittonia*, iv. 168.—Am. bor.
ovata, *Greene, l. c.* 161.—Am. bor.
pedunculata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 297.—Am. bor.
polycephala, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 202.—Am. bor.
pumila, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 433.—Am. bor.
rivularis, *Greene, Pittonia*, iv. 163.—Am. bor.
Rydbergii, *Greene, l. c.* 36.—Am. bor.
scaberrima, *Greene, l. c.* 165.—Am. bor.
Sonnei, *Greene, l. c.* iii. 104.—Am. bor.
spathulata, *Greene, l. c.* 103.—Am. bor.
subcordata, *Greene, l. c.* iv. 173.—Am. bor.
subplumosa, *Greene, l. c.* iii. 104.—Am. bor.
teucriifolia, *Greene, l. c.* iv. 164.—Am. bor.
tomentella, *Greene, l. c.* 166.—Am. bor.
tomentosa, *Macoun, in Ottawa Natural.* 1899, 166.—Am. bor.
ventorum, *Greene, Pittonia*, iv. 173.—Am. bor.

ARNOSERIS, Gaertn. (Compos.).
clavata, Bub. Fl. Pyren. ii. 49 = pusilla.

ARRABIDAEA, DC. (Bignon.).
ateramnantha, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 68.—Bras.
carichanensis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 62 (= *Bignonia carichanensis*).—Venez.
coleocalyx, *Bureau & K. Schum. l. c.* 35.—Am. austr.
divaricata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 33.—Peruv.
egensis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 65.—Bras.
elliptica, *Bureau & K. Schum. l. c.* 26.—Bras.
grandiflora, *Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 26.—Parag.
guatemalensis, *K. Schum. & Loes. in Engl. Jahrb.* xxiii. 129.—Guatem.
japurensis, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 65 (= *Tabebuia japurensis*).—Bras.
lasiantha, *Bureau & K. Schum. l. c.* 72.—Bras.
lauta, *Bureau & K. Schum. l. c.* 43.—Bras.
lenticellosa, *Bureau & K. Schum. l. c.* 64.—Bras.
macrocarpa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 242.—Bolivia.
mazagana, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 512.—Bras.
mollisima, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 46 (= *Bignonia mollissima*).—Venez.
muehlbergiana, *Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 25.—Parag.
multiflora, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 47.—Bras.
mutabilis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 38.—Am. austr.
oligantha, *Bureau & K. Schum. l. c.* 63.—Bras.
parviflora, *Bureau & K. Schum. l. c.* 53 (= *Pithecoctenium parviflorum*).—Bras.
platyphylla, Bureau & K. Schum. l. c. 38 = brachypoda.
pliciflora, *Bureau & K. Schum. l. c.* 51 (= *Adenocalymna pliciflorum*).—Bras.
praecox, *Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 25.—Parag.
quinquenervia, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 44.—Peruv.
rhodantha, *Bureau & K. Schum. l. c.*—Am. austr.
sordida, *Bureau & K. Schum. l. c.* 30 (= *Bignonia sordida*).—Guiana.
spicata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 42.—Peruv.
subexserta, *Bureau & K. Schum. l. c.* 59.—Bras.
subverticillata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 24.—Bras.
trichoclada, *Bureau & K. Schum. l. c.* 49 (= *Bignonia trichoclada*).—Bras.
xanthophylla, *Bureau & K. Schum. l. c.* 70 (= *Phyganocydia xanthophylla*).—Bras.

ARRACACIA, Bancr. (Umbellif.).
aegopodioides, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 139 (= *Smyrnium aegopodioides*).—Mexic.
chiapensis, *Coult. & Rose, l. c.* 140.—Am. cent.
dissecta, *Coult. & Rose, l. c.* 141.—Am. cent.
Dugesii, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
filiformis, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 296, nomen; *et in Hook. Ic. Pl.* t. 2429.—Mexic.
hemsleyana, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 141.—Am. cent.
longipedunculata, *Coult. & Rose, l. c.* 142.—Am. cent.
montana, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
rigida, *Coult. & Rose, l. c.* 143.—Am. cent.

ARTABOTRYS, R. Br. (Anonac.).
Antunesii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 299.—Afr. trop.
aurantiacus, *Engl. & Diels, l. c.* 300.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 2.—Afr. trop.
dahomensis, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 299.—Afr. trop.
lanuginosa, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 52.—Borneo.
rosea, *Boerl. l. c.* t. 53.—Borneo.
stenopetalus, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 300.—Afr. trop.

ARTANEMA, D. Don (Scrophul.).
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 131.—Afr. trop.

ARTEMISIA, Linn. (Compos.).
aromatica, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 273.—Am. bor.
candicans, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 296.—Am. bor.
chewsurica, *Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1898, 130.—Reg. Caucas.
coloradensis, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 506.—Am. bor.

ARTEMISIA :—
elatior, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 430.—Am. bor.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. ii. 211 = maritima.
floccosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 297.—Am. bor.
gracilenta, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 35.—Am. bor.
graveolens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 296.—Am. bor.
Grenardi, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 323.—Tibet.
kansana, *Britton, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 466.—Am. bor.
latiloba, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 429.—Am. bor.
microcephala, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 455 (non Hillebr.).—Am. bor.
natronensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 485.—Am. bor.
nova, *A. Nelson, l. c.* 1900, 274.—Am. bor.
paniculata, Roxb. Fl. Ind. iii. 418 = pallens.
paucicephala, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 35.—Am. bor.
pseudopontica, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 168.—Eur.
rhizomata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 34.—Am. bor.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 55.—Ecuador.
spiciformis, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 507.—Am. bor.
subglabra, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 36.—Am. bor.
tenuifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 214 = campestris.
tenuis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.
tripartita, *Rydb. l. c.* 432.—Am. bor.

ARTHRATHERUM, Beauv. = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
ciliatum, Nees, in Linnaea, vii. 287 = A. hirtigluma.
elatum, Boiss. & Buhse, Diagn. Ser. II. iv. 128 = A. hirtigluma.
Hystrix, Nees, in Linnaea, vii. 287 = A. vestita.
lanuginosum, Burch. Trav. ii. 612 = A. vestita.
pogonoptilum, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 56 = A. hirtigluma.
royleanum, Edgew. ex Aitch. Cat. Panjab Pl. 164 = A. funiculata.
Schimperi, Nees, Fl. Afr. Austr. 178 = A. funiculata.
Zeyheri, Nees, l. c. 177 = A. capensis.

ARTHRAXON, Beauv. (Gramin.).
cuspidatus, Hochst. in Flora, xxxix. 188 = ciliaris.
inermis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 145.—Ind. or.
micans, Hochst. in Flora, xxxix. 188 = ciliaris.
spathaceus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 145.—Ind. or.
submuticus, *Hochst. in Flora*, xxxix. 188.—As. or.

ARTHROPHYLLUM, Blume (Aral.).
borneënse, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.

ARTHROPODIUM, R. Br. (Liliac.).
curvipes, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 227.—Austral.

ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.).
albomarginata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xiv. 30 = Veitchii.
aristata, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 18.—Ind. or.
armata, *Gamble, l. c.* 130.—Ind. or.
auricoma, *Mitford, Bamb. Gard.* 100.—Hort.
borealis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 20.—Japon.
chartacea, *Makino, l. c.* 55.—Japon.
Falconeri, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 20.—Ind. or.
Fischeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 351, nomen.—Afr. trop.
Gallatlyi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 23.—Ind. or.
gammieana, Gamble, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 379 = racemosa.
glaucescens, Beauv. Agrost. 144 = Bambusa nana.
jaunsarensis, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 23.—Ind. or.
Kurzii, *Gamble, l. c.* 25.—Ind. or.
linearis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 721.—Ins. Luchu.

ARUNDINARIA :—
Mannii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 26.—Ind. or.
Matsumarae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 716.—Japon.
nana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xi. 160.—Japon.
nipponica, *Makino, l. c.* xiv. 23.—Japon.
nitida, *Mitford, in Gard. Chron.* 1895, II. 186, nomen; *et in Kew Bull.* 1896, 20.—China.
nobilis, *Mitford, Bamb. Gard.* 100.—Afr. austr.
paniculata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xiv. 50 = palmata.
Pantlingi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 129.—Ind. or.
papuana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 186.—N. Guin.
paraguayensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 341.—Parag.
patula, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 719.—N. Granat.
polystachya, *Kurz, ex Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 7.—Ind. or.
Prainii, Gamble, l. c. 21 = Microcalamus Prainii.
purpurascens, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 716.—Japon.
quadrangularis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, ix. 71, et xiv. 12 (= *Bambusa quadrangularis*).—Japon.
ramosa, *Makino, l. c.* xiv. 22.—Japon.
rolloana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 24.—Ind. or.
tolange, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 351.—Afr. trop.
vaginata, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 717.—Japon.

ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.).
agrostoides, *Trin. Ic.* xxiii. t. 265.—As. or.
birmanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 73.—Ind. or.
blephariphylla, *Trim. ex Hook. f. l. c.* 77.—Ind. or.
capillaris, *Hook. f. l. c.* 74.—Ind. or.
ciliata, Nees, in Wight, Cat. n. 1666 = agrostoides.
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 75.—Ind. or.
convoluta, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 25.—N. Granat.
Ecklonii, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 80.—Afr. austr.
elata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 710.—N. Granat.
gigantea, *Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 293.—Ind. or.
hirsuta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = setosa.
hookeriana, Wight & Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 264 = Calamagrostis pilosula.
Hookerii, Munro, ex Hook. f. l. c. 73 = villosa.
lasiostoma, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 174.—N. Guin.
Lawii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 180.—Zeylan.
Lawsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 76.—Ind. or.
laxiflora, *Hook. f. l. c.* 75.—Ind. or.
leptochloa, *Hook. f. l. c.* 76.—Ind. or.
martinicensis, Trin. Gram. Panic. ii. 62 = brasiliensis.
mutica, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 116 = capillaris.
nepalensis, Trin. Sp. Gram. t. 268 = brasiliensis.
nervosa, *Nees, in Wall. Cat.* n. 8662.—Ind. or.
pallida, Nees, Agrost. Bras. 465 = brasiliensis.
pilosa, Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. iii. IV. 30 = agrostoides.
pumila, Steud. Syn. Pl. Gram. 114 = tenella.
purpurea, Hochst. ex Steud. l. c. 74 = fuscata.
pygmaea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 72.—Ind. or.
rigida, Nees, Fl. Afr. Austr. 80 = brasiliensis.
Schultzii, Benth. Fl. Austral. vii. 545 = Axonopus semialatus.
setifera, Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = setosa.
spicata, *Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 293.—Ind. or.
stricta, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 102 = setosa.
Thwaitesii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 77.—Ind. or.
tuberculata, *Munro, ex Lisboa, Bombay Grasses*, 29.—Ind. or.

ARUNDO, Tourn. (Gramin.).
bambusifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 303 = A. Donax.
bengalensis, Retz. Obs. v. 20 = A. Donax.
bifaria, Retz. l. c. iv. 22 = A. Donax.
Corea, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 304 = Phragmites Karka.
dioica, Spreng. Syst. i. 36 = Cortaderia argentea.
formosana, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 724.—Formosa.
Karka, Retz. Obs. iv. 21 = Phragmites Karka.
longifolia, Salisb. Prodr. 24 = A. Donax.

ARUNDO :—
madagascariensis, Kunth, Rev. Gram. i. 273 = Neyraudia madagascariensis.
reynaudiana, Kunth, l. c. = Neyraudia madagascariensis.
selloana, Schult. ii. Mant. 605 = Cortaderia argentea.
tibialis, Roxb. in Wall. Cat. n. 5017 B = Phragmites Karka.
triflora, Roxb. Ic. Pict. t. 853 = A. Donax.
Zollingeri, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 343 = Neyraudia madagascariensis.

ASARCA, Poepp. = **Chloraea**, Lindl. (Orchid.).
Arechavaletae, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 298 = C. Arechavaletae.

ASARUM, Tourn. (Aristoloch.).
acuminatum, *Bickn. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 513.—Am. bor.
Balansae, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 303.—Tonkin.
brevistylum, *Franch. l. c.* 301.—China.
callifolium, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 334.—Am. bor.
chinense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 303.—China.
debile, *Franch. l. c.* 305.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 306.—China.
Fauriei, *Franch. l. c.*—Japon.
franchetianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 308.—China.
heterophyllum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 33.—Am. bor.
majus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Hartwegi.
Memmingeri, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 34.—Am. bor.
minus, *Ashe, l. c.* 33.—Am. bor.
reflexum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 533.—Am. bor.
Ruthii, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 35.—Am. bor.
Savatieri, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 307.—Japon.

ASCLEPIAS, Linn. (Asclepiad.).
aceratoides, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1895, 154 = arenicola.
albens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 5 (= *Gomphocarpus albens*).—Afr. austr.
appendiculata, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus appendiculatus*).—Afr. austr.
arenicola, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 252.—Am. bor.
brevicuspis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 5 (= *Gomphocarpus brevicuspis*).—Afr. austr.
concolor, *Schlechter, l. c.* 6 (= *Gomphocarpus concolor*).—Afr. austr.
crispa, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus crispus*).—Afr. austr.
dealbata, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus dealbatus*).—Afr. austr.
eustegioides, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus eustegioides*).—Afr. austr.
expansa, *Schlechter, l. c.* 7 (= *Gomphocarpus expansus*).—Afr. austr.
firma, *Schlechter, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 684 (= *Schizoglossum firmum*).—Afr. trop.
foliosa, *Hiern, l. c.* 688 (= *Gomphocarpus foliosus*).—Afr. trop.
Frederici, *Hiern, l. c.* 684.—Afr. trop.
gibba, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 7 (= *Gomphocarpus gibbus*).—Afr. austr.
gomphocarpoides, *Schlechter, l. c.* (= *Xysmalobium gomphocarpoides*).—Afr. austr.
hastata, Schlechter, l. c. = Gomphocarpus hastatus.
Kotolo, *Eastw. in Zoe*, v. 86.—Am. bor.
meyeriana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus meyerianus*).—Afr. austr.
multicaulis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus multicaulis*).—Afr. austr.
navicularis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus navicularis*).—Afr. austr.
Nuttii, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 308.—Afr. trop.
Palmeri, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 171.—Am. bor.
parvula, *Vail, l. c.* 1899, 423.—Am. bor. et cent.
peltigera, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus peltigerus*).—Afr. austr.
physocarpa, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus physocarpus*).—Afr. austr.

ASCLEPIAS:—
praemorsa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus truncatus*).—Afr. austr.
pumila, *Vail, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 12.—Am. bor.
reflectens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus reflectens*).—Afr. austr.
scaposa, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 171.—Am. bor.
schumanniana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 688 (= *Gomphocarpus amoenus*).—Afr. trop.
semiamplectens, *Hiern, l. c.* 684 (= *Gomphocarpus semiamplectens*).—Afr. trop.
stellifera, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus revolutus*).—Afr. austr.
subverticillata, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 178.—Am. bor.
tenuifolia, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus linearis*).—Afr. austr.
vexillata, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus dealbatus*).—Afr. austr.

ASCOCHILUS, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. (1896) 374. *ORCHIDEAE.*
hirtulus, Ridley, l. c. 375 = Sarcochilus hirtulus.
siamensis, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

ASCOLEPIS, Nees (Cyperac.).
pinguis, *C. B. Clarke, in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. II. 69.—Afr. trop.

ASIMINA, Adans. (Anonac.).
costaricensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 2.—Am. cent.
foetida, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 134.—Mexic.
obovata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 239 (= *Anona obovata*).—Am. bor.
Rugelii, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 465.—Am. bor.
speciosa, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 238 (= *Uvaria obovata*).—Am. bor.

ASPALATHUS, Linn. (Legum.).
Bodkini, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 19.—Afr. austr.
cliffortioides, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 144.—Afr. austr.
concava, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 455.—Afr. austr.
desertorum, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
Gerrardi, *Bolus, l. c.* 20.—Afr. austr.
intervallaris, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 456.—Afr. austr.
laeta, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 20.—Afr. austr.
latibracteatus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 353.—Afr. austr.
latifolia, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
Leipoldtii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 341.—Afr. austr.
lenticula, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 456.—Afr. austr.
munita, *Bolus, l. c.*—Afr. austr.
rigida, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 145.—Afr. austr.
robusta, *Bolus, ex Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
Schlechteri, *Bolus, l. c.* 146.—Afr. austr.
Simii, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 146.—Afr. austr.

ASPARAGUS, Tourn. (Liliac.).
abyssinicus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 319 = africanus.
bechuanicus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 429.—Afr. trop.
conglomeratus, *Baker, l. c.* 428.—Afr. trop.
cuscutoides, Burch. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. 606 = Schizobasis cuscutoides.
Fleckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 43.—Afr. austr.
hereroënsis, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
Judtii, *Schinz, l. c.* 44.—Afr. trop.
lanceus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 66 = aethiopicus.
Lowei, Kunth, Enum. Pl. v. 79 = umbellatus.
Lugardi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 431.—Afr. trop.
mitis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 319 = asiaticus.
namaensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 44.—Afr. austr.

ASPARAGUS:—
Nelsii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 44.—Afr. trop.
nitidus, Forst. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 263 = thunbergianus.
nudicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 428.—Afr. trop.
petitianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 320 = racemosus.
retrofractus, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 73 = africanus.
scaberulus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 320 = asiaticus.
shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 427.—Afr. trop.
spinescens, Steud. in Schult. f. Syst. vii. 333 = stipulaceus.
spinosissimus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 315.—Afr. austr.
stachyoides, Spreng. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. 624 = racemosus.
suaveolens, Burch. Trav. i. 226 = stipulaceus.
ternifolius, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7728.—Afr. austr.

ASPERELLA, Humb. (Gramin.).
Duthiei, *Stapf, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 375.—Ind. or.

ASPERUGO, Tourn. (Borag.).
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 507 = procumbens.

ASPERULA, Linn. (Rubiac.).
asterocephala, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. vii. 6, nomen; *et in Bull. Herb. Boiss.* vii. 116.—Oriens.

ASPHODELINE, Reichb. (Liliac.).
Basilii, *Siehe, in Gard. Chron.* 1898, I. 111.—Oriens.
dammeriana, *Siehe, l. c.*—Oriens.
imperialis, *Siehe, l. c.*—Oriens.
rhytidosperma, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 197.—As. Min.

ASPHODELUS, Tourn. (Liliac.).
aestivus, Reichb. Pl. Crit. t. 451 = fistulosus.
lusitanicus, *Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xv. 47.—Eur.
messeniacus, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1899, 194.—Graecia.
microcarpus, Reichb. Ic. Fl. Germ. t. 513 = fistulosus.
occidentalis, Henriq. in Bol. Soc. Broter. xiii. 84 = lusitanicus.
parviflorus, Wight, Ic. t. 2062 = fistulosus.
tenuifolius, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 46 = fistulosus.

ASPIDIXIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 192. *LORANTHACEAE.*
anceps, *Van Tiegh. l. c.* 193 (= *Viscum anceps*).—Afr. austr.
angulata, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. angulatum*).—As. et Austral. trop.
articulata, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. articulatum*).—As. et Austral. trop.
attenuata, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. attenuatum*).—Ind. or.; Malaya.
bivalvis, *Van Tiegh. l. c.* 192.—Afr. austr.
capensis, *Van Tiegh. l. c.* 163 (= *V. capense*).—Afr. austr.
dichotoma, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. dichotomum*).—Ind. or.; Malaya.
Grandidieri, *Van Tiegh. l. c.*—Madag.
Junodi, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. austr.
minima, *Van Tiegh. l. c.* 192 (= *V. minimum*).—Afr. austr.
myriophlebia, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. myriophlebium*).—Madag.
ramosissima, *Van Tiegh.* 193 (= *V. ramosissimum*).—Ind. or.
robusta, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. robusta*).—Afr. austr.
semiplana, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
trachycarpa, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. trachycarpum*).—Madag.

ASPIDOCARYA, Hook. f. & Thoms. (Menisperm.).
dissitiflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 312.—N. Guin.
kelidophylla, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 313.—N. Guin.

ASPIDOPTERYS, A. Juss. (Malpigh.).
obcordata, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2673.—China.

ASPIDOSPERMA, Mart. & Zucc. (Apocyn.).
guaraniticum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 10. 7.—Parag.

ASPILIA, Thou. (Compos.).
bipartita, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 30.—Afr. trop.
chrysops, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 459.—Afr. trop.
Dewevrei, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 32.—Afr. trop.
fontinalis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 578.—Afr. trop.
latissima, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 63.—Parag.
leucoglossa, *Malme, l. c.* 62.—Bras.
monopetala, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.
montevidensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 129 = buphthalmiflora.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 38.—Ecuador.
trichodesmoides, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 28.—Afr. trop.
Welwitschii, *O. Hoffm. l. c.* 29.—Afr. trop.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.

ASPRELLA, Schreb. = **Leersia**, Sw. (Gram.).
japonica, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 715.—Japon.

ASSONIA, Cav. = **Dombeya**, Cav. (Stercul.).
cuanzensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 86 = D. cuanzensis.
huillensis, Hiern, l. c. 87 = D. huillensis.
sparmannioides, Hiern, l. c. = D. sparmannioides.

ASTELIA, Banks & Soland. (Liliac.).
argyrocoma, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 805 = menziesiana.
minima, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 611.—N. Zel.
Petriei, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 419.—N. Zel.

ASTEPHANUS, R. Br. (Asclepiad.).
fruticulosus, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 41.—Reg. Argent.
fusculus, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 242 (= *Metastelma fusculum*).—Cuba.
leptophyllus, *Schlechter, l. c.* 241.—Ind. occ.
pubescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 299.—Mexic.

ASTER, Tourn. (Compos.).
adsurgens, *Greene, Pittonia,* iv. 216.—Am. bor.
Amani, *Post, Fl. Syria,* 16.—Syria.
amplexifolius, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 391.—Am. bor.
amplissimus, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895, 550.—Am. bor.
apricus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 396.—Am. bor.
armeriifolius, *Greene, Pittonia,* iv. 214.—Am. bor.
auriculatus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 379 (non Schloss.).—China.
Bietii, *Franch. l. c.* 373.—China.
Boltoniae, *Greene, Pittonia,* iii. 248.—Am. bor.
brachytrichus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 372.—China.
brevibracteatus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 392.—Am. bor.
calocephalus, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 47.—Bras.
camptosorus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 339.—Am. bor.
carmesinus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 356.—Am. bor.
centaurodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 129 (= *Pteronia centauroides*).—Afr. austr.
ciliomarginatus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 392.—Am. bor.
Claytoni, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 358.—Am. bor.
continuus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 620.—Am. bor.
cordalenus, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 345.—Am. bor.
curvescens, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 359.—Am. bor.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 374.—China.
distichophyllus, *Greene, Pittonia,* iv. 213.—Am. bor.
ensatus, *Greene, l. c.* 223.—Am. bor.
exsul, *Greene, l. c.* 221.—Am. bor.

ASTER:—
frondeus, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895, 551.—Am. bor.
fulcratus, *Greene, Pittonia*, iv. 217.—Am. bor.
furcatus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 358.—Am. bor.
glastifolius, *Greene, Pittonia*, iv. 218.—Am. bor.
hispanicus, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 334.—Hispan.
ianthinus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 360.—Am. bor.
insularis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 71.—Japon.
jalapensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 572.—Mexic.
Jessicae, *Suksd. in Erythea*, 1898, 30.—Am. bor.
komonoensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 65.—Japon.
laetevirens, *Greene, Pittonia*, iv. 219.—Am. bor.
latahensis, *Hend. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 201.—Am. bor.
latibracteatus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 371.—China.
leptocladus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 69.—Japon.
likiangensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 370.—China.
limoniifolius, *Greene, Pittonia*, iv. 222.—Am. bor.
limosus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
lingulatus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 377.—China.
majusculus, *Greene, Pittonia*, iv. 215.—Am. bor.
militaris, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895, 550.—Am. bor.
missouriensis, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 378.—Am. bor.
multiformis, *Burgess, ex Britton & A. Brown, l. c.* 361.—Am. bor.
Nardophyllum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 130.—Patag.
nebraskensis, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 375.—Am. bor.
Nelsonii, *Greene, Pittonia*, iv. 219.—Am. bor.
nobilis, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 361.—Am. bor.
ochroleucus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 131 = Diplostephium ochroleucum.
oreophilus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 378.—China.
oxylepis, *Greene, Pittonia*, iv. 223.—Am. bor.
oxyphyllus, *Greene, l. c.* iii. 103.—Am. bor.
Piccolii, *Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7669.—China.
Poncinsii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 345.—Turkestan.
pratincola, *Greene, Pittonia*, iv. 215.—Am. bor.
Pringlei, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 379.—Am. bor.
proximus, *Greene, Pittonia*, iv. 220.—Am. bor.
Pteronia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131 (= *Pteronia paniculata*).—Afr. austr.
quinquenervius, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 459.—Afr. austr.
roscidus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 360.—Am. bor.
scorzonerifolius, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 530 (= *Erigeron scorzonerifolius*).—Patag.
Scribneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 393.—Am. bor.
sejaensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131.—Bolivia.
senebierifolius, *Kuntze, l. c.* (= *Aplopappus coronopifolius*).—Chili.
senecioides, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 381.—China.
sericocarpoides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 375 (= *Doellingera sericocarpoides*).—Am. bor.
setchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 377.—China.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 20.—Ecuador.
Souliei, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 372.—China.
spithamaeus, *Greene, Pittonia*, iv. 217.—Am. bor.
squamatus, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 19 (= *Conyza squamata*).—Am. bor. et austr.
staehelinoides, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131 (= *Dolichogyne staehelinoides*).—Reg. Argent.
staticefolius, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 370.—China.
subracemosus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 394.—Am. bor.
subspathulatus, *Rydb. l. c.* 385.—Am. bor.
tenebrosus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 357.—Am. bor.
tenuipes, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 64.—Japon.

ASTER:—
tongolensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 376.—China.
uliginosus, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 252.—Natal.
vallicola, *Greene, Pittonia*, iv. 221.—Am. bor.
vellereus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 380.—China.
vestitus, *Franch. l. c.* 378.—China.
Vilmorini, *Franch. l. c.* 373.—China.
violaceus, *Greene, Pittonia*, iv. 214.—Am. bor.
violaris, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 361.—Am. bor.
Wilsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 196.—Am. bor.
Woodhousei, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 458.—Am. bor.
Woodii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 830.—Afr. austr.
xylophyllus, *Klatt, l. c.* 831.—Afr. austr.
yosemitanus, *Greene, Fl. Francisc.* 383.—Calif.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 375.—China.

ASTERACANTHA, Nees = **Hygrophila**, R. Br. (Acanth.).
lindaviana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 100 = H. lindaviana.

ASTERISCIUM, Cham. & Schlecht. (Umbellif.).
Dipterygia, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 135 (= *Mulinum Dipterygia*).—Am. austr.
fimbriatum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 523.—Patag.
pungens, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 134 = chilense.
spinescens, *Drude, l. c.* 135 (= *Gymnophyton spinescens*).—Am. trop.
spinosissimum, *Drude, l. c.* (= *Gymnophyton spinosissimum*).—Am. trop.

ASTERISCUS, Moench = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).
Morrisoni, Bub. Fl. Pyren. ii. 245 = O. aquaticum.
pygmaeus, Coss. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. 471 = O. pygmaeum.

ASTEROLASIA, F. Muell. (Rutac.).
Woombye, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.

ASTILBE, Buch.-Ham. (Saxifrag.).
platyphylla, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 684.—Japon.

ASTRAGALINA, Bub. Fl. Pyren. ii. 516 (1900) = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
alpestris, Bub. l. c. = A. alpinus.
alpina, Bub. l. c. = A. alpinus.
australis, Bub. l. c. = A. australis.

ASTRAGALUS, Tourn. (Legum.).
aciphyllus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 604.—Persia.
aculeatus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 10.—Am. bor.
agameticus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 38.—As. cent.
akscheberensis, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 42.—Oriens.
americanus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 8.—Am. bor.
amoenus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 112 (= *Phaca amoena*).—Chili.
amunateguianus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 103 (= *Phaca amunateguiana*).—Chili.
antiochianus, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 756.—As. Min.
araucanus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca araucana*).—Chili.
araxinus, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 281.—Reg. Caucas.
Arthuri, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 20.—Am. bor.
assyriacus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 591.—As. Min.
baissunensis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 32.—As. cent.
Baldaccii, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 415.—Albania.
berterianus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 98 (= *Phaca berteriana*).—Chili.
brachypterus, *Reiche, l. c.* 84 (= *Phaca brachyptera*).—Chili.
brachytropis, *Reiche, l. c.* 87 (= *Phaca brachytropis*).—Chili.

ASTRAGALUS:—
brevicaulis, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 158.—Reg. Magell.
brevicaulis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 9.—Am. bor.
campylophyllus, *Greene, Pittonia*, iii. 195.—Am. bor.
canescens, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 98 (= *Phaca canescens*).—Chili.
canonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 15.—Am. bor.
carinatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca carinata*).—Chili.
carniolicus, *A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 3.—Eur.
cerbicus, *Panç. ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* xxii. 202.—Eur.
chadjanensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
Chamissonis, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 96 (= *Phaca Chamissonis*).—Chili.
chilensis, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca chilensis*).—Chili.
Chomutowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 826.—Turkestan.
chrysanthus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 108 (= *Phaca chrysantha*).—Chili.
clandestinus, *Reiche, l. c.* 80 (= *Phaca clandestina*).—Chili.
Clusii, Bub. Fl. Pyren. ii. 520 = A. Glaux.
compactus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 82 (= *Phaca compacta*).—Chili.
concinnus, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca concinna*).—Chili.
confirmans, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 17.—Oriens.
coquimbensis, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 109 (= *Phaca coquimbensis*).—Chili.
Cornu-bovis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 23.—As. cent.
Craigii, *M. E. Jones, in Zoe*, v. 42.—Am. bor.
Cruickshanksii, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 101 (= *Phaca Cruickshanksii*).—Chili.
curvicaulis, *Reiche, l. c.* 102 (= *Phaca curvicaulis*).—Chili.
curvidens, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 589.—Persia.
Cusickii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 541.—Am. bor.
cyaneus, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 236.—Eur.
cymatodes, *Greene, Pittonia*, iii. 196.—Am. bor.
depauperatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 80 (= *Phaca depauperata*).—Chili.
djigensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
dolichostachys, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 99 (= *Phaca dolichostachya*).—Chili.
domeykoanus, *Reiche, l. c.* 93 (= *Phaca domeykoana*).—Chili.
domitus, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 517.—Eur.
dschuparensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 600.—Persia.
elatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca elata*).—Chili.
elongatus, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca elongata*).—Chili.
eurekensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 12.—Am. bor.
exiliformis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 10.—Am. bor.
fastidius, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 8 = fastidiosus.
feensis, *M. E. Jones, l. c.* 20.—Am. bor.
Fialae, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 242.—Eur.
flavus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 107 (= *Phaca flava*).—Chili.
Galagani, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 258.—Reg. Caucas.
galilaeus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 978.—Syria.
gilgianus, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 185.—As. Min.
grandiflorus, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1892, 46 = schuschnasensis.
Gremlii, *Burnat, Fl. Alpes Marit.* ii. 157.—Eur.
huninensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 980.—Syria.
huthianus, *Freyn & Bornm. l. c.* v. 605.—Persia.
intermedius, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. 656 = phoenicis.

ASTRAGALUS:—
involucratus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 46.—As. cent.
japonicus, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 664.—Japon.
junciformis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899.—Am. bor.
Kelseyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 241.—Am. bor.
Kindlii, *Form. in Verh. Nat. Ver. Brünn*, xxxviii. 239.—Eur.
lagunensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 11.—Am. bor.
laguriformis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 602.—Oriens.
laguroides, Freyn, l. c. iii. 180 = laguriformis.
Landbecki, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 105 (= *Phaca Landbecki*).—Chili.
lateritians, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 599.—Persia.
laxiflorus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 99 (= *Phaca laxiflora*).—Chili.
lazicus, Rouy, Fl. Fr. v. 190 = Oxytropis lazica.
leiophyllus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 594.—As. Min.
lesbiacus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 161.—Lesbos.
Litwinowi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 39.—As. cent.
Loczyi, *Kan. in Szech. Keletazsiai Utj.* ii. 805.—China.
luristanicus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 596.—Persia.
Macounii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 243.—Am. bor.
macrocarpus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 106 (= *Phaca macrocarpa*).—Chili.
macrophysus, *Reiche, l. c.* (= *Phaca macrophysa*).—Chili.
macropodium, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 26.—As. cent.
mediterraneus, Bub. Fl. Pyren. ii. 521 = sesameus.
melanostictus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 603.—Persia.
minutissimus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 588.—Persia.
moabiticus, *Post, Fl. Syria*, 11.—Palaest.
Morgani, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 601.—Persia.
Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 601.—Patag.
Mudfordae, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 18.—Am. bor.
Mulkak, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 49.—As. cent.
multispinus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 597.—Persia.
Muschketowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 825.—Turkestan.
nanus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 112 (= *Phaca nana*).—Chili.
narynensis, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 6.—Oriens.
nubigenus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 103.—Chili.
occidentalis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 17.—Am. bor.
ochroleucus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 97 (= *Phaca ochroleuca*).—Chili.
ochtoranensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 596.—Persia.
oliganthus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 110 (= *Phaca oligantha*).—Chili.
oocalycis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 10.—Am. bor.
oreophilus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 104 (= *Phaca oreophila*).—Chili.
orites, *Reiche, l. c.* 94 (= *Phaca orites*).—Chili.
Palenae, *Reiche, l. c.* 85 (= *Phaca Palenae*).—Chili.
pallens, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 353, sphalm. = Palenae.
palousensis, *Piper, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 489.—Am. bor.
pamirensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
parvifolius, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 218.—Eur.
patagonicus, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 256 (= *Phaca patagonica*).—Patag.
pauperculus, *Greene, Pittonia*, iii. 224.—Am. bor.

ASTRAGALUS:—
phoenicis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 11.—Am. bor.
Pinonis, *M. E. Jones, l. c.* 14.—Am. bor.
playanus, *M. E. Jones, l. c.* 6.—Am. bor.
prunifer, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 239.—Am. bor.
pulchellus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 82 (= *Phaca pulchella*).—Chili.
pyrenaicus, *Rouy, Fl. Fr.* 192 (= *Oxytropis pyrenaica*).—Eur.
quindecimjugus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 83 (= *Phaca quindecimjuga*).—Chili.
Rahmeri, *Reiche, l. c.* 85 (= *Phaca Rahmeri*).—Chili.
rascheyaensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 982.—Syria.
rascheyanus, Freyn & Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlviii. 585 = rascheyaensis.
rufescens, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 981.—Persia.
rupestris, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 105 (= *Phaca Bustillosii*).—Chili.
salmonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 9.—Am. bor.
Sanctae-Crucis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 505.—Patag.
San-Romani, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 102 (= *Phaca San-Romani*).—Chili.
schizostegius, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 14.—As. Min.
schuschnasensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 983.—Oriens.
scophioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 241.—Am. bor.
somalensis, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 93.—Afr. trop.
sonneanus, *Greene, Pittonia*, iii. 186.—Am. bor.
stenonychioides, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 11.—As. Min.
stenophyllus, *Rouy, Fl. Fr.* v. 182.—Reg. Medit.
stereophyllus, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 8.—As. Min.
straturensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 19.—Am. bor.
striatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 113.—Chili.
taldelsensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
tenuiscapus, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 590.—Persia.
transcaspicus, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 16.—Oriens.
Traskiae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 102.—Am. bor.
tricolor, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 93 (= *Phaca tricolor*).—Chili.
vagus, *Reiche, l. c.* 106 (= *Phaca vaga*).—Chili.
variabilis, Rouy, Fl. Fr. v. 189 = Oxytropis foetida.
variegatus, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 592 = rufescens.
verticillatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 86 (= *Phaca verticillata*).—Chili.
vicarius, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 25.—As. cent.
Wilsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 196.—Am. bor.
xylobasis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 984.—Oriens.
xylorrhizus, Freyn & Sint. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1892, 46 = xylobasis.
zebedanensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 981.—Syria.

ASTROCARYUM, G. F. W. Mey. (Palm.).
echinatum, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 51.—Bras.
leiospatha, *Barb. Rodr. l. c.* 56.—Bras.

ASTROCHLAENA, Hallier f. (Convolv.).
tubiflora, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 228.—Afr. trop.

ASTRODAUCUS, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. (1898) 156. *UMBELLIFERAE.*
leptocarpus, *Drude, l. c.* 157 (= *Daucus leptocarpus*).—Oriens.
littoralis, *Drude, l. c.* (= *D. bessarabicus*).—Oriens.
orientalis, *Drude, l. c.* (= *D. pulcherrimus*).—Oriens.
persicus, *Drude, l. c.* (= *D. persicus*).—Persia.

ASTROLINON, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 231 = **Asterolinon**, Hoffmgg. & Link (Primul.).
pusillum, Bub. l. c. = A. stellatum.

ASTRONIA, Noronha (Melast.).
Stapfii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.

ASYSTASIA, Blume (Acanth.).
acuminata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 201 = coromandeliana.
africana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 134.—Afr. trop.
ansellioides, *C. B. Clarke, l. c.* 136.—Afr. trop.
australasica, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 230.—Austral.
calycina, Benth. in Hook. Niger Fl. 478 = coromandeliana.
congensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 132.—Afr. trop.
floribunda, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 200 = coromandeliana.
kalantha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 321.—Afr. trop.
multiflora, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 203 = coromandeliana.
parvula, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 132.—Afr. trop.
petalidioides, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 223.—Arabia.
podostachys, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 199 = coromandeliana.
pubescens, Klotzsch, l. c. 202 = coromandeliana.
quaterna, Nees, in DC. Prod. xi. 166 = coromandeliana.
querimbensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 204 = coromandeliana.
scabrida, Klotzsch, l. c. 202 = coromandeliana.
subhastata, Klotzsch, l. c. 200 = coromandeliana.

ATAMASCO, Rafin. = **Zephyranthes**, Herb. (Amaryll.).
arenicola, Greene, Pittonia, iii. 187 = Z. arenicola.
Atamasco, Greene, l. c. = Z. Atamasco.
pulchella, Greene, l. c. = Z. pulchella.
rosea, Greene, l. c. 188 = Z. rosea.
Simpsoni, Greene, l. c. 187 = Z. Simpsoni.
taubertiana, Greene, l. c. 188 = Z. taubertiana.
texana, Greene, l. c. 187 = Z. texana.
Treatiae, Greene, l. c. = Z. Treatiae.

ATAXIA, R. Br. = **Hierochloë**, S. G. Gmel. (Gramin.).
Ecklonis, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1840) 31 = Anthoxanthum Ecklonii.
Hookeri, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 77 = H. Hookeri.
tenuis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1840) 32 = Anthoxanthum Tongo.
Tongo, Trin. l. c. = Anthoxanthum Tongo.

ATHAMANTA, Linn. (Umbell.).
hirsuta, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, iv. 199 = cretensis.

ATHANASIA, Linn. (Compos.).
schistostephiodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 589.—Afr. trop.

ATHENAEA, Sendt. (Solanac.).
Nelsonii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 567.—Mexic.

ATHRIXIA, Ker-Gawl. (Compos.).
asteroides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 430.—Afr. austr.
diffusa, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.
feliciodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 565.—Afr. trop.
stenophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 270.—Afr. trop.

ATHYROCARPUS, Schlecht. (Commelin.).
efoveolatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 319 = Phaeosphaerion efoveolatum.
Matthewsii, Kuntze, l. c. = Phaeosphaerion Matthewsii.
pseudomonosperma, *Kuntze, l. c.*—Bras.

ATOMOSTIGMA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. (1898) 76. *ROSACEAE.*
mattogrossense, *Kuntze, l. c.*—Bras.

ATRACTOGYNE, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1896) 1261. *RUBIACEAE.*
Gabonii, *Pierre, l. c.* 1262.—Afr. trop.

ATRACTYLIS, Linn. (Compos.).
lutea, Bub. Fl. Pyren. ii. 151 = Carthamus lanatus.

ATRIPLEX, Tourn. (Chenopod.).
angustifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 426.—Chili.
Amanus, *Post, Fl. Syria*, 681.—Syria.
Autrani, *Post, l. c.* 682.—Syria.
Cachiyuyu, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xv. 518.—Reg. Argent.
Caput-medusae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 316.—Am. bor.
ceratophylla, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 266.—Am. austr.
Draconis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 40.—Am. bor.
eremicola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 284.—Am. bor.
fruticulosa, Osterh. l. c. 207 = eremicola.
kochiana, *Maiden, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xx. 87.—Austral.
lapathifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 133.—Am. bor.
Lorentzii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 266.—Reg. Argent.
maximowicziana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1896, 2.—Ins. Luchu.
nivea, *Merino, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxviii. 8.—Eur.
pabularis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 203.—Am. bor.
Reichei, *Volkens, ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 190.—Reg. Magell.
sagittifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 568.—Patag.
suckleyana, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 134 = A. Endolepis.
volutans, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 203.—Am. bor.
vulgatissima, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 569.—Patag.

ATROPIS, Rupr. (Gramin.).
angusta, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 717.—Afr. austr.
Borreri, *Stapf, l. c.* 716.—Afr. austr.
Foucaudi, *Hack. ex Fouc. in Ann. Soc. Sci. Char.-Inf.* xxxii. 222.—Corsica.
parviflora, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 226.—Reg. Magell.
Preslii, Hack, l. c. 227 = Catabrosa tenuifolia.
vilfoidea, *Rowler & Wieg. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 422 (= *Catabrosa vilfoidea*).—Am. austr.

ATTALEA, H. B. & K. (Palm.).
Boehmii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 59.—Afr. trop.
ceraensis, *Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 22.—Bras.
guaranitica, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 27.—Parag.
insignis, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 56 = Cocos insignis.

ATYLOSIA, Wight & Arn. (Legum.).
crassa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 47 (= *Dolichos crassus*).—Penins. Mal.

AUBRIETIA, Adans. (Crucif.).
thessala, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 288.—Eur.

AUCOUMEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1896) 1241. *BURSERACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

AUDIBERTIA, Benth. (Labiat.).
pachystachya, *Parish, in Erythea*, 1898, 91.—Am. bor.

AULACOCALYX, Hook. f. (Rubiac.).
auriculata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 67.—Afr. trop.
leptactinioides, *K. Schum. l. c.* xxiii. 453.—Afr. trop.

AULOJUSTICIA, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 324. *ACANTHACEAE.*
linifolia, *Lindau, l. c.*—Afr. austr.

AULOSPERMUM, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 174. *UMBELLIFERAE.*
cinerarium, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *Cymopterus cinerarius*).—Am. bor.
glaucum, *Coult. & Rose, l. c.* 176 (= *C. glaucus*).—Am. bor.
ibapense, *Coult. & Rose, l. c.* (= *C. ibapensis*).—Am. bor.
Jonesii, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *C. Jonesii*).—Am. bor.
longipes, *Coult. & Rose, l. c.* 175 (= *C. longipes*).—Am. bor.

AULOSPERMUM:—
panamintense, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 177 (= *C. panamintensis*).—Am. bor.
purpureum, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *C. purpureus*).—Am. bor.
Rosei, *Jones, ex Coult. & Rose, l. c.* 179.—Am. bor.
Watsoni, *Coult. & Rose, l. c.* 176.—Am. bor.

AULOSTEPHANUS, Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 451. *ASCLEPIADACEAE.*
natalensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

AUTUNESIA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 327 (1897). *COMPOSITAE.*
angolensis, *O. Hoffm. l. c.* (= *Newtonia angolensis*).—Afr. trop.

AUXOPUS, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. (1900) 275. *ORCHIDEAE.*
kamerunensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

AVENA, Linn. (Gramin.).
aenea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 279.—Ind. or.
airoides, Koel. Gram. 208 = subspicata.
americana, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vii. 183 = Hookeri.
andropogonoides, Steud. in Flora, 1829, 486 = Triraphis Rehmanni.
antarctica, Thunb. Prod. 22 = Avenastrum antarcticum.
argaea, Boiss. Fl. Orient. v. 546 = pratensis.
aristidioides, Thunb. Prod. 22 = Pentaschistis aristidioides.
Azo-carti, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 29.—Chili.
caffra, Stapf, in Kew Bull. 1897, 293 = Avenastrum caffrum.
Cavanillesii, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. I. 797.—Oriens; Reg. Medit.
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 278.—Ind. or.
colorata, Steud. in Flora, 1829, 481 = Pentaschistis juncifolia.
flaccida, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 280.—Ind. or.
flavescens, *Linn. Sp. Pl.* 80.—As. temp.; Afr. bor.
glomerata, Steud. in Flora, 1829, 483 = Pentaschistis curvifolia.
leonina, Steud. l. c. 484 = Avenastrum antarcticum.
longa, Stapf, in Kew Bull. 1897, 292 = Avenastrum longum.
malabarica, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 69 = Arundinella avenacea.
micans, *Hook. f. l. c.* 279.—Ind. or.
micrantha, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 3.—Am. bor.
mollis, Michx. Fl. Am. Bor. i. 72 = subspicata.
mortoniana, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 133.—Am. bor.
muricata, Spreng. Neue Entdeck. i. 247 = Pentaschistis aspera.
muriculata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 291.—Abyss.
mysorensis, Spreng. Syst. i. 337 = Tripogon bromoides.
Newtonii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 291.—Afr. trop.
orientalis, Schreb. Spicil. 52 = sativa.
pallida, Thunb. Prod. 22 = Pentaschistis Thunbergii.
phleoides, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. 601 = subspicata.
polyneura, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 277.—Ind. or.
quinqueseta, Steud. in Flora, 1829, 485 = Avenastrum quinquesetum.
rigida, Steud. l. c. 482 = Danthonia obtusifolia.
Rothii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 292.—Afr. trop.
sikkimensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 280.—Ind. or.
stipoides, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 4 (non Willd.).—Am. bor.
subspicata, *Clairv. Man. Herb.* 17.—Eur.; As.; Amer.
tolucensis, H.B.&K. Nov. Gen. et Sp. i. 148 = subspicata.
triseta, Thunb. Prod. 22 = Pentaschistis triseta.
turgidula, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 293.—Afr. austr.
valesiaca, Nym. Syll. 414 = Cavanillesii.

AVENASTRUM, Jess. (Gramin.).
alpinum, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena alpina*).—Eur.
antarcticum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 476.—Afr. austr.
caffrum, *Stapf, l. c.* 477.—Afr. austr.
Dodii, *Stapf, l. c.* 475.—Afr. austr.
dregeanum, *Stapf, l. c.* 473.—Afr. austr.
filifolium, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 54 (= *Avena filifolia*).—Eur.
longum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 476.—Afr. austr.

AVENASTRUM:—
pseudoviolaceum, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena pseudoviolacea*).—Eur.
quinquesetum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 475.—Afr. austr.
sesquitertia, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena sesquitertia*).—Eur.
turgidulum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 474.—Afr. austr.
versicolor, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena versicolor*).—Eur.

AXONOPUS, Beauv. Agrost. 12 (1812). *GRAMINEAE.*
cimicinus, *Beauv. l. c.*—As. or.; Malaya.
corymbosus, Schult. Mant. ii. 177 = Digitaria sanguinalis.
semialatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 64.—Ind. or.

AXYRIS, Linn. (Chenopod.).
caucasica, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 430.—Reg. Caucas.

AYENIA, Loefl. (Stercul.).
echinococca, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 24.—Bras.
fruticosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.
schumanniana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 24.—Bolivia.

AZALEA, Linn. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
dilatata, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 7681 = R. dilatatum.

AZALEASTRUM, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 297. *ERICACEAE.*
albiflorum, *Rydb. l. c.* (= *Rhododendron albiflorum*).—Am. bor.

AZORELLA, Lam. (Umbellif.).
acaulis, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Huanaca acaulis*).—Reg. Magell.
andina, *Drude, l. c.* (= *Huanaca andina*).—Chili.
Bovei, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 58.—Fuegia.
coriacea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 111 (= *Pozoa coriacea*).—Reg. Andin.
exigua, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Pozoa exigua*).—N. Zel.
fuegiana, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 58.—Fuegia.
Haastii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Pozoa Haastii*).—N. Zel.
Hookeri, *Drude, l. c.*—N. Zel.
pallida, *Kirk, Fl. N. Zeal.* 193 (= *Pozoa pallida*).—N. Zel.
radians, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132.—N. Zel.
trifoliolata, Hook. f. Fl. N. Zel. i. t. 18 = Hookeri.

B

BABIANA, Ker-Gawl. (Irid.).
caerulescens, Eckl. Verz. 32 = plicata.
obtusifolia, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. 234 = stricta.
pygmaea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. 165.—Afr. austr.
rubro-cyanea, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. 234 = stricta.
spathacea, Ker-Gawl. ex Sims, in Bot. Mag. t. 638 = mucronata.
Sprengelii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. 165.—Afr. austr.
stellata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 99 (non Eckl.).—Afr. austr.
stenomera, *Schlechter, l. c.* 100.—Afr. austr.
sulphurea, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. 234 = stricta.
umbellata, Ker-Gawl. Gen. Irid. 31 = Moraea edulis.
velutina, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 100.—Afr. austr.
villosa, Ker-Gawl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 176 = stricta.

BACCAUREA, Lour. (Euphorb.).
macrophylla, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 21 (non Muell. Arg.).—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.
Staudtii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 521.—Afr. trop.

BACCHARIS, Linn. (Compos.).
abietina, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 132.—Chili.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 611.—Patag.
Czermakii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 173.—Bras.
debilis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 60.—Bolivia.
Dusenii, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 244.—Patag.
fallax, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 132.—Bolivia.
Jelskii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 24.—Ecuador.
lloensis, *Hieron. l. c.* 27.—Ecuador.
macrocephala, *Sch. Bip. ex Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 576.—Am. cent.
mapirensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 61.—Bolivia.
neglecta, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 394.—Am. bor.
oblanceolata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 61.—Bolivia.
oppositifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 133.—Bolivia.
padifolia, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 26.—Ecuador.
pentodonta, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 52.—Bras.
perulata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 133.—Reg. Argent.
plucheaeformis, *Kuntze, l. c.* 134.—Reg. Argent.
pululahuensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 23.—Ecuador.
Sodiroi, *Hieron. l. c.* 25.—Ecuador.
Vitis-idaea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 135 (non Oliver).—Bolivia.

BACOPA, Aubl. (Scrophul.).
alternifolia, *Engl. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 313, nomen.—Afr. trop.
punctata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 499.—Afr. trop.

BACTRIS, Jacq. (Palm.).
Anizitzii, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 19.—Parag.
chapadensis, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 41.—Bras.
cuyabaensis, *Barb. Rodr. l. c.* 42.—Bras.
Fragae, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 5. 11.—Bras.
lindmanniana, *Drude, ex Lindm. l. c.* 12.—Bras.
mattogrossensis, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 38.—Bras.
Mindellii, *Barb. Rodr. in Plant. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 19.—Bras.

BAERIA, Fisch. & Mey. (Compos.).
hirsutula, *Greene, Fl. Francisc.* 438 (= *Lasthenia hirsuta*).—Am. bor.
microglossa, *Greene, l. c.* (= *Burrielia microglossa*).—Am. bor.
tenella, *Greene, l. c.* 439 (= *Dichaeta uliginosa*).—Am. bor.

BAGUENAUDIERA, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 513 = **Colutea**, Tourn. (Legum.).
arborea, Bub. l. c. = C. arborescens.

BAHIA, Lag. (Compos.).
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 309.—Mexic.
xylopoda, *Greenm. l. c.* 577.—Am. cent.

BAIKIAEA, Benth. (Legum.).
anomala, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 72.—Afr. trop.

BAILEYA, Harv. & Gray (Compos.).
nervosa, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 34.—Am. bor.

BAILLONIA, Bocq. (Verben.).
juncea, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1144 = Diostea juncea.

BAISSEA, A. DC. (Apocyn.).
Bailloni, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 8.—Afr. trop.
borneensis, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 20.—Arch. Mal.
floribunda, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 12 (= *Guerkea floribunda*).—Afr. trop.
gracillima, *Hua, l. c.* (= *Guerkea gracillima*).—Afr. trop.
Heudeloti, *Hua, l. c.* 9.—Afr. trop.
major, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 675.—Afr. trop.

BAISSEA:—
micrantha *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 11.—Afr. trop.
ogowensis, *Hua, l. c.* 10.—Afr. trop.
spectabilis, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
Tholloni, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
uropetala, *Hua, l. c.* 12 (= *Guerkea uropetala*).—Afr. trop.
Welwitschii, *Stapf, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 675 (= *Perinerion Welwitschii*).—Afr. trop.
Wulfhorstii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 816.—Afr. trop.

BALANSAEPHYTUM, Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 82. *URTICACEAE.*
tonkinense, *Drake, l. c.* 83.—Tonkin.

BALBISIA, Cav. (Geran.).
microphylla, *Reiche, Fl. Chile*, i. 294 (= *Ledocarpum microphyllum*).—Chili.

BALFOURODENDRON, Mello (Rutac.).
riedelianum, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 174 = eburneum.

BALISAEA, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. (1896) 436. *LEGUMINOSAE.*
genistoides, *Taub. l. c.* 437.—Bras.

BALLOTA, Linn. (Labiat.).
acuta, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 259 = rupestris.
cinerea, Briq. l. c. 260 = hirsuta.
Labillardieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 112.—Syria.
velutina, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 599.—Eur.

BALSAMEA, Gled. = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).
angolensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 124 = C. angolensis.
foliolosa, Hiern, l. c. 126.—Afr. trop.
fraxinoides, Hiern, l. c. 125.—Afr. trop.
longebracteata, Hiern, l. c. 124 = C. longebracteata.
Mulelame, Hiern, l. c. 125.—Afr. trop.
multijuga, Hiern, l. c. 126.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 124 = C. Welwitschii.

BALSAMORHIZA, Hook. f. (Compos.).
Balsamorhiza, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 132 = Hookeri.
floccosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 628.—Am. bor.
tomentosa, *Rydb. l. c.* 629.—Am. bor.

BAMBUSA, Schreb. (Gramin.).
albo-marginata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1900, 31 = Arundinaria Veitchii.
amahussana, Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.
andropogonifolia, Griff. Itin. Notes, 124 = Ophalostachyum pallidum.
arundinacea, Ait. Hort. Kew. ed. II. 316 = vulgaris.
atra, Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.
auriculata, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 86.—Ind. or.
Binghami, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 45.—Ind. or.
borealis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 720.—Japon.
Brandisii, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 109 = Dendrocalamus Brandisii.
burmanica, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 35.—Ind. or.
calostachya, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. II. 250 = Dendrocalamus calostachyus.
critica, Kurz, l. c. = pallida.
cyanostachya, Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 389 = polymorpha.
elegantissima, Hassk. Pl. Jav. 42 = Schizostachyum elegantissimum.
Falconeri, Munro, in Trans. Linn. Soc xxvi. 95 = nutans et Dendrocalamus Hamiltonii.
globifera, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 72 = Dendrocalamus Hookeri.
Helferi, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 114 = Teinostachyum Helferi.
heterostachya, Munro, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 400 = Gigantochloa heterostachya.
kingiana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 46.—Ind. or.
kurilensis, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 719 = Arundinaria kurilensis.

BAMBUSA:—
latiflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. II. 250 = Dendrocalamus latiflorus.
longispatha, Kurz, l. c. 249 = Dendrocalamus longispathus.
Macala, Buch.-Ham. ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 387 = B. Tulda.
Mac-Clellandi, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 114 = Dinochloa Mac-Clellandi.
Oliveriana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 130.—Ind. or.
orientalis, Nees, in Linnaea, ix. 475 = arundinacea.
patellaris, Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 406 = Dendrocalamus patellaris.
picta, Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.
prava, Lindl. l. c. = lineata.
regia, Thoms. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 116 = Thyrsostachys siamensis.
Ridleyi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 34.—Ind. or.
Ritcheyi, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 113 = Oxytenanthera monostigma.
rumphiana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. II. 86 = lineata.
scandens, Blume, ex Nees, in Flora, vii. (1824) 291 = Dinochloa Tjankorreh.
schizostachyoides, *Kurz, ex Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 48.—Ind. or.
scriptoria, Dennst. Schlüss. Hort. Malab. 31 = Ochlandra Rheedii.
spinosa, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. 480 = arundinacea.
stenostachya, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 725.—Formosa.
stridula, Moon, Cat. 26 = Ochlandra stridula.
tanaea, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5038A = Dendrocalamus strictus.
Wightii, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 111 = Ochlandra Brandisii.

BAMLERA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 481 (1900). *MELASTOMACEAE.*
insignis, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

BANALIA, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 568 = **Hedysarum** Tourn. (Legum.).
alpina, Bub. l. c. 570 = H. alpinum.
humilis, Bub. l. c. 569 = H. humile.

BANARA, Aubl. (Samyd.).
arguta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, iv. 223.—Parag.
exechandra, *Briq. l. c.* ii. 48.—Bras.
Hassleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 54.—Parag.
portoricensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 370.—Ind. or.
umbraticola, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 280.—Urug.

BANISTERIA, Linn. (Malpigh.).
guatemalensis, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1900, hiem., 6.—Guatem.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 16.—Parag.
lanceolata, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1900, hiem., 17.—Bras.
lanuginosa, *Niedenzu, l. c.* 1899, i. 9 (= *Stigmatophyllum lanuginosum*).—Am. trop.
ovata, *Niedenzu, l. c.* 1900, hiem., 7.—Bras.
padifolia, *Poepp. ex Niedenzu, l. c.* 8.—Peruv.
quitensis, *Niedenzu, l. c.* 10.—Ecuador.

BAPHIA, Afzel. (Legum.).
aurivellerea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 174.—Afr. trop.
barombiensis, *Taub. l. c.* 177.—Afr. trop.
borneensis, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2456.—Borneo.
brachybotrys, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 200; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 281.—Afr. trop.
Buettneri, *Harms, ll. cc.*—Afr. trop.
crassifolia, *Harms, l. c.* 200; *l. c.* 280.—Afr. trop.
chrysophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 175.—Afr. trop.
cuspidata, *Taub. l. c.* 176.—Afr. trop.
densiflora, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 200; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 280.—Afr. trop.
Dinklagei, *Harms, l. c.* 200; *et l. c.* 279.—Afr. trop.
gracilipes, *Harms, l. c.*; *et l. c.* 280.—Afr. trop.

BAPHIA:—
henriquesiana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 176.—Afr. trop.
hylophila, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 200; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 282.—Afr. trop.
leptobotrys, *Harms, ll. cc.*—Afr. trop.
longepetiolata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 176.—Afr. trop.
obovata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 815.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 175.—Afr. trop.
Zenkeri, *Taub. l. c.* 174.—Afr. trop.

BAPTISIA, Vent. (Legum.).
cuneata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 139.—Am. bor.
Hugeri, *Small, l. c.*—Am. bor.
laevicaulis, *Small, l. c.* 134.—Am. bor.
texana, *Pollard & Ball, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 133.—Am. bor.

BARBACENIA, Vand. (Amaryll.).
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 363.—Afr. trop.
hereroënsis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 49.—Afr. austr.

BARBAREA, R. Br. (Crucif.).
americana, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 174.—Am. bor.
cochlearifolia, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 783.—Japon.
longirostris, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1898, 1.—Eur.
macrophylla, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 58.—Graecia.
patens, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 783.—Japon.

BARLERIA, Linn. (Acanth.).
Afzelii, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 319 = flava.
albostellata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 162.—Afr. trop.
Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 212.—Afr. trop.
cardiocalyx, Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 105 = orbicularis.
chlamydocalyx, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 73 = orbicularis.
clivorum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 153.—Afr. trop.
crassa, *C. B. Clarke, l. c.* 151.—Afr. trop.
Delamerei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 206.—Afr. trop.
Descampsi, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 318.—Afr. trop.
diacantha, *Nees, in DC. Prod.* xi. 238, partim.—Afr. trop.
elegans, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 269.—Afr. trop.
eranthemoides, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64.—Afr. trop.
farinosa, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 222.—Arabia.
fulvostellata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 163.—Afr. trop.
grandiflora, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = grandis.
Harnierii, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 106 = parviflora.
homoiotricha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 154.—Afr. trop.
hypocrateriformis, Hochst. ex T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 28 = eranthemoides.
induta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 146.—Afr. trop.
jucunda, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 75 = argentea.
lancifolia, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 28 = alata.
linearifolia, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 397.—Afr. trop.
longipedunculata, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 69.—Bolivia.
longissima, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 93.—Afr. trop.
Lugardii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 161.—Afr. trop.
Marghilomanae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis,* 216.—Afr. trop.
micrantha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 168.—Afr. trop.
mollis, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = ventricosa.
mucronifolia, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 71.—Afr. trop.

BARLERIA:—
neurophylla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 166.—Afr. trop.
nyasensis, *C. B. Clarke, l. c.* 150.—Afr. trop.
obtusisepala, *C. B. Clarke, l. c.* 158.—Afr. trop.
Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 377.—Afr. austr.
Pirottaei, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 75 = Hochstetteri.
proxima, *Lindau, l. c.* 72.—Afr. trop.
Pseudoprionitis, Lindau, l. c. 73 = Smithii.
pumila, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 372 = Justicia diffusa.
quadrispina, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 72.—Afr. trop.
ramulosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 150.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 203.—Afr. trop.
rhynchocarpa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 204 = Crossandra nilotica.
Rivaei, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 74 = Hochstetteri.
rotundisepala, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 376.—Afr. austr.
setigera, *Rendle, l. c.* 1896, 395.—Afr. trop.
Smithii, *Rendle, l. c.* 396.—Afr. trop.
squarrosa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 207 = spinulosa.
stelligera, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 71.—Afr. trop.
Steudneri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 155.—Afr. trop.
triacantha, *Nees, in DC. Prod.* xi. 240.—Afr. trop.
vixdentata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 165.—Afr. trop.
waggana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 377.—Afr. austr.

BARLERIANTHUS, Oerst. = **Barleria**, Linn. (Acanth.).
grandis, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 136 = B. grandis.

BARNADESIA, Mutis. (Compos.).
glomerata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 135.—Bolivia.
laurifolia, Kuntze, l. c. = Fucaldea laurifolia.
Lehmannii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 77.—Ecuador.
macrocephala, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 135.—Bolivia.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 78.—Ecuador.
venosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 69.—Bolivia.

BARRINGTONIA, Forst. (Myrtac.).
calophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 463.—N. Guin.
gigantostachya, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 9.—Java.

BARTERIA, Hook. f. (Passiflor.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. I. 8.—Afr. trop.

BARTONIA, Muhl. (Gentian.).
iodandra, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 47.—Am. bor.

BARYXYLUM, Lour. (Legum.).
adnatum, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 390 (= *Peltophorum adnatum*).—Ins. Baham.
africanum, *Pierre, l. c.* (= *P. africanum*).—Afr. trop.
brasiliense, *Pierre, l. c.* (= *P. Linnaei*).—Jamaic.
dasyrachis, *Pierre, l. c.* t. 391 A (= *P. dasyrachis*).—Malacca.
dubium, *Pierre, l. c.* sub t. 390 (= *P. vogelianum*).—Bras.
grande, *Pierre, l. c.* (= *P. grande*).—Hab. ?
inerme, *Pierre, l. c.* t. 390 (= *P. ferrugineum*).—Austral.
tonkinense, *Pierre, l. c.* t. 391 C.—Cochinch.

BASEONEMA, Schlechter & Rendle, in Journ. Bot. 1896, 97. *ASCLEPIADACEAE.*
Gregorii, *Schlechter & Rendle, l. c.*—Afr. austr.

BASSIA, All. = **Chenolea**, Thunb. (Chenopod.).
reuteriana, Guerke, Pl. Europ. ii. 151 = Kochia reuteriana.

BASSIA, Koenig (Sapotac.).
Thurstonii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2569.—Ins. Fiji.

BASSOVIA, Aubl. (Solan.).
anceps, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 197 (= *Solanum anceps*).—Peruv.
Fendleri, *Rusby, l. c.*—Am. austr.
inaequilatera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 90.—Bolivia.

BATESANTHUS, N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t. 2500 (1896). *ASCLEPIADACEAE.*
purpureus, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.

BATODENDRON, Nutt. = **Vaccinium**, Linn. (Vacciniac.).
glaucescens, Greene, Pittonia, iii. 326.—Am. bor.
speciosum, Greene, l. c.—Am. bor.

BATRACHIUM, S. F. Gray = **Ranunculus**, Tourn. (Ranunc.).
Lobbii, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 13 = R. Lobbii.

BATRATHERUM, Nees = **Arthraxon**, Beauv. (Gramin.).
khasianum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 144 = A. breviaristatus.
submuticum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 382 = A. submuticus.

BAUERELLA, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, ii. (1898) 153. *RUTACEAE.*
australiana, *Borzi, l. c.* 155.—Austral.

BAUHINIA, Linn. (Legum.).
albolutea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 181.—Malaya.
amblyophylla, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 548.—Am. cent.
Bainesii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1. 121.—Afr. trop.
brachyscypha, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
caloneura, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11. 29.—Bras.
Cavanillei, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 364 = inermis.
Creaghi, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 21.—Borneo.
Curtisii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 195.—Penins. Mal.
enigmatica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 496.—Ind. or.
griffithiana, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 183.—Penins. Mal.
guaranitica, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 7. 30.—Am. austr.
Hullettii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 183.—Penins. Mal.
kalantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 398.—Afr. trop.
Kingii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 189.—Penins. Mal.
macropoda, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 629.—Celebes.
Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 290.—Ind. or.
Ridleyi, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 185.—Penins. Mal.
saccocalyx, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 400 B.—Cochinch.
Scortechinii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 188.—Penins. Mal.
seleriana, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 549.—Am. cent.
Seminarioi, *Harms, ex Eggers, in Bot. Centralbl.* lxxiii. 69.—Ecuador.
stenoscypha, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
strychnoidea, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 195.—Penins. Mal.
unilaterale, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 233.—Am. cent.
wituensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 275.—Afr. trop.
Wrayi, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 191.—Penins. Mal.

BAUMANNIA, DC. = **Damnacanthus**, Gaertn. (Rubiac.).
hedyotoidea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 456.—Afr. trop.

BECHIUM, DC. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
scapiforme, DC. Prod. v. 71 = V. scapiformis.

BECKERA, Fresen. (Gramin.).
dioica, Heynh. Nom. ii. 63 = Pennisetum unisetum.
glabrescens, Steud. Syn. Pl. Gram. 118 = Pennisetum unisetum.

BECKWITHIA, Jepson, in Erythea, vi. (1898) 97. *RANUNCULACEAE.*
Austinae, *Jepson, l. c.*—Calif.

BEESHA, Munro = **Ochlandra**, Thw. (Gramin.).
elegantissima, Kurz, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 146 = Schizostachyum tenue.
stridula, Munro, l. c. 145 = O. stridula.
travancorica, Bedd. Forest. Man. Bot. 234 = O. travancorica.

BEGONIA, Tourn. (Begon.).
argentinensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 53.—Reg. Argent.
Augustinei, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1900, II. 286.—China.
Bangii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 105.—Bolivia.
barbana, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 261.—Am. cent.
Biolleyi, *C. DC. l. c.* 263.—Am. cent.
bonthainensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 37.—Celebes.
bretschneideriana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2635.—China.
chaetocarpa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 105.—Bolivia.
comata, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
cuspidata, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 260.—Am. cent.
dielsiana, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 479.—China.
Heddei, *Warb. in Wittm. Gartenfl.* 1900, 1.—Hort.
hemsleyana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7685.—China.
heteroclinis, *Miq. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 484.—Celebes.
hispidissima, *Zipp. ex Koord. l. c.* 485.—Celebes.
hygrophila, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 265.—Am. cent.
juntasensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 106.—Bolivia.
Lauterbachii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 458.—N. Guin.
Lehmbachii, *Warb. in Wittm. Gartenfl.* 1900, 281.—Afr. trop.
leptophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 445.—Bras.
macrura, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.
papuana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 458.—N. Guin.
Ragozini, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 4.—Bras.
santarosensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 106.—Bolivia.
Schlechteri, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.
Somervillei, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 17.—Ins. Solomon.
Tonduzii, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 264.—Am. cent.
umbraculifera, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7457.—Bras.
venosa, *Skan, ex Hook. f. l. c.* t. 7657.—Bras.
Warburgii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 459.—N. Guin.
Warpuri, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2656.—Madag.
Weigallii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1890, 17.—Ins. Solomon.

BEILSCHMIEDIA, Nees (Laurac.).
fruticosa, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 386.—Afr. trop.
nitida, *Engl. l. c.* 387.—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 388.—Afr. trop.

BELLEVALIA, Lapeyr. = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).
Freynii, F. Foerst. in Bull. Herb. Boiss. v. 73.—As. Min.
Millingeni, Post, in Mém. Herb. Boiss. no. 18. 101.—Cyprus.
silvestris, Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto, 1896, 215.—Eur.

BELLIA, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 411 = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).
aurata, Bub. l. c. 412 = C. aureum.
hirsuta, Bub. l. c. 413 = C. hirsutum.
temulenta, Bub. l. c. 412 = C. temulum.

BELLIS, Tourn. (Compos.).
majoricensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 121.—Eur.
margaritifolia, *Huter, in Jahrescat. Wien. Bot. Tauschanst.* 1899, 107.—Eur.

BELMONTIA, E. Mey. (Gentian.).
debilis, *Schinz, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. 332.—Afr. trop.
divaricata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 274.—Madag.
micrantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 102.—Afr. austr.
oligantha, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
primulaeflora, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.

BELOPERONE, Nees (Acanth.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 104.—Bolivia.
cochabambensis, *Rusby, l. c.* 103.—Bolivia.
consanguinea, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 676.—Bolivia.
Hassleri, *Lindau, l. c.* vi. *App.* I. 30.—Parag.
Mandoni, *Lindau, l. c.* v. 676.—Bolivia.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 488.—Mexic.
nuda, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 103.—Bolivia.
pubinervia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 675.—Peruv.
urophylla, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 316.—Am. cent.
variegata, *Lindau, l. c.* 315.—Am. cent.

BENTHAMANTHA, Alef. = **Cracca**, Benth. (Legum.).
caribaea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 53 = C. caribaea.
sericea, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1900, 19 = C. sericea.

BENTHAMIELLA, Speg. (Solanac.).
acutifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 555.—Patag.
longifolia, *Speg. l. c.*—Patag.
Nordenskioldii, *P. Dusén, ex N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2636 A.—Patag.
pycnophylloides, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 556.—Patag.

BERARDIA, Brongn. = **Nebelia**, Neck. (Bruniac.).
trigyna, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 315.—Afr. austr.
velutina, Schlechter, l. c. 25.—Afr. austr.

BERBERIS, Tourn. (Berber.).
brevifolia, *Philippi, ex Reiche, Fl. Chile*, i. 42.—Chili.
fragrans, *Philippi, l. c.* 38.—Chili.
haematocarpa, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor.
Hemsleyi, *Donn. Sm. in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 17.—Am. cent.
koreana, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 22.—Corea.
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 3.—Patag.
nana, *Greene, Pittonia*, iii. 98.—Am. bor.
phyllacantha, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 4.—Bolivia.

BERCHEMIA, Neck. (Rhamn.).
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 123.—Arab.

BERENDTIA, A. Gray (Scroph.).
levigata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 39.—Mexic.

BERENDTIELLA, Wettst. & Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register, 459 (1899) = **Berendtia**, A. Gray (Scroph.).

BERGHAUSIA, Endl. = **Garnotia**, Brongn. (Gramin.).
elata, Arn. ex Miq. Anal. Bot. Ind. 32 = G. scoparia.
Emodi, Endl. ex Miq. l. c. = G. polypogonoides.
mutica, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. 362 = G. tectorum.
scoparia, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 242 = G. scoparia.

BERGIA, Linn. (Elatin.).
pentheriana, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 58.—Afr. austr.
prostrata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 22.—Afr. trop.
spathulata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 526.—Afr. austr.

BERKHEYA, Ehrh. (Compos.).
Adlami, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7514.—Afr. austr.
amplexicaulis, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
andongensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 375.—Afr. trop.
angolensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 475.—Afr. trop.
angusta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 219.—Afr. austr.
arctiifolia, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
buphthalmoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343 (= *Stobaea buphthalmoides*).—Afr. austr.
carlinopsis, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 34.—Afr. trop.
echinopsoides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
Evansii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 501.—Afr. austr.
gracilis, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 35.—Afr. trop.
hypoleuca, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343.—Afr. austr.
Kuntzei, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
latifolia, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 351.—Afr. austr.
maritima, *J. M. Wood, in Journ. Bot.* 1899, 253.—Afr. austr.
montana, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 351.—Afr. austr.
parvifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
polyacantha, *Baker, l. c.* 156.—Afr. trop.

BERKHEYOPSIS, O. Hoffm. (Compos.).
Kuntzei, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 136.—Afr. austr.

BERLA, Bub. Fl. Pyren. ii. 356 (1900) = **Sium**, Tourn. (Umbellif.).
monspeliensium, Bub. l. c. 357 = S. erectum.

BERLINIA, Soland. (Legum.).
densiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
Scheffleri, *Harms, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84.—Afr. trop.

BERMUDIANA, Tourn. = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).
Bermudiana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 305 = S. Bermudiana.
humilis, Kuntze, l. c. = S. humile.
leucantha, Kuntze, l. c. = S. leucanthum.
rigidifolia, Kuntze, l. c. = S. rigidifolium.

BERNARDIA, Houst. (Euphorb.).
Bernardia, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. I. 58 = dichotoma.

BERRIA, Roxb. (Tiliac.).
quinquelocularis, *Teysm. & Binn. ex Koord. & Valet. in Ic. Bogor.* t. 5.—Java.

BERSAMA, Fresen. (Sapind.).
acutidens, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 173.—Afr. trop.
andongensis, *Hiern, l. c.* 174.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 424.—Afr. trop.

BERTIERA, Aubl. (Rubiac.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 28.—Afr. trop.
glabrata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 450.—Afr. trop.
globiceps, *K. Schum. l. c.* 451.—Afr. trop.
retrofracta, *K. Schum. l. c.* 452.—Afr. trop.
spicata, K. Schum. l. c. 451 = africana.

BESLERIA, Plum. (Gesner.).
imbricans, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 155.—Am. cent.
longipedunculata, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxvii. 69.—Bolivia.
macropoda, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 155.—Am. cent.
pauciflora, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 31.—Am. austr.
robusta, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 156.—Am. cent.
rotundifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 98.—Bolivia.

BESLERIA:—
Seitzii, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 325.—Ind. occ.
Sprucei, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 31.—Am. austr.

BETONICA, Tourn. = **Stachys**, Tourn. (Labiat.).
purpurea, Bub. Fl. Pyren. i. 449 = S. Betonica.

BETULA, Tourn. (Cupulif.).
albo-sinensis, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 497.—China.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 205.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
insignis, *Franch. l. c.* 206.—China.
kenaica, *W. H. Evans, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 481.—Am. bor.

BIASOLETTIA, Koch (Umbellif.).
Barbeyi, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 614.—Ins. Rhodes.
cynapioides, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 150 (= *Carum cylindricum*).—Oriens.
pumila, Drude, l. c. (= *Freyera pumila*).—Eur.
stylosa, Drude, l. c. (= *Freyera stylosa*).—Eur.

BICORNELLA, Lindl. (Orchid.).
arabica, Deflers, Voy. Yemen, 208. t. 6 = Habenaria arabica.

BICUCULLA, Borckh. (Papav.).
formosa, Howell, Fl. N. W. Amer. 33 (= *Dicentra formosa*).—Am. bor.
ochroleuca, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 55 (= *D. ochroleuca*).—Am. bor.
pauciflora, Howell, Fl. N. W. Amer. 34 (= *D. pauciflora*).—Am. bor.
uniflora, Howell, l. c. (= *D. uniflora*).—Am. bor.

BIDENS, Linn. (Compos.).
africana, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 464.—Ins. Bourbon.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 588.—Afr. trop.
comosa, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 436.—Am. bor.
decipiens, *Warnst. in Herb. Eur.* 1896, 3.—Eur.
decumbens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxi. 576.—Am. cent.
dentata, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 412.—Am. bor.
melanocarpa, *Wiegand, l. c.* 405.—Am. bor.
Nashii, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 481.—Am. bor.
peucedanifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 136 (= *Cosmos peucedanifolius*).—Bolivia.
speciosa, *Parish, in Zoe*, v. 75.—Am. bor.
vulgatus, *Greene, Pittonia*, iv. 72.—Am. bor.

BIERMANNIA, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. (1897) 591. *ORCHIDEAE.*
quinquecallosa, *King & Pantl. l. c.*—Ind. or.

BIFARIA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. (1898) 359. *GRAMINEAE.*
bifaria, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum bifarium*).—Bras.
caudiculata, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum caudiculatum*).—Bras.
elytrochaeta, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum elytrochaetum*).—Bras.

BIFARIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 164. *LORANTHACEAE.*
abyssinica, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Afr. trop.
Aitchisoni, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Afghan.
albicans, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ind. occ.
aoraiensis, *Van Tiegh. l. c.* 169 (= *Viscum aoraiense*).—Geront. trop.
apiculata, *Van Tiegh. l. c.* 174.—Ind. or.
attenuata, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ind. or.
Balansae, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
Balfouri, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Rodriguez.
bigibba, *Van Tiegh. l. c.* 171.—Ins. Norfolk.
Bojeri, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Maurit.
breviarticulata, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Austral.
capensis, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Afr. austr.
Commersoni, *Van Tiegh. l. c.*—Madag.
complanata, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.
coralloides, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
coriacea, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
crassa, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.

BIFARIA:—
cylindrica, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 166.—Ins. Sandw.
davidiana, *Van Tiegh. l. c.* 173.—China.
dichotoma, *Van Tiegh. l. c.* 171.—N. Caled.
disticha, *Van Tiegh. l. c.* (= *Viscum distichum*).—Ins. Norfolk.
fasciata, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.
fasciculata, *Van Tiegh. l. c.* 174.—China.
flava, *Van Tiegh. l. c.* 166.—Ins. Sandw.
garhwalensis, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
Gaudichaudii, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Bourbon.
Helleri, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Hillebrandi, *Van Tiegh. l. c.*—Ins. Sandw.
howensis, *Van Tiegh. l. c.* 171.—Ins. Dom. Howe.
Humbloti, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Ins. Comor.
Jacquemonti, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
japonica, *Van Tiegh. l. c.* 173 (= *Viscum japonicum*).—Geront.
khasiensis, *Van Tiegh. l. c.* 174.— Ind. or.
latissima, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Lepini, *Van Tiegh. l. c.* 169.—Ind. occ.
Mannii, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Metzii, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
mixta, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
multicostata, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
ovalis, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
Pancheri, *Van Tiegh. l. c.*—N. Caled.
Perrottetii, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
platycaula, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ind. occ.
platystachya, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
Remyi, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.
Richardi, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Bourbon.
rubescens, *Van Tiegh. l. c.* 169.—Ind. occ.
rubra, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Austral.
rugosa, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
spiciformis, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Japon.
taenioides, *Van Tiegh. l. c.* 176 (= *Viscum taenioides*).—Geront.
tricostata, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
vitiensis, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ins. Fiji.
vittata, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Walkeri, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
Wightii, *Van Tiegh. l. c.*—Ind. or.

BIGELOWIA, DC. (Compos.).
glauca, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 375 (= *Chrysothamnus glaucus*).—Am. bor.
hypoleuca, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 18 (non A. Gray).—Ecuador.
pyramidata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Mexic.

BIGNONIA, Tourn. (Bignon.).
benensis, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 70.—Bolivia.
boliviana, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
brevipes, *Rusby, l. c.* 71.—Bolivia.
egensis, Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 66 = Arrabidaea egensis.
impressa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 100.—Bolivia.
inaequilatera, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 222.—Bras.
Karstenii, Klotzsch, ex Bureau & K. Schum. l. c. 130 = Anemopaegma Karstenii.
laxiflora, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 197 (= *Tynanthus myrianthus*).—Bras.
myrianthus, *Poepp. l. c.* (= *Tynanthus myrianthus*).—Bras.
Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 100.—Bolivia.
pratensis, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 256.—Bras.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 71.—Bolivia.
tecomaeflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 101.—Bolivia.

BILLBERGIA, Thunb. (Bromel.).
Binoti, *R. Gerard, in Journ. Soc. Hort. Rhône*, 1896 (1).—Bras.
Canterae, *André, in Rev. Hortic.* 1897, 60.—Bras.

BIPINNULA, Comm. (Orchid.).
montana, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 282.—Urug.

BISERRULA, Linn. (Legum.).
mediterranea, Bub. Fl. Pyren. ii. 532 = B. Pelecinus.

BLAERIA, Linn. (Ericac.).
microdonta, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 272.—Afr. trop.

BLAKEA, P. Br. (Melast.).
boliviensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 94 = Topobea boliviensis.

BLECHUM, P. Br. (Acanth.).
Blechum, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. I. 100 = Brownei.
hamatum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 220 = Ecbolium hamatum.

BLEPHARIPAPPUS, Hook. (Compos.).
neomexicanus, *Greene, Pittonia*, iii. 168 (= *Layia glandulosa*).—Am. bor.
nudatus, *Greene, l. c.*—Am. bor.

BLEPHARIS, Juss. (Acanth.).
acanthodioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 229, partim = B. Asteracanthus.
Asteracanthus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 100.—Afr. trop.
Bainesii, *S. Moore, ex C. B. Clarke, l. c.* 98.—Afr. trop.
cuspidata, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 76 = molluginifolia.
diversispina, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 104.—Afr. trop.
fruticulosa, *C. B. Clarke, l. c.* 99.—Afr. trop.
grandis, *C. B. Clarke, l. c.* 104.—Afr. trop.
involucrata, Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 107 = boerhaaviaefolia.
leptophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 812.—Afr. trop.
obmitrata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 101.—Afr. trop.
Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 375.—Afr. austr.
pinguior, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 97.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *C. B. Clarke, l. c.* 99.—Afr. trop.
saturejaefolia, Pers. Syn. ii. 180 = molluginifolia.
Sol, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 100.—Afr. trop.
tenuiramea, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 205.—Afr. trop.
Togodelia, Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 108 = boerhaaviaefolia.

BLEPHARISPERMUM, Wight (Compos.).
hirtum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2435.—Arab.
yemense, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 105.—Arab.

BLEPHAROCALYX, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).
angustifolius, Berg, in Linnaea, xxvii. 421 = M. montevidensis.

BLEPHAROCHLOA, Endl. = **Leersia**, Sw. (Gramin.).
ciliata, Endl. Gen. 1352 = L. hexandra.

BLEPHARODON, Decne. (Asclep.).
reflexus, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7. 90.—Bras.

BLEPHARONEURON, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 88. *GRAMINEAE.*
tricholepis, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

BLETIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
macristhmochila, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 297.—Mexic.

BLITUM, Tourn. = **Chenopodium**, Linn. (Chenopod.).
perenne, Bub. Fl. Pyren. i. 173 = C. Bonus-Henricus.

BLOOMERIA, Kellogg (Liliac.).
gracilis, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, 1897, 19.—Hort.

BLUFFIA, Nees = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
eckloniana, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 447 = Axonopus semialatus.

BLUMEA, DC. (Compos.).
adenophora, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 382.—China.
floresiana, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 506.—Celebes.
veronicaefolia, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 382.—China.

BLUMENBACHIA, Koel. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
halepensis, Koel. Gram. Gall. et Germ. 29 = A. halepense.

BLUMENBACHIA, Schrad. (Loas.).
catharinensis, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 355.—Bras.

BLYXA, Noronha (Hydrocharid.).
zeylanica, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv. 125 = ceylanica.

BOEA, Comm. (Gesner.).
acutifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 519.—Penins. Mal.
elegans, *Ridley, l. c.* 522.—Penins. Mal.
ferruginea, *Ridley, l. c.* 521.—Penins. Mal.
glabra, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
lanata, *Ridley, l. c.* 520.—Penins. Mal.
lanuginosa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 540.—N. Guin.
paniculata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 519.—Penins. Mal.
patens, *Ridley, l. c.* 520.—Penins. Mal.
suffruticulosa, *Ridley, l. c.* 518.—Penins. Mal.
verticillata, *Ridley, l. c.* 519.—Penins. Mal.

BOEHMERIA, Jacq. (Urtic.).
edentata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 367.—Bolivia.
gracilis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 485.—China.
grandis, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 812 = stipularis.

BOERHAAVIA, Vaill. (Nyctag.).
capitata, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien,* xxiii. repr. 28 (= *Nyctaginia capitata*).—Am. bor.
ciliato-bracteata, *Heimerl, l. c.* 25.—Reg. Argent.
cordobensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 265.—Reg. Argent.
rufopilosa, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
squarrosa, *Heimerl, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 813.—Afr. trop.

BOERLAGIODENDRON, Harms (Aral.).
celebicum, *Harms, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 489, nomen.—Celebes.
Lauterbachii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 484.—N. Guin.

BOISDUVALIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
diffusa, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895, 547.—Am. bor.
parviflora, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 199.—Am. bor.

BOLELIA, Rafin. = **Downingia**, Torr. (Campanul.).
brachyantha, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 483.—Am. bor.

BOLLEA, Reichb. f. (Orchid.).
schroderiana, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1895, I. 401 = Pescatoria schroederiana.

BOMBAX, Linn. (Malvac.).
chartifolium, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 16.—Bras.
heteromorphum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 18.—Bolivia.
Ruizii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 17.—Ecuador.

BONAMIA, A. Gray = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
abscissa, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. v. 812 = B. abscissa.
cordata, Hallier f. l. c. vii. 43 (= *Prevostea cordata*).—Madag.
densiflora, Hallier f. l. c. v. 999 = B. densiflora.
dietrichiana, Hallier f. l. c. 1012.—Austral.
grandiflora, Hallier f. l. c. 810 = B. grandiflora.
Langsdorffii, Hallier f. l. c. 814 = B. Langsdorffii.
poranoides, Hallier f. l. c. 1007 (= *Porana densiflora*).—Afr. trop.

BONATEA, Willd. (Orchid.).
Emini, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 254.—Afr. trop.
Kayseri, *Rolfe, l. c.* 255.—Afr. trop.
Phillipsii, *Rolfe, l. c.* 254.—Afr. trop.
rabaiensis, *Rolfe, l. c.* 253.—Afr. trop.
volkensiana, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.

BONNERIA, Cordem. in Rev. Gén. de Bot. xi. (1899) 416. *ORCHIDEAE.*
appendiculata, *Cordem. l. c.* (= *Angraecum appendiculatum*).—Ins. Bourbon.
corrugata, *Cordem. l. c.*—Ins. Bourbon.

BOOPIS, Juss. (Calycer.).
oocaulis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 127.—Reg. Argent.
ventosa, *Kuntze, l. c.* (= *Calycera ventosa*).—Bolivia.

BOOTTIA, Wall. (Hydrochar.).
crassifolia, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxii. 239 = Ottelia crassifolia.
macrantha, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 9.—Afr. trop.
muricata, *C. H. Wright, l. c.* 569.—Afr. trop.
scabra, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 454.—Afr. trop.

BORNMUELLERA, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. (1897) 70. *CRUCIFERAE.*
Dieckii, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 313.—Oriens.
Tymphaea, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. 72 = Vesicaria Tymphaea.

BORRAGINOIDES, Moench = **Trichodesma**, R. Br. (Borag.).
africana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl i. 721 = T. africanum.
Medusa, Hiern, l. c. = T. Medusa.
physaloides, Hiern, l. c. = T. physaloides.
zeylanica, Hiern, l. c. 720 = T. zeylanicum.

BORRERIA, G. F. W. Mey. = **Spermacoce**, Linn. (Rubiac.).
alternans, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. 283 = S. alternans.
andongensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel andongensis.
angustifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 330 = S. Chamissonis.
anthospermoides, DC. Prodr. iv. 550 = S. anthospermodes.
aprica, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel aprica.
aralioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 339 = Emeorhiza brasiliensis.
aretioides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 286 = S. aretiodes.
argentea, Cham. in Linnaea, ix. 215 = S. argentea.
arida, DC. Prodr. iv. 549 = S. arida.
arvensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel arvensis.
basalis, Anderss. Om Galap. Oarnes Vegetat. 191 = S. basalis.
brachystemonoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 314 = S. brachystemodes.
Buchneri, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 109.—Afr. trop.
centranthoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 327 = S. centranthodes.
decipiens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 57 = S. decipiens.
diodon, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 109.—Afr. trop.
discolor, DC. Prodr. iv. 545 = S. manillensis.
dispersa, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 217 = S. dispersa.
divaricata, Hook. f. l. c. 219 = S. divaricata.
equisetoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 338 = S. equisetodes.
ericaefolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 218 = S. Hookeri.
eritrichoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 142 = S. eritrichodes.
eryngioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 316 = S. eryngiodes.
eupatorioides, Cham. & Schlecht. l. c. 327 = S. eupatoriodes.
falcifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 219 = S. falcifolia.
fastigiata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 68 = S. fastigiata.
filituba, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 110.—Afr. trop.
huillensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel huillensis.
humifusa, Mart. in Flora, xxiv. Beibl. ii. 68 = S. martiana.
lancea, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel lancea.
latituba, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 110.—Afr. trop.

BORRERIA :—
laxa, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 337 = S. laxa.
leiophylla, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 66 = S. leiophylla.
linearifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 217 = S. linearifolia.
Monodon, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 63 = S. Monodon.
neglecta, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 177 = S. abyssinica.
ovalis, Anderss. Om Galap. Oarnes Vegetat. 192 = S. ovalis.
parvifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 218 = S. parvifolia.
pedicellata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 111.—Afr. trop.
perpusilla, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 218 = S. perpusilla.
pygmaea, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 58 = S. spruceana.
Runkii, K. Schum. l. c. 42 = S. Runkii.
saxicola, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 112.—Afr. trop.
scabiosoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 318 = S. scabiosodes.
schumanniana, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 453.—Bras.
squamosa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 142 = S. squamosa.
suberecta, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. 217 = S. suberecta.
subvulgata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 111.—Afr. trop.
tenella, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 217 = S. suaveolens.
thalictroides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 71 = S. thalictrodes.
thymifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 350 = S. thymifolia.
thymoidea, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 391 = Tardavel thymoidea.
trichantha, Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl. vii. 178 = S. trichantha.
umbellata, Spreng. Neue Entdeck. ii. 144 = Emeorhiza brasiliensis.
valerianoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. 335 = S. valerianodes.
verbenoides, Cham. & Schlecht. l. c. 331 = S. verbenodes.
Warmingii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 42 = S. Warmingii.
wydleriana, DC. Prodr. iv. 545 = S. wydleriana.
Wunschmannii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. 53 = S. Wunschmannii.

BOSCIA, Lam. (Capparid.).
arabica, *Pest. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 127.—Arab.
caloneura, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 390.—Afr. trop.
elegans, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 90.—Afr. trop.
hypoglauca, *Gilg, l. c.* 91.—Afr. trop.
kalachariensis, *Pest. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 98.—Afr. trop.
matabelensis, *Pest. l. c.* 115.—Afr. austr.
rehmanniana, *Pest. l. c.* 95.—Afr. trop.
somalensis, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 91.—Afr. trop.
transvaalensis, *Pest. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 112.—Afr. austr.
xylophylla, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 90.—Afr. trop.

BOSQUEIA, Thou. (Urtic.).
cerasifolia, *Volk. ex Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 36.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. l. c.* 37.—Afr. trop.

BOSWELLIA, Roxb. (Burser.).
multifoliolata, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 16.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

BOTHRIOCLINE, Oliver (Compos.).
misera, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 11 (= *Vernonia misera*).—Afr. trop.
papuana, *O. Hoffm. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 594.—N. Guin.
pauciseta, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 502.—Afr. trop.

BOTRYOPLEURON, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2670 (1900). *SCROPHULARIACEAE.*
axillare, *Hemsl. l. c.*—China.
latifolium, *Hemsl. l. c.*—China.
stenostachyum, *Hemsl. l. c.*—China.
venosum, *Hemsl. l. c.*—China.

BOTRYOSICYOS, Hochst. = **Dioscorea**, Linn. (Dioscor.).
pentaphyllum, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 3 = D. beccariana.

BOUCEROSIA, Wight & Arn. (Asclepiad.).
adenensis, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 115.—Arab.
awdeliana, *Deflers, l. c.* 116.—Arab.
cicatricosa, *Deflers, Voy. Yemen*, 170. t. 4.—Arab.
hispanica, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 336.—Hispan.
penicillata, *Deflers, Voy. Yemen*, 169.—Arab.
tombuctuensis, *A. Chevall. in Compt. Rend. Intern. Congr. Bot.* 1900, 271.—Afr. trop.

BOUCHEA, Cham. (Verben.).
Schlechteri, *Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 75.—Afr. austr.
Wilmsii, *Guerke, l. c.* 74.—Afr. austr.

BOUCHETIA, DC. (Solan.).
anomala, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 105 (= *Nierembergia anomala*).—Am. trop.

BOUGAINVILLAEA, Comm. (Nyctag.).
berberidifolia, *Heimerl, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxx. 121.—Bolivia.
longispinosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 109.—Bolivia.
malmeana, *Heimerl, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxx. 119.—Bras.
modesta, *Heimerl, l. c.* 118.—Bolivia.

BOURLAGEODENDRON, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1898) 342, sphalm. = **Boerlagiodendron**, Harms (Aral.).

BOURRERIA, P. Br. (Borag.).
litoralis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 150.—Am. cent.

BOUSIGONIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 35. *APOCYNACEAE.*
mekongensis, *Pierre, l. c.* 36.—Cochinch.

BOUSSINGAULTIA, H. B. & K. (Chenopod.).
marginata, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 128 (= *Tandonia marginata*).—Ecuador.

BOUTELOUA, Lag. (Gramin.).
repens, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 26 (= *Dinebra repens*).—Am. bor.

BOWKERIA, Harv. (Scrophul.).
calceolarioides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 120.—Afr. austr.

BOWLESIA, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
septentrionalis, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 31.—Am. bor.

BOYKINIA, Nutt. (Saxifrag.).
Purpusi, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 447.—Am. bor.

BRACHISTUS, Miers (Solan.).
Feddei, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 674.—Ins. Samoa.
hispidus, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 198.—Am. austr.
lasiophyllus, *Rusby, l. c.* (= *Solanum lasiophyllum*).—N. Granat.
leptocaulis, *Rusby, l. c.* 199.—Am. austr.
strigosus, *Rusby, l. c.* 198.—Am. austr.

BRACHYACTIS, Ledeb. (Compos.).
angustus, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 383 (= *Aster angustus*).—Am. bor.

BRACHYCHITON, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn. (Stercul.).
australis, Terr. in Boll. Ort. Palermo, i. 62 = S. trichosiphon.
diversifolius, Terr. l. c. 63 = S. diversifolia.
rupestris, Terr. l. c. 64 = S. rupestris.

BRACHYCLADOS, D. Don (Compos.).
involutus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 137.—Patag.
macrocephalus, *Kuntze, l. c.*—Patag.
obtusifolius, *Kuntze, l. c.*—Patag.
pygmaeus, *Kuntze, l. c.* 138.—Patag.
Stuckerti, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 133.—Reg. Argent.

BRACHYCOME, Cass. (Compos.).
alpina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 271.—N. Zel.
lineata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 259 (= *Lagenophora lineata*).—N. Zel.
polita, *T. Kirk, l. c.* 261.—N. Zel.

BRACHYCORYTHIS, Lindl. (Orchid.).
briantiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 219.—Afr. trop.
Buchanani, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 570.—Afr. trop.
congoensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 544.—Afr. trop.
disoides, *Kraenzl. l. c.* 543 (= *Habenaria disoides*).—Madag.
goetziana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 176.—Afr. trop.
Lastii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 203.—Afr. trop.
Leopoldi, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 542.—Afr. trop.
parviflora, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 202.—Afr. trop.
rhomboglossa, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 544.—Afr. trop.
sibangensis, *Kraenzl. l. c.* 547.—Afr. trop.
soyauxiana, *Kraenzl. l. c.* 546.—Afr. trop.
tenuior, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 183 = Platanthera tenuior.

BRACHYELYTRUM, Beauv. (Gramin.).
procumbens, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 42.—Ecuador.
silvaticum, *Hack. l. c.* (= *Pseudobromus silvaticus*).—Afr. trop.

BRACHYPODIUM, Beauv. (Gramin.).
Bolusii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 737.—Afr. austr.
columbianum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 34.—N. Granat.
constrictum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 363, sphalm. = seq.
contractum, Presl, Cyp. & Gram. Sic. 40 = pinnatum.
fontanesianum, Nees, Fl. Afr. Gram. 457 = sylvaticum.
Fontanesii, Nees, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 363 = sylvaticum.
holcoides, Kunth, Rév. Gram. ii. 129 = Arundinella agrostoides.
nepalense, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = sylvaticum.
scaberrimum, Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 221 = sylvaticum.

BRACHYSTEGIA, Benth. (Legum.).
cynometroides, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 267.—Afr. trop.
microphylla, *Harms, l. c.* xxviii. 397.—Afr. trop.
mpalensis, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 73.—Afr. trop.
Randii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 433.—Afr. trop.

BRACHYSTELMA, R. Br. (Asclepiad.).
caffrum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 14 = meyerianum.
meyerianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
Rehmannii, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 449.—Afr. austr.
subaphyllum, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 40.—Afr. trop.
Tavalla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 459.—Afr. trop.
togoense, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 310, nomen.—Afr. trop.

BRACHYSTEPHANUS, Nees (Acanth.).
Mannii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 179.—Afr. trop.

BRACHYTHALAMUS, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 146. *THYMELAEACEAE.*
caudatus, *Gilg, l. c.*—N. Guin.
podocarpus, *Gilg, l. c.*—N. Guin.

BRADBURIA, Torr. & Gray (Compos.).
Schottii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 364.—Mexic.

BRANDEGEA, Cogn. (Cucurb.).
minima, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 121.—Mexic.
Palmeri, *Rose, l. c.* 120 (= *Echinopepon Palmeri*).—Mexic.

BRASSICA, Tourn. (Crucif.).
brachycarpa, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 154.—Lesbos.
Hilarionis, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18. 90.—Ins. Cyprus.
magellanica, Pers. Syn. Pl. ii. 207 = Sisymbrium magellanicum.
nostalgica, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 142.—Eur.
Parra, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. 118 (= *Sisymbrium Parra*).—Reg. Medit.

BRAUNERIA, Neck. = **Echinacea**, Moench (Compos.).
tennesseensis, Beadle, in Coult. Bot. Gaz. xxv. 359.—Am. bor.

BRAYA, Sternb. & Hoppe (Crucif.).
cachensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 46.—Reg. Argent.
linearis, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 254.—Eur.

BREONIA, A. Rich. (Rubiac.).
Boivini, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 35.—Madag.
coriacea, *Havil. l. c.* 36.—Madag.
cuspidata, *Havil. l. c.* 37 (= *Nauclea cuspidata*).—Madag.
longipetiolata, *Havil. l. c.* 36.—Hab.?
mauritiana, *Havil. l. c.* 35.—Ins. Maurit.
membranacea, *Havil. l. c.*—Madag.
parviflora, *Havil. l. c.* 37.—Madag.
richardiana, *Havil. l. c.* 36 (= *Sarcocephalus richardiana*).—Madag.
stipulata, *Havil. l. c.* 35.—Madag.

BRICCHETTIA, Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. (1897) 181. *EUPHORBIACEAE.*
somalensis, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

BRIDELIA, Willd. (Euphorb.).
subnuda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 393.—N. Guin.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 327.—Afr. trop.

BRILLANTAISIA, Beauv. (Acanth.).
alata, T. Anders. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. 125 = patula.
debilis, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 39.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 45.—Afr. trop.
didynama, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 313.—Afr. trop.
fulva, *Lindau, l. c.*—Afr. trop.
Kirungae, *Lindau, in Goetzen, Durch Afr.* (repr.). 9.—Afr. trop.
leonensis, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 41.—Afr. trop.
Nyanzarum, *Burkill, l. c.* 39.—Afr. trop.
subcordata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 44.—Afr. trop.
subulugurica, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 42.—Afr. trop.

BRITTONASTRUM, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III. A. (1896) 234. *LABIATAE.*
aurantiacum, *Briq. l. c.* 235 (= *Cedronella aurantiaca*).—Mexic.
breviflorum, *Briq. l. c. Nachtr.* I. 291 (= *Cedronella breviflora*).—Am. bor.
canum, *Briq. l. c.* iv. III. A. 235 (= *Cedronella cana*).—Mexic.
coccineum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella coccinea*).—Mexic.
mexicanum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella mexicana*).—Mexic.
micranthum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella micrantha*).—Am. bor.
pallidiflorum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 621.—Am. bor.
pallidum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III. A. 235 (= *Cedronella pallida*).—Am. bor.

BRIZA, Linn. (Gramin.).
brizodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 341 = elegans.
deltoidea, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 = minor.
geniculata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 21 = Eragrostis obtusa.
glomerata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 342.—Reg. Argent.

BRIZA:—
imbricata, Steud. in Flora, xii. (1829) 489 = Brizopyrum capense.
patula, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 163.—Chili.
poaeformis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 342 = triloba.
rubra, Lam. Illustr. i. 187 = Eragrostis amabilis.
Uniolae, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 283 = Brizopyrum capense.

BRIZOPYRUM, J. Presl, in Rel. Haenk. 280 (1830). *GRAMINEAE.*
acutiflorum, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 371.—Afr. austr.
alternans, *Nees, l. c.* 369.—Afr. austr.
brachystachyum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 707.—Afr. austr.
capense, *Trin. Fl. Afr. Austr.* 371.—Afr. austr.
ciliare, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2602.—Afr. austr.
glomeratum, *Stapf, l. c.* t. 2603.—Afr. austr.
mucronatum, Nees, in Wall. Cat. n. 8896 = Halopyrum mucronatum.
obliterum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 703.—Afr. austr.

BROCHONEURA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 128. *MYRISTICACEAE.*
acuminata, *Warb. l. c.* 237 (= *Myristica acuminata*).—Madag.
madagascariensis, *Warb. l. c.* 234 (= *Myristica madagascariensis*).—Madag.
Vouri, *Warb. l. c.* 238 (= *Myristica Vouri*).—Madag.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 575.—Patag.
brevipes, *Baker, in Gard. Chron.* 1896, II. 459.—Chili.
candida, *Baker, l. c.* 239.—Am. bor.
hirtella, *Baker, l. c.* 459.—Urug.
hyacinthina, *Baker, l. c.*—Am. bor.
lactea, S. Wats. in Proc. Amer. Acad. xiv. 238 = hyacinthina.
Leichtlini, *Baker, in Gard. Chron.* 1896, II. 459.—Chili.
leptandra, *Baker, l. c.* 213.—Am. bor.
lilacina, *Baker, l. c.* 459.—Am. bor.
lugens, *Baker, l. c.*—Am. bor.
nivalis, *Baker, l. c.*—Chili.
Orcuttii, *Baker, l. c.* 214.—Am. bor.
patagonica, *Baker, l. c.* 459.—Patag.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 576.—Patag.
philippiana, *Baker, in Gard. Chron.* 1896, II. 459.—Chili.
Purdyi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 427.—Calif.
rosea, *Baker, in Gard. Chron.* 1896, II. 214.—Am. bor.
scabra, *Baker, l. c.* 459.—Calif.
sellowiana, *Baker, l. c.*—Am. austr.
sessiliflora, *Baker, l. c.*—Chili.
setacea, *Baker, l. c.*—Am. cent.
subbiflora, *Baker, l. c.*—Chili.
violacea, *Baker, l. c.*—Chili.
vittata, *Baker, l. c.*—Reg. Argent.

BROMELIA, Plum. (Bromel.).
Nidus-puellae, *Mez, in DC. Monogr. Phan.* ix. 22 (= *Karatas Nidus-puellae*).—Am. trop.
Palmeri, *Mez, l. c.* 40.—Mexic.
superba, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 252.—Ind. occ.

BROMHEADIA, Lindl. (Orchid.).
brevifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 340.—Penins. Mal.
pungens, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
rupestris, *Ridley, l. c.* 341.—Penins. Mal.
scirpoidea, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 71.—Malaya.

BROMUS, Dill. (Gramin.).
alaicus, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 101.—Turkestan.
andinus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 342.—Chili.
angustatus, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 719.—Bolivia.
annuus, Jacq. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 361 = patulus.
araucanus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 343.—Chili.
chapprianus, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 361, sphalm. = seq.

BROMUS:—
chiapporianus, De Not. ex Nym. Consp. 824 = patulus.
confinis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 320 = inermis.
culmineus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 343.—Chili.
decumbens, Koel. Gram. 242 = Danthonia decumbens.
dolichostachys, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 343.—Chili.
dubius, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 373 = Elymus sibiricus.
firmior, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 733.—Afr. austr.
himalaicus, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 358.—Ind. or.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 51. t. 11 = patulus.
lacmonicus, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii. 53.—Graecia.
laevipes, *Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiii. 45.—Am. bor.
Leyboldtii, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 344.—Chili.
membranaceus, Jacq. ex Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 74 = Duthiaea bromoides.
multiflorus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 865 = oxyodon.
multiflorus, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 56 = polyanthus.
Munroi, Boiss. Fl. Orient. v. 643 = inermis.
Myurus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 287 = Tripogon bromoides.
natalensis, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 732.—Afr. austr.
oliganthus, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 718.—Am. trop.
oxyodon, *Schrenk, Enum. Pl. Nov.* ii. 1.—Ind. or.; Turkestan.
pacificus, *Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiii. 23.—Am. bor.
patagonicus, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 230.—Reg. Magell.
pauciflorus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 713 (= *Festuca pauciflora*).—As. et Am. bor.
pectinatus, Thunb. Prodr. 22 = patulus.
pellitus, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 230.—Reg. Magell.
pindicus, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii. 53.—Graecia.
polyanthus, *Scribn. ex Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiii. 56.—Am. bor.
scaber, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 341.—Chili.
Schaffneri, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 30.—Mexic.
Stribrnyi, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 297.—Eur.
subvelutinus, *Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiii. 52.—Am. bor.
tataricus, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 369 = Agropyron Jacquemontii.
vestitus, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2074 = patulus.
villiferus, Steud. Syn. Pl. Gram. 326 = patulus.
vulgaris, *Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiii. 43.—Am. bor.

BRONGNIARTIA, H. B. & K. (Legum.).
diffusa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 194.—Mexic.
lunata, *Rose, l. c.*—Mexic.
suberea, *Rose, l. c.* 134.—Mexic.

BRONNIA, H. B. & K. = **Fouquieria**, H. B. & K. (Tamarisc.).
Duguetii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1899, 297.—Calif.
Thiebautii, Van Tiegh. l. c.—Mexic.

BROWNLEEA, Harv. (Orchid.).
alpina, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 287.—Afr. trop.
apetala, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.

BRUINSMIA, Boerl. & Koord. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. liii. (1893) I. 1. *STYRACACEAE.*
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 525.—Celebes.

BRUNFELSIA, Plum. (Solan.).
densifolia, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 324.—Ind. occ.
lactea, *Krug & Urb. l. c.* 323.—Ind. occ.
Picardae, *Krug & Urb. l. c.* 321.—Ind. occ.
portoricensis, *Krug & Urb. l. c.* 322.—Ind. occ.
silvicola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 450.—Bras.

BRUNIA, Linn. (Bruniac.).
Marlothii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 280.—Afr. austr.
neglecta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 443.—Afr. austr.

BRUNNICHIA, Banks (Polygon.).
congoensis, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxvi. 357.—Afr. trop.

BRUNSVIGIA, Heist. (Amaryll.).
humilis, Eckl. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 206 = minor.
Insizwae, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 27.—Afr. austr.
natalensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 208.—Afr. austr.
sphaerocarpa, *Baker, l. c.* 207.—Afr. austr.

BRUNYERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 649 (1900) = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
biennis, Bub. l. c. = O. biennis.

BRYA, P. Br. (Legum.).
buxifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 301 (= *Pterocarpus buxifolius*).—Ind. occ.

BRYOPSIS, Reiche, Fl. Chile, i. 206 (1895). *CARYOPHYLLACEAE.*
andicola, *Reiche, l. c.* (= *Lyallia andicola*).—Chili.

BUCERAGENIA, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. (1897) 303. *ACANTHACEAE.*
minutiflora, *Greenm. l. c.*—Mexic.

BUCHANANIA, Spreng. (Anacard.).
pallida, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 370 A.—Cochinch.

BUCHENROEDERA, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
biflora, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 18.—Afr. austr.
pauciflora, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 391.—Afr. austr.
sparsiflora, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 487.—Afr. austr.

BUCHNERA, Linn. (Scrophul.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 775.—Afr. trop.
ensifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 512.—Afr. trop.
fulgens, *Engl. l. c.* xxviii. 478.—Afr. trop.
humpatensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 777.—Afr. trop.
pallescens, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 512.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 467.—Afr. trop.
rhodesiana, *S. Moore, l. c.* 468.—Afr. trop.
trinervia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 512.—Afr. trop.

BUCKLEYA, Torr. (Santalac.).
graebneriana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. (1900) 306.—China.
Henryi, *Diels, l. c.*—China.

BUDA, Adans. = **Spergularia**, C. & J. Presl (Caryoph.).
campestris, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = S. rubra.
grandis, Kuntze, l. c. = S. grandis.

BUDDLEIA, Houst. (Logan.).
acutifolia, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 24.—China.
anchoensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 200.—Bolivia.
canescens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 78.—Bolivia.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 535.—China.
megalocephala, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 10.—Am. cent.
montana, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 544.—Am. bor.
oreophila, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 202.—Afr. trop.
tiraquiensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 201.—Bolivia.
verleyseniana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. 722.—Ecuador.
Woodii, *Gilg, l. c.* xxiii. 201.—Afr. austr.

BUETTNERIA, Loefl. (Stercul.).
campicola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 444.—Bras.
macrocarpa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 239.—Am. cent.
subulifolia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 15.—Bras.

BUGLOSSITES, Bub. Fl. Pyren. i. 494 (1897) = **Lycopsis**, Linn. (Borag.).
arvensis, Bub. l. c. = L. arvensis.

BUGULA, Tourn. = **Ajuga**, Linn. (Labiat.).
montana, Bub. Fl. Pyren. i. 471 = A. pyramidalis.
moschata, Bub. l. c. 472 = A. Iva.

BULBINE, Linn. (Liliac.).
brunsvigiaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 366. —Afr. austr.
caespitosa, *Baker, l. c.* 361.—Afr. austr.
caulescens, *Linn. Hort. Cliff.* 122.—Afr. austr.
concinna, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 534.—Afr. austr.
flexuosa, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 27.—Afr. austr.
frutescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 372 = caulescens.
natalensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 366.—Afr. austr.
parviflora, *Baker, l. c.* 361.—Afr. austr.
tenuifolia, *Baker, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 317.—Afr. austr.
Zeyheri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 263 = alooides.

BULBINELLA, Kunth (Liliac.).
punctulata, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 16. —Afr. austr.

BULBINOPSIS, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, (1897) 20. *LILIACEAE.*
semibarbata, *Borzi, l. c.* 21.—Austral.

BULBOPHYLLUM, Thou. (Orchid.).
antioquiense, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 457.—N. Granat.
apetalum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 127 = Polystachya bulbophylloides.
attenuatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 45.—Borneo.
Avicella, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 270.—Penins. Mal.
botryophorum, *Ridley, l. c.* 275.—Penins. Mal.
clarkeanum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 333.—Ind. or.
cleistogamum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 277.—Penins. Mal.
Collettii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 585.—Ind. or.
congolanum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
Cornu-cervi, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 332.—Ind. or.
cryptanthum, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 120.—Bras.
cylindricum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 333.—Ind. or.
decipiens, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
densiflorum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 277 (non Rolfe).—Penins. Mal.
depressum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 585.—Ind. or.
Drallei, Reichb. f. in Regel, Gartenfl. 1885, 20 = flavidum.
ebulbum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 334.—Ind. or.
elatius, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 275.—Borneo.
flammuliferum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 211.—Penins. Mal.
forsythianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 163.—Madag.
gabunense, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
galbinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 267.—Penins. Mal.
galeatum, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 57 = Polystachya grandiflora.
Gigas, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 277.—Penins. Mal.
gilgianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 162.—Afr. trop.
gracilipes, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 119.—Ind. or.
hirtulum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 71.—Malaya.
hispidum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 268.—Penins. Mal.
imbricatum, Lindl. Bot. Reg. 1841, Misc. 37 = Megaclinium imbricatum.
insigne, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 272.—Borneo.

BULBOPHYLLUM:—
intermedium, *Bailey, in Bull. Dept. Agr. Queensl.* xiv. 12.—Austral.
kamerunense, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
laurentianum, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 58.—Afr. trop.
lehmannianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 458.—N. Granat.
Leoni, *Kraenzl. l. c.* xxviii. 164.—Ins. Comor.
leptorrhachis, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
lilacinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 276.—Penins. Mal.
linearifolium, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 586.—Penins. Mal.
Listeri, *King & Pantl. l. c.* lxiv. 334.—Ind. or.
longibulbum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
longiflorum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 268. —Penins. Mal.
longiscapum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 45.—Ins. Fiji.
macrochilum, *Rolfe, l. c.*—Borneo.
melinostachyum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 342. —Afr. trop.
micropetalum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 127 = Polystachya micropetala.
mirabile, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316.—Borneo.
monanthos, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 271.—Penins. Mal.
monticolum, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 219 = gravidum.
multiflorum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, I. 294 (= *Odontostylis multiflora*).—Ind. or.
Nummularia, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 35.—Afr. trop.
oblanceolatum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 586.—Penins. Mal.
orthoglossum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, I. 326. —Malaya.
oxychilum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
oxypterum, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.
pectinatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 268.—Hab.?
pedicellatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 278. —Borneo.
piluliferum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 76.—Ind. or.
popayanense, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 458.—N. Granat.
prismaticum, *Thou. Orch. Afr.* t. 109.—Ins. Mascar.
ptiloglossum, *Wendl. & Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, I. 330.—Madag.
puberulum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 275.—Borneo.
pumilum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 54 = Polystachya bulbophylloides.
radicans, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 81.—Austral.
reticosum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 273.—Borneo.
Ridleyi, Kraenzl. in Gard. Chron. 1896, I. 294 = multiflorum.
rigidum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 69.—Ind. or.
roseum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 276.—Penins. Mal.
rugosum, *Ridley, l. c.* 266.—Penins. Mal.
Sangae, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
sanguineo-maculatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 265.—Penins. Mal.
schinzianum, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 57.—Afr. trop.
sessiliflorum, *Kraenzl. in Xenia Orch.* t. 290.—Afr. trop.
shanicum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 587.—Ind. or.
spectabile, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 193.—Ind. or.
Stella, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 277.—Penins. Mal.
subumbellatum, *Ridley, l. c.* 274.—Penins. Mal.
tardeflorens, *Ridley, l. c.* 276.—Borneo.
teretifolium, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
Trifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 278.—Penins. Mal.

BULBOPHYLLUM:—
urbanianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 163.—Afr. trop.
Vanessa, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 587.—Penins. Mal.
virescens, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 3.—Arch. Mal.
vitellinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 271.—Sumatra?

BULBOSTYLIS, Kunth (Cyperac.).
arenaria, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 19 (= *Isolepis arenaria*).—Bras.
atrosanguinea, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 611 (= *Scirpus atrosanguineus*). —Afr. trop.
Burkei, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 208.—Afr. austr.
fimbriata, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 86.—Ind. occ.
floccosa, *C. B. Clarke, l. c.*—Ind. occ.
Jacobinae, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Isolepis Jacobinae*).—Bras.
junciformis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 337 (= *Isolepis junciformis*).—Bolivia.
parvinux, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 207.—Afr. austr.
Rehmanni, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 615 = filamentosa.
scabra, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Isolepis scabra*).—Bras.
scleropus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 207.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Scirpus sphaerocephalus*). —Bras.
subaphylla, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 86. —Ind. occ.
trichobasis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 616 (= *Scirpus trichobasis*).—Afr. trop.

BULLIARDA, DC. = **Tillaea**, Mich. (Crassul.).
rosea, Bub. Fl. Pyren. ii. 710 = T. Vaillantii.

BUMELIA, Sw. (Sapot.).
cassinifolia, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 442. —Am. bor.
lucida, *Small, l. c.* 443.—Am. bor.
megacocca, *Small, l. c.* 441.—Am. bor.
microcarpa, *Small, l. c.* 440.—Am. bor.
rigida, *Small, l. c.* 444.—Am. bor.
rufomentosa, Small, l. c. 440, sphalm. = seq.
rufotomentosa, *Small, l. c.* 438.—Am. bor.

BUNCHOSIA, Rich. (Malpigh.).
costaricensis, *Rose, ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 63.—Am. cent.
gracilis, *Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsb.* 1898, I. 5.—Am. cent.
guatemalensis, *Niedenzu, l. c.*—Am. cent.
jamaicensis, *Urb. & Niedenzu, ex Niedenzu, l. c.* 10. —Ind. occ.
lancifolia, *Niedenzu, l. c.* 6.—Am. cent.
macrophylla, *Rose, ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 64.—Am. cent.

BUNIUM, Linn. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).
apiculatum, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 194 = C. apiculatum.
avromanum, Drude, l. c. = C. avromanum.
buriaticum, Drude, l. c. = C. buriacticum.
chaerophylloides, Drude, l. c. = C. chaerophylloides.
cornigerum, Drude, l. c. = C. cornigerum.
cylindricum, Drude, l. c. = C. cylindricum.
Elvendia, Drude, l. c. = C. Elvendia.
imbricatum, Drude, l. c. = C. imbricatum.
Sewerzowi, Drude, l. c. = C. Sewerzowi.
trichophyllum, Drude, l. c. = C. trichophyllum.

BUPHANE, Herb. (Amaryll.).
Fischeri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.

BUPLEURUM, Tourn. (Umbellif.).
gracilipes, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 493.—China.
microcephalum, *Diels, l. c.* 494.—China.
thianschanicum, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 23.—Oriens.

BURMANNIA, Linn. (Burmann.).
australis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 8. 25.—Bras.
grandiflora, *Malme, l. c.* 27.—Bras.

BURMEISTERA, Karst. & Triana (Campan.).
microphylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 146.—Am. cent.
tenuiflora, *Donn. Sm. l. c.* 147.—Am. cent.

BURNATASTRUM, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III. A. 358 (1897). *LABIATAE.*
lanceolatum, *Briq. l. c.* (=*Plectranthus lanceolatus*).—Madag.
lavanduloides, *Briq. l. c.* (=*Plectranthus lavanduloides*).—Madag.
spicatum, *Briq. l. c.* (=*Plectranthus spicatus*).—Afr. austr.

BURSERA, Jacq. (Burser.).
diversifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 113.—Mexic.
glabrifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 251=penicillata.
Macgregorii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 282.—Austral.

BURTONIA, R. Br. (Legum.).
simplicifolia, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 349.—Austral.

BUTTONIA, MacKen (Scrophul.).
Hildebrandtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 509.—Afr. trop.

BUXANTHUS, Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VIII. v. (1897) 325. *EUPHORBIACEAE.*
Hildebrantii, *Van Tiegh. l. c.* 326 (=*Buxus Hildebrandtii*).—Afr. trop.
pedicellatus, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.

BUXELLA, Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VIII. v. (1897) 326. *EUPHORBIACEAE.*
Macowani, *Van Tiegh. l. c.* (=*Buxus Macowani*).—Afr. austr.
madagascarica, *Van Tiegh. l. c.* (=*Buxus madagascarica*).—Madag.

BUXUS, Linn. (Euphorb.).
benguellensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 115.—Afr. trop.
pubescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 481.—Mexic.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 117=sempervirens.

BYRONIA, Endl. (Ilicin.).
anomala, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 847 (=*Ilex anomala*).—Ins. Sandw.

BYRSONIMA, Rich. (Malpigh.).
biacuminata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 13.—Bolivia.
brachybotrya, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 206.—Am. austr.
cornifolia, *Niedenzu, l. c.*—Bras.
glazioviana, *Niedenzu, l. c.*—Bras.
spruceana, *Niedenzu, l. c.* 207.—Bras.
wrightiana, *Niedenzu, l. c.* 206.—Ind. occ.

BYSTROPOGON, L'Hérit. (Labiat.).
andinum, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 83.—Bolivia.
axillare, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 108.—Bolivia.
kuntzeanum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 800.—Reg. Argent.
mandonianus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 192.—Bolivia.
minutus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 803.—Bolivia.
ovatus, *Briq. l. c.* 800.—Bolivia.
pavonianus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 193.—Peruv.
setosus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 801.—Bolivia.

C

CACALIA, Burm.=**Vernonia**, Schreb. (Compos.).
Harveyi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 138=V. monocephala.
Hieronymi, Kuntze, l. c.=V. Hieronymi.
Kuntzei, Kuntze, l. c.=V. Kuntzei.
Lehmannii, Kuntze, l. c.=V. Lehmannii.

CACALIA:—
mattogrossensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 139=V. mattogrossensis.
praecox, Kuntze, l. c.=V. praecox.
rufipapposa, Kuntze, l. c.=V. rufipapposa.
santacruzensis, Kuntze, l. c.=V. santacruzensis.
scabrifoliata, Kuntze, l. c.=V. scabrifoliata.
Schlechteri, Kuntze, l. c.=V. Schlechteri.
sordidopapposa, Kuntze, l. c.=V. sordidopapposa.
squamulosa, Kuntze, l. c.=V. squamulosa.
subacuminata, Kuntze, l. c.=V. subacuminata.
tarijensis, Kuntze, l. c.=V. sericea.
tristis, Kuntze, l. c.=V. tristis.

CACALIA, Linn.=**Senecio**, Tourn. (Compos.).
ampullacea, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 577.—Am. cent.
Iinumae, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 80 (=*Senecio Iinumae*).—Japon.
lobatifolia, Makino, l. c.—Japon.
nikomontana, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 94.—Japon.
pendula, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 145=S. pendulus.
shikokiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 80.—Japon.
suffulta, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 310.—Mexic.

CACARA, Rumph.=**Pachyrhizus**, Rich. (Legum.).
orbicularis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 261.—Afr. trop.

CACOUCIA, Aubl. (Combret.).
Barteri, *Hemsl. in Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.
exannulata, O. Hoffm. in Linnaea, xliii. (1880–82) 132=Campylogyne exannulata.
splendens, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2548.—Afr. trop.

CACTUS, Linn.=*CACTEAE.*
Notesteinii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 272=Mammillaria Notesteinii.
Palmeri, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 108.—Calif.

CADABA, Forsk. (Capparid.).
barbigera, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 94.—Afr. trop.
divaricata, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. trop.
mirabilis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Ruspolii, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. trop.
termitaria, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2527.—Afr. trop.

CADALVENA, Fenzl (Scitamin.).
pistiaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 297.—Afr. trop.

CAESALPINIA, Linn. (Legum.).
bicolor, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 22.—Peruv.
caymanensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. I. 49.—Ind. occ.
ciliata, *Urb. Symb. Antill.* ii. 275 (=*Guilandina ciliata*).—Ind. occ.
cubensis, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 416.—Ind. occ.
divergens, *Urb. Symb. Antill.* ii. 271.—Ind. occ.
domingensis, *Urb. l. c.* 279.—Ind. occ.
glauca, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 53.—Bras.
glaucophylla, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.
Hauthalii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 54.—Parag.
intermedia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.
lucida, *Urb. l. c.* 275.—Ind. occ.
melanosperma, *Urb. l. c.* 276 (=*Guilandina melanosperma*).—Ind. occ.
oblongifolia, *Urb. l. c.* 281.—Ind. occ.
ovalifolia, *Urb. l. c.* 273.—Ind. occ.
parviflora, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 230.—Penins. Mal.
rugeliana, *Urb. Symb. Antill.* ii. 278.—Ind. occ.
spinosa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 54=tinctoria.
Trothaei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 277.—Afr. trop.
wrightiana, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.

CAESIA, R. Br. (Liliac.).
africana, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 160=Dasystachys Grantii.

CAIOPHORA, Presl=**Blumenbachia**, Schrad. (Loas.).
acanthoides, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 286.—Reg. Argent.
aequatoriana, Urb. & Gilg, l. c. 313=B. contorta.

CAIOPHORA:—
andina, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 287.—Bolivia.
angustisecta, Urb. & Gilg, l. c. 300.—Reg. Argent.
aspera, Urb. & Gilg, l. c. 347=B. aspera.
chuquisacana, Urb. & Gilg, l. c. 322.—Bolivia.
chuquitensis, Urb. & Gilg, l. c. 301 (=*Loasa chuquitensis*).—Peruv.
cinerea, Urb. & Gilg, l. c. 321.—Bolivia.
clavata, Urb. & Gilg, l. c. 308.—Reg. Argent.
dumetorum, Urb. & Gilg, l. c. 309.—Reg. Argent.
Kuntzei, Urb. & Gilg, l. c. 314.—Bolivia.
lorentziana, Urb. & Gilg, l. c. 289.—Reg. Argent.
mandoniana, Urb. & Gilg, l. c. 299.—Bolivia.
pachylepis, Urb. & Gilg, l. c. 288.—Peruv.
patagonica, Urb. & Gilg, l. c. 341 (=*Loasa patagonica*).—Am. austr.
platyphylla, Urb. & Gilg, l. c. 317.—Reg. Argent.
Preslii, Urb. & Gilg, l. c. 306.—Am. austr.
pterosperma, Urb. & Gilg, l. c. 324.—Peruv.
pulchella, Urb. & Gilg, l. c. 272.—Reg. Argent.
pycnophylla, Urb. & Gilg, l. c. 274.—Reg. Argent.
saltensis, Urb. & Gilg, l. c. 317.—Reg. Argent.
silvestris, Urb. & Gilg, l. c. 338=B. scandens.
Spegazzinii, Urb. & Gilg, l. c. 312.—Reg. Argent.
sphaerocarpa, Urb. & Gilg, l. c. 296.—Bolivia.
stenocarpa, Urb. & Gilg, l. c. 330.—Peruv.
tomentosula, Urb. & Gilg, l. c. 340.—Chili.
tucumana, Urb. & Gilg, l. c. 315.—Reg. Argent.

CAJAN, Adans.=**Cajanus**, DC. (Legum.).
Cajan, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 53=C. indicus.

CAKILE, Linn. (Crucif.).
alacranensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 130.—Am. cent.
Chapmanii, *Millsp. l. c.*—Am. sept.
fusiformis, *Greene, Pittonia*, iii. 346.—Am. bor.
geniculata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 126.—Am. sept.

CALAMAGROSTIS, Adans. (Gramin.).
alaskana, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 32.—Am. bor.
americana, *Rydb. & Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* v. 27.—Am. bor.
angusta, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 21.—Am. bor.
californica, *Kearn. l. c.* 37.—Am. bor.
chrysostachya, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 344 (=*Deyeuxia chrysostachya*).—Chili.
debilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 260.—Ind. or.
decora, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
deserticola, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 21 (=*Deyeuxia deserticola*).—Chili.
fasciculata, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 23.—Am. bor.
Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 653.—Japon.
foliosa, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 17.—Am. bor.
fuegiana, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 85.—Fuegia.
fulva, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 344=Deyeuxia robusta.
grata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 22.—Chili.
griffithiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 263.—Ind. or.
Hirthi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 22.—Chili.
inaequiglumis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 651.—Japon.
Jacquemontii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 265.—Ind. or.
labradorica, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 38.—Am. bor.
lalesarensis, *Torg. & Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 77.—Persia.
laxiflora, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 34.—Am. bor.
laxiflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 18.—Chili.
Lemmoni, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 16.—Am. bor.
lithuanica, Bess. in Roem. & Schult. Add. ad Mant. ii. 602=epigeios.
longiseta, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 650.—Japon.
magellanica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 20.—Am. austr.
micrantha, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 36.—Am. bor.
nemoralis, *Kearn. l. c.* 26.—Am. bor.
nemoralis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 18.—Chili.

CALAMAGROSTIS :—
nepalensis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 193 = littorea.
pentapogonodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 344.—Bolivia.
pilosula, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 263.—Ind. or.
plebeia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 343 = Deyeuxia plebeia.
quadriseta, Kuntze, l. c. = Deyeuxia quadriseta.
robusta, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 19 = Deyeuxia robusta.
Schmidii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 264.—Ind. or.
scirpiformis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 20.—Chili.
Stolizkai, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 262.—Ind. or.
subflexuosa, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 22.—Am. bor.
suka, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 85.—Fuegia.
tartarica, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 262 = littorea.
tripilifera, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
urelytra, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 653.—Japon.
variegata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 345 = Deyeuxia variegata.
vilnensis, Bess. in Roem. & Schult. Add. ad Mant. ii. 602 = epigeios.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 205.—Afr. trop.

CALAMINA, Beauv. = **Apluda**, Linn. (Gramin.).
gigantea, Beauv. Agrost. 129 = A. varia.
humilis, Roem. & Schult. Syst. ii. 810 = A. varia.

CALAMINTHA, Tourn. (Labiat.).
caucasica, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 207.—Reg. Caucas.
oaxacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 564.—Mexic.
thessala, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xi. 46.—Graecia.
thracica, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1899, 7.—Eur.
Troodii, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18. 97.—Ins. Cyprus.

CALAMUS, Linn. (Palm.).
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 151.—Afr. trop.
Iaboolum, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 14.—Austral.
longipinna, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 203.—N. Guin.
Moti, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 13.—Austral.
ralumensis, *Warb. ex K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 98.—N. Brit.
Warburgii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 203.—N. Guin.

CALANDRINIA, H. B. & K. (Portul.).
glaucopurpurea, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 342.—Chili.
Grayi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 137.—Am. bor.
macrocarpa, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 131.—Reg. Argent.
pygmaea, A. Gray, in Proc. Amer. Acad. viii. 623 = Grayi.
thyrsoidea, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 342.—Chili.
Tweedyi, A. Gray, in Proc. Amer. Acad. xxii. 277 = Lewisia Tweedyi.

CALANTHE, R. Br. (Orchid.).
arcuata, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 196.—China.
celebica, *Rolfe, l. c.* 1899, 129.—Celebes.
Englishii, *Rolfe, l. c.* 111.—N. Guin.
ensifolia, *Rolfe, l. c.* 1896, 197.—China.
Hancockii, *Rolfe, l. c.*—China.
Henryi, *Rolfe, l. c.*—China.
lamellosa, *Rolfe, l. c.*—China.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiii. 128.—Japon.
saccata, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 3.—Arch. Mal.
Shelfordi, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 23.—Arch. Mal.
trulliformis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 337.—Ind. or.
tunensis, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 3.—Arch. Mal.
Volkensii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 46.—Afr. trop.
whiteana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* xv. 121.—Ind. or.

CALATHEA, G. F. W. Mey. (Scitam.).
Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 123.—Bolivia.
picta, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7674.—Bras.

CALCEOLARIA, Linn. (Scrophul.).
sciadephora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 151.—Am. cent.

CALCEOLARIA, Loefl. = **Ionidium**, Vent. (Violac.).
parviflora, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 8 = I. glutinosum.
serrata, Kuntze, l. c. = I. lorenzianum.
sessiliflora, Kuntze, l. c. = I. sessiliflorum.

CALEA, Linn. (Compos.).
guatemalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 9.—Am. cent.
longipedicellata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 28.—Mexic.
megacephala, *Robinson & Greenm. l. c.* 21.—Mexic.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. l. c.* 25.—Mexic.
Oliverii, *Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxix. 106.—Guiana.
Pittieri, *Robinson & Greenm. l. c.* 105.—Am. cent.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 51.—Ecuador.
ternifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 294.—N. Granat.
ternifolia, Oliv. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. 277 = Oliverii.
terrifolia, Index Kew. i. 383, sphalm. = ternifolia.
thysanolepis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 22.—Mexic.

CALESIAM, Adans. = **Odina**, Roxb. (Anacard.).
ambacensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 177.—Afr. trop.
antiscorbutica, Hiern, l. c. 178.—Afr. trop.
rubra, Hiern, l. c. 177.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 179.—Afr. trop.

CALLIANDRA, Benth. (Legum.).
bijuga, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 135.—Mexic.
fulgens, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7626.—Mexic.
haematostoma, *Urb. Symb. Antill.* ii. 263 = haematomma.
inaequilatera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 28.—Bolivia.
laevis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 194.—Mexic.
nicaraguensis, *Taub. & Loes. in Engl. Jahrb.* xxiii. 124.—Am. cent.
oaxacana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 193.—Mexic.
penduliflora, *Rose, l. c.*—Mexic.
peninsularis, *Rose, l. c.* 135.—Mexic.
serjanioides, *Urb. Symb. Antill.* ii. 262.—Ind. occ.
silvicola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 429.—Bras.
unijuga, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 193.—Mexic.

CALLIANTHEMUM, C. A. Mey. (Ranuncul.).
acaule, Cambess. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7603 = rutaefolium.
alatavicum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 882.—As. cent.
angustifolium, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 336.—As. cent.
cachemirianum, Camb. in Jacquem. Voy. Bot. 5 = rutaefolium.
isopyroides, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 341.—As. cent.
pimpinelloides, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 26 = rutaefolium.
sajanense, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 338.—As. cent.
tibeticum, *Witasek, l. c.* 330.—Tibet.

CALLICARPA, Linn. (Verben.).
Pringlei, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 345.—Mexic.
repanda, *K. Schum. & Warb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 144.—N. Brit.
vastifolia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 547.—China.

CALLIGONUM, Linn. (Polygon.).
aphyllum, Guerke, Pl. Europ. ii. 111 = C. Pallasia.
arborescens, *Litwinow, in Delect. Pl. Jurjev.* 1900, 52.—Turkestan.

CALLIPRORA, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
albida, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, 1897, 20.—Hort.
scabra, Greene, in Erythea, iii. 126 = B. scabra.

CALLIRRHOË, Nutt. (Malvac.).
geranioides, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 283.—Am. bor.
scabriuscula, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 302.—Am. bor.

CALLITRICHE, Linn. (Halorag.).
aeolica, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 157.—Lesbos.

CALLYNTRANTHELE, Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsb. 1897, aest. 4. *MALPIGHIACEAE.*
angustifolia, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 206 (= *Byrsonima angustifolia*).—Venez.

CALOCARPUM, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 274 (1897) = **Lucuma**, Molina (Sapotac.).

CALOCHORTUS, Pursh (Liliac.)
acuminatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 189.—Am. bor.
Purdyi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 137.—Am. bor.

CALOLISIANTHUS, Gilg (Gentian.).
macranthus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 346.—Bras.

CALONYCTION, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
campanulatum, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. v. 1050.—Am. trop.
Pavoni, Hallier f. l. c. 1048.—Am. trop.
setosum, Hallier f. l. c. = I. setosa.

CALOPHANES, D. Don (Acanth.).
crenatus, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. 415 = Dyschoriste depressa.
linifolius, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 76 = Dyschoriste linifolius.
Nagchana, Nees, in DC. Prod. xi. 109 = Dyschoriste depressa.
radicans, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 23 = Dyschoriste radicans.
setosus, Nees, in DC. Prod. xi. 112 = Ruelliopsis setosa.
verticillaris, T. Anders. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. xxix. 126 = Dyschoriste verticillaris.

CALOPHYLLUM, Linn. (Guttif.).
Chapelieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1220.—Madag.
costatum, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 104.—Austral.
Kiong, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 450.—N. Guin.
laxiflorum, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1220.—Madag.
Pervillei, *Drake, l. c.*—Madag.
subsessile, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 142.—Penins. Mal.

CALOPOGONIUM, Desv. (Legum.).
orthocarpum, *Urb. Symb. Antill.* i. 327.—Ind. occ.

CALORHABDOS, Benth. (Scrophul.).
axillaris, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 963 = Botryopleuron axillare.
Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 16.—China.
latifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. 196 = Botryopleuron latifolium.
stenostachya, Hemsl. l. c. = Botryopleuron stenostachyum.
sutchuenensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 18.—China.
venosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. 197 = Botryopleuron venosum.

CALOSTIGMA, Decne. (Asclep.).
Mosenii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7. 68.—Bras.
multiflorum, *Malme, l. c.* 67.—Bras.
Regnelii, *Malme, l. c.* 66.—Bras.

CALOTHECA, Spreng. = **Aeluropus**, Trin. (Gramin.).
arabica, Spreng. Syst. i. 348 = A. villosus.
elegans, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 199 = Pappophorum elegans.
niliaca, Spreng. Syst. i. 348 = A. villosus.

CALPOCALYX, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 191 (1897). *LEGUMINOSAE.*
Dinklagei, *Harms, l. c.* (= *Erythrophloeum Dinklagei*). —Afr. trop.

CALPURNIA, E. Mey. (Legum.).
Antunesii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 173.—Afr. trop.
mucronulata, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 54. —Afr. austr.
obovata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 426.—Afr. austr.
Woodii, *Schinz, l. c.* 428.—Afr. austr.

CALTHA, Rupp. (Ranuncul.).
Chelidonii, *Greene, Pittonia,* iv. 75.—Am. bor.
chionophila, *Greene, l. c.* 80.—Am. bor.
confinis, *Greene, l. c.* 76.—Am. bor.
Howellii, *Greene, l. c.* 79.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* 77.—Am. bor.
malvacea, *Greene, l. c.* 75.—Am. bor.
rotundifolia, *Greene, l. c.* 80.—Am. bor.
uniflora, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 474.—Am. bor.

CALVOA, Hook. f. (Melastom.).
Molleri, *Gilg, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* ii. 31.—Afr. trop.
sessiliflora, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. I. 22.—Afr. trop.

CALYCADENIA, DC. = **Hemizonia**, DC. (Compos.).
bicolor, Greene, Fl. Francisc. 421.—Calif.
campestris, Greene, l. c.—Calif.
ciliosa, Greene, l. c.—Calif.
elegans, Greene, l. c. 423.—Calif.
hispida, Greene, l. c. 421 = H. Douglasii.
oppositifolia, Greene, l. c. 423 = H. multiglandulosa.
ramulosa, Greene, l. c.—Calif.
scabrella, Greene, l. c. 420 = H. scabrella.
spicata, Greene, l. c. 422 = H. Douglasii.

CALYCERA, Cav. (Calycer.).
integrifolia, *Reiche, in Engl. Jahrb.* xxix. 116 (= *Boopis integrifolia*).—Chili.
leucanthema, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 127 (= *Boopis leucanthema*).—Chili.
sympaganthera, Kuntze, l. c. = balsamitaefolia.

CALYCOPEPLUS, Planch. (Euphorb.).
Helmsii, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 341.—Austral.

CALYCOTHRIX, Meissn. = **Calythrix**, Labill. (Myrtac.).
Watsoni, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xvi. 355.—Austral.

CALYPSO, Salisb. (Orchid.).
occidentalis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 193.—Am. bor.

CALYPTRANTHES, Sw. (Myrtac.).
Tonduzii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 245.—Am. cent.

CALYPTROCARYA, Nees (Cyperac.).
glomerulata, Urb. Symb. Antill. ii. 169 = fragifera.

CALYPTROTHECA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 307. *CAPPARIDACEAE.*
somalensis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

CALYSACCION, Wight = **Ochrocarpus**, Thou. (Guttif.).
excelsum, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1225 = O. excelsum.
Harmandi, Pierre, l. c. 1226 = O. Harmandi.

CALYSTEGIA, R. Br. (Convolv.).
atriplicifolia, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 385.—Am. bor.
discolor, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvi. 42. —Bras.
Glaziovii, *Damm. l. c.* 41.—Bras.

CALYTHRIX, Labill. (Myrtac.).
desolata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 191.—Austral.

CAMARA, Plum. = **Lantana**, Linn. (Verbenac.).
lilacina, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 250 = L. lilacina.
montevidensis, Kuntze, l. c. = L. sellowiana.

CAMARIDIUM, Lindl. (Orchid.).
parviflorum, *Fawcett, in Urb. Symb. Antill.* i. 472.—Ind. occ.
polyanthum, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 488.—Ecuador.

CAMAROTIS, Lindl. = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).
Mannii, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 239 = S. Mannii.

CAMASSIA, Lindl. (Liliac.).
azurea, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 547.—Am. bor.

CAMELLIA, Linn. (Ternstroem.).
lutchuensis, *Ito, ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo,* xii. 332.—Ins. Luchu.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 643.—Celebes.

CAMMARUM, Fourr. (Ranuncul.).
hyemale, Hill, British Herbal, (1756) 47 = Eranthis hyemalis.

CAMPANOPSIS, Kuntze = **Wahlenbergia**, Schrad. (Compos.).
Krebsii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 185 = W. Zeyheri.

CAMPANULA, Tourn. (Campanul.).
albicans, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 319 (= *Trachelium albicans*).—Eur.
angustiflora, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 132.—Am. bor.
arenaria, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 290.—Eur.
asperuloides, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 319 (= *Trachelium asperuloides*).—Eur.
Brotheri, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 199.—Reg. Caucas.
chalcidica, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 319 (= *Trachelium chalcidicum*).—Eur.
cinerea, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 289 (non Linn.).—Eur.
esculenta, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 148 (non A. Rich.).—Lesbos.
formanekiana, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 702.—Eur.
luristanica, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 791.—Persia.
Plasonii, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 155.—Eur.
Postii, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 318 (= *Trachelium Postii*).—Oriens.
revoluta, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxviii. 190.—Eur.
saxifragoides, *Doumergue, in Compt. Rend. Assoc. Fr.* xxvii. II. 455.—Afr. bor.
semisecta, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12. (1897) 115.—Hispan.
tubulosa, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 319 (= *Trachelium tubulosum*).—Oriens.
wilkinsiana, *Greene, Pittonia,* iv. 38.—Am. bor.

CAMPDERIA, Benth. (Polygon.).
paniculata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 440. —Am. cent.

CAMPTANDRA, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1899) 103. *SCITAMINEAE.*
latifolia, *Ridley, l. c.* 104.—Penins. Mal.
parvula, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

CAMPTOSEMA, Hook. & Arn. (Legum.).
nobile, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7. 12.—Am. austr.
Sanctae-Barbarae, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 439.—Bras.

CAMPTOSTYLUS, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. (1898) 57. *BIXACEAE.*
caudatus, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

CAMPULOA, Desv. (Gramin.).
hirsuta, Desv. in Journ. Bot. i. (1813) 69 = Harpechloa capensis.

CAMPULOSUS, Desv. (Gramin.).
falcatus, Beauv. Agrost. 157 = Harpechloa capensis.
hirsutus, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. 189 = Harpechloa capensis.

CAMPYLOCENTRON, Benth. (Orchid.).
Kuntzei, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 298.—Bolivia.

CAMPYLOCHITON, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 353 (1898). *COMBRETACEAE.*
platypterus, *Hiern, l. c.* 354.—Afr. trop.

CAMPYLOGYNE, Welw. ex Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2550 (1899). *COMBRETACEAE.*
exannulata, *Hemsl. l. c.*—Afr. trop.

CAMPYLOSTEMON, Welw. (Celastr.).
Duchesnei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 57.—Afr. trop.

CAMPYLOTHECA, Cass. = **Coreopsis**, Linn. (Compos.).
mutica, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 916 = C. macrocarpa.

CANARIASTRUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 364. *BURSERACEAE.*
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CANARIELLUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 242. *BURSERACEAE.*
oleiferum, Engl. l. c. (= *Canarium oleiferum*).—N. Caled.

CANARIUM, Rumph. (Burserac.).
edule, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 285 = Pachylobus edulis.
Greshoffi, *Koord, in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 375, nomen.—Celebes.
greveanum, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 241 = multiflorum.
liebertianum, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 270.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 376, nomen.—Celebes.
Mubafo, Ficalho, in Bol. Soc. Geogr. Lisboa, Ser. II. 611 = Pachylobus edulis.
Saphu, Engl. in Engl. Jahrb. xv. 99 = Pachylobus edulis.

CANAVALIA, DC. (Legum.).
lasiocalyx, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 55.—Bolivia.
rusiosperma, *Urb. Symb. Antill.* i. 473.—Ind. occ.

CANNA, Linn. (Scitamin.).
bidentata, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bolog. x. (1859) 33 = indica.
Ehrenbergii, Bouché, in Linnaea, viii. 150 = indica.
orientalis, Rosc. Scit. t. 12 = indica.

CANNOMOIS, Beauv. (Restiac.).
aristatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 19.—Afr. austr.
complanatus, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
congesta, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 143.—Afr. austr.
Schlechteri, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 18.—Afr. austr.
spicatus, *Mast. l. c.* 19.—Afr. austr.

CANSCORA, Lam. (Gentian.).
ramosissima, Baker, in Kew Bull. 1898, 158 = Torenia spicata.

CANTHIUM, Lam. = **Plectronia**, Linn. (Rubiac.).
Chamaedendrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = P. Chamaedendrum.
ciliatum, Kuntze, l. c. = P. ciliata.
golungense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 478.—Afr. trop.
huillense, Hiern, l. c. 476.—Afr. trop.
inerme, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = P. ventosa.
kraussioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 473.—Afr. trop.
lactescens, Hiern, l. c. 511.—Afr. trop.
Medusula, Hiern, l. c. 474.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 493, nomen.—Celebes.
pauciflorum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = P. pauciflora.

CANTHIUM:—
pergracile, Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xii. 352.—Ind. or.
platyphyllum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 479.—Afr. trop.
rhamnoides, Hiern, l. c. 472.—Afr. trop.
spinosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = P. spinosa.
suaveolens, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 194.—Austral.
sylvaticum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 477.—Afr. trop.
tenuiflorum, Welw. ex Hiern, l. c.—Afr. trop.
umbrosum, Hiern, l. c. 479.—Afr. trop.
virgatum, Hiern, l. c. 473.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 475.—Afr. trop.
zanzibaricum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = P. zanzibarica.

CAPNOIDES, Tourn. = **Corydalis**, Vent. (Papaverac.).
Brandegei, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = C. Brandegei.
claviculata, Druce, Fl. Berkshire, 36 = C. claviculata.
Cusickii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = C. Cusickii.
Halei, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 137.—Am. bor.

CAPPARIS, Tourn. (Capparid.).
andamanica, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 119.—Ins. Andaman.
Atamisquea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6 = Atamisquea emarginata.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 5.—Bolivia.
Dahlii, *Gilg & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 208.—N. Brit.
discolor, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 389.—Am. cent.
Erycibe, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 217.—Java.
filipes, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 2.—Am. cent.
Gallatlyi, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 118.—Ind. or.
Henryi, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 33.—Formosa.
malmeana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 23.—Parag.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 309.—Ind. occ.
Rivae, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 89.—Afr. trop.
somalensis, *Gilg, l. c.* 90.—Afr. trop.
thyrsiflora, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. I. 480, sphalm. = Cleome thyrsiflora.

CAPSELLA, Medic. (Crucif.).
draboides, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 416.—Turkestan.
Gelmii, *Jos. Murr, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 171.—Eur.
villosula, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 335.—S. Austral.

CAPSICUM, Tourn. (Solanac.).
grandiflorum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 218.—Bolivia.

CARAGANA, Lam. (Legum.).
Aitchisoni, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 372.—Ind. or.
chumbica, *Prain, l. c.* 370.—Reg. Himal.
polourensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 321.—Tibet.

CARALLIA, Roxb. (Rhizophor.).
borneensis, *Oliv. in Hook. Ic. Pl.* t. 2459.—Borneo.
eugenoidea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 320.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 319.—Penins. Mal.

CARALLUMA, R. Br. (Asclep.).
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 697.—Afr. trop.
scutellata, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 114.—Arab.

CARANDAS, Rumph. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).
edulis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 664 = C. edulis.

CARDAMINE, Tourn. (Crucif.).
argentina, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 12.—Reg. Argent.
bilobata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 27.—N. Zel.
caledonica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 4 (= *Nasturtium caledonicum*).—Afr. austr.

CARDAMINE:—
callosicrenata, *Piper, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 488.—Am. bor.
dentipetala, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 51.—Japon.
drakeana, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 791.—Japon.
Enisii, *Cheesem. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 28.—N. Zel.
fernandeziana, Johow, Fl. Juan Fernandez, 110 = chenopodifolia.
Fialae, *Fritsch, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 44.—Eur.
foliacea, *Greene, Pittonia*, iv. 201.—Am. bor.
fulcrata, *Greene, l. c.* iii. 155.—Mexic.
gemmifera, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 49.—Japon.
hederaefolia, *Greene, Pittonia*, iv. 202.—Am. bor.
Kruesselii, *Johow, Fl. Juan Fernandez*, 112.—Ins. Juan Fernandez.
modocensis, *Greene, Pittonia*, iv. 203.—Am. bor.
nasturtiifolia, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 793 (non Steud.).—Japon.
neglecta, *Greene, Pittonia*, iii. 154.—Am. bor.
occidentalis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 50.—Am. bor.
orbicularis, *Greene, Pittonia*, iv. 202.—Am. bor.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 490.—Patag.
purpurea, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 130 (non Cham.).—Am. bor.
pygmaea, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 175.—Reg. Magell.
umbellata, *Greene, Pittonia*, iii. 154.—Am. bor.
unijuga, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 246.—Am. bor.
vallicola, *Greene, Pittonia*, iii. 116.—Am. bor.
xanthina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 267.—N. Zel.

CARDANTHERA, Buch.-Ham. (Acanthac.).
africana, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1075 = Synnema africanum.
justicioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 6 = Hemigraphis abyssinica.

CARDIACANTHUS, Schau. = **Jacobinia**, Moric. (Acanthac.).
fragrans, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vii. 577.—Am. cent.
tetramerioides, Lindau, l. c.—Am. cent.

CARDIOSPERMUM, Linn. (Sapind.).
galapageium, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 38.—Ins. Galap.

CARDOSANCTUS, Bub. Fl. Pyren. ii. 152. (1900) = **Carbenia**, Adans. (Compos.).
officinalis, Bub. l. c. = C. benedicta.

CARDUNCELLUS, Adans. (Compos.).
Battandieri, *Barratte & Chevall. ex Chevall. in Mém. Herb. Boiss.* no. 7. 9.—Afr. bor.

CARDUUS, Tourn. (Compos.).
Andrewsii, *Greene, Fl. Francisc.* 478 (= *Cnicus Andrewsii*).—Am. bor.
canovirens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 450.—Am. bor.
Chevallieri, *Barratte, ex Chevall. in Mém. Herb. Boiss.* no. 7. 9.—Afr. bor.
cymosus, *Greene, Fl. Francisc.* 480.—Calif.
Flodmanii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 451.—Am. bor.
Hallii, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (= *Cnicus Hallii*).—Am. bor.
hookerianus, *A. A. Heller, l. c.* (= *Cnicus hookerianus*).—Am. bor.
inamoenus, *Greene, Fl. Francisc.* 479.—Calif.
Kelseyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 449.—Am. bor.
Lecontei, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 157.—Am. bor.
leiocarpus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (= *Cnicus Eatoni*).—Am. bor.
nebraskensis, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 487.—Am. bor.
nevadensis, *Greene, Pittonia*, iii. 26.—Am. bor.
Nuttallii, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 157 (= *Cnicus Nuttallii*).—Am. bor.
perennans, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 123.—Am. bor.

CARDUUS:—
prasinus, *Glaab, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 148.—Eur.
scariosus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (= *Cnicus scariosus*).—Am. bor.
spinulosus, *Glaab, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 147.—Eur.
Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 449.—Am. bor.
validus, *Greene, Fl. Francisc.* 479.—Calif.
Wheeleri, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (= *Cnicus Wheeleri*).—Am. bor.
Wrightii, *A. A. Heller, l. c.* 8 (= *Cnicus Wrightii*).—Am. bor.

CAREX, Dill. (Cyperac.).
altocaulis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 326 = saltuensis.
amurensis, *Kuek. in Bot. Centralbl.* lxxvii. 94.—As. bor.
andina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 485.—Chili.
Anwandteri, *R. Phil. l. c.* 498.—Chili.
aomorensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. viii. 198.—Japon.
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 495.—Chili.
arcuata, Wahl. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. xxiv. (1803) 151 = extensa.
arkansana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 6.—Am. bor.
ascotreta, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 182.—China.
atrovirens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 52.—Reg. Argent.
Balansae, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. viii. 258.—Tonkin.
baviensis, *Franch. l. c.* x. 77.—Tonkin.
Bicknellii, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* i. 360.—Am. bor.
bisexualis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 302.—Afr. austr.
Blankinshipii, *Fernald, in Erythea*, vii. 121.—Am. bor.
Bolusii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 304.—Afr. austr.
boniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 190.—Tonkin.
Bornmulleri, *Kuek. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 136.—Persia.
Brehmeri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 190.—Bolivia.
Brotherorum, *Christ, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 434.—Reg. Caucas.
brunnescens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 44.—Reg. Argent.
Buchanani, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 305.—Afr. austr.
calbucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 499.—Chili.
canariensis, *Kuek. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 235.—Ins. Canar.
capitellata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 174 (non Boiss. & Bal.).—Bras.
catamarcensis, *C. B. Clarke, ex Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 518.—Reg. Argent.
catharinensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 191.—Bras.
chlorosaccus, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 298.—Afr. trop.
colchaguensis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 484.—Chili.
Congdoni, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 6.—Am. bor.
Costei, *Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar.* t. 149.—Eur.
cristatella, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* i. 357.—Am. bor.
cryptantha, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* Ser. IV. x. 267.—Am. bor.
Delacosta, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 332 (= *Uncinia macloviana*).—Ins. Falkland.
Dessaueri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 496.—Chili.
distachya, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 336.—Reg. Medit.
distichoidea, *Léveillé & Van. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. 108.—Japon.
drakensbergensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 309.—Afr. austr.
Durandii, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 189.—Costa Rica.
dussiana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 42.—Ind. occ.
Eggertii, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 6.—Am. bor.

CAREX:—
elynoides, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* 1900, I. 356.—Am. bor.
fibrata, *Vidal, Phanerog. Cuming.* 156.—Ins. Philipp.
fuegina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 491.—Chili.
fulta, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. viii. 202.—Japon.
galbana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Mexic.
gracilirostris, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 138.—China.
haematosaccus, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 297.—Madag.
Hassei, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
helodes, *Link, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 309.—Eur.
hinnulea, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 159.—Ind. occ.
Idahoa, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
inconspicua, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 612.—N. Zel.
irrasa, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Am. bor.
kurtziana, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 503.—Reg. Argent.
laevigata, Sm. in Trans. Linn. Soc. v. (1800) 272 = helodes.
lamprocarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 497.—Chili.
lateriflora, *R. Phil. l. c.* 488.—Chili.
latibracteolata, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 518.—Chili.
laticeps, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 178.—China.
laxiflora, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 48.—Eur.
ligniciensis, *Figart, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 38.—Eur.
Linkii, Willd. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 39 = distachya.
longispica, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 174.—Tonkin.
longistolon, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. viii. 243.—China.
luctuosa, *Franch. l. c.* ix. 130.—China.
lugens, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* Ser. IV. x. 269.—Am. bor.
madrensis, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 270.—Mexic.
mancaeformis, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 62.—China.
mandoniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 174.—Bolivia.
melanolepis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 499 (non Boeck.).—Chili.
melinacra, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 135.—China.
Moelleri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 487.—Chili.
Molinae, *R. Phil. l. c.* 486.—Chili.
microtricha, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 189.—Japon.
multimoda, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
Nebularium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 492.—Chili.
nervulosa, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. ix. 120.—Japon.
nigrolutea, Gaud. Étrennes de Fl. 196 = glauca.
Novae-Zealandiae, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 273 = rubicunda.
oaxacana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Mexic.
ochrolepis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 48.—Japon.
ochrostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 500.—Chili.
oreocharis, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* 1900, 358.—Am. bor.
Ortegae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 488.—Chili.
oxyphylla, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 57 (non Britton).—China.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 626.—Patag.
pedicellata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 500.—Chili.
Peraltae, *R. Phil. l. c.* 490.—Chili.

CAREX:—
Pittieri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 190.—Am. cent.
posnaniensis, *Sprib. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 184.—Eur.
praticola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 84.—Am. bor.
Preussii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 340.—Afr. trop.
promaucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 496.—Chili.
pseudobicolor, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 44.—Reg. Himal.
pseudopunctata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 191.—Bras.
pseudoscirpoidea, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 78.—Am. bor.
pterocarpa, *Petrie, Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 353.—N. Zel.
pterolepta, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. viii. 215.—China.
pusilla, *Valb. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 174 (non Pers.).—Eur.
Raddei, *Kuek. in Bot. Centralbl.* lxxvii. 97.—As. bor.
Rahmeri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 502.—Chili.
rariflora, *Sm. in Sowerby, Engl. Bot.* t. 2516.—Reg. bor. et arct.
reicheana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 173.—Chili.
Reichei, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 504.—Chili.
rubicunda, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 353.—N. Zel.
Sagei, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 494.—Chili.
samoensis, *Boeck. in Engl. Jahrb.* xxv. 588.—Ins. Samoa.
schenckiana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 35.—Bras.
schwackeana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 191.—Bras.
seatoniana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 270.—Mexic.
sepulta, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 494.—Chili.
Serranoi, *R. Phil. l. c.* 501.—Chili.
setifolia, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 332 = eburnea.
sicula, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 9 = distans.
sonderiana, *Boott, ex Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 38.—Bras.
sparsinux, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 66.—China.
taurina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 490.—Chili.
temnolepis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 61.—Japon.
tenuissima, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 288.—China bor.; Japon.
Thompsonii, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 298 = pterocarpa.
turgidula, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Am. bor.
tymphaea, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 279.—Eur.
uleana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 42.—Bras.
Vallispulchrae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 487.—Chili.
Vilmorini, *Mottet, in Rev. Hort.* 1897, 79.—N. Zel.
vratislaviensis, *Figert, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 39.—Eur.
xanthocarpa, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 21.—Am. bor.
Zeyheri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 303.—Afr. austr.

CAREYA, Roxb. (Myrtac.).
niedenzuana, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 136.—N. Brit.

CARICA, Linn. (Passifl.).
dolicaula, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 247.—Am. cent.

CARINIANA, Casar. = **Couratari**, Aubl. (Myrtac.).
estrellensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 89 = C. estrellensis.
legalis, Kuntze, l. c. = C. legalis.

CARLINA, Linn. (Compos.).
macrocephala, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 18.—Eur.
neglecta, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxv. 172.—Eur.
officinalis, Bub. Fl. Pyren. ii. 173 = acaulis.
rhodopea, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 19.—Eur.
rigida, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 305.—Eur.
striata, *Form. l. c.* xxxvii. 169.—Eur.
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. ii. 174 = vulgaris.

CARLOSTEPHANIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 658 (1900) = **Circaea**, Tourn. (Onagrac.).
major, Bub. l. c. 659 = C. lutetiana.
minor, Bub. l. c. 660 = C. alpina.

CARLOWRIGHTIA, A. Gray (Acanth.).
glandulosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 40.—Mexic.
linearifolia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 661 (non A. Gray).—Mexic.
Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 40.—Mexic.

CARLUDOVICA, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
Goebelii, *J. E. Weiss & Wagn. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 138.—Venez.
laucheana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7683.—N. Granat.
mattogrossensis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 8. 6.—Bras.
rivularis, *Lindm. l. c.* 4.—Bras.

CARMICHAELIA, R. Br. (Legum.).
acuminata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 506.—N. Zel.
angustata, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
Hookeri, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
Petriei, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
robusta, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
subulata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 112.—N. Zel.
violacea, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 506.—N. Zel.
virgata, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.

CAROLOFRITSCHIA, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 362. *GESNERACEAE.*
diandra, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CARPACOCE, Sond. (Rubiac.).
heteromorpha, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 25.—Afr. austr.

CARPESIUM, Linn. (Compos.).
eximium, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 58.—China.
Faberi, *Winkl. l. c.* 65.—China.
humile, *Winkl. l. c.* 70.—China.
Lipskyi, *Winkl. l. c.* 68.—As. cent.
velutinum, *Winkl. l. c.* 73.—China.

CARPINUS, Linn. (Cupulif.).
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 202.—China.
polyneura, *Franch. l. c.*—China.
pubescens, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 502.—China.
seemeniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 279.—China.

CARPODINUS, R. Br. (Apocyn.).
congolensis, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
decipiens, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 37, nomen.—Afr. trop.
exserens, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 219.—Afr. trop.
flava, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 37, nomen.—Afr. trop.
flavidiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
foretiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 38, nomen.—Afr. trop.
friabilis, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
fulva, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
glabra, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
gracilis, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
hirsuta, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1900, 312.—Afr. trop.
Iganda, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 38, nomen.—Afr. trop.
Jumellei, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
klaineana, Pierre, l. c. 36 = Klainii.

CARPODINUS:—
Klainii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 38, nomen.—Afr. trop.
laxiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
leptantha, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 303 (non K. Schum.).—Afr. trop.
ligustrifolia, *Stapf, l. c.* 304.—Afr. trop.
macrantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
maximus, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 105.—Afr. trop.
myriantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 221.—Afr. trop.
parvifolia, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 38, nomen.—Cochinch.
rufonervis, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 306, nomen.—Afr. trop.
tenuifolia, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 37, nomen.—Afr. trop.
trichanthera, *Pierre, l. c.* 38, nomen.—Afr. trop.
turbinata, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 304.—Afr. trop.
umbellata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 221.—Afr. trop.
violacea, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 112.—Afr. trop.
watsoniana, *Vogtherr, in Koehl. Medizinalpfl.* iii. sub t. 14 (= *Landolphia watsoniana*).—Afr. trop.

CARPOLOBIA, G. Don (Polygal.).
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 417.—Afr. trop.
macrostachya, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* v. 117.—Afr. trop.

CARRIEREA, Franch. in Rev. Hort. 1896, 498. *BIXACEAE.*
calycina, *Franch. l. c.*—China.

CARSONIA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 211. *CAPPARIDACEAE.*
sparsifolia, *Greene, l. c.* 212 (= *Cleome sparsifolia*).—Am. bor.

CARTHAMUS, Tourn. (Compos.).
ambiguus, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 186.—Eur.
Boissieri, Halacsy, l. c. = glaucus.

CARUM, Rup. (Umbellif.).
colchicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 277.—Reg. Caucas.
pachypodium, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 157.—Lesbos.

CARVI, Bub. Fl. Pyren. ii. 352 (1900) = **Carum**, Rup. (Umbellif.).
Bulbocastanum, Bub. l. c. = C. Bulbocastanum.
careum, Bub. l. c. = C. Carvi.
flexuosum, Bub. l. c. 354 = C. flexuosum.
verticillatum, Bub. l. c. 353 = C. verticillatum.

CASEARIA, Jacq. (Samyd.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 16.—Ins. Andaman.
attenuata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 40.—Bolivia.
bicolor, *Urb. Symb. Antill.* i. 372.—Ind. occ.
boliviana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 69.—Bolivia.
Clarkei, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 18.—Malaya.
commutata, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 65.—Am. trop.
coriacea, Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 20 = Thwaitesii.
ehrenbergiana, *Urb. Symb. Antill.* i. 373.—Ind. occ.
ferruginea, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 70.—Bras.
Glaziovii, *Briq. l. c.* 72.—Bras.
gossypiosperma, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 55.—Parag.
Grisebachii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 62 (= *Valentinia coriacea*).—Ind. occ.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 52.—Afr. austr.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 17.—Malaya.
lindeniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 67.—Mexic.

CASEARIA:—
obovata, Poepp. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 472 = commutata.
orizabana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 67.—Mexic.
platyphylla, *Briq. l. c.* 68.—Mexic.
Pringlei, *Briq. l. c.* 65.—Mexic.
rusbyana, *Briq. l. c.* 73.—Venez.
Thwaitesii, *Briq. l. c.* 62.—Zeylan.

CASIMIROA, La Llave (Rutac.).
Pringlei, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 178 (= *Sargentia Pringlei*).—Mexic.
tetrameria, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 401.—Mexic.
Watsonii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 178.—Mexic.

CASSIA, Tourn. (Legum.).
angolensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 291.—Afr. trop.
Caeciliae, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 549.—Am. cent.
confinis, *Greene, Pittonia*, iii. 225.—Am. bor.
goyazensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 435.—Bras.
guatemalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 6.—Am. cent.
myrtifolia, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 36.—Chili.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 135.—Mexic.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 317.—Ind. occ.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 194.—Mexic.
proboscidea, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 281.—Ind. occ.
seleriana, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 551.—Am. cent.
Stahlii, *Urb. Symb. Antill.* i. 316.—Ind. occ.
unijuga, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.

CASSIDA, Tourn. = **Scutellaria**, Riv. (Labiat.).
minor, Bub. Fl. Pyren. i. 424 = S. minor.

CASSINE, Linn. (Celastr.).
Burchellii, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 223.—Afr. austr.
lacinulata, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 432.—Afr. trop.
schinziana, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 223 (= *Maurocenia schinziana*).—Afr. austr.
schlechteriana, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 432.—Afr. trop.

CASSINIA, R. Br. (Compos.).
alba, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 470.—Afr. trop.
amoena, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 391.—N. Zel.

CASSINOPIS, Sond. (Olacin.).
ilicifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 36 = capensis.

CASSYTHA, Linn. (Laurin.).
pondoensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 392.—Afr. trop.

CASTANOPSIS, Spach (Cupul.).
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 194.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 195.—China.
Henryi, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 523.—China.
orthacantha, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 194.—China.
tonkinensis, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 55.—Tonkin.

CASTANOSPORA, F. Muell. (Sapind.).
longistipitata, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 288.—Austral.

CASTELNAVIA, Tul. & Wedd. (Podostem.).
lindmaniana, *Warm. in Danske Vid. Selsk. Skrift.* Ser. VI. ix. 140.—Bras.

CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.).
Applegatei, *Fernald, in Erythea*, 1898, 49.—Am. bor.
aurea, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 39.—Mexic.
brachyantha, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 360.—Am. bor.
Breweri, *Fernald, in Erythea*, 1898, 49.—Am. bor.

CASTILLEJA:—
cervina, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 269.—Am. bor.
chromosa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 245.—Am. bor.
confusa, *Greene, Pittonia*, iv. 1.—Am. bor.
covilleana, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 353.—Am. bor.
Crista-galli, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 355.—Am. bor.
Cusickii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 267.—Am. bor.
Dixonii, *Fernald, in Erythea*, 1899, 122.—Am. bor.
Elmeri, *Fernald, l. c.* 1898, 51.—Am. bor.
fasciculata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 133.—Am. bor.
Haydeni, *Greene, Pittonia*, iv. 1.—Am. bor.
lanceifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 357.—Am. bor.
láuta, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 269.—Am. bor.
levisecta, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 268.—Am. bor.
lineata, *Greene, Pittonia*, iv. 151.—Am. bor.
longispica, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 480.—Am. bor.
lutea, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 268.—Am. bor.
lutescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 359.—Am. bor.
montana, *Congd. in Erythea*, 1900, 188.—Calif.
oreopola, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 264.—Am. bor.
pallescens, *Greenm. l. c.* 266 (= *Orthocarpus pallescens*).—Am. bor.
pilosa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 361 = Orthocarpus pilosus.
pinetorum, *Fernald, in Erythea*, 1898, 50.—Am. bor.
pruinosa, *Fernald, l. c.*—Am. bor.
remota, *Greene, Pittonia*, iv. 2.—Am. bor.
rhexifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 356.—Am. bor.
rubida, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 398.—Am. bor.
rupicola, *Piper, ex Fernald, in Erythea*, 1898, 45.—Am. bor.
rustica, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 398.—Am. bor.
stricta, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 354 (non Benth.).—Am. bor.
subinclusa, *Greene, Pittonia*, iv. 2.—Am. bor.
sulphurea, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 359.—Am. bor.
Tweedyi, *Rydb. l. c.* 358.—Am. bor.
villosa, *Rydb. l. c.* 361.—Am. bor.

CASTILLOA, Cervant. (Urtic.).
Tunu, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2651.—Am. cent.

CASUARINA, Linn. (Casuarin.).
Cambagei, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 605.—Austral.
Luehmanni, *R. T. Baker, l. c.* 608.—Austral.

CATABROSA, Beauv. (Gramin.).
himalaica, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 311.—Ind. or.
nutans, *Stapf, l. c.* 312.—Ind. or.
sikkimensis, *Stapf, l. c.* 311.—Ind. or.
Thomsoni, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
Wallichii, *Hook. f. l. c.* 312.—Ind. or.

CATAPODIUM, Link = **Festuca**, Linn. (Gramin.).
filiforme, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 301 = Tripogon abyssinicus.
tenellum, Husnot, Graminées, i. 68 = F. Poa.
unilaterale, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 347 = F. tenuiflora.

CATARIA, Adans. = **Nepeta**, Linn. (Labiat.).
latifolia, Bub. Fl. Pyren. i. 428 = N. latifolia.
tenuifolia, Bub. l. c. 426 = N. Nepetella.

CATASETUM, Rich. (Orchid.).
rostratum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 134.—Ind. occ.

CATESBAEA, Linn. (Rubiac.).
melanocarpa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 427.—Ind. occ.
nana, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 428.—Ind. occ.

CATHCARTIA, Hook. f. (Papav.).
lyrata, *Cummins & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 325.—Reg. Himal.
polygonoides, *Prain, l. c.* 326.—Ind. or.

CATOPHERIA, Benth. (Labiat.).
spicata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 374 (= *Orthosiphon spicatus*).—N. Granat.

CATOPSIS, Griseb. (Bromel.).
berteroniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 621.—Am. bor.
deflexa, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. 323.—Bras.
morreniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 628.—Mexic.
Mosenii, *Mez, l. c.* 622.—Bras.
nitida, Baker, Handb. Bromel. 154 = berteroniana.
oerstediana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 630.—Am. cent.
sessiliflora, Mez, l. c. 625 = nutans.
tenella, *Mez, l. c.* 631.—Mexic.
wawreana, *Mez, l. c.* 626.—Mexic.

CATTLEYA, Lindl. (Orchid.).
Alexandrae, L. Linden & Rolfe, in Gard. Chron. 1892, I. 522 = elongata.
brasiliensis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 135.—Bras.
Patini, *Cogn. Dict. Ic. Orch. Cattl.* t. 25.—Ind. or.

CAUCALIS, Linn. (Umbellif.).
cordisepala, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12. (1897) 85.—Afr. bor.
grandiflora, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 160 (non Linn.).—Lesbos.
heterocarpa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1. (1900) 33.—Afr. bor.
homaeophylla, *Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 571.—Eur.
mossamedensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 432.—Afr. trop.

CAVENDISHIA, Lindl. (Vaccin.).
capitulata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 147.—Am. cent.

CAYAPONIA, Silva Manso (Cucurb.).
Aubia, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 121 = attenuata.
grandifolia, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 496 = Melothria grandifolia.

CEANOTHUS, Linn. (Rhamnac.).
glaber, *Trel. in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 412 (non Spach).—Am. bor.
laevigatus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 114.—Am. bor.
Martini, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 41.—Am. bor.
perplexans, *Trel. in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 417.—Am. bor.

CECROPIA, Linn. (Urtic.).
polyphlebia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 442.—Am. cent.

CEDRELA, P. Br. (Meliac.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 636.—Celebes.
oaxacensis, *C. DC. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 190.—Mexic.
occidentalis, *C. DC. & Rose, l. c.*—Mexic.

CEIBA, Medic. = **Eriodendron**, DC. (Malvac.).
boliviana, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1896, 174.—Bolivia.
Glaziovii, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 343.—Bras.
Mandoni, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1896, 175.—Bolivia.
Schottii, Britten & Baker f. l. c. 173.—Am. cent.
Sipolisii, K. Schum. & Schwacke, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. 16.—Bras.
tunariensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 343.—Bolivia.

CELASTRUS, Linn. (Celastr.).
angustifolius, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 37 = polyacanthus.

CELASTRUS:—
hypoleucus, *Warb. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 445 (= *Erythrospermum hypoleucum*).—China.
Moya, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 37 (= *Moya spinosa*).—Reg. Argent.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.
racemosa, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 222 = Maytenus racemosa.
rosthornianus, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 445.—China.
Saharae, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 251.—Afr. bor.
Schlechteri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 37 = Gymnosporia Schlechteri.

CELMISIA, Cass. (Compos.).
argentea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 292.—N. Zel.
flaccida, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 423.—N. Zel.
mollis, *Cockayne, l. c.*—N. Zel.

CELOME, Greene, Pittonia, iv. (1900) 210. *CAPPARIDACEAE.*
platycarpa, *Greene, l. c.* 211 (= *Cleome platycarpa*).—Am. bor.

CELOSIA, Linn. (Amarant.).
chenopodiifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 276.—Afr. trop.
cuneifolia, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
falcata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 58.—Afr. trop.
loandensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 277.—Afr. trop.
minutiflora, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
nana, *Baker, l. c.* (non Blanco).—Afr. trop.
oblongocarpa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 418.—Afr. trop.
pandurata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 276.—Afr. trop.
semperflorens, *Baker, l. c.* 277.—Afr. trop.
staticodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 886.—Afr. trop.
stuhlmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 419.—Afr. trop.

CELSIA, Linn. (Scrophul.).
atroviolacea, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 201.—Reg. Caucas.
Bottae, *Deflers, Voy. Yemen*, 178.—Arab.
carmanica, *Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 51.—Persia.

CELTIS, Tourn. (Urtic.).
Durandii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 22.—Afr. trop.
georgiana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 439.—Am. bor.
Helleri, *Small, l. c.*—Am. bor.
Henriquezii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 22.—Afr. trop.
Prantlii, *Priemer, ex Engl. l. c.* 23.—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Stuhlmanni, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 22.—Afr. trop.

CENCHRUS, Linn. (Gramin.).
alopecuroides, Thunb. Prod. Pl. Cap. 24 = Pennisetum typhoideum.
Anjania, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8649 B = Pennisetum cenchroides.
annularis, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 553 = catharticus.
asperifolius, Desf. Fl. Atlant. ii. 388 = Pennisetum orientale.
bulbifer, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient. v. 443 = biflorus.
frutescens, Sieb. in Bot. Zeit. ix. 14 = Phragmites communis.
hordeiformis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 24 = Pennisetum macrurum.
insularis, *Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 26.—Am. cent.
Lapeta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8654, A, D = catharticus.
longifolius, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 109 = Pennisetum cenchroides.
macrocephalus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 110.—Am. bor.
montanus, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 416 = biflorus.
mutabilis, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 88 = Pennisetum cenchroides.

CENCHRUS:—
mutilatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 (= *Pennisetum mutilatum*).—Reg. Argent.
nervosus, *Kuntze, l. c.* (= *Pennisetum nervosum*).—Bras.
paniceus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8650 = Pennisetum typhoideum.
pennisetiformis, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 317 = Pennisetum cenchroides.
pubescens, Steud. l. c. = Anthephora pubescens.
purpurascens, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 329 = Pennisetum compressum.
quinquevalvis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8854 B, C = biflorus.
Schimperi, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 317 = biflorus.
spicatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 346 = Pennisetum typhoideum.
triflorus, Aitch. Cat. Panjab. Pl. 163, sphalm. = biflorus.
tripsacoides, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 = biflorus.
tristachyus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 (= *Pennisetum tristachyon*).—Ecuador.
uniflorus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. v. 448 = biflorus.
villosus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 347 = Pennisetum villosum.

CENOSTIGMA, Tul. (Legum.).
sclerophyllum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11. 24.—Parag.

CENTAUREA, Linn. (Compos.).
Adamovicii, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 173.—Eur.
aragonensis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 162.—Eur.
asperula, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 588.—Eur.
Bridgesii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 169.—Chili.
confusa, *Coste & Sennen, in Magnier, Scrinia Fl. Select. fide Just, Jahresb.* xxv. II. 335.—Hybr.
confusa, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 596.—Eur.
drakiensis, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 783.—Eur.
emigrantis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 165.—Eur.
epirota, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 581.—Eur.
ferulacea, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iii. 370.—Eur.
hoffmanniana, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 752 = pulchra.
hoffmanseggiana, *Lazaro, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 150.—Eur.
Jankae, *Brandza, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. iv. (1884) 42.—Eur.
kalambakensis, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 784.—Eur.
kanitziana, *Janka, ex Brandza, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. iv. (1884) 43.—Eur.
Kochii, *Claire, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1900, 45.—Eur.
lacerata, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 591.—Eur.
lactiflora, *Halacsy, l. c.* 601.—Eur.
Linarsii, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 152.—Eur.
macedonica, Halacsy, in Bull. Herb. Boiss. vi. 595 = Grisebachii.
ossaea, *Halacsy, l. c.* 591.—Eur.
pallidior, *Halacsy, l. c.* 594.—Eur.
parnonia, *Halacsy, l. c.* 648.—Eur.
paucifuga, *Halacsy, l. c.* 595.—Eur.
peregrina, *Coste & Sennen, in Magnier, Scrinia Fl. Select. fide Just, Jahresb.* xxv. II. 335.—Hybr.
Rouyi, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 165.—Eur.
saxifraga, *Coincy, l. c.* 45.—Eur.
setabensis, *Coincy, l. c.* 332.—Eur.
Sibthorpii, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 635.—Eur.
Spina-badia, Bub. Fl. Pyren. ii. 160 = caerulescens.
spruneriana, Halacsy, in Bull. Herb. Boiss. vi. 640 = Spruneri.
subarachnoidea, Halacsy, l. c. 638 = laconica.
transiens, *Halacsy, l. c.* 587.—Eur.
Urumovi, *Vel. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1899, 5.—Eur.
Wettsteinii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 726.—Eur.

CENTAURODENDRON, Johow, Fl. Juan Fernandez, 63 (1896). *COMPOSITAE.*
dracaenoides, *Johow, l. c.*—Ins. Juan Fernandez.

CENTAUROPSIS, Boj. (Compos.).
Boivini, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.

CENTELLA, Linn. = **Hydrocotyle**, Linn. (Umbellif.).
callioda, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 119 = H. callioda.
Chamissonis, Drude, l. c. 120 = H. Centella.
debilis, Drude, l. c. = H. debilis.
eriantha, Drude, l. c. 119 = H. eriantha.
flexuosa, Drude, l. c. = H. flexuosa.
glochidiata, Drude, l. c. 120 = H. glochidiata.
hederifolia, Drude, l. c. 119 = H. hederifolia.
homalocarpa, Drude, l. c. 120 = H. verticillata.
Solandra, Drude, l. c. = H. Solandra.
triloba, Drude, l. c. = H. triloba.

CENTEMA, Hook. f. (Amarant.).
alternifolia, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 419.—Afr. trop.
glomerata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 49.—Afr. trop.
gracilenta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 890.—Afr. trop.
polygonoides, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 48.—Afr. trop.
rubra, *Lopr. l. c.* 49.—Afr. trop.

CENTOTHECA, Desv. (Gramin.).
owariensis, Hack. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo, 333 (= *Eragrostis beninensis*).—Afr. trop.
parviflora, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 559 = lappacea.

CENTRATHERUM, Cass. (Compos.).
grande, *Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, 169 (= *Decaneurum grande*).—Afr. trop.; Madag.

CENTRILLA, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 232 = **Dianthera**, Gronov. (Acanth.).
sagraeana, Lindau, l. c. = D. sagraeana.

CENTROMADIA, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 196 (1894). *COMPOSITAE.*
Fitchii, *Greene, l. c.* 197.—Calif.
maritima, *Greene, l. c.* 196.—Calif.
Parryi, *Greene, l. c.* 197.—Calif.
perennis, *Greene, Pittonia*, iii. 26.—Calif.
pungens, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay*, 196.—Calif.
rudis, *Greene, l. c.* 197.—Calif.

CENTROPHORUM, Trin. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
chinense, Trin. Fund. Agrost. 106. t. 5 = A. aciculatus.

CENTROPLACUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 114. *BIXACEAE.*
glaucinus, *Pierre, l. c.* 115.—Afr. trop.

CENTROPOGON, Presl (Campan.).
Bangi, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 372.—Bolivia.
brittonianus, *A. Zahlbr. l. c.* 373.—Bolivia.
gloriosus, *A. Zahlbr. l. c.* (= *Siphocampylus gloriosus*).—Bolivia.
incanus, *A. Zahlbr. l. c.* (= *Siphocampylus incanus*).—Bolivia.
unduavensis, *A. Zahlbr. l. c.* 374 (= *Siphocampylus unduavensis*).—Bolivia.

CENTROSEMA, Benth. (Legum.).
Schottii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 353 (= *Bradburya Schottii*).—Mexic.

CENTUNCULUS, Dill. (Primul.).
pumilus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 193 = pentandrus.

CEPHALANTHERA, Rich. (Orchid.).
Austinae, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = oregana.
chartacea, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 598.—Ind. or.
royleana, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. 490 = Epipactis gigantea.

CEPHALARALIA, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 22. *ARALIACEAE.*
cephalobotrys, *Harms, l. c.* 23 (= *Panax cephalobotrys*).—Austral.

CEPHALARIA, Schrad. (Dipsac.).
natalensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 126.—Afr. austr.

CEPHALOCEREUS, Pfeiff. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
macrocephalus, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 197.—Mexic.

CEPHALOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
fuchsianum, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 107.—Ind. or.
schizostachyoides, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 565 = Bambusa schizostachyoides.

CEPHALOSTIGMA, A. DC. (Campan.).
candolleanum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 629.—Afr. trop.

CEPHALOTAXUS, Sieb. & Zucc. (Conif.).
celebica, *Warb. Monsunia*, i. (1900) 194.—Celebes.
Griffithii, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 1933 = Oliveri.
Oliveri, *Mast. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 270.—China.

CERASTIUM, Dill. (Caryoph.).
argentinum, *Williams, in Journ. Bot.* 1898, 387.—Reg. Argent.
Blyttii, *Baenitz, in Herb. Eur.* 1896, 16.—Eur.
Buffumae, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 239.—Am. bor.
chassium, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 193.—Eur.
chewsuricum, *Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1898, 129.—Reg. Caucas.
fimbriatum, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxix. 320.—China.
fuegianum, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 364.—Reg. Magell.
Ianthes, *Williams, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 131.—Japon.
macropodon, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 156.—Lesbos.
minutum, *Kom. in Trav. Soc. Natural. St. Pétersb.* xxvi. 139.—Turkestan.
robustum, *Williams, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 130.—Japon.
rupestre, *Krasan, in Mitth. Naturw. Ver. Steiermark*, 1896, 308.—Eur.
sordidum, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* 1900, 58.—Mexic.
spurium, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 443.—Eur.
subtetrandrum, *Murb. in Herb. Eur.* 1896, 16.—Eur.
szechuense, *Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 433.—China.
viscosioides, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 156.—Lesbos.

CERASUS, Tourn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
hippophaoides, Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 15.—As. Min.

CERATANDRA, Eckl. (Orchid.).
venosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 433 (= *Pterygodium venosum*).—Afr. austr.

CERATOMINTHE, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 875. *LABIATAE.*
achalensis, *Briq. l. c.* 877.—Reg. Argent.
kuntzeana, *Briq. l. c.*—Bolivia.

CERATOSTYLIS, Blume (Orchid.).
cryptantha, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 309.—Penins. Mal.

CERATOTHECA, Endl. (Pedal.).
elliptica, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 452.—Afr. trop.

CERCESTIS, Schott (Arac.).
Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 422.—Afr. trop.

CERCOCARPUS, H. B. & K. (Rosac.).
Traskiae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 136.—Am. bor.

CERCOPETALUM, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 308. *CAPPARIDACEAE.*
dasyanthum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

CEREFOLIUM, Riv. = **Anthriscus**, Hoffm. (Umbellif.).
sylvestre, Bub. Fl. Pyren. ii. 410 = A. sylvestris.
vulgare, Bub. l. c. 411 = A. vulgaris.

CEREUS, Mill. (Cact.).
aggregatus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 395 = coccineus.
alamosensis, *Coult. l. c.* 406.—Mexic.

CEREUS:—
amecaensis, *Heese, in Hesdörf. Monatsheft. Blum.-Gartenfr.* i. (1897) 317.—Mexic.
Anisitsii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 185.—Parag.
aureus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 124 (= *Cactus aureus*).—Peruv.
bavosus, *A. Web. ex K. Schum. l. c.* 84.—Mexic.
bradtianus, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 406.—Mexic.
Brandegei, *Coult. l. c.* 389.—Am. bor.
calvus, *Engelm. ex Coult. l. c.* 409.—Mexic.
Candelabrum, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 107 = Weberi.
Cavendishii, Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 211 = paxtonianus.
Chiotilla, *A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 83.—Mexic.
Cumengei, *A. Web. in Monatsschr. Kakt.* 1896, 137.—Calif.
Dussii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 89.—Ind. occ.
euchlorus, *A. Web. ex K. Schum. l. c.* 84.—Am. austr.
flaviflorus, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 391.—Am. bor.
flexuosus, *Engelm. l. c.* 411.—Mexic.
Funkii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 61.—Chili.
galapagensis, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 312.—Ins. Galap.
Ghiesbreghtii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 81.—Mexic.
hankeanus, *A. Web. ex K. Schum. l. c.* 88.—Am. austr.
Hassleri, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1900, 45.—Parag.
hirschtianus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 130.—Am. cent.
hollianus, *A. Web. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 411.—Mexic.
hyalacanthus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 101.—Reg. Argent.
isogonus, *K. Schum. l. c.* 102.—Am. austr.
Jusbertii, *Rebut, ex K. Schum. l. c.* 137.—Am. austr.
Kerberi, *K. Schum. l. c.* 89.—Mexic.
lamprospermus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 166.—Parag.
laniceps, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 93.—Bolivia.
lindbergianus, *A. Web. ex K. Schum. l. c.* 151.—Parag.
Lindmanii, *A. Web. ex K. Schum. l. c.* 163.—Parag.
malletianus, *Cels, ex K. Schum. l. c.* 120.—Am. austr.
mamillatus, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 405.—Mexic.
maritimus, *Coult. l. c.* 397.—Am. bor.
monvilleanus, *A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 67.—Am. trop.
Neumannii, *K. Schum. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 91.—Am. cent.
octacanthus, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 395 (= *Echinopsis octacantha*).—Am. bor.
Orcuttii, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 3.—Calif.
pacificus, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 397.—Mexic.
Palmeri, *Engelm. ex Coult. l. c.* 401.—Mexic.
parviflorus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 100.—Bolivia.
patagonicus, *A. Web. ex Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 604.—Patag.
perlucens, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1900, 173.—Am. trop.
phatnospermus, *K. Schum. l. c.* 1899, 186.—Parag.
polyrhizus, *A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 151.—N. Granat.
pomanensis, *K. Schum. l. c.* 136.—Reg. Argent.
Poselgeri, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 398.—Am. bor.
rhodoleucanthus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 187.—Parag.
Roezlii, *Haage, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 64.—Am. trop.
sanborgianus, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 398.—Am. bor.
Schumannii, *Mathsson, ex K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 131.—Hort.
Spegazzinii, *A. Web. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 102.—Reg. Argent.
stenogonus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 165.—Parag.
Tetazo, *A. Web. ex Coult. in U. S Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 409.—Mexic.

CEREUS:—
theligonus, *A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 78.—Reg. Argent.
Thouarsii, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 312.—Ins. Galap.
Titan, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 409.—Mexic.
tuberosus, Poselg. in Allg. Gartenz. xxi. 135 = Poselgeri.
Weberi, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 410.—Mexic.
Wittii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1900, 153.—Bras.

CEROLEPIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 111. *BIXACEAE.*

CEROPEGIA, Linn. (Asclep.).
biddumana, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 41.—Afr. trop.
boerhaaviifolia, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 112.—Arab.
fusiformis, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 273.—Afr. trop.
Giletii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 95.—Afr. trop.
gymnopoda, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 450.—Afr. trop.
kachinensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 170.—Ind. or.
papillata, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 308.—Afr. trop.
paricyma, *N. E. Br. l. c.* 309.—Afr. trop.
Perrottetii, *N. E. Br. l. c.* 308.—Afr. trop.
pumila, *N. E. Br. l. c.* 309.—Afr. trop.
rupicola, *Deflers, Voy. Yemen*, 167.—Arab.
ruspoliana, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 42.—Afr. trop.
sepium, *Deflers, Voy. Yemen*, 167.—Arab.
tubulifera, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* 1896, 111.—Arab.
yorubana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 310, nomen.—Afr. trop.

CERVICINA, Delile = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).
hederacea, Druce, Fl. Berkshire, 324 = W. hederacea.
huillana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 631 = W. huillana.

CESPEDESIA, Goudot (Ochnac.).
excelsa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 17.—Bolivia.

CESTRUM, Linn. (Solan.).
atroxanthum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 219.—Bolivia.
bourgeauianum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 572.—Mexic.
dasyanthum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 11.—Am. cent.
flavescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 572.—Am. cent.
fulvescens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 572.—Mexic.
floribundum, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 92 (non Willd.).—Bolivia.
pacificum, *Brandegee, in Erythea*, 1899, 6.—Mexic.
sparsifolium, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 22.—Peruv.

CHABRAEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 640 (1900) = **Lythrum**, Linn. (Lythrac.).
compressa, Bub. l. c. 645 = Peplis Portula.
hyssopifolia, Bub. l. c. 642 = L. hyssopifolia.
serpyllifolia, Bub. l. c. 641 = L. thymifolia.
vulgaris, Bub. l. c. 640 = L. Salicaria.

CHAENACTIS, DC. (Compos.).
floribunda, *Greene, Pittonia*, iii. 169.—Am. bor.
gracilenta, *Greene, Fl. Francisc.* 447.—Calif.
orcuttiana, *Fernald, in Erythea*, 1898, 92.—Am. bor.
pedicularia, *Greene, Pittonia*, iv. 98.—Am. bor.

CHAENARRHINUM, Lange = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).
Formenterae, Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 140.—Eur.

CHAENOCEPHALUS, Griseb. (Compos.).
pallatangensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 47.—Ecuador.

CHAENOSTOMA, Benth. (Scrophul.).
divaricatum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 476.—Afr. trop.
gracile, *Diels, l. c.*—Afr. trop.
heucherifolium, *Diels, l. c.* 475.—Afr. trop.
huillanum, *Diels, l. c.* 477.—Afr. trop.
macrosiphon, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 502.—Afr. austr.
montanum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 121.—Afr. austr.
neglectum, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 352.—Afr. austr.
sessilifolium, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 476.—Afr. austr.
stenopetalum, *Diels, l. c.* 477.—Afr. trop.
violaceum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 180.—Afr. austr.
woodianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 474.—Afr. austr.

CHAEROPHYLLUM, Linn. (Umbell.).
azoricum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897, 116.—Ins. Azor.
silvicola, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 273.—Reg. Caucas.
texanum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 59.—Am. bor.

CHAETACHME, Planch. (Urtic.).
serrata, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 24.—Afr. trop.

CHAETANTHERA, Ruiz & Pav. (Compos.).
euphrosiodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 140 = debilis.
salsolodes, Kuntze, l. c. = linifolia.
sublignosa, *Kuntze, l. c.*—Chili.

CHAETARIA, Beauv. = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
bromoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 396 = A. Adscensionis.
caerulescens, Beauv. Agrost. 30 = A. Adscensionis.
canariensis, Beauv. l. c. = A. Adscensionis.
coarctata, Roem. & Schult. Syst. ii. 396 = A. Adscensionis.
elatior, Beauv. Agrost. 30 = A. Adscensionis.
Forskolii, Nees, Fl. Afr. Austr. 188 = A. barbicollis.
humilis, Roem. & Schult. Syst. ii. 396 = A. Adscensionis.
interrupta, Beauv. Agrost. 30 = A. Adscensionis.
murina, Nees, ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 160 = A. Adscensionis.
nana, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 340 = A. Adscensionis.
royleana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 143 = A. funiculata.

CHAETOBROMUS, Nees (Gramin.).
dregeanus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 343.—Afr. austr.
fascicularis, Nees, l. c. 341 = Danthonia stricta.
interceptus, *Nees, l. c.* 339.—Afr. austr.
involucratus, *Nees, l. c.* 344.—Afr. austr.
Schraderi, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 538.—Afr. austr.

CHAETOCALYX, DC. (Legum.).
scandens, *Urb. Symb. Antill.* ii. 292 (= *Coronilla scandens*).—Ind. occ.

CHAETOCHLAMYS, Lindau (Acanth.).
ciliata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 677.—Bras.

CHAETOCHLOA, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. (1897) 38 = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).
ambigua, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 18 = S. ambigua.
amplifolia, Scribn. in Donn. Sm. Pl. Guatem. v. 91 = S. composita.
apiculata, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. (1897) 9.—Austral.
australiensis, Scribn. & Merrill, l. c. 29.—Austral.
brevispica, Scribn. & Merrill, l. c. 15.—Am. bor.
caudata, Scribn. in Rep. Missouri Bot. Gard. 1899, 52 = S. setosa.
composita, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. (1897) 39 = S. macrostachya.
corrugata, Scribn. l. c. = S. corrugata.
flava, Scribn. l. c. = S. glauca.
gibbosa, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 24.—Am. bor.
glauca, Scribn. l. c. iv. 39 = S. glauca.
gracilis, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 15 = S. gracilis.
Grisebachii, Scribn. l. c. iv. 39 = S. Grisebachii.
hispida, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 25.—Am. bor.
imberbis, Scribn. l. c. iv. 39 = S. viridis.

CHAETOCHLOA:—
italica, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39 = S. italica.
latifolia, Scribn. l. c. xi. 44.—Mexic.
leucopila, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 26.—Am. bor.
Liebmanni, Scribn. & Merrill, l. c. 31 = S. Liebmanni.
longipila, Scribn. & Merrill, l. c. 22 = S. longipila.
macrosperma, Scribn. & Merrill, l. c. 33.—Am. bor.
macrostachya, Scribn. & Merrill, l. c. 29 = S. macrostachya.
magna, Scribn. l. c. iv. 39 = S. magna.
onurus, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 27.—Am. bor.
penicillata, Scribn. l. c. iv. 39 = S. penicillata.
perennis, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 107.—Am. bor.
polystachya, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. 37 = S. polystachya.
purpurascens, Scribn. & Merrill, l. c. 13 = S. viridis.
rigida, Scribn. & Merrill, l. c. 30.—Am. bor.
scandens, Scribn. ex Donn. Sm. Pl. Guatem. v. 91 = S. scandens.
setosa, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39 = S. setosa.
versicolor, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 105.—Am. bor.
verticillata, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39 = S. verticillata.
villosissima, Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 35.—Am. bor.
viridis, Scribn. l. c. iv. 39 = S. viridis.

CHAETOSPORA, R. Br. = **Schoenus**, Linn. (Cyperac.).
antarctica, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 361. t. 147 = S. antarcticus.

CHAETOSTOMA, DC. (Melast.).
scoparia, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 447.—Bras.

CHAETOTROPIS, Kunth (Gramin.).
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 17.—Chili.

CHAILLETIA, DC. (Chaillet.).
chartacea, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 160.—Afr. trop.
setosa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 515.—Penins. Mal.
tesselata, *King, l. c.*—Penins. Mal.

CHALAZOCARPUS, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 464 (1898). *RUBIACEAE.*
hirsuta, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

CHALMERSIA, F. Muell. ex S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 174 = **Dichrotrichum**, Reinw. (Gesnerac.).
papuana, F. Muell. l. c. = D. papuanum.

CHAMAECRISTA, Moench = **Cassia**, Tourn. (Legum.).
Aeschinomene, Greene, Pittonia, iv. 32 = C. mimosoides.
angustissima, Greene, l. c. 30 = C. mimosoides.
aspera, Greene, l. c. iii. 243 = C. nictitans.
bifoliolata, Greene, l. c. iv. 31 = C. rotundifolia.
brevifolia, Greene, l. c. 30 = C. brevifolia.
brevipes, Greene, l. c. 31 = C. brevipes.
calycioides, Greene, l. c. 32 = C. calycioides.
chamaecristoides, Greene, l. c. 29 = C. chamaecristoides.
cinerea, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = C. cinerea.
complexa, Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47.—Ind. occ.
cuneata, Greene, Pittonia, iv. 31 = C. cuneata.
depressa, Greene, l. c. iii. 242 = C. depressa.
diphylla, Greene, l. c. iv. 28 = C. diphylla.
fascicularis, Greene, l. c. iii. 242 = C. fasciculata.
flavicoma, Greene, l. c. = C. flavicoma.
flexuosa, Greene, l. c. iv. 27 = C. flexuosa.
glandulosa, Greene, l. c. 28 = C. glandulosa.
grammica, Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47 = C. grammica.
Greggii, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = C. Greggii.
hecatophylla, Greene, Pittonia, iv. 32 = C. mimosoides.
lineata, Greene, l. c. 31 = C. lineata.
Millspaughii, Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47.—Ind. occ.
mimosoides, Greene, Pittonia, iv. 27 = C. mimosoides.
mississippiensis, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = C. mississippiensis.
multipinnata, Greene, Pittonia, iii. 243 = C. multipinnata.
nigricans, Greene, l. c. iv. 30 = C. nigricans.
Palmeri, Greene, l. c. iii. 242 = C. Palmeri.

CHAMAECRISTA :—
patellaria, Greene, Pittonia, iv. 32 = C. patellaria.
Persoonii, Greene, l. c. 31 = C. uniflora.
pilosa, Greene, l. c. 28 = C. pilosa.
procumbens, Greene, l. c. = C. procumbens.
robusta, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5.—Am. bor.
rotundifolia, Greene, Pittonia, iv. 31 = C. rotundifolia.
serpens, Greene, l. c. 29 = C. serpens.
Simpsoni, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = C. Simpsoni.
tristicula, Greene, Pittonia, iii. 242 = C. tristicula.
virgata, Greene, l. c. iv. 31 = C. virgata.

CHAMAELEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1898, 244. *SIMARUBACEAE.*
pulverulenta, *Van Tiegh. l. c.* (= *Cneorum pulverulentum*).—Ins. Canar.

CHAMAEMELUM, Tourn. = **Anthemis**, Linn. (Compos.).
lesbiacum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 143.—Lesbos.
tempskyanum, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 781.—Eur.

CHAMAEMELUM, Vis. = **Matricaria**, Linn. (Compos.).
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 225 = M. Chamomilla.

CHAMAENERION, Tourn. = **Epilobium**, Linn. (Onagr.).
Fleischeri, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 392 = E. Fleischeri.

CHAMAEPERICLIMENUM, Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 225. (1898). *CORNACEAE.*
canadense, *Aschers. & Graebn. l. c.* 799 (= *Cornus canadensis*).—Am. bor.
suecicum, *Aschers. & Graebn. l. c.* 539 (= *Cornus suecica*).—Reg. bor.

CHAMAERANTHEMUM, Nees (Acanth.).
Tonduzii, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 303.—Am. cent.

CHAMAERAPHIS, R. Br. (Gramin.).
depauperata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 49 = spinescens.
paradoxa, Poir. Encycl. Suppl. II. 189 = spinescens.
rachitricha, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 347 = Panicum rhachitrichum.
sulcata, Kuntze, l. c. = Panicum sulcatum.

CHAMAERHODENDRON, Bub. Fl. Pyren. ii. 5 (1900), sphalm. = seq.

CHAMAERHODODENDRON, Bub. Fl. Pyren. ii. pp. ii et 18. (1900) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
ferrugineum, Bub. l. c. 5 = R. ferrugineum.
hirsutum, Bub. l. c. 18 = R. hirsutum.

CHAMAETAXUS, Bub. Fl. Pyren. i. 118 (1897) = **Empetrum**, Tourn. (Empetrac.).
nigra, Bub. l. c. = E. nigrum.

CHAMISSONIA, Endl. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
acuminata, Reiche, Fl. Chile, ii. 263 (= *Sphaerostigma acuminatum*).—Chili.
dentata, Reiche, l. c. 264 = O. dentata.
paradoxa, Reiche, l. c. = O. micrantha.

CHAPTALIA, Vent. (Compos.).
cordata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 370.—N. Granat.
ebracteata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 376.—Bolivia.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 371.—Ecuador.

CHARADROPHILA, Marloth, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 358. *GESNERACEAE.*
capensis, *Marloth, l. c.*—Afr. austr.

CHARPENTIERA, Gaudich. (Amarant.).
elliptica, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 820.—Ins. Sandw.

CHASALIA, Comm. (Rubiac.).
Afzelii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 469 (= *Psychotria Afzelii*).—Afr. trop.
macrodiscus, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
parvifolia, *K. Schum. l. c.* xxviii. 103.—Afr. trop.
violacea, *K. Schum. l. c.* 498.—Afr. trop.
yorubensis, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 322, nomen.—Afr. trop.

CHASMANTHERA, Hochst. (Menisperm.).
strigosa, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 14.—Afr. trop.

CHASMONE, E. Mey. = **Argyrolobium**, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
Gesneri, Bub. Fl. Pyren. ii. 460 = A. linneanum.

CHAVICA, Miq. = **Piper**, Linn. (Piperac.).
hainana, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 275.—China.

CHEILOPSIS, Moq. = **Acanthus**, Tourn. (Acanth.).
Steudneri, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 243 = A. arboreus.

CHEIRANTHUS, Linn. (Crucif.).
angustatus, *Greene, Pittonia*, iii. 132.—Am. bor.
arenicola, *Greene, l. c.* 131 (= *Erysimum arenicolum*).—Am. bor.
argillosus, *Greene, l. c.* 136.—Am. bor.
aridus, *Greene, l. c.* iv. 198.—Am. bor.
aridus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 351.—Am. bor.
arkansanus, *Greene, Pittonia*, iii. 135 (= *E. arkansanum*).—Am. bor.
asperrimus, *Greene, l. c.* 133 (= *E. pumilum*).—Am. bor.
californicus, *Greene, l. c.* (= *E. californicum*).—Am. bor.
cheiranthoides, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 4 (= *E. cheiranthoides*).—Eur. ; Am. bor.
elatus, *Greene, Pittonia*, iii. 135 (= *E. elatum*).—Am. bor.
inconspicuus, *Greene, l. c.* 134 (= *E. inconspicuum*).—Am. bor.
insularis, *Greene, l. c.* 131 (= *E. insulare*).—Am. bor.
nivalis, *Greene, l. c.* 137.—Am. bor.
perennis, *Greene, l. c.* 132.—Am. bor.
syrticola, *Greene, l. c.* 136 (= *E. syrticolum*).—Am. bor.
Wheeleri, *Greene, l. c.* 135 (= *E. Wheeleri*).—Am. bor.

CHEIRODENDRON, Nutt. = **Panax**, Linn. (Araliac.).
trigynum, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 870 = P. Gaudichaudii.

CHEIROSTYLIS, Blume (Orchid.).
heterosepala, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 183.—Afr. trop.
yunnanensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 201.—China.

CHELONECARYA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1260. *MENISPERMACEAE.*
fusca, *Pierre, l. c.* 1261.—Afr. trop.

CHELONOPSIS, Miq. (Labiat.).
longipes, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 57.—Japon.

CHENOPODIUM, Tourn. (Chenopod.).
antarcticum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 568 (= *Blitum antarcticum*).—Patag.
atrovirens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 131.—Am. bor.
fuegianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 72.—Reg. Magell.
Sanctaeclarae, *Johow, Fl. Juan Fernandez*, 119.—Ins. Juan Fernandez.
striatum, *Jos. Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xiv. 32.—Eur.

CHESMONE, Bub. Fl. Pyren. ii. 460 (1900), sphalm. = CHASMONE, E. Mey. = **Argyrolobium**, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

CHESNEYA, Lindl. = **Calophaca**, Fisch. (Legum.).
ferganensis, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. 90.—Turkestan.

CHEVALIERIA, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
comata, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 153 = A. comata.
stephanophora, Mez, l. c. 154 = A. stephanophora.

CHILDSIA, Childs, Cat. Rar. Fl. 1899, 1 = **Hidalgoa**, La Llave (Compos.).
Wercklei, Childs, l. c. = H. Wercklei.

CHILIOPHYLLUM, Phil. (Compos.).
fuegianum, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 96.—Reg. Magell.

CHILIOTRICHUM, Cass. (Compos.).
diffusum, P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 99 = amelloideum.

CHILOCARPUS, Blume (Apocyn.).
alyxifolius, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 102.—Malaya.
beccarianus, *Pierre, l. c.* 101.—Malaya.
brachyanthus, *Pierre, l. c.*—Malaya.

CHILOCHLOA, Beauv. = **Phleum**, Linn. (Gramin.).
dentata, Trin. Gram. Unifl. 168 = Prionanthium rigidum.

CHIONACHNE, R. Br. (Gramin.).
barbata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 18 = Polytoca barbata.
Koenigii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 357 = Polytoca barbata.
Wightii, Munro, ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 1113 = Polytoca Wightii.

CHIONANTHUS, Gaertn. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
celebicus, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 637.—Celebes.
cordulatus, Koord. l. c. 638.—Celebes.
gigantifolius, Koord. l. c.—Celebes.

CHIONOPHILA, Benth. (Scrophul.).
Tweedyi, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 352.—Am. bor.

CHIONOTHRIX, Hook. f. (Amarant.).
latifolia, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 54.—Afr. trop.

CHIRITA, Buch.-Ham. (Gesner.).
elata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 518.—Penins. Mal.
Forbesii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 175.—Sumatra.
mollissima, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 517.—Penins. Mal.
Viola, *Ridley, l. c.* 516.—Penins. Mal.

CHIRONIA, Linn. (Gentian.).
angolensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 104.—Afr. trop.
Bachmannii, *Gilg, l. c.* 103.—Afr. austr.
erythraeodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 709.—Afr. trop.
humilis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 105.—Afr. austr.
laxa, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
rosacea, *Gilg, l. c.* 104.—Afr. austr.
transvaalensis, *Gilg, l. c.* 106.—Afr. austr.
Tysonii, *Gilg, l. c.* 104.—Afr. austr.
Wilmsii, *Gilg, l. c.* 105.—Afr. austr.

CHISOCHETON, Blume (Meliac.).
beccarianus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 296 (= *Dasycoleum beccarianum*).—Borneo.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 636.—Celebes.
cochinchinensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 346 B.—Cochinch.
coriaceus, *Pierre, l. c.* t. 346 A.—Cochinch.
cumingianus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 296 (= *Dasycoleum cumingianum*).—Ins. Philipp.
globosus, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 347 A.—Cochinch.
harmandianus, *Pierre, l. c.* sub t. 347.—Cochinch.
Kingii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 636.—Celebes.
Lauterbachii, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 382.—N. Guin.
microcarpus, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 115.—Java.
pachyrhachis, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 382.—N. Guin.
philippinus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 296 (= *Dasycoleum philippinum*).—Ins. Philipp.
polyanthus, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 383.—N. Guin.
rugosus, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 347.—Cochinch.
sandoricocarpus, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 111.—Java.
sarawakanus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 296 (= *Dasycoleum sarawakanum*).—Borneo.
Thorelii, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 346.—Cochinch.

CHLAINANTHUS, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. (1896) 257. *LABIATAE.*
platycalyx, *Briq. l. c.* 258 (= *Lagochilus platycalyx*).—As. bor.

CHLAMYDOCARDIA, Lindau (Acanth.).
nuda, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 235.—Afr. trop.

CHLAMYDOCARYA, Baill. (Olacac.).
glabrescens, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 485.—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1317.—Afr. trop.
lobata, *Pierre, l. c.* 1316.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 486.—Afr. trop.
tenuis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CHLOOTHAMNUS, Buese = **Schizostachyum**, Nees (Gramin.).
chilianthus, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 386 = S. chilianthus.

CHLORAEA, Lindl. (Orchid.).
phoenicea, *Speg. Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 6.—Reg. Argent.

CHLORANTHUS, Sw. (Chloranth.).
kachinensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 173.—Ind. or.

CHLORIDION, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2640 (1900). *GRAMINEAE.*
Cameroni, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.

CHLORIS, Sw. (Gramin.).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 406 = gayana.
barbata, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 443 = polydactyla.
beyrichiana, Kunth, Rév. Gram. i. 89 = pycnothrix.
brachystachys, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. 556 = virgata.
brevispica, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 438.—Am. bor.
caudata, Trin. ex Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 70 = virgata.
clandestina, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 25 (= *Gymnopogon longifolius*).—Mexic.
compressa, DC. Cat. Pl. Hort. Monsp. 94 = virgata.
cryptostachya, Steud. ex J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap Verd. Ins. 148 = virgata.
decora, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 205 = virgata.
delicatula, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 290.—Ind. or.
digitata, Steud. Syn. Pl. Gram. 207 = incompleta.
falcata, Sw. in Ges. Naturf. Freunde, Neue Schr. iii. (1801) 160 = Harpechloa capensis.
filiformis, Poir. Encycl. Suppl. II. 238 = Leptochloa cynosuroides.
glabrata, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. ii. 557 = gayana.
intermedia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 407 = pycnothrix.
latisquamea, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 439.—Am. bor.
leptostachya, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 407 = pycnothrix.
meccana, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 205 = virgata.
multiradiata, Hochst. in Flora, 1855, 204 = virgata.
myosuroides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 290.—Ind. or.
Nealleyi, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 435 = texensis.
pallida, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 289 (non Hack.).—Ind. or.
pycnothrix, *Trin. Gram. Unifl.* 234.—Afr. austr.
Roxburghii, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 183 = incompleta.
somalensis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 66.—Afr. trop.
subaequigluma, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 222.—Afr. trop.
tenuispica, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 436.—Am. bor.
tetrameris, Trin. Gram. Unifl. 235 = incompleta.
Tetrapogon, Beauv. Agrost. 158 = villosa.
tetrastachys, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 291 = virgata.

CHLORIS:—
texana, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 441.—Am. bor.
texensis, *Nash, l. c.* 1896, 151.—Am. bor.
triangulata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 409 = tenella.
villosa, *Pers. Syn.* i. 87.—Reg. Medit.; Ind. or.
wightiana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 206.—Ind. or.

CHLOROCHARIS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 564 = **Eleocharis**, R. Br. (Cyperac.).
balanseana, Rikli, l. c. = E. balansaiana.
capitata, Rikli, l. c. = E. capitata.
emarginata, Rikli, l. c. = E. emarginata.
geniculata, Rikli, l. c. = E. geniculata.
palustris, Rikli, l. c. = E. palustris.
subprolifera, Rikli, l. c. = E. afflata.
tuberculosa, Rikli, l. c. = E. tuberculosa.
vivipara, Rikli, l. c. = E. vivipara.

CHLOROCYPERUS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 563 = **Cyperus**, Mich. (Cyperac.).
abyssinicus, Rikli, l. c. 564 = Pycreus flavescens.
aegyptiacus, Rikli, l. c. = C. aegyptiacus.
articulatus, Rikli, l. c. 563 = C. articulatus.
badius, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = C. longus.
Barteri, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 563 = C. pustulatus.
cimicinus, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Am. trop.
confertus, Rikli, l. c. 564 = C. confertus.
Eragrostis, Rikli, l. c. 563 = C. Eragrostis.
flavescens, Rikli, l. c. = Pycreus flavescens.
glaber, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = C. glaber.
glomeratus, Palla, l. c. = C. glomeratus.
grammicus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 563 (= *Pycrei sp.*).—Chili.
intermedius, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Afr. trop.
Iria, Rikli, l. c. 564 = C. Iria.
Jacquini, Rikli, l. c. 563 = C. nutans.
junciformis, Rikli, l. c. = C. laevigatus.
laevigatus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 221 = C. laevigatus.
latispicatus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 564 (= *Pycrei sp.*).—Ind. or.
longus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = C. longus.
megapotamicus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 563 = Pycreus megapotamicus.
melanostachyus, Rikli, l. c. 564 (= *Pycrei sp.*).—Mexic.
Mundlii, Rikli, l. c. 563 = Pycreus Mundtii.
nilagiricus, Rikli, l. c. 564 = Pycreus capillaris.
pannonicus, Rikli, l. c. 563 = C. pannonicus.
Papyrus, Rikli, l. c. = C. Papyrus.
patuliflorus, Rikli, l. c. = Pycreus albomarginatus.
pauper, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Abyss.; Reg. Himal.
polystachyus, Rikli, l. c. = C. polystachyus.
rivularis, Rikli, l. c. 564 = C. rivularis.
serotinus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = C. Monti.

CHLOROMYRTUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 71. *MYRTACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* 72.—Afr. trop.

CHLOROPATANE, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 383. *MONIMIACEAE.*
africana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CHLOROPHYTUM, Ker-Gawl. (Liliac.).
abyssinicum, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 46 = laxum.
asparagifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 361.—Afr. trop.
bracteatum, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 673.—Afr. trop.
brevipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 497.—Afr. trop.
brunneum, *Baker, l. c.* 507.—Afr. trop.
capense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 316 = elatum.
Carsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 499.—Afr. trop.
colubrinum, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 362 = Dasystachys colubrina.
debile, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 260 = laxum.
delagoense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 399.—Afr. austr.
drepanophyllum, *Baker, l. c.* 398.—Afr. austr.
durbanense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 316.—Afr. austr.
falcatum, Baker, in Saund. Ref. Bot. t. 333 = laxum.

CHLOROPHYTUM:—
Fischeri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 506.—Afr. trop.
floribundum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
gallabatense, *Schweinf. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. 325.—Afr. trop.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 361.—Afr. trop.
Haygarthii, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 254.—Afr. austr.
hispidulum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 53.—Afr. trop.
krookianum, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 19.—Afr. austr.
longipes, Baker, in Journ. Bot. 1878, 325 = andongense.
Mannii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 498.—Afr. trop.
ruahense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 361.—Afr. trop.
scabrum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 497.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Baker, l. c.* 503.—Afr. trop.
stamineum, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 18.—Afr. austr.
thollonianum, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 672.—Afr. trop.
ukambense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 504.—Afr. trop.
vaginatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 397.—Afr. austr.
vaginatum, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 674.—Afr. trop.

CHOMELIA, Jacq. (Rubiac.).
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 29.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 66.—Afr. austr.
meiantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 61.—Afr. trop.
mechowiana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 434.—Afr. trop.
oligoneura, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
ulugurensis, *K. Schum. l. c.* xxviii. 61.—Afr. trop.

CHOMELIA, Vell. = **Ilex**, Tourn. (Ilicin.).
amara, Vell. Fl. Flum. i. t. 107 = I. amara.

CHONDODENDRON, Ruiz & Pav. (Menisperm.).
macrophyllum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 16.—Afr. trop.

CHONDRILLA, Tourn. (Compos.).
viminea, Bub. Fl. Pyren. ii. 105 = juncea.

CHONDRORHYNCHA, Lindl. (Orchid.).
albicans, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 195.—Am. cent.

CHONDROSTYLIS, Boerl. in Ic. Bogor. t. 23 (1897). *EUPHORBIACEAE.*
bancana, *Boerl. l. c.*—Malaya.

CHONEMORPHA, G. Don (Apocyn.).
mollissima, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 400.—Java?
nouettiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 30 (= *Nouettea cochinchinensis*).—Cochinch.

CHORISTIGMA, Baill. = **Schoepfia**, Schreb. (Olacac.).
stuckertianum, Kurtz, Pharmac. Post, xxx. no. 37, fide K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. I. 520.—Reg. Argent.

CHRISTOLEA, Cambess. (Crucif.).
pamirica, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 89.—Turkestan.

CHRYSANTHEMUM, Tourn. (Compos.).
djilgense, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 345.—As. cent.
lineare, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 83.—Japon.
obtusum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 141 = Matricaria globifera.

CHRYSASPIS, Desv. Fl. Anjou, (1827) 338 = **Trifolium**, Tourn. (Legum.).
agraria, Greene, Pittonia, iii. 205 = T. procumbens.
aurea, Greene, l. c. 204 = T. agrarium.
badia, Greene, l. c. 206 = T. badium.
campestris, Desv. Fl. Anjou, 338 = T. campestre.
dubia, Greene, l. c. 206 = T. dubium.
spadicea, Greene, l. c. 205 = T. spadiceum.

CHRYSITHRIX, Linn. (Cyperac.).
Dodii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 760.—Afr. austr.

CHRYSOBALANUS, Linn. (Rosac.).
sublanatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 76.—Bras.

CHRYSOCYCNIS, Linden & Reichb. f. (Orchid.).
rhomboglossum, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 479.—N. Granat.

CHRYSOPHYLLUM, Linn. (Sapot.).
argyrophyllum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 641.—Afr. trop.
batangense, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. trop.
cerasiferum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 643 (= *Sapota cerasifera*).—Afr. trop.
Disaco, *Hiern, l. c.* 642.—Afr. trop.
excelsum, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 55.—Hort.
ferrugineo-tomentosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 447.—Afr. trop.
ulugurense, *Engl. l. c.* 448.—Afr. trop.

CHRYSOPOGON, Trin. (Gramin.).
acicularis, Duthie, Grass. N. W. Ind. 22 = Andropogon aciculatus.
aciculatus, Trin. Fund. Agrost. 188 = Andropogon aciculatus.
arnottianus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = Andropogon zeylanicus.
asper, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8784 = Andropogon asper.
ciliolatus, Boiss. Fl. Orient. v. 458 = Andropogon monticola.
Elliottii, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 21.—Am. bor.
Esenbeckii, Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = wightianus.
glabratus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 318 = Andropogon Gryllus.
Gryllus, Trin. Fund. Agrost. 188 = Andropogon Gryllus.
increscens, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = Andropogon monticola.
montanus, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 93 = Andropogon monticola.
muricatus, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 242 = Garnotia tenuiglumis.
pictus, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. 252 = Andropogon assimilis.
serrulatus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 318 = Andropogon monticola.
subulatus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 360 = Andropogon aciculatus.
trivialis, Arn. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 171 = Andropogon aciculatus.
velutinus, Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 194 = Andropogon velutinus.
verticillatus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 360 = Andropogon verticillatus.
violascens, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 319 = Andropogon micranthus.
wightianus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 366 = Andropogon zeylanicus.
zeylanicus, Thw. l. c. = Andropogon zeylanicus.

CHRYSOPSIS, Ell. (Compos.).
Bakeri, *Greene, Pittonia,* iv. 153.—Am. bor.
Brandegei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Calif.
camphorata, *Eastw. in Zoe,* v. 81.—Am. bor.
camporum, *Greene, Pittonia,* iii. 88.—Am. bor.
depressa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 381.—Am. bor.
fastigiata, *Greene, Pittonia,* iii. 296.—Am. bor.
flexuosa, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 107.—Am. bor.
floribunda, *Greene, Pittonia,* iii. 100.—Am. bor.
fulcrata, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 119.—Am. bor.
hirsuta, *Greene, Pittonia,* iii. 296.—Am. bor.
hirsutissima, *Greene, l. c.* iv. 153.—Am. bor.
latisquamea, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 131.—Am. bor.
nivea, Greene, Pittonia, iii. 43 = Aplopappus niveus.
pedunculata, *Greene, l. c.* iv. 154.—Am. bor.
Ruthii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 493.—Am. bor.

CHRYSOSPLENIUM, Tourn. (Saxifr.).
beringianum, *Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 275.—Am. bor.
Scouleri, Rose, l. c. 277 = glechomaefolium.

CHRYSOTHAMNUS, Nutt. = **Bigelowia**, DC. (Compos.).
affinis, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. 1899, 374.—Am. bor.
arizonicus, Greene, Pittonia, iv. 42.—Am. bor.
Bakeri, Greene, l. c. 152.—Am. bor.
collinus, Greene, l. c. iii. 24.—Am. bor.
formosus, Greene, l. c. iv. 41.—Am. bor.
glaucus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 377.—Am. bor.
gnaphalodes, Greene, Pittonia, iv. 42.—Am. bor.
humilis, Greene, l. c. iii. 24.—Am. bor.
latisquameus, Greene, l. c. iv. 42.—Am. bor.
linifolius, Greene, l. c. iii. 24.—Am. bor.
nauseosa, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 326 = B. graveolens.
occidentalis, Greene, Fl. Francisc. 369.—Calif.
oreophilus, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. 1899, 374.—Am. bor.
pallidus, A. Nelson, l. c. 372.—Am. bor.
plattensis, Greene, Pittonia, iv. 42.—Am. bor.
pulcherrimus, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxviii. 370.—Am. bor.
tortifolius, Greene, Fl. Francisc. 368.—Calif.
wyomingensis, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. 1899, 372.—Am. bor.

CHUPALON, Adans. = **Thibaudia**, Pav. (Vaccin.).
turbinatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 190.—Bolivia.
viridiflorum, Kuntze, l. c.—Bolivia.

CHUQUIRAGUA, Juss. (Compos.).
brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 141 = glabra.
Dusenii, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 246.—Patag.
mattogrossensis, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 77.—Bras.
paranahybensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.

CHUSQUEA, Kunth (Gramin.).
Lehmannii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 35.—N. Granat.
longipendula, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 348.—Bolivia.
macrostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 350.—Chili.
Nelsoni, *Scribn. & J. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 16.—Mexic.
Palenae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 350.—Chili.
parviflora, *R. Phil. l. c.* 349.—Chili.
ramosissima, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 24.—Am. trop.
serrulata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 719.—N. Granat.
spadicea, *Pilg. l. c.* xxvii. 35.—N. Granat.

CHYLISMA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 506. (1840) = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
brevipes, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 194 = O. brevipes.
cardiophylla, Small, l. c. 193 = O. cardiophylla.
cruciformis, Howell, Fl. N. W. Amer. 233 = O. scapoidea.
heterochroma, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 193 = O. heterochroma.
multijuga, Small, l. c. = O. multijuga.
Parryi, Small, l. c. = O. Parryi.
pterosperma, Small, l. c. = O. pterosperma.
scapoidea, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 506 = O. scapoidea.

CHYTRACULIA, P. Br. = **Calyptranthes**, Sw. (Myrtac.).
Chytraculia, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 80 = C. Chytraculia.
punctata, Millsp. l. c. i. 431 = C. punctata.

CHYTRANTHUS, Hook. f. (Sapind.).
edulis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1249.—Afr. trop.
macrophyllus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 298.—Afr. trop.
stenophyllus, *Gilg, l. c.* 297.—Afr. trop.
Zenkeri, *Gilg, l. c.* 298.—Afr. trop.

CICENDIOLA, Bub. Fl. Pyren. i. 536 = **Cicendia**, Adans. (Gentianac.).
filiformis, Bub. l. c. = C. filiformis.
Vaillantii, Bub. l. c. = C. pusilla.

CICHORIUM, Tourn. (Compos.).
Bottae, *Deflers, Voy. Yemen,* 159.—Arab.

CICUTA, Tourn. (Umbell.).
Curtisii, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 97.—Am. bor.
Douglasii, Coult. & Rose, l. c. 95 = crassifolia.
mexicana, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 145.—Am. cent.
orientalis, *A. Degen, in Pótfüz. Termész. Közl.* xxxvi. (1896) 38; *ex Just, Jahresb.* xxiv. II. 210, 358.—Eur.

CIENFUEGOSIA, Cav. = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).
yucatanensis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 74.—Am. cent.

CIENKOWSKYA, Solms = **Kaempferia**, Linn. (Scitam.).
aethiopica, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 197. t. 1 = K. aethiopica.
Kirkii, Hook. f. Bot. Mag. t. 5994 = K. Kirkii.

CIMICIFUGA, Linn. (Ranunc.).
rubifolia, *Kearn. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 561.—Am. bor.

CINCINNOBOTRYS, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 265 (1897). *MELASTOMACEAE.*
oreophila, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

CINERARIA, Linn. (Compos.).
bracteosa, *O. Hoffm. in Goetzen, Durch Afr.* (repr.) 10.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 402.—Afr. trop.
Grisebachii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 725.—Eur.
pinnata, *O. Hoffm. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 73.—Afr. austr.
Prittwitzii, *O. Hoffm. in Goetzen, Durch Afr.* (repr.) 10.—Afr. trop.

CINNAMODENDRON, Endl. (Canell.).
Dinisii, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 5.—Bras.

CINNAMOMUM, Tourn. (Laurac.).
elegans, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 633.—Ins. Samoa.

CIRRHOPETALUM, Lindl. (Orchid.).
acuminatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 282.—Penins. Mal.
brunnescens, *Ridley, l. c.* xxxi. 279.—Borneo.
caudatum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 93 (non Wight).—Ind. or.
ciliatum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 136.—Hort.
citrinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 279.—Malaya.
Curtisii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7554.—Malaya.
emarginatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* 1897, 269.—Hab. ?
Fordii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—China.
graveolens, F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 33 = robustum.
kamersianum, *Zahlbr. in Wien. Ill. Gart. Zeit.* xxv. 193.—Hort.
Koordersii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 128.—Celebes.
linearifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 283.—Penins. Mal.
longissimum, *Ridley, l. c.* 280.—Penins. Mal.
maximum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 70.—Malaya.
microbulbon, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 283.—Penins. Mal.
ochraceum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 212.—Malaya.
pileolatum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 137.—Hort.
Proudlockii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 588.—Ind. or.
psittacoides, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 280.—Penins. Mal.
semibifidum, *Ridley, l. c.* 284.—Penins. Mal.
sikkimense, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 90.—Ind. or.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon,* iv. 158.—Zeylan.

CIRSIUM, Tourn. = **Cnicus**, Tourn. (Compos.).
abruptum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 62.—Eur.
candidissimum, Damm. in Gard. Chron. 1898, I. 161. —As. Min.
dolopicum, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 74.—Eur.
exiguum, Bub. Fl. Pyren. ii. 137 = C. acaulis.
hystrix, Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto, 1896, 213.—Eur.
latinervium, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 167.—Eur.
montanum, Bub. Fl. Pyren. ii. 131 = C. monspessulanus.
narbonense, Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 240.—Eur.
Pelii, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 303.—Eur.
validum, Form. l. c.—Eur.

CISSAMPELOS, Linn. (Menisperm.).
Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 399.—Afr. trop.
lycioides, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 50 (= *Antizoma lycioides*).—Afr. austr.
miersiana, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* (= *Antizoma miersiana*).—Afr. austr.
tenuipes, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 399.—Afr. trop.
truncatus, *Engl. l. c.* 398.—Afr. trop.

CISSAROBRYON, Poepp. = **Viviania**, Cav. (Geran.).
elegans, Poepp. Fragm. Syn. Fl. Chil. 29 = V. elegans.
macrophyllum, Phil. in Linnaea, xxxiii. 32 = V. macrophylla.
parvifolium, Phil. l. c. 33 = V. microphylla.

CISSUS, Linn. = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).
barbeyana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 11.—Afr. trop.
Beya, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 427.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 12.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 58.—Afr. trop.
hasslerianus, Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 73.—Am. cent.
haullevilleana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 12.—Afr. trop.
hauptiana, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 278. —Afr. trop.
prostrata, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 13.—Afr. trop.
schumanniana, Gilg, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 429.—N. Guin.
setulosa, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. 466.—China.
stenopoda, Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 298, nomen.—Afr. trop.

CISTANTHERA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 234 (1897). *TILIACEAE.*
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 174.—Afr. trop.
kabingaensis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 234.—Afr. trop.

CITHAREXYLUM, Mill. (Verben.).
Germaini, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 343.—Chili.
glabrum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 300.—Mexic.
Jurgenseni, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 342.—Mexic.
ovatifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 301. —Mexic.
scandens, *Briq. & Spruce, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 341.—Mexic.
spicatum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 81.—Bolivia.

CITRULLUS, Forsk. (Cucurb.).
Citrullus, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 606 = vulgaris.

CITRUS, Linn. (Rutac.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 639.—Celebes.
dolichophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 377.—N. Guin.

CLADAPUS, Moeller, in Ann. Jard. Buitenz. xvi. (1899) 115. *PODOSTEMACEAE.*
Nymani, *Moeller, l. c.*—Java.

CLAOXYLON, A. Juss. (Euphorb.).
bicarpellatum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 393.—N. Guin.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 23.—Afr. trop.
sphaerocarpum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 284.—Afr. austr.
tomentosum, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies,* i. 843.—Ins. Hawaii.

CLARKIA, Pursh (Onagr.).
Breweri, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay,* 136. —Calif.
concinna, *Greene, l. c.*—Calif.
grandiflora, *Greene, l. c.*—Calif.

CLATHROSPERMUM, Planch. (Anonac.).
pilosum, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 44 (= *Popowia pilosa*).—Afr. trop.

CLAUSENA, Burm. (Rutac.).
Forbesii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 178.—Sumatra.
impunctata, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 117. —Afr. trop.
melioides, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

CLAYTONIA, Gronov. (Portul.).
aurea, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 260. —Am. bor.
calycina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 592 (non Kuntze).—N. Zel.
depressa, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 221.—Am. bor.
multicaulis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 259.—Am. bor.
washingtoniana, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 220.—Am. bor.

CLEISOSTOMA, Blume (Orchid.).
armigera, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 123.—Reg. Himal.
bambusarum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 233 = Sarcanthus bambusarum.
crassum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 295.—Borneo.
gemmatum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 234 = Saccolabium gemmatum.
Ionosma, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 366.—Penins. Mal.
Koordersii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 131.—Celebes.
Lauterbachii, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 251, nomen.—N. Guin.
micranthum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 239 (= *Saccolabium micranthum*).—Ind. or.
parvum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 366.—Penins. Mal.
tenuicaule, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 596.—Penins. Mal.
zollingerianum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, I. 70. —Malaya.

CLEISTACHNE, Benth. (Gramin.).
Stocksii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 162.—Ind. or.

CLEISTANTHUS, Hook. f. (Euphorb.).
caudatus, *Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. I. 49.—Afr. trop.
glaucus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 955.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.

CLEISTOPHOLIS, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 160 (1897). *ANONACEAE.*

CLEMATIS, Dill. (Ranunc.).
arizonica, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 547.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Pittonia,* iv. 147.—Am. bor.
boissieriana, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 400.—Turkestan.
brevifolia, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 8.—Am. bor.
Everettii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 37.—Celebes.
Gattingeri, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 210. —Am. bor.
glaucophylla, *Small, l. c.* 337.—Am. bor.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 388.—Afr. trop.
Hillii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 266.—N. Zel.
iringaensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 388.—Afr. trop.

CLEMATIS:—
rubifolia, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 21.—China.
spectabilis, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 12. —China.
tangutica, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 399.—As. cent.
uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 387.—Afr. trop.

CLEMATOCLETHRA, Maxim. (Ternstroem.).
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 472.—China.

CLEOME, Linn. (Capparid.).
epilobioides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 243.—Afr. trop.
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 12. —Parag.
humilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196.—Mexic.
inornata, *Greene, Pittonia,* iv. 16.—Am. bor.
macradenia, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 188.—Arab.
montevidensis, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* ix. (*Fl. Urug.* 54).—Urug.
polyandra, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 196 = kunthiana.
thyrsiflora, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 14.—Afr. trop.
tunarensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 6.—Bolivia.

CLEOMELLA, DC. (Capparid.).
alata, *Eastw. in Zoe,* v. 87.—Am. bor.
gracilis, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 444.—Am. bor.

CLERMONTIA, Gaudich. (Campan.).
clermontioides, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 906 = Gaudichaudii.

CLERODENDRON, Linn. (Verben.).
angolense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 291.—Afr. trop.
aurantiacum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 313.—Afr. trop.
Barteri, *Baker, l. c.* 298.—Afr. trop.
Bernieri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 348.—Madag.
bipindense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 296.—Afr. trop.
bolivianum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 82.—Bolivia.
botryoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 516.—Afr. trop.
caesium, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 300.—Afr. trop.
carnosulum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 311.—Afr. trop.
congestum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 296.—Afr. trop.
conglobatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 296.—Afr. trop.
cuneatum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 303 (non Turcz.).—Afr. austr.
cuneifolium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 306.—Afr. trop.
Dekindtii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 301.—Afr. trop.
dumale, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 519.—Afr. trop.
Dusenii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 293.—Afr. trop.
emarginatum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 348.—Am. trop.
eupatorioides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 295.—Afr. trop.
Giletii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 113.—Afr. trop.
glabratum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 295.—Afr. trop.
Greyi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 308.—Afr. trop.
Guerkii, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Holstii, *Guerke, ex Baker, l. c.* 303.—Afr. trop.
hysteranthum, *Baker, l. c.* 306.—Afr. trop.
ingratum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 526.—N. Guin.
Kalbreyeri, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 311 = violaceum.
kentrocaule, *Baker, l. c.* 296.—Afr. trop.
Kirkii, *Baker, l. c.* 299.—Afr. trop.

CLERODENDRON:—
kissakense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 304.—Afr. trop.
longitubum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 74.—Afr. trop.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* xxxviii. 213.—Afr. trop.
macrostachyum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 159 (non Turcz.).—Afr. trop.
mandarinorum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 549.—China.
Mannii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 519.—Afr. trop.
megasepalum, *Baker, l. c.* 306.—Afr. trop.
orbiculare, *Baker, l. c.* 307.—Afr. trop.
polyanthum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 295.—Afr. trop.
porphyrocalyx, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 526.—N. Guin.
Rehmannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 294.—Afr. trop. et austr.
Scheffleri, *Guerke, l. c.* 301.—Afr. trop.
Schlechteri, *Guerke, l. c.* 302.—Afr. trop.
Schlechteri, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 310, nomen.—Afr. trop.
silvicola, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 299.—Afr. trop.
speciosum, Guerke, l. c. xviii. 171 = angolense.
strictum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 305.—Afr. trop.
subreniforme, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 291.—Afr. trop.
subscaposum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2675.—China.
suffruticosum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 302.—Afr. trop.
syringaefolium, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
Thonneri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 292.—Afr. trop.
thyrsoideum, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 309 = Mannii.
thyrsoideum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 293.—Afr. trop.
toxicarium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 298.—Afr. trop.
ulugurense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 294.—Afr. trop.
violaceum, *Guerke, l. c.* 303.—Afr. trop.
Whitfieldii, Seem. in Bonplandia, x. 250 = capitatum.
Wilmsii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 304.—Afr. austr.
yaundense, *Guerke, l. c.* 297.—Afr. trop.
zambesiacum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 309.—Afr. trop.

CLEYERA, DC. (Ternstroem.).
albopunctata, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 537.—Ind. occ.
Nimanimae, *Krug & Urb. l. c.* 540 (= *Freziera Nimanimae*).—Ind. occ.

CLIBADIUM, Linn. (Compos.).
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 32.—Ecuador.
subsessilifolium, *Hieron. l. c.*—Ecuador.

CLIDEMIA, D. Don (Melastom.).
costaricensis, *Cogn. ex Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 28, nomen.—Am. cent.

CLIFFORTIA, Linn. (Rosac.).
amplexistipula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 140.—Afr. austr.
neglecta, *Schlechter, l. c.* 141.—Afr. austr.
pedunculata, *Schlechter, l. c.* xxiv. 444.—Afr. austr.
phyllanthoides, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
ramosissima, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
repens, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 392.—Afr. austr.

CLINOGYNE, Salisb. (Scitamin.).
arillata, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 96.—Afr. trop.
azurea, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
canniformis, *K. Schum. l. c.* (= *Thalia cannaeformis*).—Ind. or.; Malaya.
congensis, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
filipes, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 651 = Donax filipes.
leucantha, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 96.—Afr. trop.
oligantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

CLINOGYNE:—
schweinfurthiana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 96 (= *Arundastrum schweinfurthianum*).—Afr. trop.
ugandensis, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

CLINOPODIUM, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiat.).
carolinianum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = C. caroliniana.
kuntzeanum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 259 = Satureia kuntzeana.
multiflorum, Kuntze, l. c. = Satureia multiflora.

CLITANDRA, Benth. (Apocyn.).
Buchanani, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 118.—Afr. trop.
flavidiflora, *Hallier f. l. c.* 124 (= *Carpodinus flavidiflorus*).—Afr. trop.
gracilis, *Hallier f. l. c.* 117 (= *Carpodinus gracilis*).—Afr. trop.
henriquesiana, *K. Schum. ex Warb. in Tropenpfl.* i. 135.—Afr. trop.
kilimanjarica, *Warb. l. c.* iv. 614.—Afr. trop.
landolphioides, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 119.—Afr. trop.
laxiflora, *Hallier f. l. c.* 124 (= *Carpodinus laxiflorus*).—Afr. trop.
leptantha, *Hallier f. l. c.* 123 (= *Carpodinus leptanthus*).—Afr. trop.
macrantha, *Hallier f. l. c.* 117 (= *Carpodinus macrantha*).—Afr. trop.
visciflua, *K. Schum. ex Hallier f. l. c.* 127.—Afr. trop.

CLITORIA, Linn. (Legum.).
humilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 169.—Mexic.
subsessilis, *Rose, l. c.*—Mexic.
tanganicensis, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 60.—Afr. trop.

CLOSIROSPERMUM, Neck. (Compos.).
asperum, Bub. Fl. Pyren. ii. 68 = Picris hieracioides.
sprengerianum, Bub. l. c. 69 = Picris sprengeriana.

CLUSIA, Linn. (Guttif.).
Burchellii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 248.—Guiana.
guedesiana, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 508.—Bras.
krugiana, *Urb. Symb. Antill.* i. 367.—Ind. occ.
purpurea, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 248.—Guiana.

CLUYTIA, Boerh. (Euphorb.).
crassifolia, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 736.—Afr. austr.
Galpini, *Pax, l. c.*—Afr. austr.
glauca, *Pax, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 50.—Afr. austr.
Krookii, *Pax, l. c.* 49.—Afr. austr.

CLYTOSTOMA, Miers = **Pithecoctenium**, Mart. (Bignon.).
campanulatum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 148 = P. tenuiflorum.
convolvuloides, Bureau & K. Schum. l. c. 154.—Bras.
costatum, Bureau & K. Schum. l. c. 150.—Bras.
decorum, Bureau & K. Schum. l. c. 151 (= *Anemopaegma decorum*).—Bras.
noterophilum, Bureau & K. Schum. l. c. 153 (= *Bignonia noterophila*).—Bras.
ramentaceum, Bureau & K. Schum. l. c. 150.—Bras.
sciuripabulum, Bureau & K. Schum. l. c. 149.—Bras.
uniflorum, K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c. 408.—Bras.

CNESTIS, Juss. (Connarac.).
aurantiaca, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 216.—Afr. trop.
emarginata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 81.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 215.—Afr. trop.
riparia, *Gilg, l. c.* 217.—Afr. trop.
togoensis, *Gilg, l. c.* 216.—Afr. trop.

CNICUS, Linn. (Compos.).
bipinnatus, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 121.—Am. bor.
diffusus, *Eastw. l. c.*—Am. bor.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 22.—China.
Henryi, *Franch. l. c.* 21.—China.

CNICUS:—
hesperius, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 122.—Am. bor.
Leduci, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 23.—China.
pinnatisectus, *Klatt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 292.—Am. cent.
Provosti, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 23.—China.
Souliei, *Franch. l. c.* 21.—China.
tioganus, *Congd. in Erythea*, vii. 186.—Calif.

CNIDIUM, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbell.).
ajanense, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 210 (= *Tilingia ajanensis*).—As. bor.
pratense, Bub. Fl. Pyren. ii. 381 = Silaus flavescens.
silaifolium, Fiori & Paol. Fl. Ital. ii. 170 = Carum rigidulum.
virescens, Bub. Fl. Pyren. ii. 418 = Silaus carvifolius.

COCCINIA, Wight & Arn. (Cucurb.).
Dinteri, *André, in Rev. Hort.* 1900, 276.—Afr. trop.
ecirrhosa, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 822.—Afr. trop.
hirtella, *Cogn. l. c.* 821.—Afr. austr.
suburceolata, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* i. 450.—Ind. occ.

COCCOLOBA, Linn. (Polygon.).
cereifera, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 7.—Bras.
Dussii, *Lindau, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 213.—Ind. occ.
Harrisii, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* i. 228.—Ind. occ.

COCCOTHRINAX, Sargent, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. (1899) 87. *PALMAE.*
Garberi, *Sargent, l. c.* 90 (= *Thrinax Garberi*).—Am. bor.
jucunda, *Sargent, l. c.* 89.—Am. bor.

COCCULUS, DC. (Menisperm.).
Blumei, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 40.—Java.
celebicus, *Boerl. l. c.*—Celebes.

COCHLEARIA, Tourn. (Crucif.).
Hobsoni, *H. H. W. Pearson, in Hook. Ic. Pl.* t. 2643.—Tibet.

COCHLIODA, Lindl. (Orchid.).
stricta, *Cogn. in Gard. Chron.* 1897, I. 410.—N. Granat.

COCHLOSPERMUM, Kunth (Bixac.).
balicum, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 49.—Ind. or.

COCOS, Linn. (Palm.).
paraguayensis, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* (1899) 9.—Parag.
sapida, *Barb. Rodr. l. c.* 12.—Parag.

CODONANTHE, Hanst. (Gesner.).
macradenia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 154.—Am. cent.

CODONIUM, Vahl = **Schoepfia**, Schreb. (Olacac.).
chrysophylloides, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 552 = S. chrysophylloides.
pallidum, Van Tiegh. l. c. 550 = S. pallida.

CODONOCROTON, E. Mey. ex Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. (1899) 95 = **Combretum**, Linn. (Combret.).
triphyllum, E. Mey. l. c. = C. bracteosum.

CODONURA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 229. *APOCYNACEAE.*
calophylla, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

COELACHNE, R. Br. (Gramin.).
brachiata, Munro, ex Benth. Fl. Austral. vii. 626, in obs. = pulchella.
infirma, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 350 = pulchella.
japonica, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 701.—Japon.
perpusilla, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 373 = pulchella.

COELACHYRUM, Nees = **Eragrostis**, Beauv. (Gramin.).
praeflorum, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 75.—Afr. trop.

COELARTHRON, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1897) 163. *GRAMINEAE.*
Brandisii, *Hook. f. l. c.* 164.—Ind. or.

COELIDIUM, Vog. (Legum.).
humile, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 218.—Afr. austr.

COELOCOCCUS, H. Wendl. = **Metroxylon,** Rottb. (Palm.).
salomonensis, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1896, 141.—Polynes.

COELOGLOSSUM, Hartm. = **Habenaria,** Willd. (Orchid.).
diphyllum, Fiori & Paol. Fl. Ital. i. 248 = H. cordata.

COELOGYNE, Lindl. (Orchid.).
angustifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 322. —Penins. Mal.
bimaculata, *Ridley, l. c.* 327.—Penins. Mal.
casta, *Ridley, l. c.* 322.—Penins. Mal.
Delavayi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 195.—China.
Henryi, *Rolfe, l. c.*—China.
lauterbachiana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 113.—N. Guin.
mandarinorum, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 269.—China.
pachybulbon, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 324. —Penins. Mal.
pogonioides, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 196.—China.
prasina, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 326.—Penins. Mal.
pulchella, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 194.—As. trop.
pusilla, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 327.—Penins. Mal.
quadrangularis, *Ridley, l. c.* 323.—Penins. Mal.
tenuiflora, *Ridley, l. c.* xxxi. 287.—Borneo.
zeylanica, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon,* iv. 161.—Zeylan.

COELOPLEURUM, Ledeb. = **Archangelica,** Hoffm. (Umbellif.).
actaeifolium, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 142 = A. Gmelini.
brevicaule, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 212 (= *Angelocarpa brevicaulis*).—As. cent.
longipes, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 142.—Am. bor.
saxatile, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 213 = Angelica saxatilis.

COFFEA, Linn. (Rubiac.).
arnoldiana, *Wildem. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot.* 1900, 236.—Afr. trop.
canephora, *Pierre, ex Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 237.—Afr. trop.
congensis, *Froehn. l. c.* 235.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 202.—Afr. trop.
divaricata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 461 (non Tausch).—Afr. trop.
gilgiana, *Froehn. in Engl. Jahrb.* xxv. 267.—Afr. trop.
Ibo, *Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 234.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot.* 1900, 234.—Afr. trop.
macrochlamys, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 462. —Afr. trop.
pulchella, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
scandens, *K. Schum. l. c.* 463.—Afr. trop.
spathicalyx, *K. Schum. l. c.* 464.—Afr. trop.
Staudtii, *Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 236. —Afr. trop.

COGNIAUXIA, Baill. (Cucurb.).
trilobata, *Cogn. in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo,* 141.—Afr. trop.

COINOCHLAMYS, T. Anders. (Acanth.).
congolana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 197.—Afr. trop.

COIX, Linn. (Gramin.).
agrestis, Lour. Fl. Cochinch. 551 = C. Lacryma-Jobi.
crypsoides, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. 334 = Polytoca barbata.
Koenigii, Spreng. Syst. i. 228 = Polytoca barbata.
Ma-Yuën, Romanet, in Bull. Soc. Acclimat. Sér. II. viii. 442 = C. Lacryma-Jobi.
stigmatosa, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) 9 = C. Lacryma-Jobi.
sulcata, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 102 = punctata.

COLA, Schott & Endl. (Stercul.).
angustifolia, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 115.—Afr. trop.
anomala, *K. Schum. l. c.* 134.—Afr. trop.

COLA:—
Ballayi, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 13.—Afr. trop.
brevipes, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 119.—Afr. trop.
caricifolia, K. Schum. l. c. 111 = Afzelii.
chlamydantha, *K. Schum. l. c.* 112.—Afr. trop.
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 181.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 184.—Afr. trop.
diversifolia, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 183.—Afr. trop.
flavo-velutina, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 306.—Afr. trop.
hypochrysea, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
lateritia, *K. Schum. l. c.* 307.—Afr. trop.
micrantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Preussii, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 120.—Afr. trop.
pugionifera, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
rhodoxantha, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 307.—Afr. trop.
rhynchophylla, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 119.—Afr. trop.
Scheffleri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 84, nomen.—Afr. trop.
semecarpophylla, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 308.—Afr. trop.
urceolata, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 114. —Afr. trop.
vera, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 15. —Afr. trop.

COLCHICUM, Linn. (Liliac.).
bifolium, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 198. —As. Min.
chalcedonicum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 174. —Eur.
Doerfleri, *Halacsy, ex Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 742.—Eur.
halepense, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 803.—Syria.
halophilum, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 800.—Persia.
hiemale, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 802.—Cyprus.
Tuntasium, *Heldr. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 395.—Graecia.
varians, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 801. —Persia.

COLEONEMA, Bartl. & Wendl. (Rutac.).
gracile, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 163.—Afr. austr.

COLEOSANTHUS, Cass. = **Brickellia,** Ell. (Compos.).
abbreviatus, Greene, Pittonia, iv. 125.—Am. bor.
ambigens, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 118. —Am. bor.
densus, Greene, Pittonia, iv. 126.—Mexic.
humilis, Greene, l. c. 124.—Am. bor.
Nevinii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 8 = B. Nevinii.
petiolaris, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 117. —Am. bor.
polyanthemus, Greene, Pittonia, iv. 126.—Mexic.
scaber, Greene, l. c. iii. 100.—Am. bor.
verbenaceus, Greene, l. c. iv. 125.—Mexic.
Wootoni, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 511.—Am. bor.

COLEUS, Lour. (Labiat.).
aconitiflorus, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 866.—Afr. trop.
albidus, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 321 = lanuginosus.
aromaticus, Benth. in DC. Prodr. xii. 72 = amboinicus.
assurgens, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 428.—Afr. trop.
aulihanensis, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis,* 211.—Afr. trop.
betonicoides, *Baker, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 866.—Afr. trop.
Briquetii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 441.—Afr. trop.
bullulatus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 69.—Afr. trop.
caninus, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 318 = comosus.
concinnus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 443.—Afr. trop.
cuneatus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 64.—Afr. trop.
cunenensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 443.—Afr. trop.

COLEUS:—
Dewevrei, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 71.—Afr. trop.
Dupuisii, *Briq. l. c.* 70.—Afr. trop.
eetveldeanus, *Briq. l. c.* 73.—Afr. trop.
elatus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 427.—Afr. trop.
floribundus, *Baker, l. c.* 438.—Afr. trop.
Forskohlii, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 359 = barbatus.
fulvescens, Kurz, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 521 = Plectranthus fulvescens.
Gaudichaudii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 237.—Ins. Philipp.
Igolotorum, *Briq. l. c.* 236.—Ins. Philipp.
leptophyllus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 427.—Afr. trop.
Mahonii, *Baker, l. c.* 434.—Afr. trop.
Malinvaldi, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 240.—Afr. trop.
Mannii, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 211 = Solenostemon Mannii.
Marquesii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 239.—Afr. austr.
nyikensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 439.—Afr. trop.
orbicularis, *Baker, l. c.* 437.—Afr. trop.
palliolatus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 464.—Afr. trop.
palustris, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 319 = edulis.
rupestris, Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 409 = Plectranthus rupestris.
ruwenzoriensis, *Baker, l. c.* 427.—Afr. trop.
savannicola, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 529.—N. Guin.
Schinzii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 555.—Afr. austr.
Sodalium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 526.—Afr. trop.
speciosus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 64.—Afr. trop.
tetensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 431.—Afr. trop.
thyrsoideus, *Baker, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7672.—Afr. trop.
ulugurensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 470.—Afr. trop.

COLIGNONIA, Endl. (Nyctag.).
acutifolia, *Heimerl, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxx. 136.—Peruv.
ovalifolia, *Heimerl, l. c.* 132.—Ecuador.
rufopilosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 264.—Bolivia.

COLLIGUAJA, Molina (Euphorb.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 572.—Patag.

COLLINSIA, Nutt. (Scrophul.).
callosa, *Parish, in Erythea,* 1899, 96.—Am. bor.
inconspicua, *Congd. in Erythea,* 1900, 187.—Calif.

COLLOMIA, Nutt. (Polemon.).
aristella, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 318 = Gilia aristella.
bellidifolia, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Amer. ii. 76 = gracilis.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 619.—Patag.
humilis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Amer. ii. 76 = gracilis.
mazama, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xi. 35.—Am. bor.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 550.—Patag.
pusilla, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 135.—Reg. Magell.

COLOBANTHUS, Bartl. (Caryoph.).
squarrosus, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 534. —N. Zel.

COLOCASIA, Schott (Arac.).
violacea, Hort. in Hook. f. Bot. Mag. t. 7732 = antiquorum.

COLOGANIA, Kunth (Legum.).
erecta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 136.—Mexic.

COLPODIUM, Trin. (Gramin.).
nutans, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 76 = Catabrosa nutans.

COLPODIUM:—
planifolium, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 330 = Poa planifolia.
subspicatum, Hack. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 311 = Catabrosa himalaica.

COLUBRINA, Rich. (Rhamn.).
anomala, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 377.—Penins. Mal.
Colubrina, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 69 = ferruginosa.
pedunculata, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 175.—Ins. Christmas.
spinosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 4.—Am. cent.

COLUMELLIA, Ruiz & Pav. (Columell.).
serrata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 93.—Bolivia.

COLUMNEA, Plum. (Gesner.).
filipes, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2428.—N. Granat.
oblongifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 98.—Bolivia.
Tulae, *Urb. Symb. Antill.* i. 409.—Ind. occ.

COLUTEA, Tourn. (Legum.).
longialata, *Koehne, in Mitth. Dendrol. Ges.* 1896, 49.—Oriens.

COLUTEASTRUM, Moehr. ex Kuntze, Rev. Gen. i. (1891) 171 = **Lessertia**, DC. (Legum.).
benguellense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 232 = L. benguellensis.

COMANTHOSPHACE, S. Moore (Labiat.).
barbinervis, S. Moore, in Journ. Bot. 1877, 293 = japonica.
stellipila, S. Moore, l. c. = japonica.
sublanceolata, S. Moore, l. c. = japonica.

COMARELLA, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. (1896) 156. *ROSACEAE.*
multifoliata, *Rydb. l. c.* (= *Potentilla depauperata*).—Am. bor.
sabulosa, *Rydb. l. c.* 157 (= *P. sabulosa*).—Am. bor.

COMBRETUM, Linn. (Combret.).
Afzelii, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 22.—Afr. trop.
albidiflorum, *Engl. & Diels, l. c.* 46.—Afr. trop.
Antunesii, *Engl. & Diels, l. c.* 58.—Afr. trop.
aphanopetalum, *Engl. & Diels, l. c.* 76.—Afr. trop.
atropurpureum, *Engl. & Diels, l. c.* 74.—Afr. trop.
auriculatum, *Engl. & Diels, l. c.* 79.—Afr. trop.
bipindense, *Engl. & Diels, l. c.* 77.—Afr. trop.
bongense, *Engl. & Diels, l. c.* 53.—Afr. trop.
borumense, *Engl. & Diels, l. c.* 64.—Afr. trop.
bracteatum, *Engl. & Diels, l. c.* 100 (= *Cacoucia bracteata*).—Afr. trop.
bracteosum, *Engl. & Diels, l. c.* 95 (= *Poivrea bracteosa*).—Afr. austr.
Bricchettii, *Engl. & Diels, l. c.* 34.—Afr. trop.
brosigianum, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 192.—Afr. trop.
bruchhausenianum, *Engl. & Diels, l. c.* 189.—Afr. trop.
brunneum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 48.—Afr. trop.
Buchananii, *Engl. & Diels, l. c.* 40.—Afr. trop.
caffrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 87 = salicifolium.
calobotrys, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 74.—Afr. trop.
chionanthoides, *Engl. & Diels, l. c.* 79.—Afr. trop.
cinereopetalum, *Engl. & Diels, l. c.* 84.—Afr. trop.
cinnabarinum, *Engl. & Diels, l. c.* iv. 35.—Afr. trop.
conchipetalum, *Engl. & Diels, l. c.* iii. 22.—Afr. trop.
cordofanum, *Engl. & Diels, l. c.* 50.—Afr. trop.
coriifolium, *Engl. & Diels, l. c.* 75.—Afr. trop.
Denhardtiorum, *Engl. & Diels, l. c.* 93.—Afr. trop.
dolichopetalum, *Engl. & Diels,* 91.—Afr. trop.
Elliotii, *Engl. & Diels, l. c.* 42.—Afr. trop.
exannulatum, *Engl. & Diels, l. c.* 88 (= *Cacoucia exannulata*).—Afr. trop.
flammeum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 344.—Afr. trop.
floribundum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 18.—Afr. trop.
fulvotomentosum, *Engl. & Diels, l. c.* 39.—Afr. trop.
Galpinii, *Engl. & Diels, l. c.* 41.—Afr. austr.
ghasalense, *Engl. & Diels, l. c.* 47.—Afr. trop.

COMBRETUM:—
gloriosum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 35.—Bolivia.
Goetzei, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 96.—Afr. trop.
guanaiense, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 34.—Bolivia.
Hensei, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 85.—Afr. trop.
Hobol, *Engl. & Diels, l. c.* 36.—Afr. trop.
insculptum, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
insulare, *Engl. & Diels, l. c.* 21.—Afr. trop.
ischnothyrsum, *Engl. & Diels, l. c.* 96.—Afr. trop.
kachinense, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 169.—Ind. or.
karaguense, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 55.—Afr. trop.
kilossanum, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 193.—Afr. trop.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 340.—Penins. Mal.
lasiocarpum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 96.—Afr. trop.
lasiopetalum, *Engl. & Diels, l. c.* 65.—Afr. trop.
latialatum, *Engl. ex Engl. & Diels, l. c.* 86.—Afr. trop.
lawsonianum, Engl. & Diels, l. c. 101 = Cacoucia paniculata.
lecananthum, *Engl. & Diels, l. c.* 42.—Afr. trop.
Lecardii, *Engl. & Diels, l. c.* 73.—Afr. trop.
leonense, *Engl. & Diels, l. c.* 51.—Afr. trop.
longipilosum, *Engl. & Diels, l. c.* 30.—Afr. trop.
longispicatum, *Engl. & Diels, l. c.* 95 (= *Cacoucia longispicata*).—Afr. trop.
lydenburgianum, *Engl. & Diels, l. c.* 26.—Afr. austr.
macrostigmateum, *Engl. & Diels, l. c.* 24.—Afr. trop.
Mannii, *Laws. ex Engl. & Diels, l. c.* 74.—Afr. trop.
marginatum, *Engl. & Diels, l. c.* 18.—Afr. trop.
Marquesii, *Engl. & Diels, l. c.* 51.—Afr. trop.
Menyhartii, *Engl. & Diels, l. c.* 46.—Afr. trop.
mittuense, *Engl. & Diels, l. c.* 83.—Afr. trop.
molle, *Engl. & Diels, l. c.* 80.—Afr. trop.
multispicatum, *Engl. & Diels, l. c.* 47.—Afr. trop.
mussaendiflorum, *Engl. & Diels, l. c.* 87.—Afr. trop.
nervosum, *Engl. & Diels, l. c.* 101.—Afr. trop.
nigrescens, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 340.—Penins. Mal.
nummularium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 34.—Bolivia.
obtusatum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 58.—Afr. trop.
odontopetalum, *Engl. & Diels, l. c.* 60.—Afr. trop.
ondongense, *Engl. & Diels, l. c.* 56.—Afr. trop.
padoides, *Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. trop.
Palmeri, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 136.—Mexic.
parvulum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 67.—Afr. trop.
Passargei, *Engl. & Diels, l. c.* 45.—Afr. trop.
patelliforme, *Engl. & Diels, l. c.* 12.—Afr. trop. et austr.
paucinervium, *Engl. & Diels, l. c.* 17.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. & Diels, l. c.* 85.—Afr. trop.
polystictum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 351.—Afr. trop.
populifolium, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 54.—Afr. trop.
porphyrobotrys, *Engl. & Diels, l. c.* 73.—Afr. trop.
porphyrolepis, *Engl. & Diels, l. c.* 63.—Afr. austr.
prunifolium, *Engl. & Diels, l. c.* 29.—Afr. trop.
puetense, *Engl. & Diels, l. c.* 46.—Afr. trop.
quangense, *Engl. & Diels, l. c.* 98.—Afr. trop.
ramosissimum, *Engl. & Diels, l. c.* 72.—Afr. trop.
Rautanenii, *Engl. & Diels, l. c.* 64.—Afr. trop.
rhodanthum, *Engl. & Diels, l. c.* 92.—Afr. trop.
rhodesicum, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 435.—Afr. trop.
rigidifolium, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 342.—Afr. trop.
sambesiacum, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 63.—Afr. trop.
Schinzii, *Engl. ex Engl. & Diels, l. c.* 54.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Diels, l. c.* 50.—Afr. trop.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 341.—Penins. Mal.
sericogyne, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 87.—Afr. trop.
somalense, *Engl. & Diels, l. c.* 81.—Afr. trop.
subvernicosum, *Engl. & Diels, l. c.* 48.—Afr. trop.
suluense, *Engl. & Diels, l. c.* 54.—Afr. austr.
taitense, *Engl. & Diels, l. c.* 80.—Afr. trop.
tenuipes, *Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. austr.

COMBRETUM:—
ternifolium, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 49.—Afr. trop.
towaense, *Engl. & Diels, l. c.* 11.—Afr. trop.
Trothae, *Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. trop.
ukamense, *Engl. & Diels, l. c.* 57.—Afr. trop.
ulugurense, *Engl. & Diels, l. c.* 35.—Afr. trop.
undulatum, *Engl. & Diels, l. c.* 48 (non Wall.).—Afr. trop.
velutinum, Engl. & Diels, l. c. 100 = Cacoucia velutina.
verticillatum, *Engl. & Diels, l. c.* 52.—Afr. trop.
virgultosum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 345.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 40.—Afr. trop.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 339.—Penins. Mal.
Zenkeri, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iii. 66.—Afr. trop.

COMMELINA, Plum. (Commelin.).
clarkeana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 343.—Afr. trop.
crispa, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 451.—Am. bor.
dammeriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 343.—Afr. trop.
microspatha, *K. Schum. l. c.* 342.—Afr. trop.
scaposa, *C. B. Clarke, ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 220.—Afr. trop.
Thwaitesii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon,* iv. 302.—Zeylan.

COMMIPHORA, Jacq. (Burser.).
Antunesi, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 255.—Afr. trop.
chlorocarpa, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 414.—Afr. trop.
coriacea, *Engl. l. c.* xxvi. 369.—Afr. trop.
Gurreh, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 253.—Afr. trop.
loandensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 370.—Afr. trop.
mombassensis, *Engl. l. c.* 372.—Afr. trop.
porensis, *Engl. l. c.* 371.—Afr. trop.
pruinosa, *Engl. l. c.* 368.—Afr. trop.
pyracanthoides, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
quadricincta, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 283.—Afr. trop.
rehmanniana, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 255.—Afr. austr.
Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
samharensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 290.—Afr. trop.
Schlechteri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 372.—Afr. austr.
spondioides, *Engl. l. c.* 371.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 255.—Afr. trop.
Trothai, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 371.—Afr. trop.
ulugurensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 255; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 369.—Afr. trop.

COMPSONEURA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 125. *MYRISTICACEAE.*
capitellata, *Warb. l. c.* 146 (= *Myristica capitellata*).—Peruv.
debilis, *Warb. l. c.* 144 (= *Myristica debilis*).—Bras.
Sprucei, *Warb. l. c.* 143 (= *Myristica Sprucei*).—Am. trop.
Trianae, *Warb. l. c.* 147.—N. Granat.

CONAMOMUM, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1899) 121. *SCITAMINEAE.*
citrinum, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
utriculosum, *Ridley, l. c.* 122.—Penins. Mal.

CONANTHUS, S. Wats. (Hydrophyll.).
angustifolius, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 479.—Am. bor.
carnosus, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 262.—Am. bor.
Coulteri, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = Nama Coulteri.
demissus, A. A. Heller, l. c. = Nama demissum.
densus, Lemmon, ex A. A. Heller, l. c. = Nama densum.
depressus, Lemmon, l. c. = Nama depressum.
dichotomus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = Nama dichotomum.

CONANTHUS:—
echiodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = Nama undulatum.
Havardi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = Nama Havardi.
hispidus, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 479 = Nama hispidum.
jamaicensis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = Nama jamaicense.
Lobbii, A. A. Heller, l. c. = Nama Lobbii.
origanifolius, A. A. Heller, l. c. = Nama origanifolium
parviflorus, *Greenm. in Erythea*, vii. 117.—Am. bor.
pusillus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = Nama pusillum.
Rothrockii, A. A. Heller, l. c. = Nama Rothrockii.
sandwicensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 879 (= *Nama sandwicense*).—Ins. Sandw.
stenocarpus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = Nama stenocarpum.
stenophyllus, A. A. Heller, l. c. = Nama stenophyllum.

CONCHOPHYLLUM, Blume = **Dischidia**, R. Br. (Asclep.).
maximum, Karst. in Ann. Jard. Buitenz. xii. 158 = D. maxima.

CONDAMINEA, DC. (Rubiac.).
angustifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 45.—Bolivia.

CONIONEURA, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 148 (1897) = **Lavalleopsis**, Van Tiegh. (Olacac.).

CONIOSELINUM, Fisch. = **Ligusticum**, Linn. (Umbell.).
Dawsoni, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 152 (= *Selinum Dawsoni*).—Am. bor.
Gmelini, Coult. & Rose, l. c. 150 (= *Selinum Gmelini*). —Am. bor.
mexicanum, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 147.—Mexic.
pacificum, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 152 (= *Selinum pacificum*).—Am. bor.
scopulorum, Coult. & Rose, l. c. 151 = L. scopulorum.

CONNARUS, Linn. (Connar.).
amplifolius, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 377 D.—Cochinch.
attopoevensis, *Pierre, l. c.* t. 377 C.—Cochinch.
bariensis, *Pierre, l. c.* sub t. 377.—Cochinch.
cochinchinensis, *Pierre, l. c.* t. 378 (= *Tricholobus cochinchinensis*).—Cochinch.
ellipticus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 7.—Penins. Mal.
harmandianus, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 377 B.—Cochinch.
hebephyllus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 5.—Penins. Mal.
mekongensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 377.—Cochinch.
nicobaricus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 6.—Ins. Nicobar.
punctulatus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 189.—Afr. trop.
quocensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 377 A.—Cochinch.
rufulus, *Pierre, l. c.* t. 378 B.—Cochinch.
schumannianus, *Gilg, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 341.—N. Guin.
Staudtii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 208.—Afr. trop.
tricarpus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 47.—Bras.
villosiflorus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 208.—Afr. trop.

CONOCARPUS, Linn. (Combret.).
lancifolius, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iv. 32.—Afr. trop.

CONOCEPHALUS, Blume (Urtic.).
sinensis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 471. —China.

CONOPODIUM, Koch (Umbell.).
graecum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 613. —Eur.

CONOSTEGIA, D. Don (Melastom.).
tenuifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 334.—Am. cent.

CONRADINA, A. Gray (Labiat.).
puberula, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 469.—Am. bor.

CONVOLVULUS, Tourn. (Convolv.).
americanus, *Greene, Pittonia*, iii. 328.—Am. bor.
aridus, *Greene, l. c.* 330.—Am. bor.
breweraceus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 212 = Breweria sericea.
camporum, *Greene, Pittonia*, iii. 328.—Am. bor.
collinus, *Greene, l. c.* 326.—Am. bor.
crinicalyx, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = Pharbitis crinicalyx.
deltoideus, *Greene, Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
engleriana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 211 = Astrochlaena engleriana.
ficifolius, Kuntze, l. c. 213 = Ipomoea ficifolia.
fistulosus, Kuntze, l. c. = Ipomoea fistulosa.
fruticetorum, *Greene, Pittonia*, iii. 333.—Am. bor.
gracilentus, *Greene, l. c.* 329.—Am. bor.
hewittaceus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = Jacquemontia hewittacea.
Hieronymi, Kuntze, l. c. 217 = Murucoa Hieronymi.
hirsutiflorus, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvi. 41.—Bras.
hirtellus, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 536.—Afr. austr.
Hochstetteri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = Ipomoea pinnata.
itatiayensis, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Juramenti, Kuntze, l. c. = Murucoa Juramenti.
limnophilus, *Greene, Pittonia*, iii. 329.—Am. bor.
Lorentzii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = Jacquemontia Lorentzii.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
magnusianus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = Ipomoea magnusiana.
malacophyllus, *Greene, Pittonia*, iii. 326 (= *Calystegia villosa*).—Calif.
malvaeodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = Ipomoea malvaeoides.
mattogrossensis, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Meisneri, Kuntze, l. c. = Ipomoea Selloi.
Mina, Kuntze, l. c. 215 = Quamoclit Mina.
Moricandi, Kuntze, l. c. 214 = Jacquemontia evolvuloides.
Nuttallii, *Greene, Pittonia*, iii. 330.—Am. bor.
nyctagineus, *Greene, l. c.* 327.—Am. bor.
obcordatus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 88. —Am. cent.
oblongatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = Ipomoea oblongata.
omanensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 405.—Arab.
Peteri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 218 = Murucoa Peteri.
physosepalus, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 535. —Afr. austr.
polymorphus, *Greene, Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
Pseudomina, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 214.—Bolivia.
purpuratus, *Greene, Pittonia*, iii. 332.—Am. bor.
Ruspolii, *Damm. ex Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1898) 225.—Afr. trop.
secundiflorus, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 90. —Mexic.
setosus, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 1048 (= *Ipomoea setosa*).—Bras.
tenuis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 215 = Ipomoea tenuis.
tomentellus, *Greene, Pittonia*, iii. 327.—Am. bor.
transvaalensis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 502.—Afr. austr.
ukambensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 215 = Ipomoea crassipes.
Volkensii, Kuntze, l. c. = Astrochlaena Volkensii.

CONYZA, Linn. (Compos.).
cordata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 142.—Reg. Argent.
major, Bub. Fl. Pyren. ii. 249 = Inula viscosa.
minor, Bub. l. c. 250 = Inula graveolens.
pinnata, Kuntze, l. c. = pinnatilobata.
pinnatifida, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 381 (non Less.).—China.
ulmifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 142 = incisa.

CONYZELLA, Rupr. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
Coulteri, Greene, Fl. Francisc. 386 (= *Conyza Coulteri*).—Am. bor.
linifolia, Greene, l. c. = E. linifolium.

COPAIBA, Adans. = **Copaifera**, Linn. (Legum.).
arnoldiana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 64.—Afr. trop.

COPAIFERA, Linn. (Legum.).
Demeusei, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 195.—Afr. trop.

COPAIFERA:—
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 265.—Afr. trop.
hemitomophylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 332.—Am. cent.
Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 56.—Bolivia.

COPROSMA, Forst. (Rubiac.).
Banksii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxx. 433.—N. Zel.
kauensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 894.—Ins. Sandw.
Kirkii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 390.—N. Zel.
lanceolata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 270.—N. Zel.
margarita, *Colenso, l. c.* xxviii. 594.—N. Zel.
obconica, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 237.—N. Zel.
sagittata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 270.—N. Zel.
Solandri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 522.—N. Zel.

COPTIS, Salisb. (Ranunc.).
chinensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 231.—China.
japonica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1899 (198) = orientalis, etc.
ospriocarpa, *Bruehl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 89.—Ind. or.
venosa, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 21.—Am. bor.

CORALLOCARPUS, Welw. (Cucurb.).
Millspaughi, *Cogn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 322.—Mexic.

CORALLORRHIZA, Hall. (Orchid.).
involuta, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 474.—Mexic.
Pringlei, *Greenm. l. c.* 475.—Mexic.

CORBULARIA, Salisb. = **Narcissus**, Tourn. (Amaryllid.).
Herberti, Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 247.—Eur.

CORDIA, Linn. (Borag.).
bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 392.—Ind. occ.
Bakeri, *Britten, in Journ. Bot.* 1895, 88.—Afr. trop.
Bellonis, *Urb. Symb. Antill.* i. 393.—Ind. occ.
borinquensis, *Urb. l. c.* 390.—Ind. occ.
buddleoides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 83.—Bolivia.
Buchii, *Urb. Symb. Antill.* i. 475.—Ind. occ.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 37.—Afr. trop.
ensifolia, *Urb. Symb. Antill.* i. 476.—Ind. occ.
erosa, Sond. in Linnaea, xxiii. 81 = caffra.
Gharaf, *Ehrenb. ex Aschers. in Sitzungsber. Naturf. Fr. Berl.* 1879, 46.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 307.—Afr. trop.
insularis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 483.—Mexic.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 38.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 541, nomen.—Celebes.
multicapitata, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 146.—Bolivia.
natalensis, Sond. in Linnaea, xxiii. 81 = caffra.
obovata, Baker, in Kew Bull. 1894, 28 = Bakeri.
perlonga, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 90.—Mexic.
rupicola, *Urb. Symb. Antill.* i. 392.—Ind. occ.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 83.—Bolivia.
socorrensis, *Brandegee, in Erythea*, 1899, 5.—Mexic.
umbrosa, *Spruce, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 147.—Bolivia.
Zeyheri, Sond. in Linnaea, xxiii. 81 = caffra.

CORDYLINE, Royen (Liliac.).
Cheesemanii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 509.—N. Zel.

COREOPSIS, Linn. (Compos.).
ambacensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 586.—Afr. trop.
aspilioides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 153.—Afr. trop.
helianthoides, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 448.—Am. bor.
Lewtonii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 146.—Am. bor.

COREOPSIS:—
rhyacophila, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 313. —Mexic.
speciosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 585.—Afr. trop.

CORETHROGYNE, DC. (Compos.).
caespitosa, *Greene, Fl. Francisc.* 378.—Calif.
viscidula, *Greene, l. c.*—Calif.

CORIARIA, Niss. (Coriar.).
intermedia, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 62.—Ins. Formosa.
lurida, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 98.—N. Zel.

CORIDOCHLOA, Nees = **Axonopus**, Beauv. (Gramin.).
cimicina, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xv. 381 = A. cimicinus.
fimbriata, Nees, ex Wight, Cat. 1656 = A. cimicinus.
semialata, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 473 = A. semialatus.

CORISPERMUM, B. Juss. (Chenopod.).
villosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 191.—Am. bor.

CORMONEMA, Reissek (Rhamnac.).
ovalifolium, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 242.—Am. cent.

CORNUS, Tourn. (Cornac.).
Bretschneideri, *J. Henry, in Le Jardin*, 1899, 309.—China.
corynostylis, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1896, 286. —Reg. Himal.
Hessei, *Koehne, l. c.* 1899, 340.—Am. bor.
homerica, Bub. Fl. Pyren. ii. 337 = C. Mas.
microcarpa, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 103. —Am. bor.
Purpusi, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1899, 338.—Am. bor.
quinquinervis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 307.—China.
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. ii. 337 = sanguinea.
Volkensii, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 266.—Afr. trop.

CORNUTIA, Plum. (Verben.).
obovata, *Urb. Symb. Antill.* i. 395.—Ind. occ.

COROKIA, A. Cunn. (Cornac.).
macrocarpa, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 224.—N. Zel.

CORONILLA, Tourn. (Legum.).
trifoliolata, Bub. Fl. Pyren. ii. 564 = scorpioides.

COROYA, Pierre, Fl. Cochinch. t. 392 C (1899). *LEGUMINOSAE.*
dialoides, *Pierre, l. c.*—Cochinch.

CORTADERIA, Stapf, in Gard. Chron. 1897, II. 396. *GRAMINEAE.*
araucana, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
argentea, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
jubata, *Stapf, in Bot. Mag.* t. 7607.—Am. austr.
pilosa, *Hack. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exped. Magell.* iii. V. 222 (= *Arundo pilosa*).—Reg. Magell.
Quila, *Stapf, in Gard. Chron.* 1897, II. 396.—Am. austr.
rudiuscula, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
selloana, Aschers. & Graebn. Mittel-Eur. Fl. ii. 325 = argentea.
speciosa, *Stapf, in Gard. Chron.* 1897, II. 396.—Am. austr.

CORYDALIS, Vent. (Papav.).
Balansae, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 25.—Tonkin.
Boissieri, *Prain, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 172.—Oriens.
casimiriana, *Duthie & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 27.—Reg. Himal.
Clarkei, *Prain, l. c.* 34.—Reg. Himal.
crispa, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
cyrtocentra, *Prain, l. c.* 20.—Reg. Himal.
drakeana, *Prain, l. c.* 31.—China.
dubia, *Prain, l. c.* 36.—Reg. Himal.
filicina, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
fimbrillifera, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 406.—As. cent.
franchetiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 34. —Reg. Himal.
Gortschakovii, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. 266 = thyrsiflora.

CORYDALIS:—
graminea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 23.—Reg. Himal.
hemsleyana, *Franch. & Prain, ex Prain, l. c.* 29.—China.
Hookeri, *Prain, l. c.* 34.—Reg. Himal.
Kingii, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
Laelia, *Prain, l. c.* 25.—Reg. Himal.
lathyroides, *Prain, l. c.* 23.—Reg. Himal.
modesta, Prain, in Bull. Herb. Boiss. vii. 168 = rutaefolia.
pirotensis, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Eur.
ramosa, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. 267 = Stracheyi.
ramosa, *O. & B. Fedtsch, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 806 (non Wall.).—Eur.
Stracheyi, *Duthie, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 37.—Reg. Himal.
thyrsiflora, *Prain, l. c.* 35.—Reg. Himal.

CORYLUS, Tourn. (Cupulif.).
californica, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 580.—Am. bor.
chinensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 197.—China.

CORYMBIS, Thou. (Orchid.).
Lauterbachii, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 241.—N. Guin.
Thouarsii, Reichb. f. in Bot. Zeit. vii. (1849) 868 = corymbosa.

CORYMBOSTACHYS, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 322. *ACANTHACEAE.*
Elytraria, *Lindau, l. c.*—Madag.

CORYNANTHE, Welw. (Rubiac.).
macroceras, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 424.—Afr. trop.

CORYNELLA, DC. (Legum.).
dubia, *Urb. Symb. Antill.* i. 322 = polyantha.

CORYNEPHORUS, Beauv. (Gramin.).
deschampsioides, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 645.—Syria.
laxus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1. (1900) 4.—Syria.
oranensis, *Murb. l. c.* 1.—Alger.

CORYSANTHES, R. Br. (Orchid.).
himalaica, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 128.—Reg. Himal.
Matthewsii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 351. —N. Zel.

CORYTHOLOMA, Decne. = **Gesneria**, Mart. (Gesner.).
bulbosum, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxv. 22 = G. bulbosa.
confertifolium, Fritsch, l. c. 19 = G. confertifolia.
igneum, Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 5. 23 (non Decne.).—Bras.
latifolium, Fritsch, l. c. 20 = G. latifolia.
pusillum, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxv. 20.—Bras.
Selloi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 241 = G. Selloi.
striatum, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxv. 21. —Bras.
uleanum, Fritsch, l. c. 22.—Bras.
verticillatum, Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 5. 19 = G. verticillata.

COSMIA, Domb. = **Calandrinia**, H. B. & K. (Portulac.).
quadrivalvis, Britten, in Journ. Bot. 1900, 77 = C. quadrivalvis.

COSTULARIA, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 274 (1898). *CYPERACEAE.*
brevicaulis, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.
paludosa, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

COSTUS, Linn. (Scitamin.).
acanthocephalus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 345.—Sumatra.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 139.—Afr. trop.
edulis, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 141.—Afr. trop.
Lamingtonii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 160.—N. Guin.
laterifolius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 301.—Afr. trop.

COSTUS:—
ligularis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 298.—Afr. trop.
maculatus, Rosc. Scitam. t. 82 = afer.
nudicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 300.—Afr. trop.
paradoxus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 345.—Borneo.
podocephalus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 250.—Am. cent.
pulcherrimus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 301.—Bolivia.
spectabilis, Zipp. ex K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 348 = Tapeinochilus spectabilis.

COTONEASTER, Rupp. (Rosac.).
arborescens, *Zabel, in Mitth. Dendrol. Ges.* 1897, 25.—As. cent.
dielsianus, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 385.—China.
rugosus, *E. Pritz. l. c.*—China.

COTULA, Tourn. (Compos.).
Haastii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 325.—N. Zel.
macroglossa, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 209.—Afr. austr.
melaleuca, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 458.—Afr. austr.
microglossa, *O. Hoffm. & Kuntze, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 142 (= *Cenia microglossa*).—Afr. austr.
obscura, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 327.—N. Zel.
paradoxa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 36.—Afr. austr.
pulchella, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 328.—N. Zel.
radiata, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 142.—Afr. austr.
Traillii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 324.—N. Zel.

COTYLEDON, Tourn. (Crassul.).
macrantha, *Berger, in Monatsschr. Kakt.* 1900, 106. —Hort.
Purpusii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 161 (= *Cotyledon Purpusii*).—Eur.
saxosum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 28. —Am. bor.

COUBLANDIA, Aubl. = **Muellera**, Linn. (Legum.).
fluvialis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7. 21.—Am. austr.

COUEPIA, Aubl. (Rosac.).
dodecandra, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2620–1.—Am. cent.
formosana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 429.—Bras.
polyandra, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 196 = kunthiana.

COULA, Baill. (Olacin.).
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 189.—Afr. trop.

COULTEROPHYTUM, Robins. (Umbell.).
brevipes, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 157.—Mexic.
macrophyllum, *Coult. & Rose, l. c.* 156.—Mexic.
pubescens, *Coult. & Rose, l. c.* 157.—Mexic.

COURALIA, Splitg. (Bignon.).
rosea, *Donn. Sm. in Pittier, Prim. Fl. Costaric.* ii. 204 (= *Tabebuia rosea*).—Mexic.

COURBONIA, Brongn. (Capparid.).
brevipilosa, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 92.—Afr. trop.
subcordata, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

COUSINIA, Cass. (Compos.).
albescens, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* iv. 223.—Persia.
Bornmuelleri, *Winkl. l. c.* 235.—Persia.
caesia, *Winkl. l. c.* 238.—Turkestan.
contumax, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 168.—Persia.
Elymaea, *Hausskn. & Winkl. ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 225.—Persia.
fragilis, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 169.—Persia.
iranica, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 233.—Persia.
Komarowii, *Winkl. l. c.* 219.—Turkestan.
Korshinskyi, *Winkl. l. c.* 236.—Turkestan.
Lamakini, *Winkl. l. c.* 220.—Turkestan.
larvea, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 167. —Persia.

COUSINIA:—
Lipskyi, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 237.—Turkestan.
longifolia, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 168.—Persia.
machaerophora, *Winkl. & Bornm. l. c.* 166.—Persia.
macilenta, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 222.—Turkestan.
rava, *Winkl. l. c.* 227.—As. cent.
Regelii, *Winkl. l. c.* 229, nomen.—Turkestan.
rhombiformis, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. l. c.* 232.—Persia.
sagittata, *Winkl. & Strauss, l. c.* 233.—Persia.
sicigera, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 166.—Persia.
Straussii, *Hausskn. & Winkl. ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 235.—Persia.
xiphacantha, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. l. c.* 225.—Persia.

COUSSAREA, Aubl. (Rubiac.).
rudgeoides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 48.—Bolivia.

COUTHOVIA, A. Gray (Logan.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 537.—Celebes.

COVILLEA, A. M. Vail = **Larrea**, Cav. (Ficoid.).
tridentata, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 302 = L. mexicana.

CRABBEA, Harv. (Acanth.).
ovalifolia, Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. 24 = nana.
reticulata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 119.—Afr. trop.

CRACCA, Benth. (Legum.).
Greenmanii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 299.—Mexic.

CRACCA, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legum.).
argyrotricha, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 57 = T. argyrotricha.
coronilloides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 224 = T. coronilloides.
decora, Hiern, l. c. = T. decora.
drepanocarpa, Hiern, l. c. = T. drepanocarpa.
flexuosa, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7 = T. flexuosa.
gracillima, A. A. Heller, l. c. = T. gracillima.
holosericea, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1900, 15 = T. virginiana.
intermedia, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, 303 = T. intermedia.
Kuntzei, Harms, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 68.—Bolivia.
Rugelii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7 = T. Rugelii.
Seemanni, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1900, 16.—Mexic.
triphylla, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 57 = T. triphylla.

CRANICHIS, Sw. (Orchid.).
thysanochila, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 35.—Mexic.

CRANIOLARIA, Linn. (Pedal.).
argentina, *Speg. Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 1.—Reg. Argent.

CRANTZIA, Scop. = **Alloplectus**, Mart. (Gesner.).
hirtella, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxv. 8 = A. sparsiflorus.

CRANZIA, Schreb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
angolensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 115.—Afr. trop.

CRASPEDOLEPIS, Steud. = **Restio**, Linn. (Restiac.).
fimbriata, Mast. in DC. Monogr. Phan. i. 280 = R. filiformis.
Verreauxii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 264 = R. filiformis.

CRASSOCEPHALUM, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).
diversifolium, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 594 = G. polycephala.
miniatum, Hiern, l. c. 595 = G. miniata.
scandens, Hiern, l. c. = G. scandens.

CRASSULA, Dill. (Crassul.).
aloides, N. E. Br. in Kew Bull. 1896, 161 = acinaciformis.
anomala, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 370.—Afr. austr.
aphylla, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 371.—Afr. austr.
closiana, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 369 (= *Tillaea closiana*).—Chili.
cogmansensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 347.—Afr. austr.
compacta, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 550.—Afr. austr.
confusa, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 366.—Afr. austr.
crassiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 347.—Afr. austr.
cyclophylla, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 363.—Afr. austr.
Dodii, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 372.—Afr. austr.
drakensbergensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 861.—Afr. austr.
elongata, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 552.—Afr. austr.
Flanagani, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 362.—Afr. austr.
Galpini, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 547.—Afr. austr.
griquaensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 860.—Afr. austr.
hirsuta, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 365.—Afr. austr.
hispida, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 368 (non D. Dietr.).—Afr. austr.
inandensis, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 364.—Afr. austr.
involucrata, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 863.—Afr. austr.
lambertiana, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 371.—Afr. austr.
latispathulata, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 364.—Afr. austr.
laxa, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 549.—Afr. austr.
leucantha, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 369.—Afr. austr.
macowaniana, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 361.—Afr. austr.
maritima, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 862.—Afr. austr.
Marlothii, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 553.—Afr. austr.
Massoni, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 485.—Afr. austr.
minima, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 369 (= *Tillaea minima*).—Chili.
mucronata, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 38.—Afr. austr.
multiflora, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 368.—Afr. austr.
namaquensis, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 367.—Afr. austr.
nana, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 372.—Afr. austr.
natalensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 861.—Afr. austr.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
oblanceolata, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 365.—Afr. austr.
Ovallei, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 370 (= *Tillaea Ovallei*).—Chili.
pachystemon, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 367.—Afr. austr.
pallens, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 361.—Afr. austr.
paludosa, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 369 (= *Tillaea paludosa*).—Chili.
papillosa, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 371.—Afr. austr.
parvisepala, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 549.—Afr. austr.
Promontorii, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 366.—Afr. austr.
punctulata, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 362.—Afr. austr.
quadrangula, Endl. ex Walp. Rep. ii. 253 = pyramidalis.
radicans, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 370 (= *Tillaea radicans*).—Chili.
rubescens, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 363.—Afr. austr.
Rudolfi, *Schoenl. & Baker f. l. c.*—Afr. austr.
scalaris, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 369.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 551.—Afr. austr.
simiana, *Schoenl. l. c.* 552.—Afr. austr.
Southi, *Schoenl. l. c.* 550.—Afr. austr.

CRASSULA:—
spiciformis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 347.—Hort.
subacaulis, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 370.—Afr. austr.
swaziensis, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 548.—Afr. austr.
tenuicaulis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 864.—Afr. austr.
tenuifolia, *Schoenl. l. c.* 860.—Afr. austr.
transvaalensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 347.—Afr. austr.
Woodii, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 863.—Afr. austr.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 284.—China.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 266.—Afr. trop.

CRATAEGUS, Tourn. (Rosac.).
alabamensis, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 342.—Am. bor.
alleghaniensis, *Beadle, l. c.* 337.—Am. bor.
aprica, *Beadle, l. c.* 335.—Am. bor.
arenicola, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 5.—Am. bor.
Ashei, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 339.—Am. bor.
atrorubens, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. II. 78.—Am. bor.
austromontana, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 412.—Am. bor.
biltmoreana, *Beadle, l. c.* 406.—Am. bor.
Boyntoni, *Beadle, l. c.* 409.—Am. bor.
brevipedicellata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 6.—Am. bor.
brevipedunculata, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 453, sphalm. = praec.
Brownii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
campestris, *Britton, l. c.* 449.—Am. bor.
catawbiensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 6.—Am. bor.
ciliata, *Ashe, l. c.* 13.—Am. bor.
coccinioides, *Ashe, l. c.* xvi. II. 74.—Am. bor.
collicola, *Ashe, l. c.* 75.—Am. bor.
columbiana, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 163.—Am. bor.
cullasagensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 10.—Am. bor.
Cuthbertii, *Ashe, l. c.* 15.—Am. bor.
disperma, *Ashe, l. c.* 14.—Am. bor.
dsungarica, *Zabel, ex Lange, Revis. Crataeg.* 43.—As. bor. or.
durifolia, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 12.—Am. bor.
Egani, *Ashe, l. c.* 15.—Am. bor.
Eggertii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
flabellata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 228 = coccinea.
flavocarnis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 9.—Am. bor.
Gattingeri, *Ashe, l. c.* 12.—Am. bor.
geniculata, *Ashe, l. c.* 16.—Am. bor.
haemacarpa, *Ashe, l. c.* 8.—Am. bor.
Harbisoni, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 413.—Am. bor.
holmesiana, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. II. 78.—Am. bor.
illinoiensis, *Ashe, l. c.* 76.—Am. bor.
lambertiana, *Lange, Revis. Crataeg.* 58.—Hab.?
macrosperma, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. II. 73.—Am. bor.
Margaretta, *Ashe, l. c.* 72.—Am. bor.
Mohri, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 416.—Am. bor.
multispina, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 7.—Am. bor.
neofluvialis, *Ashe, l. c.* xvi. II. 71.—Am. bor.
occidentalis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.
palustris, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 13.—Am. bor.
Pearsoni, *Ashe, l. c.* 10.—Am. bor.
pertomentosa, *Ashe, l. c.* xvi. II. 70.—Am. bor.
pinetorum, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 343.—Am. bor.
polybracteata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. II. 79.—Am. bor.
Porteri, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.

CRATAEGUS :—
pulcherrima, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. II. 77.—Am. bor.
pyriformis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 449.—Am. bor.
riparia, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 11.—Am. bor.
roribacca, *Ashe, l. c.* 4.—Am. bor.
rubella, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 344.—Am. bor.
rugosa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 5.—Am. bor.
saligna, *Greene, Pittonia,* iii. 99.—Am. bor.
Sargenti, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 407.—Am. bor.
Schnecki, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 8.—Am. bor.
senta, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 341.—Am. bor.
silvicola, *Beadle, l. c.* xxviii. 414.—Am. bor.
sororia, *Beadle, l. c.* xxx. 336.—Am. bor.
straminea, *Beadle, l. c.* 345.—Am. bor.
tenuifolia, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.
tiliaefolia, *Koehne, ex Lange, Revis. Crataeg.* 31.—Am. bor.
triflora, *Chapm. Fl. S. U. S. Suppl.* II. (1892) 684.—Am. sept.
Vailiae, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* xxiv. 53.—Am. bor.
venusta, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 338.—Am. bor.
yadkinensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. I. 17.—Am. bor.

CRATERIPHYTUM, Scheff. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. (1898) 540; et ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. (1899) 445. *LOGANIACEAE.*
moluccanum, *Scheff. ex Boerl. l. c.* 456.—Ins. Molucc.

CRATERISPERMUM, Benth. (Rubiac.).
angustifolium, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 89.—Afr. trop.
congolanum, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 90.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 88.—Afr. trop.

CRATEROSTIGMA, Hochst. (Scrophul.).
crassifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 500.—Afr. trop.
Goetzei, *Engl. l. c.* xxviii. 477.—Afr. trop.
hirsutum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 461.—Afr. trop.
linearifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 501.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* (= *Torenia Schweinfurthii*).—Afr. trop.
Smithii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 461.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 501.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. l. c.* xxvi. 122.—Afr. austr.

CRATYLIA, Mart. (Legum.).
argentea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 58 = hypargyrea.

CRAWFURDIA, Wall. (Gentian.).
Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 306.—China.
thibetica, *Franch. l. c.* 307.—China.

CREAGHIELLA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2455 (1896). *MELASTOMACEAE.*
purpurea, *Stapf, l. c.*—Borneo.

CREMASPORA, Benth. (Rubiac.).
coffeoides, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 18.—Afr. trop.
comorensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 453.—Ins. Comor.
confluens, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 84, nomen.—Afr. trop.

CREMASTRA, Lindl. (Orchid.).
unguiculata, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 235.—Japon.

CREMASTUS, Miers = **Bignonia**, Linn. (Bignon.).
sceptrum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 216 = B. glutinosa.

CREMOLOBUS, DC. (Crucif.).
subscandens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 4.—Bolivia.

CREPIDOPSIS, Arv. Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, i. (1897) 105. *COMPOSITAE.*
mexicana, *Arv. Touv. l. c.*—Mexic.

CREPIS, Vaill. (Compos.).
ambacensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 618.—Afr. trop.
atrabarba, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 314.—Am. bor.
barbigera, *Leiberg, ex Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 565.—Am. bor.
bumbensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 616.—Afr. trop.
cichoriodes, *Hiern, l. c.* 617.—Afr. trop.
costata, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 147.—Lesbos.
dumicola, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 618.—Afr. trop.
ephemera, *Hiern, l. c.* 616.—Afr. trop.
Gillii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 170.—China.
gracilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 461.—Am. bor.
grandifolia, *Greene, Pittonia,* iii. 107.—Am. bor.
lancifolia, *Greene, l. c.* 108.—Am. bor.
monticola, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 562.—Am. bor.
platyphylla, *Greene, Pittonia,* iii. 27.—Am. bor.
pumila, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 462.—Am. bor.
riparia, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 486.—Am. bor.
rostrata, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 564.—Am. bor.
sagittata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvi. 213 (non Wender.).—Eur.
scopulorum, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 563.—Am. bor.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 84.—Ecuador.
subacaulis, Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 562 = modocensis.
subcarnosa, *Greene, Pittonia,* iii. 107.—Am. bor.
trojanensis, *Urum. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 202.—Eur.
turcica, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 417.—Eur.

CRINUM, Linn. (Amaryll.).
acaule, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 532.—Afr. austr.
belkianum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 47.—Afr. trop.
brevistylum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 197.—Austral.
brisbanicum, *F. M. Bailey, l. c.* iv. 47.—Austral.
distychum, *Herb. Amaryll.* 260.—Afr. trop.
majakallense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 399.—Afr. trop.
Menyharthi, *Baker, l. c.* 395.—Afr. trop.
natans, *Baker, l. c.* 396.—Afr. trop.
parvum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
pestilentis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 198.—Austral.
rhodanthum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 397.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *Baker, l. c.* 578.—Afr. trop.
tanganyikense, *Baker, l. c.* 400.—Afr. trop.
Woodrowi, *Baker, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7597.—Ind. or.
yemense, *Deflers, Voy. Yemen,* 209.—Arab.

CRIOCERAS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1311. *APOCYNACEAE.*
dipladeniiflorum, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 56 (= *Tabernaemontana dipladeniiflora*).—Afr. trop.
longiflorus, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1312.—Afr. trop.

CRISTARIA, Heist. (Malv.).
glabra, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 256 = australis.
pannosa, *Phil. l. c.* 261.—Chili.
patagonica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 18.—Patag.

CRITHO, E. Mey. = **Hordeum**, Linn. (Gramin.).
Aegiceras, E. Mey. Ind. Sem. Hort. Regiom. 5 = H. vulgare.

CROCODILINA, Bub. Fl. Pyren. ii. 171 (1900) = **Atractylis**, Linn. (Compos.).
cancellata, Bub. l. c. 274 = A. cancellata.
humilis, Bub. l. c. 171 = A. humilis.

CROCODILOIDES, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).
amplexicaule, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 143 = B. amplexicaulis.

CROCODILOIDES :—
andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 609 = B. andongensis.
arctiifolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 143 = B. arctiifolia.
Autunesii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 608 = B. Antunesii.
carduodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 143 = B. carduiformis.
carlinopsis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 608 = B. carlinopsis.
gracilis, Hiern, l. c. 609 = B. gracilis.
Kuntzei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 143 = B. Kuntzei.
Welwitschii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 608 = B. Welwitschii.

CROCUS, Tourn. (Irid.).
niveus, *Bowles, in Gard. Chron.* 1900, II. 334.—Eur.

CROFTIA, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxv. (1896) 298. *SCITAMINEAE.*
spectabilis, *King & Prain, l. c.*—Ind. or.

CROSSANDRA, Salisb. (Acanth.).
pubescens, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. 213 = puberula.
Smithii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 462.—Afr. trop.
stenostachya, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 113.—Afr. trop.
subacaulis, *C. B. Clarke, l. c.* 116.—Afr. trop.

CROSSOTROPIS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 317 (1898). *GRAMINEAE.*
eleusinoides, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 226.—Afr. trop.
grandiglumis, *Rendle, l. c.*—Afr. trop. et austr.

CROTALARIA, Dill. (Legum.).
apiculata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 126.—Afr. trop.
argyrolobioides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
Barkae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 226.—Afr. trop.
caespitosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 252.—Afr. trop.
cernua, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 127.—Afr. trop.
Collettii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 349.—Ind. or.
colorata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 127.—Afr. trop.
comanestiana, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis,* 203.—Afr. trop.
Deflersii, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 224.—Arab.
Descampsii, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 53.—Afr. trop.
dura, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 487.—Afr. austr.
filifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 136.—Mexic.
Fleckii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 128.—Afr. trop.
formosana, *Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo,* xii. 395.—Formosa.
gambica, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 179.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 399.—Afr. trop.
grandistipulata, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
gymnocalyx, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 252.—Afr. trop.
Heidmannii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 128.—Afr. trop.
Johnstoni, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 250.—Afr. trop.
karongensis, *Baker, l. c.* 252.—Afr. trop.
leucotricha, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
lukwangulensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 400.—Afr. trop.
minima, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 52.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 250.—Afr. trop.
oocarpa, *Baker, l. c.* 252.—Afr. trop.
pauciflora, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
phyllostachys, *Baker, l. c.* 250.—Afr. trop.
pilosiflora, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
Poggei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 179.—Afr. trop.
polyantha, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
quangensis, *Taub. l. c.* 177.—Afr. trop.
schumanniana, *Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 89.—Afr. trop.

CROTALARIA :—
sertulifera, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 178.—Afr. trop.
sparsifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
squamigera, *Deflers, Voy. Yemen*, 126. t. 3.—Arab.
squarrosa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 130.—Afr. trop.
stenothyrsus, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 178.—Afr. trop.
tappenbeckiana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 351.—N. Guin.
Thomasii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 283.—Afr. trop.
trifoliolata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 53.—Afr. trop.
truncata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 130.—Afr. trop.
valida, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 253.—Afr. trop.

CROTON, Linn. (Euphorb.).
amphileucus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 227.—Mexic.
Antunesii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 523.—Afr. trop.
arboreus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 303.—Mexic.
costaricensis, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 331.—Am. cent.
Eggersii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 503.—Ecuador.
fluminensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 348.—Bras.
Hauthalii, *K. Schum. l. c.*—Parag.
impressus, *Urb. Symb. Antill.* i. 335.—Ind. occ.
integrifolius, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 732.—Afr. trop.
Lehmannii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 504.—Ecuador.
Menyharti, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 733.—Afr. trop.
peruvianus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 228.—Peruv.
Pittieri, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 328.—Am. cent.
poecilanthus, *Urb. Symb. Antill.* i. 334.—Ind. occ.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 119.—Bolivia.
Siraki, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 36 = Coriaria japonica.
subdioecus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 349.—Reg. Argent.
subglaber, *K. Schum. l. c.*—Bras.
Tonduzii, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 330.—Am. cent.
trinitatis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 57 = chamaedryfolius.
ventanicolus, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 54.—Reg. Argent.

CROTONOGYNE, Muell. Arg. (Euphorb.).
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 524.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pax, l. c.* xxvi. 327.—Afr. trop.

CROTONOGYNOPSIS, Pax, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 328. *EUPHORBIACEAE.*
usambarica, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

CRUDDASIA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. (1899) 287. *LEGUMINOSAE.*
insignis, *Prain, l. c.*—Ind. or.

CRUDEA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1900) 353, sphalm. = seq.

CRUDIA, Schreb. (Legum.).
caudata, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 219.—Malaya.
chrysantha, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 353 (= *Apalatoa chrysantha*).—Cochinch.
Curtisii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 220.—Penins. Mal.
glauca, *Prain, l. c.* 221.—Penins. Mal.
gracilis, *Prain, l. c.* 223.—Penins. Mal.
Scortechinii, *Prain, l. c.* 220.—Penins. Mal.
speciosa, *Prain, l. c.* 222.—Penins. Mal.
Wrayi, *Prain, l. c.*—Penins. Mal.

CRUMENARIA, Mart. (Rhamnac.).
Glaziovii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 1.—Bras.

CRUSEA, Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
calcicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 305.—Mexic.

CRYPSIS, Ait. (Gramin.).
compacta, Steud. Syn. Pl. Gram. 151 = Heleochloa schoenoides.
vaginiflora, Opiz, Natural. viii. 83 = Heleochloa schoenoides.

CRYPTANDRA, Sm. (Rhamnac.).
petraea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 184.—Austral.

CRYPTANGIUM, Schrad. (Cyper.).
brevifolium, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 143.—Bras.
dioicum, *Boeck. l. c.* 142.—Bras.
griseum, *Boeck. l. c.* 143.—Bras.
insigne, *Boeck. l. c.*—Bras.
parviflorum, Ind. Kew. Suppl. I. 117, sphalm. = seq.
pauciflorum, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 142.—Bras.

CRYPTANTHE, Benth. & Hook. f. = **Eritrichium**, Schrad. (Boragin.).
calycosa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 331.—Am. bor.
costata, Brandegee, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 453.—Am. bor.
excavata, Brandegee, l. c. 452.—Am. bor.
multicaulis, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 194.—Am. bor.
ramulosissima, A. Nelson, in Erythea, vii. 68.—Am. bor.
Torreyi, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 331 = Krynitzkia torreyana.

CRYPTOCARYA, R. Br. (Laurac.).
laxiflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 503.—Chili.
liebertiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 390.—Afr. trop.
nativitatis, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monogr. Christmas Isl.* 187.—Ins. Christmas.
pauciflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 333.—N. Guin.
Woodii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 391.—Afr. austr.

CRYPTOCORYNE, Fisch. (Aroid.).
cruddasiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 174.—Ind. or.
Grabowskii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 28.—Borneo.
Nevillii, *Trim. Fl. Ceylon*, iv. 346.—Zeylan.

CRYPTOLAPPA, Kuntze = **Camarea**, St. Hil. (Malpigh.).
argentea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 27 = Janusia argentea.
lanata, Kuntze, l. c. = C. lanata.
linearifolia, Kuntze, l. c. = Janusia linearifolia.
linearis, Kuntze, l. c. 28 = C. linearifolia.
robusta, Kuntze, l. c. 27 = C. robusta.
salicifolia, Kuntze, l. c. = C. salicifolia.

CRYPTOLEPIS, R. Br. (Asclep.).
angolensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 677.—Afr. trop.
myrtifolia, *Hiern, l. c.* (= *Ectadiopsis myrtifolia*).—Afr. trop.

CRYPTOSEPALUM, Benth. (Legum.).
Staudtii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 267.—Afr. trop.

CRYPTOTAENIA, DC. (Umbell.).
africana, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 189 (= *Anthriscus africanus*).—Afr. trop.

CTENIUM, Panz. (Gramin.).
brevispicatum, *J. G. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 363.—Am. bor.
digitatum, Spreng. Syst. i. 274 = Chloris incompleta.
glandulosum, *Scribn. & J. G. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 362.—Am. bor.
indicum, Spreng. Syst. i. 274 = Chloris tenella.
sechellense, Baker, Fl. Maurit. 452 = Enteropogon melicoides.

CUCURBITA, Tourn. (Cucurb.).
andreana, *Naud. in Rev. Hortic.* 1896, 542.—Urug.

CUDRANIA, Tréc. (Urtic.).
crenata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 469.—China.

CULCASIA, Beauv. (Aroid.).
Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 418.—Afr. trop.
falcifolia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
lanceolata, *Engl. l. c.* 419.—Afr. trop.
obliquifolia, *Engl. l. c.* 418.—Afr. trop.
striolata, *Engl. l. c.* 417.—Afr. trop.

CULCITIUM, Humb. & Bonpl. (Compos.).
sessile, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 533.—Patag.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 63.—Ecuador.

CULLUMIA, R. Br. (Compos.).
Massoni, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 404.—Afr. austr.

CULLUMIOPSIS, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 103. *COMPOSITAE.*
Grandidieri, *Drake, l. c.*—Madag.

CUNIGUNDA, Bub. Fl. Pyren. ii. 273 (1900) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).
vulgaris, Bub. l. c. = E. cannabinum.

CUNILA, Linn. (Labiat.).
Arechevaletae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 194.—Urug.
tomentosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.

CUPANIA, Plum. (Sapind.).
concolor, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 587.—Bras.
crassifolia, *Radlk. l. c.* 574.—Bras.
howeana, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 126.—Austral.
laxiflora, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 585.—Bras.
revoluta, *Radlk. l. c.* 577.—Bras.
schizoneura, *Radlk. l. c.* 584.—Bras.
semidentata, *Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 337.—Venez.
verrucosa, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 578.—Bras.

CUPHEA, P. Br. (Lythrac.).
acicularis, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 22.—Bras.
affinitatum, *Koehne, l. c.* 20.—Bras.
Caeciliae, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 564.—Am. cent.
cristata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196.—Mexic.
crulsiana, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 23.—Bras.
emarginata, *Koehne, l. c.* 21.—Bras.
empetrifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 137.—Mexic.
fuscinervis, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 156.—Bras.
Gaumeri, *Koehne, l. c.* 154.—Am. cent.
hybogyna, *Koehne, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 27.—Bras.
koehneana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 137.—Mexic.
pseudericoides, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 21.—Bras.
reflexifolia, *Koehne, l. c.* 24.—Bras.
remotifolia, *Koehne, l. c.*—Bras.
roseana, *Koehne, l. c.* xxix. 161.—Mexic.
sanguinea, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 565.—Am. cent.
Schumannii, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 160.—Mexic.
Seleri, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 565.—Am. cent.
sordida, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 155.—Am. trop.
trichopetala, *Koehne & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 40.—Bolivia.
trichopetala, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196.—Mexic.
venusta, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 159.—Mexic.
watsoniana, *Koehne, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 29.—Mexic.

CUPIDONIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 47 (1900) = **Catananche**, Linn. (Compos.).
caerulea, Bub. l. c. = C. caerulea.

CURATELLA, Linn. (Dillen.).
Glaziovii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 25.—Bras.

CURCUMA, Linn. (Scitamin.).
ceratotheca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 335.—Celebes.

CURTIA, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
malmeana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 42.—Bras.

CUSCUTA, Tourn. (Convolv.).
blepharolepis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 743.—Afr. trop.
Engelmanni, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 95.—Turkestan.
falkiiformis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 449.—Afr. austr.
fragrans, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 85.—Bolivia.
plattensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 131.—Am. bor.

CUSPIDARIA, DC. (Bignon.).
schumanniana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 243.—Bolivia.

CUSSONIA, Thunb. (Araliac.).
Boivini, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 125.—Ins. Comor.
Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 251.—Afr. trop.
hamata, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 53 ; *et l. c.* 247.—Afr. trop.
laciniata, *Harms, l. c.* 53 ; *et l. c.* 248.—Afr. trop.
microstachys, *Harms, l. c.* 54 ; *et l. c.* 250.—Afr. trop.

CUVIERA, DC. (Rubiac.).
australis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 78.—Afr. trop.
leniochlamys, *K. Schum. l. c.* 79.—Afr. trop.
trichostephana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 461.—Afr. trop.

CYANASTRUM, Oliv. (Haemodor.).
goetzeanum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 359.—Afr. trop.
hostifolium, *Engl. l. c.* 358.—Afr. trop.
Johnstoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 336.—Afr. trop.

CYANEA, Gaudich. (Campan.).
longifolia, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 909 = arborea.
spathulata, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.
sylvestris, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.

CYANELLA, Linn. (Haemodor.).
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 26.—Afr. austr.

CYANOCARPUS, F. M. Bailey (Proteac.).
cribbiana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 370.—Austral.

CYANOTHYRSUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 197. *LEGUMINOSAE.*
oblongus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 270 (= *Daniella oblonga*).—Afr. trop.
Ogea, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
Soyauxii, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

CYANOTIS, D. Don (Commelin.).
nyctitropa, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 234.—Arab.
obtusa, *Trim. Fl. Ceylon,* iv. 312.—Zeylan.

CYATHANTHUS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 120. *URTICACEAE.*
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CYATHISCUS, Van Tiegh. (Loranth.).
montanus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 188.—As. et Austral. trop.

CYATHOCALYX, Cham. (Anonac.).
bancanus, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 54.—Malaya.
biovulatus, *Boerl. l. c.* t. 55.—Borneo.
borneensis, *Boerl. l. c.* t. 56.—Borneo.
cauliflorus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 318.—N. Guin.
Havilandi, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 57.—Borneo.
Kingii, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 333.—Celebes.
Minahassae, *Koord. l. c.* 334.—Celebes.

CYATHODES, Labill. (Epacrid.).
articulata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 600.—N. Zel.

CYATHOGYNE, Muell. Arg. (Euphorb.).
Dewevrei, *Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. I. 49.—Afr. trop.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 521.—Afr. trop.

CYATHOSTEMMA, Griff. (Anonac.).
grandifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 318.—N. Guin.
sumatrana, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 58 (= *Anaxagorea sumatrana*).—Sumatra.

CYATHULA, Lour. (Amarant.).
albida, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 53.—Afr. trop.
Mannii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 278.—Afr. trop.
polycephala, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
spathulata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 421.—Afr. austr.
spathulifolia, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 54.—Afr. austr.

CYCAS, Linn. (Cycad.).
schumanniana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 154.—N. Guin.

CYCLAMEN, Tourn. (Primul.).
libanoticum, *Hildebr. in Engl. Jahrb.* xxv. 477.—Oriens.
Mindleri, *Heldr. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 386.—Eur.
rohlfsianum, *Aschers. in Bull. Herb. Boiss.* v. 528.—Afr. bor.

CYCLAMINOS, Heldr. in Bull. Herb. Boiss. vi. (1898) 386 = praec.

CYCLAMINUM, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 229 = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).
vernum, Bub. l. c. = C. hederaefolium.

CYCLANTHEROPSIS, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 169. *CUCURBITACEAE.*
parviflora, *Harms, l. c.* (= *Gerrardanthus parviflorus*).—Afr. trop.

CYCLOCHEILON, Oliv. (Verben.).
eriantherum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 508.—Afr. trop.
Kelleri, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 26 = somalense.
minutibracteolatum, Engl. l. c. 27 = eriantherum.

CYCLOSTEMON, Blume (Euphorb.).
Afzelii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
celebicum, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 591.—Celebes.
Dingklagei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
euryodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 961.—Afr. trop.
Minahassae, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 590.—Celebes.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 326.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

CYCNIUM, E. Mey. (Scrophul.).
aquaticum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 479.—Afr. trop.
Bricchettii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 30.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 129.—Afr. trop.
erectum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 128.—Afr. trop.
gallaense, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 29.—Afr. trop.
paucidentatum, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
suffruticosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 479.—Afr. trop.
tomentosum, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 29.—Afr. trop.

CYDONIA, Tourn. (Rosac.).
cathayensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2657–8.—China.

CYLINDROPSIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 38. *APOCYNACEAE.*
parvifolia, *Pierre, l. c.* 39 (= *Carpodinus parvifolia*).—Cochinch.
togolana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 133.—Afr. trop.

CYLINDROPSIS:—
watsoniana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 134 (= *Carpodinus watsoniana*).—Afr. trop.

CYLINDROSOLENIUM, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 670. *ACANTHACEAE.*
Sprucei, *Lindau, l. c.* 671.—Peruv.

CYLISTA, Ait. (Legum.).
Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 303.—Afr. trop.

CYMBIDIUM, Sw. (Orchid.).
acutum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 334.—Penins. Mal.
Faberi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 198.—China.
Leai, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 221.—Austral.
pedicellatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 268.—Japon.
queeneanum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 137.—Austral.
Sparkesii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 221.—Austral.
Stephensi, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 71.—Malaya.
Whiteae, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 193.—Ind. or.

CYMBOPOGON, Spreng. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
andongensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 159.—Afr. trop.
arabicus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 387 = A. Iwarancusa.
Arriani, Aitch. Cat. Punjab Pl. 174 = A. Iwarancusa.
circinnatus, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 203 = A. Iwarancusa.
filipendulus, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 157 = A. filipendulus.
finitimus, Rendle, l. c. = A. finitimus.
glandulosus, Spreng. Pugill. ii. 14 = A. Wightii.
laniger, Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Ind. 640 = A. Iwarancusa.
Nardus, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 155 = A. Nardus.
Phoenix, Rendle, l. c. 156.—Afr. trop.
rufus, Rendle, l. c. 155 = A. rufus.
Ruprechti, Rendle, l. c. 160 = A. Ruprechtii.
Schimperi, Rendle, l. c. 155 = A. Schimperi.
Welwitschii, Rendle, l. c. 157.—Afr. trop.

CYMOPTERUS, Rafin. (Umbell.).
bulbosus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 241.—Am. bor.
calcareus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 32.—Am. bor.
corrugatus, *M. E. Jones, in Am. Nat.* xvii. 973.—Am. bor.
lapidosus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 31 (= *Peucedanum lapidosum*).—Am. bor.
Leibergii, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 182.—Am. bor.
petraeus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 32.—Am. bor.

CYNANCHUM, Linn. (Asclep.).
adriaticum, *R. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xiii. 30 (= *Vincetoxicum adriaticum*).—Eur.
brachyphyllum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 726.—Ecuador.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 533, nomen.—Celebes.
cucullatum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 272.—Madag.
defoliascens, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 38.—Afr. trop.
dentatum, *K. Schum. l. c.* 39.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. II. i. II. 42.—Afr. trop.
dimidiatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum dimidiatum*).—Malaya.
Henryi, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 542.—China.
intricatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 727.—Ecuador.
lineare, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 273.—Madag.
longipes, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
microstegium, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 39.—Afr. trop.
muricatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum muricatum*).—Java.
nipponicum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* 1898, 39.—Japon.

CYNANCHUM:—
palustre, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 6 (= *Vincetoxicum palustre*).—Am. bor.
pichinchense, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 727.—Ecuador.
pleianthum, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 39.—Afr. trop.
quitense, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 728.—Ecuador.
Sodiroi, *K. Schum. l. c.*—Ecuador.
stenospira, *K. Schum. l. c.* 729.—Ecuador.
subcoriaceum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 447.—Madag.
trifurcatum, *Schlechter, l. c.* 448 (= *Schizostephanus somalensis*).—Afr. trop.
tuberculatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum tuberculatum*).—Java.
unguiculatum, Ruiz & Pav. ex Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 499 = Vincetoxicum unguiculatum.
villosum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 39.—Ins. Luchu.
Welwitschii, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 99.—Afr. trop.
Zollingeri, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum Zollingeri*).—Malaya.

CYNAPIUM, Riv. = **Aethusa**, Linn. (Compos.).
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 372 = A. Cynapium.

CYNOCRAMBE, Tourn. = **Thelygonum**, Linn. (Urtic.).
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. i. 75 = T. Cynocrambe.

CYNOCTONUM, E. Mey. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).
angustifolium, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 129.—Am. bor.
crassifolium, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 216 = V. obtusifolium.

CYNODON, Rich. (Gramin.).
elongatus, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 64 = Chloris incompleta.
erectus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 290 = C. Dactylon.
filiformis, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 712 = C. Dactylon.
glabratus, Steud. Syn. Pl. Gram. 212 = C. Dactylon.
Neesii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 371 = Leptochloa polystachya.
pascuus, Nees, Agrost. Bras. 425 = C. Dactylon.
radiatus, Roth, Nov. Pl. Sp. 38 = C. Dactylon.
ruspolianus, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 70.—Afr. trop.
ternatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 405 = Digitaria ternata.
virgatus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 213 = C. Dactylon.

CYNOGLOSSOSPERMUM, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 204 (1898) = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).
capituliflorum, Kuntze, l. c. = E. capituliflorum.
humile, Kuntze, l. c. = E. humile.
uliginosum, Kuntze, l. c. = E. uliginosum.

CYNOGLOSSUM, Tourn. (Borag.).
albanicum, *Degen & Baldacci, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* vi. 337.—Eur.
Bottae, *Deflers, Voy. Yemen*, 173.—Arab.
macrostylum, Bunge, in Lehm. Reliq. Bot. (1847) 236 = Paracaryum heliocarpum.
viride, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 428.—Calif.

CYNOMARATHRUM, Nutt. ex Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 244. *UMBELLIFERAE.*
alpinum, *Coult. & Rose, l. c.* 245.—Am. bor.
Brandegei, *Coult. & Rose, l. c.* 246 (= *Peucedanum Brandegei*).—Am. bor.
Eastwoodae, *Coult. & Rose, l. c.* 247.—Am. bor.
Nuttallii, *Coult. & Rose, l. c.* 245.—Am. bor.
Parryi, *Coult. & Rose, l. c.* 246 (= *Peucedanum Parryi*).—Am. bor.
scabrum, *Coult. & Rose, l. c.* 247.—Am. bor.

CYNOMETRA, Linn. (Legum.).
Beddomei, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 478.—Ind. or.
Carvalhoi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 261.—Afr. trop.
dongnaiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 389 A.—Cochinch.

CYNOMETRA:—
megalophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 262.—Afr. trop.
portoricensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 312.—Ind. occ.
Schlechteri, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 290, nomen.—Afr. trop.
sessiliflora, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 262.—Afr. trop.
trinitensis, *Oliv. in Hook. Ic. Pl.* t. 2443.—Ind. occ.

CYNORCHIS, Thou. (Orchid.).
Buchanani, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 260.—Afr. trop.
Hanningtoni, *Rolfe, l. c.* 261.—Afr. trop.
Johnsoni, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
Kirkii, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
Usambarae, *Rolfe, l. c.* 260.—Afr. trop.

CYNOSCIADIUM, DC. (Umbell.).
pumilum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 121.—Am. bor.

CYNOSORCHIS, Thou. = **Cynorchis**, Thou. (Orchid.).
betsileensis, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 492.—Madag.
boiviniana, Kraenzl. l. c. 483.—Ins. Comor.
buchwaldiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 175.—Afr. trop.
calanthoides, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 475 = C. gibbosa.
cylindrostachys, Kraenzl. l. c. 489.—Maurit.
gracilis, Kraenzl. l. c. 488.—Corea.
humblotiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 176.—Ins. Comor.
japonica, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 487.—Japon.
lowiana, Reichb. f. in Gard. Chron. 1888, I. 424 = purpurascens.
oblonga, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 333.—Afr. trop.
platyclinoides, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 367.—Afr. trop.
purpurea, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 482 (= *Habenaria purpurea*).—Madag.
sigmoidea, Kraenzl. l. c. 490.—Ins. Comor.
tenerrima, Kraenzl. l. c. 493 (= *Habenaria tenerrima*).—Madag.

CYNOSURUS, Linn. (Gramin.).
Ara, Ham. ex Wall. Cat. n. 3816 I = Eleusine indica.
aurasiacus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, (1900) 15.—Alger.
Cavara, Ham. ex Wall. Cat. n. 3818 B = Eleusine aegyptiaca.
ciliaris, *Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 296.—Ind. or.
coracanus, Linn. Syst. ed. II. 875 = Eleusine indica.
coromandelianus, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 297 = Dinebra arabica.
falcatus, Thunb. Prod. 23 = Harpechloa capensis.
junceus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, (1900) 13.—Afr. bor.
macara, Ham. ex Wall. Cat. n. 3818 C = Eleusine aegyptiaca.
paniculatus, Thunb. Prod. 23 = Brizopyrum capense.
retroflexus, Vahl, Symb. Bot. ii. 20 = Dinebra arabica.
Uniolae, Linn. f. Suppl. 110 = Brizopyrum capense.

CYPELLA, Herb. (Irid.).
Mandoni, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 125.—Bolivia.

CYPERUS, Mich. (Cyperac.).
aequalis, Krauss, in Flora, 1845, 754 = isocladus.
araeus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 346.—Chili.
atronitens, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20 = Pycreus elongatus.
biuncialis, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853, (1855) 156 = Mariscus confertus.
blandus, Kunth, Enum. Pl. ii. 36 = marginatus.
Boeckleri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 344.—Chili.
Bolusi, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 585 = Mariscus umbilensis.
brevis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 341 = Mariscus congestus.
brizaeus, Vahl, Enum. ii. 316 = Mariscus brizaeus.
brunneus, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 116 = Mariscus bruneus.
Buchanani, Boeck. Cyp. Nov. i. 4 = esculentus.
bulbifex, E. Mey. ex Drège, in Linnaea, xx. 245 = usitatus.

CYPERUS:—
caffer, Bertol. f. in Mem. Rend. Ist. Bologna, 1853–4, 33 = compressus.
caymanensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 120.—Ind. occ.
cognatus, Kunth, Enum. Pl. ii. 52 = rupestris.
compactus, *Lam. Tabl. Encyc.* i. 144.—Madag.
confertus, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 115 = Mariscus confertus.
congensis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, 285.—Afr. trop.
congestus, Vahl, Enum. ii. 358 = Mariscus congestus.
Cooperi, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 328 = Mariscus Cooperi.
coracana, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3815 = Eleusine brevifolia.
cyperodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 333 (= *Scirpus cyperoides*).—Austral.
Cyprius, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 102.—Ins. Cyprus.
deciduus, Boeck. in Flora, 1879, 547 = Mariscus deciduus.
dissitiflorus, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853, (1855) 153 = Mariscus confertus.
dissitiflorus, Nees, in Linnaea, ix. 285 = Mariscus dissitiflorus.
elegantulus, Steud. in Flora, 1842, 583 = Pycreus elegantulus.
elephantinus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 559 = Mariscus elephantinus.
Engelmanni, Steud. Syn. Pl. Cyp. 47 = Torulinium michauxianum.
esculentus, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 177 = iocladus.
filiformis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 = Torulinium filiforme.
flavicomus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 53 = Torulinium michauxianum.
flavissimus, Schrad. Anal. Fl. Cap. 5 = compactus.
flavissimus, Steud. in Flora, 1829, 152 = sphaerospermus.
flexifolius, *Boeck. ex Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 586.—Ins. Samoa.
flexuosus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 566 = Torulinium Vahlii.
fluminalis, Ridley, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. 127 = Pycreus fluminalis.
glaucus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 42 = Mariscus brizaeus.
haematocephalus, *C. B. Clarke, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 333.—Natal.
havanensis, Kunth, Enum. Pl. ii. 84 = Torulinium filiforme.
Hensii, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, 289.—Afr. trop.
hirtus, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaett. i. 6 = Fimbristylis exilis.
involutus, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 328 = Mariscus involutus.
isocladus, *Kunth, Enum. Pl.* ii. 37.—Afr. austr.
jocladus, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 177 = isocladus.
lanceus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = Pycreus umbrosus.
lepidus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 347 (non F. Muell.).—Chili.
lutescens, *R. Phil. l. c.* 345 (non Torr. & Hook.).—Chili.
Mauryi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 333 (= *Pycreus Mauryi*).—Bras.
micans, Kunth, Enum. Pl. ii. 12 = Pycreus ferrugineus.
michauxianus, Schult. Mant. ii. 123 = Torulinium michauxianum.
minutulus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 339 (non Vahl).—Afr. trop.
multibracteatus, Boeck. in Flora (1875), 107 = Torulinium Eggersii.
Nocha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 346.—Chili.
oakportensis, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 543 = Pycreus oakfortensis.
obtusiflorus, Vahl, Enum. ii. 308 = compactus.
Oerstedii, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. v. II. 224 = Torulinium Vahlii.
olivetorum, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3, (1899) 25.—Tunis.
ornithopus, Pers. Syn. i. 61 = Torulinium filiforme.
paposanus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 343.—Chili.
parvinux, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 167.—Afr. austr.
permutatus, Boeck. in Linnaea, xxxv. 477 = Pycreus umbrosus.

CYPERUS:—
planifolius, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. 106 = Mariscus purpurascens.
pohlianus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 334 (= *Mariscus pohlianus*).—Bras.
pseudobromoides, Boeck. in Linnaea, xxxv. 464 = Pycreus angulatus.
purpurascens, Vahl, Enum. ii. 359 = Mariscus purpurascens.
rancoanus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 345.—Chili.
rehmannianus, *Boeck. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 334 (= *Mariscus rehmannianus*).—Afr. austr.
Reineckei, *Boeck. in Engl. Jahrb.* xxv. 585.—Ins. Samoa.
retusus, Nees, in Linnaea, ix. 285 = latifolius.
rufinus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. v. II. 222 = Torulinium michauxianum.
rupestris, *Kunth, Enum. Pl.* ii. 52.—Afr. austr.
samoensis, *Boeck. in Engl. Jahrb.* xxv. 586.—Ins. Samoa.
sieberianus, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 96 = Mariscus sieberianus.
speciosus, Vahl, Enum. ii. 364 = Torulinium michauxianum.
sphaerocephalus, Vahl, l. c. 310 = compactus.
subchoristachys, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 177.—Afr. austr.
tenuiflorus, Rottb. Descr. et Ic. 30 = longus.
tenuis, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 119 = Mariscus tenuis.
tetragonus, Ell. Sketch, i. 71 = Mariscus tetragonus.
toisensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 334 (= *Mariscus involutus*).—Afr. austr.
umbilensis, *Boeck. ex Kuntze, l. c.* (= *Mariscus umbilensis*).—Afr. austr.
unifolius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 374 = Torulinium filiforme.
Urbani, Boeck. Cyp. Nov. i. 10 = Mariscus Urbani.
Vahlii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 48 = Torulinium Vahlii.
virginicus, Steud. l. c. 47 = Torulinium michauxianum.
webbianus, Steud. l. c. 20 = sexangularis.

CYPHIA, Berg. (Campan.).
lasiandra, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 111.—Afr. trop.
lobelioides, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 628.—Afr. trop.
longiflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 194.—Afr. austr.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.
oligotricha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 195.—Afr. austr.
stenopetala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 112.—Afr. austr.
tenera, *Diels, l. c.*—Afr. austr.
wilmsiana, *Diels, l. c.* 113.—Afr. austr.

CYPHOCARPA, Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 42. *AMARANTACEAE.*
Petersii, *Lopr. l. c.* 43.—Afr. trop.
resedoides, *Lopr. l. c.* 44.—Afr. austr.
Wilmsii, *Lopr. l. c.* 42.—Afr. austr.

CYPHOKENTIA, Brongn. (Palm.).
samoensis, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 588.—Ins. Samoa.

CYPHOMANDRA, Mart. (Solan.).
acuminata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 196.—Am. austr.
benense, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
heterophylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 436.—Am. cent.
uniloba, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 90.—Bolivia.
yungasense, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 195.—Am. austr.

CYPHOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 186 (1898) = **Cyphia**, Berg. (Campan.).
elata, Kuntze, l. c. = C. elata.
Gerrardii, Kuntze, l. c. = C. Gerrardii.
volubilis, Kuntze, l. c. = C. volubilis.

CYPRIPEDIUM, Linn. (Orchid.).
Chica, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 36 (= *Selenipedium Chica*).—Am. cent.
Crawshawae, *O'Brien, in Gard. Chron.* 1898, I. 18.—Ind. or.
czerwiakowianum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 49 (= *Selenipedium czerwiakowianum*).—Peruv.
ebracteatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 204.—China.
epidendricum, Vell. Fl. Flum. ix. t. 64 = Eulophia Woodfordii.

CYPRIPEDIUM:—
sargentianum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 38 (= *Selenipedium sargentianum*).—Bras.
yatabeanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 91.—Japon.

CYRILLA, Garden (Cyrill.).
parvifolia, *Shuttlew. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 101.—Am. bor.
Perrottetii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 232.—Ind. occ.

CYRTANDRA, Forst. (Gesner.).
Beckmanni, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 680.—Ins. Samoa.
bruteliana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 550, 627.—Celebes.
campanulata, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 681.—Ins. Samoa.
cupulata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 527.—Penins. Mal.
degenerans, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 887 = latebrosa.
Engleri, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 550, 628.—Celebes.
Funkii, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 677.—Ins. Samoa.
gayana, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 887.—Ins. Sandw.
geminata, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 681.—Ins. Samoa.
geminiflora, *Nad. in Journ. de Bot.* 1897, 113.—Ins. Societ.
geocarpa, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 550, 627.—Celebes.
Godeffroyi, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 677.—Ins. Samoa.
Hufnagelii, *Reinecke, l. c.* 680.—Ins. Samoa.
hypogaea, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 550, 628.—Celebes.
Jellesmani, *Koord. ll. cc.*—Celebes.
Kraemeri, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 679.—Ins. Samoa.
Kruegeri, *Reinecke, l. c.* 678.—Ins. Samoa.
lanceolata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 527.—Penins. Mal.
mamillata, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 287.—Malaya.
Mamolea, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 679.—Ins. Samoa.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 551, nomen.—Celebes.
velutina, *Nad. in Journ. de Bot.* 1899, 4 (non Korth.).—Ins. Societ.
virgata, *Nad. l. c.*—Ins. Societ.

CYRTANTHUS, Ait. (Amaryll.).
alboluteus, Burch. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 225 = lutescens.
Elliotii, *Baker, l. c.* 220.—Afr. austr.
Flanagani, *Baker, l. c.* 532.—Afr. austr.
leucanthus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 454.—Afr. austr.
rectiflorus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 222.—Afr. austr.
sanguineus, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5218.—Afr. trop.
stenanthus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 532.—Afr. austr.

CYRTOCHILUM, H. B. & K. = **Oncidium**, Sw. (Orchid.).
micranthum, Kraenzl. in Gard. Chron. 1896, II. 63.—Bras.

CYRTOPERA, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).
amazonica, Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 180 = E. Woodfordii.
flavopurpurea, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 68 = E. flavopurpurea.
formosana, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 198.—Ins. Formosa.
longifolia, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 668 = E. Woodfordii.
papuana, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 104 (non Ridley).—N. Brit.
Shupangae, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 116 = E. Shupangae.
vellosiana, Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 179 = E. Woodfordii.
Walleri, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 117 = E. Walleri.
Woodfordii, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 189 = E. Woodfordii.

CYRTOPODIUM, R. Br. (Orchid.).
ecristatum, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 433.—Am. bor.
Woodfordii, Sims, in Bot. Mag. t. 1814 = Eulophia Woodfordii.

CYRTORRHYNCHA, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn. (Ranunc.).
neglecta, Greene, Pittonia, iv. 146.—Am. bor.

CYRTOXIPHUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 203. *LEGUMINOSAE.*
Staudtii, *Harms, l. c.* 204.—Afr. trop.

CYSTORCHIS, Blume (Orchid.).
aphylla, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 400.—Penins. Mal.

CYTISUS, Linn. (Legum.).
bosnaicus, *Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xi. 57.—Eur.
cantabricus, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 464 (= *Sarothamnus cantabricus*).—Hispan.
glaber, Bub. l. c. 463 = Genista sessilifolia.
hirsutus, Bub. l. c. = triflorus.
Nejceffii, *Urum. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 54.—Eur.
medius, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 339.—Eur.
Petrovicii, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 95.—Eur.
rectipilosus, *Adamov. l. c.*—Eur.

D

DACTYLIS, Linn. (Gramin.).
adscendens, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 351 = Lasiochloa ciliaris.
aschersoniana, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 274.—Eur.
brevifolia, Koen. ex Willd. Sp. Pl. i. 410 = Eleusine brevifolia.
hirta, Schrad. in Schult. Mant. ii. 350 = Lasiochloa longifolia.
hispida, Thunb. Prod. Pl. Cap. 22 = Lasiochloa longifolia.
ibizensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 139.—Eur.
interrupta, Rottl. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 325 = Eragrostis cynosuroides.
laevis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 22 = Festuca scabra.
lagopodioides, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 298 = Aeluropus villosus.
lagopoides, Linn. Mant. i. 33 = Aeluropus villosus.
madraspatensis, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 297 = Dinebra arabica.
massaviensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 298 = Aeluropus villosus.
ovata, Steud. l. c. = Lasiochloa obtusifolia.
paucinervis, Nees, Fl. Afr. Austr. 429 = Diplachne paucinervis.
phleoides, Klein, ex Steud. Nom. ed. II. i. 478 = Eragrostis phleoides.
repens, Desf. Fl. Atlant. i. 79 = Aeluropus villosus.
serrata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 22 = Festuca scabra.
villosa, Thunb. l. c. = Koeleria cristata.

DACTYLOCTENIUM, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).
falcatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 1030 = Harpechloa capensis.
geminatum, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 26.—Afr. austr.
glaucophyllum, Courb. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. 133 = E. aristata.

DACTYLODES, Zanoni-Monti = **Tripsacum**, Linn. (Gramin.).
Dactylodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 349 = T. dactyloides.

DACTYLOPETALUM, Benth. (Rhizophor.).
verticillatum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. 866 = Cassipourea verticillatum.

DAHLIA, Cav. (Compos.).
dumicola, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 289.—Ind. occ.
tenuis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 48.—Mexic.

DALBERGIA, Linn. (Legum.).
ajudana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 295.—Afr. trop.
anomala, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 381.—Cochinch.
bariensis, *Pierre, l. c.* t. 380 B.—Cochinch.
Brownei, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 731 (=*Ecastaphyllum Brownei*).—Am. austr.
burmanica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 448.—Ind. or.
cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 383 A.—Cochinch.
cochinchinensis, *Pierre, l. c.* t. 382 B.—Cochinch.
dekindtiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 298.—Afr. trop.
Dinklagei, *Harms, l. c.* 293.—Afr. trop.
dongnaiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 382 A.—Cochinch.
duperreana, *Pierre, l. c.* t. 381 B.—Cochinch.
elata, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 296.—Afr. trop.
fusca, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 381 A.—Cochinch.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 407.—Afr. trop.
Hemsleyi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 450.—Ind. or.
hiemalis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 15.—Bras.
Hullettii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 119.—Penins. Mal.
kingiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 289.—Ind. or.
Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 121.—Penins. Mal.
Kurzii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 450.—Ind. or.
lagosana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 298.—Afr. trop.
laxiflora, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 64.—Afr. trop.
luluensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 294.—Afr. trop.
macrothyrsus, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
mammosa, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 380 A.—Cochinch.
menoeides, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 120.—Penins. Mal.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 430, 630.—Celebes.
mossambicensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 295.—Afr. trop.
Nelsii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 729.—Afr. trop.
ochracea, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 297.—Afr. trop.
Oliveri, *Gamble, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 451.—Ind. or.
oxyphylla, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 49.—Bolivia.
Prazeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 452.—Ind. or.
Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 294.—Afr. trop.
saigonensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 381.—Cochinch.
sessiliflora, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 296.—Afr. trop.
subsympathetica, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 116.—Penins. Mal.

DALEA, Linn. (Legum.).
Anthonyi, *Brandegee, in Erythea,* vii. 2.—Mexic.
azurea, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 77 (=*Psoralea azurea*).—Chili.
Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 59.—Bolivia.
Purpusii, *Brandegee, in Erythea,* vii. 2.—Mexic.
retusifolia, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 59.—Bolivia.
tapacariensis, *Harms, ex Kuntze, l. c.*—Bolivia.

DALECHAMPIA, Plum. (Euphorb.).
brevipes, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 232.—N. Granat.
Galpini, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 736.—Afr. austr.

DAMAPANA, Adans. = **Smithia**, Ait. (Legum.).
Welwitschii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 238 = S. Welwitschii.

DAMASONIUM, Mill. (Alism.).
Damasonium, Aschers. & Graebn. Mittel-Eur. Fl. i. 389 = stellatum.

DAMMARA, Rumph. = **Agathis**, Salisb. (Conif.).
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 263.—Celebes.

DAMMERA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 201 (1900). *PALMAE.*
ramosa, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
simplex, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

DANIELIA, Lem. Pl. Grasses, (1869) 94 = **Rochea**, DC. (Crassul.).
coccinea, Lem. l. c. = R. coccinea.
jasminea, Lem. l. c. 95 = R. jasminea.
odoratissima, Lem. l. c. = R. odoratissima.
versicolor, Lem. l. c. = R. versicolor.

DANTHONIA, DC. (Gramin.).
airoides, Nees, Fl. Afr. Austr. 284 = Pentaschistis airoides.
andina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 30.—Chili.
andina, *R. Phil. l. c.* 33 (non R. Phil. l. c. 30).—Chili.
andongensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 212.—Afr. trop.
angustifolia, Nees, Fl. Afr. Austr. 302 = Pentaschistis angustifolia.
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
aristidioides, Lehm. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 318 = Pentaschistis aristidioides.
Bachmanni, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 385 = curva.
brachyphylla, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 520.—Afr. austr.
cachemyriana, *Jaub. & Spach, Illustr.* iv. 46.—Ind. or.
calva, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
circinnata, Steud. Syn. Pl. Gram. 239 = Achneria setifolia.
cirrhulosa, Nees, Fl. Afr. Austr. 309 = Pentaschistis angustifolia.
collinita, Nees, l. c. 315 = Pentaschistis triseta.
colorata, Steud. Syn. Pl. Gram. 241 = Pentaschistis colorata.
Cumminsii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 282.—Ind. or.
curvifolia, Schrad. in Schult. Mant. ii. 386 = Pentaschistis curvifolia.
cyatophora, Nees, Fl. Afr. Austr. 286 = Pentaschistis airoides.
decumbens, *DC. Fl. Fr.* iii. 33.—Eur.; Afr. bor. et austr.
denudata, Nees, Fl. Afr. Austr. 320 = Pentaschistis curvifolia.
dregeana, Steud. Syn. Pl. Gram. 244 = Chaetobromus dregeanus.
dura, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 527.—Afr. austr.
elegans, Nees, Fl. Afr. Austr. 296 = Pentaschistis elegans.
eriostoma, Nees, l. c. 304 = Pentaschistis eriostoma.
exilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 281.—Ind. or.
fascicularis, Steud. Syn. Pl. Gram. 243 = stricta.
filiformis, Nees, Fl. Afr. Austr. 293 = Pentaschistis filiformis.
glabra, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 43.—Am. bor.
glabra, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 30.—Chili.
hapalotricha, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715.—N. Granat.
heptamera, Nees, Fl. Afr. Austr. 309 = Pentaschistis heptamera.
himalaica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 281.—Ind. or.
hirsuta, Nees, Fl. Afr. Austr. 282 = Achneria hirsuta.
inermis, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 534.—Afr. austr.
intercepta, Steud. Syn. Pl. Gram. 243 = Chaetobromus interceptus.
involucrata, Steud. l. c. 244 = Chaetobromus involucratus.
juncea, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. II. (1838) 35 = macrantha.
kashmiriana, Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Ind. 630 = cachemyriana.
leonina, Steud. ex Kunth, Enum. Pl. i. 303 = Avenastrum antarcticum.
leptophylla, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 421 = Tripogon abyssinicus.
Lima, Nees, Fl. Afr. Austr. 312 = Pentaschistis Lima.
livida, Trin. Sp. Gram. t. 50 = Pentaschistis curvifolia.
longiglumis, Nees, Fl. Afr. Austr. 306 = Pentameris longiglumis.
Macowanii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 527.—Afr. austr.
macrocephala, *Stapf, l. c.* 522.—Afr. austr.
micrantha, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 71 = Pentaschistis Thunbergii.
mossamedensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 211.—Afr. trop.
nervosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 612 (non Hook. f.).—N. Zel.
nutans, Nees, Fl. Afr. Austr. 314 = Pentaschistis nutans.

DANTHONIA:—
octoflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
oreoboloides, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2606.—N. Guin.
oresigena, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 32.—Chili.
pallescens, Schrad. in Schult. Mant. ii. 386 = Pentaschistis pallescens.
papillosa, Trin. Sp. Gram. t. 66 = Pentaschistis aspera.
Parryi, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 133.—Am. bor.
patula, Nees, Fl. Afr. Austr. 285 = Pentaschistis patula.
porosa, Nees, l. c. 283 = Achneria setifolia.
procumbens, Nees, ex Drège, in Linnaea, xx. 254 = Pentaschistis Thunbergii.
radicans, Steud. Syn. Pl. Gram. 243 = Pentaschistis capensis.
rigida, Steud. l. c. = obtusifolia.
rufa, Nees, in Linnaea, vii. 316 = lanata.
rupestris, Nees, Fl. Afr. Austr. 300 = Pentaschistis rupestris.
setosa, Nees, l. c. 325 = purpurea.
speciosa, Lehm. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 307 = Pentameris speciosa.
suffrutescens, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 533.—Afr. austr.
tandilensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 349.—Reg. Argent.
Thouarsii, Nees, Fl. Afr. Austr. 337 = Pentameris Thuarii.
Thuarii, Desv. Opusc. 99 = Pentameris Thuarii.
Thunbergii, Kunth, Rév. Gram. i. 107 = Pentaschistis Thunbergii.
tortuosa, Trin. Sp. Gram. t. 68 = Pentaschistis tortuosa.
trichotoma, Nees, Fl. Afr. Austr. 318 = Pentaschistis aristidioides.
villosa, Steud. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. II. (1838) 34 = Pentaschistis Thunbergii.
viscidula, Nees, Fl. Afr. Austr. 303 = Pentaschistis viscidula.
webbiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 240 = Pentaschistis airoides.

DAPHNE, Tourn. (Thymel.).
gemmata, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 481.—China.
gracilis, *E. Pritz. l. c.* 480.—China.
Stapfii, *Bornm. & Keissl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1897, 36.—Persia.
tenera, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 505.—Chili.
Vahli, *Keissl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1896, 214.—Oriens.

DARWINIA, Rudge (Myrtac.).
Luehmanni, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 353.—Austral.

DASIPHORA, Rafin. Ant. Bot. 167 (1838) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
fruticosa, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 188 = P. fruticosa.

DASISTOMA, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).
bignoniiflora, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 285.—Am. bor.

DASYANTHUS, Bub. Fl. Pyren. ii. 198 (1900) = **Gnaphalium**, Linn. (Compos.).
conglobatus, Bub. l. c. 199 = G. luteoalbum.
fuscus, Bub. l. c. 200 = G. sylvaticum.
supinus, Bub. l. c. 201 = G. supinum.
sylvaticus, Bub. l. c. 200 = G. sylvaticum.
uliginosus, Bub. l. c. 199 = G. uliginosum.

DASYPOA, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 716. *GRAMINEAE.*
tenuis, *Pilg. l. c.*—Peruv.

DASYSPHAERA, Volkens, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 153 (1897). *AMARANTACEAE.*
lanata, *Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 153.—Afr. trop.
Robecchii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 52.—Afr. trop.
tomentosa, *Volkens, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 153.—Afr. trop.

DASYSTACHYS, Baker (Liliac.).
aurea, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 512.—Afr. trop.
crassifolia, *Baker, l. c.* 511.—Afr. trop.
debilis, *Baker, l. c.* 513.—Afr. trop.
decorata, *Baker, l. c.* 512.—Afr. trop.

DASYSTACHYS :—
Drimiopsis, *Baker, ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 789.—Afr. trop.
gracilis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 510.—Afr. trop.
marginata, *Baker, l. c.* 512.—Afr. trop.
papillosa, *Baker, l. c.* 514.—Afr. trop.
polyphylla, *Baker, l. c.* 511.—Afr. trop.

DATURA, Linn. (Solanac.).
pruinosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 486.—Mexic.
villosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 571.—Mexic.

DAUCUS, Tourn. (Umbell.).
Daucorlaya, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 250 (= *Orlaya Daucorlaya*).—Eur.
Matthioli, Bub. Fl. Pyren. ii. 403 = D. Gingidium.
pumilus, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 249 = muricatus.
sahariensis, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 89.—Afr. bor.
syrticus, *Murb. l. c.* 87.—Afr. bor.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 402 = D. Carota.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 142.—Arab.

DAVILLA, Vand. (Dillen.).
alata, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 217 = vaginata.
Lechleri, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 2.—Bolivia.
neurophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 24.—Bras.
parviflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 3.—Bolivia.

DAVYELLA, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 134 = **Neostapfia**, Davy (Gramin.).
colusana, Hack. l. c. 134 = N. colusana.

DEANEA, Coult. & Rose (Umbell.).
diffusa, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 155.—Am. cent.
glauca, *Coult. & Rose, l. c.* 156.—Am. cent.
longibracteata, *Coult. & Rose, l. c.* 154.—Am. cent.
montana, *Coult. & Rose, l. c.* 155.—Am. cent.
Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.

DEBREGEASIA, Gaudich. (Urtic.).
obovata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 492.—China.
rhodopleura, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 380 (= *Villebrunea rhodopleura*).—N. Guin.

DECANEURUM, DC. = **Centratherum**, Cass. (Compos.).
platylepis, Boivin, ex Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 236 = Vernonia platylepis.

DECASPERMUM, Forst. (Myrtac.).
neurophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 468.—N. Guin.
pyrifolium, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 40 (= *Nelitris pyrifolia*).—Java.

DECASTELMA, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 264 (1898). *ASCLEPIADACEAE.*
Broadwayi, *Schlechter, l. c.* 265.—Ind. occ.

DEHAASIA, Blume (Laurac.).
borneensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 136 (= *Haasia borneensis*).—Borneo.
cyrtopoda, *Boerl. l. c.* (= *Haasia cyrtopoda*).—Sumatra.
spectabilis, *Boerl. l. c.* (= *Haasia spectabilis*).—Sumatra.

DEIANIRA, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
cyathifolia, *Barb. Rodr. Plant. Mattogross.* 32.—Bras.

DEIDAMIA, Noronha (Passifl.).
clematoides, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 254 = Efulensia clematoides.

DEINACANTHON, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. (1896) 12 = **Rhodostachys**, Phil. (Bromel.).
urbanianum, Mez, l. c. 13 = R. urbaniana.

DEINANDRA, Greene, Fl. Francisc. 424 (1897) = **Hemizonia**, DC. (Compos.).
fasciculata, Greene, l. c. = H. fasciculata.

DEINANDRA :—
Heermanni, Greene, Fl. Francisc. 425 = H. Heermanni.
Kelloggii, Greene, l. c. 424 = H. Kelloggii.
Lobbii, Greene, l. c. 425 = H. Lobbii.
virgata, Greene, l. c. = H. virgata.
Wrightii, Greene, l. c. 424 = H. Wrightii.

DEINBOLLIA, Schum. & Thonn. (Sapind.).
brachybotrys, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 295.—Afr. trop.
Elliotii, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
hierniana, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
leptophylla, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 298, nomen.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
stenobotrys, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 297.—Afr. trop.
unguiculata, *Gilg, l. c.* 296.—Afr. trop.

DELAMEREA, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 457. *COMPOSITAE.*
procumbens, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

DELARBREA, Vieill. (Aral.).
Lauterbachii, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 485.—N. Guin.

DELPHINIUM, Tourn. (Ranunc.).
albescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 583.—Am. bor.
cognatum, *Greene, Pittonia*, iii. 14.—Am. bor.
cucullatum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 262.—Am. bor.
densiflorum, *Duthie, ex Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 102.—Ind. or.
dinaricum, *Fritsch, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 239.—Eur.
diversifolium, *Greene, Pittonia*, iii. 93.—Am. bor.
exiguum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 327.—China.
foetidum, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 285.—Reg. Caucas.
geraniifolium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 583.—Am. bor.
glareosum, *Greene, Pittonia*, iii. 257.—Am. bor.
glaucescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 155.—Am. bor.
gracilentum, *Greene, Pittonia*, iii. 15.—Am. bor.
Hanseni, *Greene, l. c.* 94.—Am. bor.
Karategini, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 402.—Turkestan.
Lipskii, *Korsh. l. c.* 403.—Turkestan.
macroseratilis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 585.—Am. bor.
midzorense, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 20.—Eur.
Nelsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 92.—Am. bor.
oreganum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 22.—Am. bor.
pachycentrum, *Hemsl. ex Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 107.—As. or.
Purpusi, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 444.—Am. cent.
Sonnei, *Greene, Pittonia*, iii. 246.—Am. bor.
Stapeliosmum, *Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 102.—Ind. or.
strictum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 263.—Am. bor.
subalpinum, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.
Treleasei, *Bush, in Minnes. Bot. Studies*, ii. 444.—Am. bor.
turkmenum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 2.—As. cent.
viridescens, *Leiberg, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xi. 39.—Am. bor.
willametense, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 210.—Am. bor.
Wootoni, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 587.—Am. bor.

DELPHYODON, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. Beibl. lix. (1898) 31. *APOCYNACEAE.*
oliganthus, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.

DELPINOA, H. Ross, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 1898, 116. *AMARYLLIDACEAE.*
gracillima, *H. Ross, l. c.* 117.—Am. bor.

DELPYDORA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1275. *SAPOTACEAE.*
macrophylla, *Pierre, l. c.* 1277.—Afr. trop.

DEMAZERIA, Dum. (Gramin.).
acutiflora, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 900 = Brizopyrum acutiflorum.
alternans, Th. Dur. & Schinz, l. c. = Brizopyrum alternans.
oblitera, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. II. 90 = Brizopyrum obliterum.
Uniolae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 349 (= *Poa Uniolae*).—Bras.

DEMEUSEA, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. (1900) 77. *AMARYLLIDACEAE.*
longifolia, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 78.—Afr. trop.

DENDROBANGIA, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. (1896) 19. *OLACACEAE.*
boliviana, *Rusby, l. c.*—Bolivia.

DENDROBIUM, Sw. (Orchid.).
abietinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 252.—Penins. Mal.
Aegle, *Ridley, l. c.* 260.—Penins. Mal.
albicolor, *Ridley, l. c.* 250.—Penins. Mal.
Anthrene, *Ridley, l. c.* xxxi. 272.—Borneo.
Armitiae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 48.—N. Guin.
atrorubens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 247.—Penins. Mal.
barbatum, *Cogn. in Gard. Chron.* 1897, II. 394.—Ind. or.
brevicaule, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 110.—N. Guin.
breviracemosum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 158.—N. Guin.
callibotrys, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 258.—Penins. Mal.
chordiforme, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 246, nomen.—N. Guin.
Clavator, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 255.—Penins. Mal.
cochinchinense, *Ridley, l. c.* 244.—Penins. Mal.
coeleste, *Loher, in Gard. Chron.* 1897, II. 1.—Ins. Philipp.
coespitosum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 332.—Reg. Himal.
cymbiforme, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 192.—Sumatra.
Dixsoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Bot. Bull. Dept. Agric.* xiii. 33.—N. Guin.
Eoum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 261.—Siam.
flexile, *Ridley, l. c.* 251.—Penins. Mal.
Foxii, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 70.—Malaya.
fragrans, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7525 = sarmentosum.
Gamblei, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 584.—Ind. or.
Giulianettii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 158.—N. Guin.
hainanense, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—China.
hirtulum, *Rolfe, l. c.* 1898, 193.—Burma?
Hodgkinsoni, *Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7724.—N. Guin.
inaequale, *Rolfe, l. c.* t. 7745.—N. Guin.
inconcinnum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 255.—Penins. Mal.
jennyanum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 329.—Hab.?
Keithii, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 247.—Penins. Mal.
Kelsalli, *Ridley, l. c.* 237.—Penins. Mal.
laciniosum, *Ridley, l. c.* 242.—Penins. Mal.
Mannii, *Ridley, l. c.* 246.—Penins. Mal.
modestum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 211.—Malaya.
ovatifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 271.—Borneo.
pallens, *Ridley, l. c.* xxxii. 241.—Penins. Mal.
pallidiflorum, *Ridley, l. c.* 240.—Penins. Mal.
pandaneti, *Ridley, l. c.* 257.—Penins. Mal.
paniculatum, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 97 = Polystachya paniculata.
papilio, *Loher, in Gard. Chron.* 1897, I. 416.—Ins. Philipp.
parvulum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 127.—Celebes.
pauciflorum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 332.—Reg. Himal.
pensile, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 253.—Penins. Mal.
pinifolium, *Ridley, l. c.* xxxi. 269.—Borneo.
prostratum, *Ridley, l. c.* xxxii. 248.—Penins. Mal.

DENDROBIUM:—
pumilum, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 97 = Polystachya bulbophylloides.
quadrilobum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 44.—N. Guin.
Rhizophoreti, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 245.—Penins. Mal.
rigidifolium, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 110.—N. Guin.
ritaeanum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 583.—Reg. Himal.
roseatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 261.—Penins. Mal.
rosellum, *Ridley, l. c.* xxxi. 268.—Borneo.
roseopunctatum, *Ridley, l. c.* xxxii. 240.—Penins. Mal.
roseum, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 97 = Polystachya elastica.
schimperianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 282 = Angraecum schimperianum.
schwartzkopffianum, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 106.—N. Brit.
setifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 270.—Borneo.
sordidum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 583.—Reg. Himal.
tigrinum, Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot. v. 507 = spectabile.
trinervium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 242.—Penins. Mal.
triviale, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxv. 604.—Ins. Samoa.
Victoriae-reginae, *Loher, in Gard. Chron.* 1897, I. 399.—Ins. Philipp.
virescens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 259.—Penins. Mal.
viridiflorum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 285.—N. Guin.
viridulum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 259.—Penins. Mal.
yunnanense, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 419.—China.

DENDROCALAMUS, Nees (Gramin.).
Brandisii, *Kurz, For. Fl. Brit. Burma*, ii. 560.—Ind. or.
collettianus, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 93.—Ind. or.
criticus, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 559 = Bambusa pallida.
griffithianus, Kurz, l. c. 562 = Bambusa griffithiana.
latifolius, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 188.—N. Guin.
longifimbriatus, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 92.—Ind. or.
multispiculatus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 187.—N. Guin.
patellaris, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 86.—Ind. or.

DENDROCHILUM, Blume (Orchid.).
album, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 287.—Penins. Mal.
crassum, *Ridley, l. c.* 288.—Penins. Mal.

DENDROCOLLA, Blume = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).
carinatifolia, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 382 = S. carinatifolia.
carnosa, Ridley, in Journ. Bot. 1898, 216 = S. carnosus.
filiformis, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 382 = S. filiformis.
fulgens, Ridley, l. c. 383.—Hab.?
fusca, Ridley, l. c. xxxi. 296.—Borneo.
maculata, Ridley, l. c. xxxii. 381.—Penins. Mal.
merguensis, Ridley, l. c. 380 = S. merguensis.
pardalis, Ridley, l. c. 382 = S. pardalis.
pungionifolia, Ridley, l. c. 380 = S. pungionifolius.
Trichoglottis, Ridley, l. c. 381 = S. Trichoglottis.

DENDROPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).
cuneifolium, Seem. in Journ. Bot. 1868, 140 = Hedera cuneifolia.
Listeri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 294.—Ind. or.
Maingayi, *King, l. c.* 58.—Malaya.
samydifolium, Seem. in Journ. Bot. 1868, 140 = Sciadophyllum samydifolium.

DENDROPEMON, Blume = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
bicolor, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 24.—Ind. occ.
caribaeus, Krug & Urb. l. c. 27.—Ind. occ.
Constantiae, Krug & Urb. l. c. 20.—Ind. occ.
montanus, Krug & Urb. l. c. 23.—Ind. occ.

DENDROPEMON:—
Picardae, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 20.—Ind. occ.
purpureus, Krug & Urb. l. c. 26 (= *Loranthus psilobotrys*).—Ind. occ.
pycnophyllus, Krug & Urb. l. c. 19.—Ind. occ.
Sintenisii, Krug & Urb. l. c. 25.—Ind. occ.

DENDROPHTHORA, Eichl. (Loranth.).
chrysostachya, *Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Phoradendron chrysostachyum*).—Peruv.
clavata, *Urb. l. c.* (= *Viscum clavatum*).—Am. trop.
confertiflora, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.*—Ind. occ.
costaricensis, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
crassuloides, *Urb. l. c.* (= *Phoradendron crassuloides*).—Am. trop.
Danceri, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 284 (= *Distichella Danceri*).—Ind. occ.
eichleriana, *Urb. l. c.* 287.—Venez.
elliptica, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 285 (= *Phoradendron ellipticum*).—Am. trop.
flagelliformis, *Krug & Urb. l. c.* 287 (= *Viscum flagelliforme*).—Ind. occ.
gracilis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 141 = pendula.
hexasticha, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 181 (= *Phoradendron hexastichon*).—Am. trop.
lindeniana, *Van Tiegh. l. c.* 182.—N. Granat.
mesembrianthemifolia, *Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Phoradendron mesembryanthemifolium*).—N. Granat.
oocarpa, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 291.—Ind. occ.
Pavoni, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 182.—Peruv.
pedicellata, *Van Tiegh. l. c.*—Mexic.
pendula, *Krug & Urb. ex Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 290.—Ind. occ.
Poeppigii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 182.—Bras.
portulacoides, *Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Viscum portulacoides*).—Ecuador.
purpurascens, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 57.—Ind. occ.
serpyllifolia, *Krug & Urb. ex Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 287 (= *Phoradendron serpyllifolium*).—Ind. occ.
sessilifolia, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 285 (= *Phoradendron sessilifolium*).—Ind. occ.
subtrinervis, *Urb. l. c.*—Bolivia.

DENDROSERIS, D. Don (Compos.).
gigantea, *Johow, Fl. Juan Fernandez*, 69.—Ins. Juan Fernandez.

DENISAEA, Neck. = **Phryma**, Linn. (Verben.).
dehiscens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 250 = P. dehiscens.
prismatica, Kuntze, l. c. 254 = Bouchea Ehrenbergii.

DENTARIA, Tourn. = **Cardamine**, Linn. (Crucif.).
appendiculata, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 51 = C. appendiculata.
corymbosa, Matsum. l. c. 52.—Japon.
cuneata, Greene, Pittonia, iii. 123 = C. cuneata.
Douglassii, Greene, l. c. 124 = C. Douglasii.
gemmata, Howell, Fl. N. W. Amer. 49 = C. gemmata.
petersiana, Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 275.—Hab.?
pulcherrima, Greene, Pittonia, iii. 123 = C. pulcherrima.
quercetorum, Greene, l. c. = C. quercetorum.
rhomboidea, Greene, l. c. 124 = C. rhomboidea.
rotundifolia, Greene, l. c. = C. rotundifolia.
sinuata, Greene, l. c. 123 = C. sinuata.

DEROEMERIA, Reichb. f. (Orchid.).
montigena, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 196.—Afr. trop.
Schimperi, *Rolfe, l. c.* 197.—Afr. trop.
squamata, *Reichb. f. Poll. Orch. Comm.* 29.—Afr. trop.
triloba, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 197.—Afr. trop.

DERRIS, Lour. (Legum.).
andamanica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 104.—Ins. Andaman.
latifolia, *Prain, l. c.* lxvii. 288.—Ind. or.
leptorhachis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. trop.
malaccensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 107.—Penins. Mal.
oligosperma, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 361.—N. Guin.
rufula, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

DERRIS:—
sinuata, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. 311 = andamanica.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 408 (= *Deguelia Stuhlmannii*).—Afr. trop.
Wallichii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 99 = Pterocarpus floribundus.

DESCHAMPSIA, Beauv. (Gramin.).
brachyphylla, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 23.—Chili.
fuegina, *R. Phil. l. c.*—Fuegia.
Martini, *R. Phil. l. c.* 24.—Chili.
micrantha, *R. Phil. l. c.*—Chili.
tenella, *R. Phil. l. c.* 25.—Chili.

DESCURAINIA, Webb & Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).
erodiifolia, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 362 = S. erodiifolium.

DESMANTHODIUM, Benth. (Compos.).
lanceolatum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 576.—Am. cent.

DESMANTHUS, Willd. (Legum.).
Campenoni, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1301.—Madag.
greveanus, *Drake, l. c.*—Madag.

DESMAZERIA, Dum. = **Demazeria**, Dum. (Gramin.).
composita, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 27.—Afr. austr.
unioloides, Deflers, Voy. Yemen, 220 = Halopyrum mucronatum.

DESMOCHAETA, DC. (Amarant.).
distorta, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 891.—Afr. trop.
uncinulata, Hiern, l. c. 890 (= *Achyranthes uncinulata*).—Afr. trop.

DESMODIUM, Desv. (Legum.).
ancistrotrichum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 358.—N. Guin.
insigne, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 398.—Ind. or.
khasianum, *Prain, l. c.* 395.—Ind. or.
kingianum, *Prain, l. c.* 398.—Ind. or.
kulhaitense, *C. B. Clarke, ex Prain, l. c.* 395.—Ind. or.
megalanthum, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 192.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 431, nomen.—Malaya.
olivaceum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 389.—Ind. or.
rugosum, *Prain, l. c.* 137.—Penins. Mal.
Tashiroi, *Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 415.—Ins. Luchu.
tenuiflorum, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 59.—Afr. trop.
Wallichii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 388.—Ind. or.
wydlerianum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 302.—Ind. occ.

DESMOGYNE, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. (1898) 297. *VACCINIACEAE.*
neriifolia, *King & Prain, l. c.*—Ind. or.

DESMONCUS, Mart. (Palm.).
cuyabaensis, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 30.—Bras.
prostratus, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 5, 8.—Bras.

DESMONEMA, Miers (Menisperm.).
mucronulatum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 409.—Afr. trop.
oblongifolium, *Engl. l. c.* 408.—Afr. trop.

DESMOSTACHYA, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 632 (1900). *GRAMINEAE.*
bipinnata, *Stapf, l. c.*—As. et Afr. trop.

DETRIS, Adans. = **Felicia**, Cass. (Compos.).
ericifolia, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 545 = F. Schimperi.
hyssopifolia, Hiern, l. c. 547 = F. angustifolia.
mossamedensis, Hiern, l. c. 546.—Afr. trop.
smaragdina, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 370.—Afr. trop.

DEUTEROCOHNIA, Mez (Bromel.).
meziana, *Kuntze, ex Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 465.—Bras.

DEUTZIA, Thunb. (Saxifr.).
baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 372.—China.
corymbiflora, *Lemoine, in Rev. Hort.* 1898, 401.—China.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 281.—China.
setchuenensis, *Franch. l. c.* 282.—China.

DEVERRA, DC. = **Pituranthos**, Viv. (Umbellif.).
aphylla, DC. Prod. iv. 143 = P. aphylla.

DEVILLEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 380 (1900) = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).
pyrenaea, Bub. l. c. = L. pyrenaeum.

DEWEVREA, Micheli, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. (1898) 47. *LEGUMINOSAE.*
bilabiata, *Micheli, l. c.* 48.—Afr. trop.

DEYEUXIA, Clar. (Gramin.).
abnormis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 268.—Ind. or.
amoena, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 28.—Bolivia.
araeantha, *Pilg. l. c.* xxv. 711.—N. Granat.
bogotensis, *Pilg. l. c.* 712.—N. Granat.
elatior, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 266.—Ind. or.
filiformis, *Hook. f. l. c.* 268.—Ind. or.
freticola, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 87.—Reg. Magell.
Griffithii, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 263 = Calamagrostis griffithiana.
leptostachya, *T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 586.—N. Zel.
macrophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 711.—Ecuador.
nemoralis, Phil. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 344 = Calamagrostis nemoralis.
nivicola, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 267.—Ind. or.
nuda, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 29.—N. Granat.
pubescens, *Pilg. l. c.* xxv. 712.—N. Granat.
pulchella, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 268.—Ind. or.
sclerophylla, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2605.—N. Guin.
secunda, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 712.—Ecuador.
Stuebelii, *Pilg. l. c.* 713.—Ecuador.
triaristata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 266.—Ind. or.

DIALIUM, Linn. (Legum.).
ambiguum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 172.—Penins. Mal.
cochinchinense, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 384 A.—Cochinch.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 275.—Afr. trop.
englerianum, *Henriques, in Bol. Soc. Brot.* 1899, 48.—Afr. trop.
Kingii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 175.—Penins. Mal.
Kunstleri, *Prain, l. c.* 168.—Penins. Mal.
Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 276.—Afr. trop.
Staudtii, *Harms, l. c.* 275.—Afr. trop.
Wallichii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 174.—Penins. Mal.

DIALYANTHERA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 126. *MYRISTICACEAE.*
gordoniifolia, *Warb. l. c.* 153 (= *Myristica gordoniaefolia*).—Peruv.
Otoba, *Warb. l. c.* 149 (= *M. Otoba*).—Am. austr.

DIANTHERA, Gronov. (Acanth.).
celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 164.—Celebes.
flava, Vahl, Symb. i. 5 = Justicia flava.

DIANTHUS, Linn. (Caryophyll.).
brachyzonus, *Borb. & Form. ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 194.—Eur.
chalcidicus, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 707.—Eur.
Degenii, *Baldacci, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. vi. 27.—Eur.
epirotus, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 708.—Eur.
exilis, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 452.—Eur.
fallacinus, *Rouy & Foucaud, Fl. Fr.* iii. 190.—Eur.
glanduloso-pubescens, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 706.—Eur.
lateritius, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 213.—Eur.

DIANTHUS:—
namaensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 84.—Afr. austr.
pindicola, *Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1897, 31.—Eur.
pseudo-Grisebachii, *Grecescu, Consp. Fl. Roman.* 100.—Eur.
Samaritani, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 213.—Eur.
serenaeus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 53.—Eur.
Sibthorpii, *Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1897, 33.—Eur.
szechuensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 428.—China.
ventricosus, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 204.—Eur.

DIAPEDIUM, Koen. = **Dicliptera**, Juss. (Acanth.).
cochabambense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 248 = D. cochabambensis.
falciflorum, Kuntze, l. c. = D. falcifolia.
multicaule, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 105.—Bolivia.
niederleinianum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 248 = D. niederleiniana.
scutellatum, Kuntze, l. c. = D. scutellata.
Torreyi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = D. Torreyi.

DIASCIA, Link & Otto (Scrophul.).
Engleri, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 471.—Afr. austr.
gracilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 177.—Afr. austr.
nana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 472.—Afr. austr.
nutans, *Diels, l. c.*—Afr. austr.
Pentheri, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 431.—Afr. austr.
veronicoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 178.—Afr. austr.

DIASPERUS, Linn. = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
cordobensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 285.—Reg. Argent.
humilis, Kuntze, l. c. = P. humilis.

DIASTEMA, Benth. (Gesner.).
latiflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 96.—Bolivia.
purpurascens, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 28.—Am. austr.

DIASTEMANTHE, Steud. = **Stenotaphrum**, Trin. (Gramin.).
platystachys, Steud. Syn. Pl. Gram. 360 = S. glabrum.

DICELLANDRA, Hook. f. (Melastom.).
liberica, Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl. ii. 33 = Phaeoneuron setosum.
setosa, Hook. f. in Oliv. Fl. Trop. Afr. ii. 459 = Phaeoneuron setosum.

DICHAELIA, Harv. = **Brachystelma**, R. Br. (Asclep.).
circinnata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 13 = B. circinnatum.

DICHAETARIA, Nees, in Steud. Syn. Pl. Gram. 145. *GRAMINEAE.*
Wightii, *Nees, l. c.*—Ind. or.

DICHAPETALUM, Thou. = **Chailletia**, DC. (Chaillet.).
acutifolium, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 348; et in Engl. Jahrb. xxiii. 136.—Afr. trop.
acutisepalum, Engl. l. c. 349; l. c. 140.—Afr. trop.
adnatiflorum, Engl. l. c. 350; l. c. 142.—Afr. trop.
andamanicum, Engl. l. c. 348 = C. andamanica.
Bangii, Engl. l. c. 349 = C. Bangii.
Barteri, Engl. l. c. 348; l. c. 134.—Afr. trop.
benthamianum, Engl. l. c. 348 = C. benthamiana.
benthamianum, Engl. l. c. 349 = C. Benthamii.
bocageanum, Engl. l. c. 349 = C. bocageana.
Bojeri, Engl. l. c. 348 = C. Bojeri.
chlorinum, Engl. l. c. 348 = C. chlorina.
cubense, Engl. l. c. 349 = C. cubensis.
cuneifolium, Engl. l. c. 349; l. c. 141.—Afr. trop.
cymosum, Engl. l. c. 349 = C. cymosa.
cymulosum, Engl. l. c. 349 = C. cymulosa.
discolor, Engl. l. c. 348 = C. discolor.
Donnell-Smithii, Engl. l. c. 349; l. c. 144.—Guatem.
Dusenii, Engl. l. c. 348; l. c. 135.—Afr. trop.

DICHAPETALUM:—
ferrugineo-tomentosum, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 139.—Afr. trop.
ferrugineum, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 349; et in Engl. Jahrb. xxiii. 139.—Afr. trop.
flavicans, Engl. l. c. 349; l. c. 145 = C. flavicans.
flexuosum, Engl. l. c. 349 = C. flexuosa.
floribundum, Engl. l. c. 348 = C. floribunda.
fructuosum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 138.—Afr. trop.
gabonense, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 348; et in Engl. Jahrb. xxiii. 137.—Afr. trop.
gelonioides, Engl. l. c. 348 = C. gelonioides.
Griffithii, Engl. l. c. 348 = C. Griffithii.
hainanense, Engl. l. c. 348 = C. hainanensis.
Heudelotii, Engl. l. c. 349 = C. Heudelotii.
hirtellum, Engl. l. c. 348 = C. hirtella.
hypoleucum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 138.—Afr. trop.
Johnstonii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 349; et in Engl. Jahrb. xxiii. 141.—Afr. trop.
kamerunense, Engl. l. c. 350; l. c. 142.—Afr. trop.
Laurocerasus, Engl. l. c. 348 = C. Laurocerasus.
Leucosia, Engl. l. c. 348 = C. Leucosia.
Lujaei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 55.—Afr. trop.
macrophyllum, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 349 = C. macrophylla.
malaccense, Engl. l. c. 348; et in Engl. Jahrb. xxiii. 143.—Ind. or.
mombuttense, Engl. l. c. 348; l. c. 135.—Afr. trop.
mundense, Engl. l. c. 348; l. c. 134.—Afr. trop.
nigrescens, Engl. l. c. 348 = C. nigrescens.
oblongum, Engl. l. c. 349 = C. oblonga.
Pachypus, Engl. l. c. 348 = C. Pachypus.
pallidum, Engl. l. c. 349 = C. pallida.
papuanum, Engl. l. c. 348 = C. papuana.
parvifolium, Engl. l. c. 348; l. c. 136.—Afr. trop.
Poggei, Engl. l. c. 349; l. c. 141.—Afr. trop.
retroversum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 139.—Afr. trop.
rufipile, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 349 = C. rufipilis.
rufo-tomentosum, Engl. l. c. 349.—Afr. trop.
rufum, Engl. l. c. 348 = C. rufa.
Schweinfurthii, Engl. l. c. 349; et in Engl. Jahrb. xxiii. 140.—Afr. trop.
Soyauxii, Engl. l. c. 348; l. c. 137.—Afr. trop.
Staudtii, Engl. l. c. 349; l. c. 139.—Afr. trop.
Stuhlmannii, Engl. l. c. 348.—Afr. trop.
subauriculatum, Engl. l. c. 349 = C. subauriculata.
subcordatum, Engl. l. c. 349 = C. subcordata.
tenuifolium, Engl. l. c. 348 = C. tenuifolia.
Thomsonii, Engl. l. c. 349 = C. Thomsonii.
timoriense, Engl. l. c. 348 = C. timoriensis.
tomentosum, Engl. l. c. 349; l. c. 138.—Afr. trop.
tonkinense, Engl. l. c. 348; l. c. 143.—Cochinch.
Virchowii, Engl. l. c. 348 = C. Virchowii.
vitiense, Engl. l. c. 348 = C. vitiensis.
Zenkeri, Engl. l. c. 349; l. c. 138.—Afr. trop.

DICHAZOTHECE, Lindau, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. (1898) 47. *ACANTHACEAE.*
cylindracea, *Lindau, l. c.*—Bras.

DICHOSTEMMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1259. *EUPHORBIACEAE.*
glaucescens, *Pierre, l. c.* 1260.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 25.—Afr. trop.

DICHOTRICHUM, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 174, sphalm. = **Dichrotrichum**, Reinw. (Gesnerac.).

DICHROMENA, Michx. (Cyperac.).
filiformis, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 102.—Ind. occ.
Grisebachii, *C. B. Clarke, l. c.*—Ind. occ.
hispidula, Kunth, Enum. Pl. ii. 279 = Rynchospora trichodes.
longa, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 23.—Bras.
pusilla, Kunth, Enum. Pl. ii. 275 = Rynchospora Berterii.
seslerioides, *Benth. ex C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 100.—Ind. occ.

DICHROTRICHUM, Reinw. (Gesnerac.).
papuanum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 174.—N. Guin.

DICLIPTERA, Juss. (Acanth.).
aculeata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 257.—Afr. trop.
colorata, *C. B. Clarke, l. c.* 260.—Afr. trop.
Elliotii, *C. B. Clarke, l. c.* 258.—Afr. trop.
iopus, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 305.—Am. cent.
laxata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 258.—Afr. trop.
laxispica, *Lindau, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 316, nomen.—Afr. trop.
lingulata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 257.—Afr. trop.
nilotica, *C. B. Clarke, l. c.* 260.—Afr. trop.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 302.—Mexic.
schumanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxxi. 204 = Megalochlamys Marlothii.
sciadephora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
Sumichrasti, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 665.—Mexic.

DICLIS, Benth. (Scrophul.).
sessilifolia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 473.—Afr. trop.
tenella, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 163.—Afr. trop.

DICOMA, Cass. (Compos.).
megacephala, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
nana, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 614.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
ramosissima, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 843.—Afr. trop.
somalense, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 60.—Afr. trop.

DICORIA, Torr. & Gray (Compos.).
paniculata, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 298.—Am. bor.

DICRANOLEPIS, Planch. (Thymel.).
baertsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 54.—Afr. trop.
laciniata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 204.—Afr. trop.
Persei, *Cummins, in Kew Bull.* 1898, 78.—Afr. trop.
polygaloides, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.
pulcherrima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 203.—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 114.—Afr. trop.

DICRASTYLIS, Drum. (Verben.).
Carnegiei, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2582.—Austral.

DICRAURUS, Hook. f. (Amarant.).
alternifolia, Uline & W. Bray, in Coult. Bot. Gaz. xxi. 355 = Iresine alternifolia.

DICTYOCHLOA, Camus, in Compt. Rend. Intern. Congr. Bot. 1900, 344. *GRAMINEAE.*
involucrata, *Camus, l. c.* (= *Ammochloa involucrata*).—Afr. bor.

DICTYONEURA, Blume = **Cupania**, Linn. (Sapind.).
Bamleri, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 421.—N. Guin.

DICTYOPHLEBA, Pierre, in Bull. Soc. Lin. Par. n. s. i. (1898) 92. *APOCYNACEAE.*
lucida, *Pierre, l. c.* 93 (= *Landolphia lucida*).—Afr. trop.

DIDESMANDRA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2646 (1900). *DILLENIACEAE.*
aspera, *Stapf, l. c.*—Borneo.

DIDICIEA, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxv. (1896) 118. *ORCHIDEAE.*
Cunninghami, *King & Prain, l. c.* 119.—Ind. or.

DIDISSANDRA, C. B. Clarke (Cyrtandr.).
atropurpurea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 504.—Penins. Mal.
Clarkei, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 551.—Celebes.
Delavayi, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 250.—China.
Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 123.—China.

DIDISSANDRA:—
flammea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 503.—Penins. Mal.
latisepala, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
Morgani, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 124.—China.
plicata, *Franch. l. c.* 123.—China.
quercifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 504.—Penins. Mal.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 574.—China.

DIDYMOCARPUS, Wall. (Gesner.).
ascendens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 512.—Penins. Mal.
Brownei, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 551, 628.—Celebes.
caerulea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 513.—Penins. Mal.
citrina, *Ridley, l. c.* 508.—Penins. Mal.
crenata, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.
cyaneus, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 68.—Malaya.
dentata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 515.—Penins. Mal.
elatior, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 299.—Ind. or.
flava, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 507.—Penins. Mal.
hispida, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
inaequalis, *Ridley, l. c.* 506.—Penins. Mal.
laxa, *Ridley, l. c.* 510.—Penins. Mal.
puncticulata, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
purpurea, *Ridley, l. c.* 508.—Penins. Mal.
regularis, *Ridley, l. c.* 515.—Penins. Mal.
sericea, *Ridley, l. c.* 513.—Penins. Mal.
violacea, *Ridley, l. c.* 509.—Penins. Mal.

DIDYMOPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).
Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 115.—Bolivia.
micans, Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 204 = Panax splendens.
tremulum, *Krug & Urb. l. c.* 206.—Ind. occ.

DIDYMOPLEXIS, Griff. (Orchid.).
cornuta, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 1.—Java.
minor, *J. J. Sm. l. c.*—Java.

DIDYMOSPERMA, H. Wendl. & Drude (Palm.).
humile, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 204.—N. Guin.
microcarpa, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c. = Arenga microcarpa.

DIEFFENBACHIA, Schott (Arac.).
aurantiaca, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 566.—Am. cent.

DIERAMA, C. Koch (Irid.).
cupuliflorum, Klatt, in Decken, Reisen Ost-Afrika, iii. 73, t. 3 = pendulum.
ensifolium, C. Koch & Bouché, in Walp. Ann. vi. 43 = pendulum.
pendulum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. 99.—Afr. trop.

DIERBACHIA, Spreng. (Solan.).
australis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 220 = Iochroma australe.
breviflora, Kuntze, l. c. = Acnistus breviflorus.
obovata, Kuntze, l. c. = Lycium obovatum.
parviflora, Kuntze, l. c. 221 = Acnistus parviflorus.

DIGITARIA, Heist. (Gramin.).
aegyptiaca, Willd. Enum. Hort. Berol. 93 = sanguinalis.
affinis, Roem. & Schult. Syst. ii. 470 = Panicum paspaloides.
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 165.—Afr. trop.
argyrograpta, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 374.—Afr. austr.
barbata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 91.—Penins. Mal.
biformis, Willd. l. c. 92 = sanguinalis.
ciliaris, Pers. Syn. i. 85 = sanguinalis.
commutata, Schult. Mant. ii. 262 = sanguinalis.
conjugata, Schult. l. c. = Paspalum conjugatum.
cruciata, Nees, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 14 = sanguinalis.
cuspidata, Schult. Mant. ii. 265 = Panicum colonum.
debilis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 91.—Reg. Medit.; Afr.
decipiens, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xiv. 359 = debilis.

DIGITARIA:—
diagonalis, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 381.—Afr. trop. et austr.
didactyla, Willd. Enum. Hort. Berol. 91 = sanguinalis.
disticha, *Fiori & Paolletti, Fl. Ital.* i. 50 (= *Paspalum distichum*).—Reg. trop. et subtrop.
diversinervis, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 379.—Afr. austr.
elongata, Spreng. Syst. i. 271 = Chloris incompleta.
elytroblephara, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 439 = barbata.
eriantha, *Steud. in Flora*, xii. (1829) 468.—Oriens; Afr.
eriogona, Link, Hort. Berol. i. 227 = sanguinalis.
fenestrata, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 163.—Afr. trop.
filiformis, Koel. Desc. Gram. 26 = glabra.
flaccida, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 382.—Afr. austr.
glabra, *Beauv. Agrost.* 51.—Reg. bor. temp. et trop.
horizontalis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 92.—Afr. trop. et austr.; Am. trop.
humifusa, Pers. Syn. i. 85 = glabra.
linearis, Rostaf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxii. 99 = glabra.
longiflora, *Pers. Syn.* i. 85.—Geront. trop.
marginata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 102 = sanguinalis.
mauritiana, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 35 = Panicum muticum.
moninensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 164.—Afr. trop.
monodactyla, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 373.—Afr. austr.
nervosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 473 = sanguinalis.
nitens, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 165.—Afr. trop.
procumbens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 508 = glabra.
pruriens, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 379 = sanguinalis.
pseudo-Durva, Nees, ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. 458 = tenuiflora.
puberula, *Link, Hort. Berol.* i. 223.—Geront. trop.
radiata, Spreng. Syst. i. 272 = Cynodon Dactylon.
radicosa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 437 = sanguinalis.
repens, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. i. 84 = sanguinalis.
Rottleri, Roem. & Schult. Syst. ii. 471 = sanguinalis.
Roxburghii, Spreng. Syst. i. 270 = tenuiflora.
sanguinalis, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 52.—Cosmop.
sanguinea, Weber, in Wigg. Prim. Fl. Holsat. 6 = sanguinalis.
sanguinolenta, Edgew. ex Aitch. Cat. Punjab Pl. 161 = sanguinalis.
setifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 376.—Afr. austr.
setigera, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 474 = sanguinalis.
setosa, Hamilt. Prod. Veg. Ind. Occ. 6 = horizontalis.
tenuiflora, *Beauv. Agrost.* 51.—Afr. austr.; Geront. trop.
ternata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 376.—Afr. austr.
tricholaenoides, *Stapf, l. c.* 381.—Afr. austr.

DIGLYPHOSA, Blume = **Chrysoglossum**, Blume (Orchid.).
macrophylla, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 98 = C. macrophyllum.

DIGRAPHIS, Trin. = **Phalaris**, Linn. (Gramin.).
americana, Loud. Hort. Brit. 27 = P. arundinacea.

DILLENIA, Linn. (Dillen.).
pedunculata, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 445.—N. Guin.

DILLWYNIA, Sm. (Legum.).
acerosa, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 187.—Austral.

DILOCHIA, Lindl. = **Arundina**, Blume (Orchid.).
Cantleyi, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 332 = A. Cantleyi.

DILOPHIA, T. Thoms. (Crucif.).
Dutreuili, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 321.—Tibet.

DIMERIA, R. Br. (Gramin.).
alata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 105.—Ind. or.
chloridiformis, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 165 = pilosissima.
Kurzii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 103.—Ind. or.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 198.—Zeylan.

DIMEROCOSTUS, Kuntze (Scitamin.).
Guttierezii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 301.—Bolivia.

DIMORPHOCHLAMYS, Hook. f. (Cucurb.).
Cabraei, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 24.—Afr. trop.
crepiniana, *Cogn. l. c.* 25.—Afr. trop.

DIMORPHOSTACHYS, Fourn. (Gramin.).
Schaffneri, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 499 = Paspalum Schaffneri.

DIMORPHOTHECA, Vaill. (Compos.).
spectabilis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 220.—Afr. austr.

DINACRIA, Harv. (Crassul.).
grammanthoides, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 859.—Afr. austr.

DINKLAGEA, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1897) 242. *CONNARACEAE.*
macrantha, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

DINOCHLOA, Buese (Gramin.).
andamanica, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. II. 253 = D. Tjankorreh.

DINOPHORA, Benth. (Melastom.).
Thonneri, *Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 114.—Afr. trop.

DINTERA, Stapf, in Mém. Herb. Boiss. no. 20. (1900) 27. *SCROPHULARIACEAE.*
pterocaulis, *Stapf, l. c.* 29.—Afr. trop.

DIOCLEA, H. B. & K. (Legum.).
pauciflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 25.—Bolivia.

DIODIA, Gronov. (Rubiac.).
benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 502.—Afr. trop.
flavescens, *Hiern, l. c.* 501.—Afr. trop.
paludosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 118.—Parag.

DIOLENA, Naud. (Melastom.).
boliviensis, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 277.—Bolivia.

DIONYSIA, Fenzl (Primul.).
heterochroa, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 72.—Persia.
hissarica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 83.—As. cent.
janthina, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 70.—Persia.
oreodoxa, *Bornm. l. c.* 68.—Persia.
Sintenisii, *Stapf, ex Bornm. l. c. in nota.*—Mesopot.

DIOSCOREA, Plum. (Dioscor.).
acerifolia, *Uline, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
acerifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 15.—Chili.
adenantha, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bras.
albicaulis, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 425.—Am. cent.
andina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 16.—Chili.
andongensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 37.—Afr. trop.
angustiflora, *Rendle, l. c.* 39.—Afr. trop.
astrostigma, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 431.—Am. cent.
axilliflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 11.—Chili.
brachystachya, *R. Phil. l. c.* 7.—Chili.
Brownii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 11.—Afr. austr.
ceratandra, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bras.
cissophylla, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 18.—Chili.
costermansiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 52.—Afr. trop.
crotalariifolia, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 85.—Bras.
dendrotricha, *Uline, l. c.* 84.—Bras.
Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 11.—Afr. trop.
dregeana, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 250.—Afr. austr.
epistephioides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 425.—Bras.
esurientium, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 429.—Am. cent.
Gayi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 9.—Chili.
Geissei, *R. Phil. l. c.* 8.—Chili.
Henryi, *Uline, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
hypotricha, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 87.—Afr. trop.

DIOSCOREA:—
Kuntzei, *Uline, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 311.—Bolivia.
laevis, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 425.—Am. cent.
latifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 535 = sativa.
Lehmannii, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 430.—N. Granat.
Liebmannii, *Uline, l. c.* 429.—Mexic.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 53.—Afr. trop.
lobata, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 427.—Mexic.
longipes, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 6.—Chili.
longituba, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Mexic.
macrocapsa, *Uline, l. c.* 83 (non Wall.).—Bras.
macrothyrsa, *Uline, l. c.* 87.—Bras.
macroura, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 266.—Afr. trop.
matagalpensis, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 432.—Am. cent.
microcephala, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 85.—Chili.
microcuspis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 250.—Afr. austr.
montana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 143 = Testudinaria Elephantipes.
nervosa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 20.—Chili.
nigrescens, *R. Phil. l. c.* 5.—Chili.
oaxacensis, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86; *et in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 322.—Mexic.
orizabensis, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Mexic.
parvifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 8.—Chili.
paupera, *R. Phil. l. c.* 12.—Chili.
pedatifida, *R. Phil. l. c.* 18.—Chili.
pencana, *R. Phil. l. c.* 7.—Chili.
polyantha, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 37.—Afr. trop.
pterocaulon, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 58.—Afr. trop.
pumicicola, *Uline, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 322.—Mexic.
racemosa, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 430 (= *Helmia racemosa*).—Am. cent.
Rehmanni, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 248.—Afr. austr.
reversiflora, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 426.—Mexic.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
Rusbyi, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bolivia.
Schlechteri, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 273, nomen.—Afr. trop.
semperflorens, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 87.—Afr. trop.
smilacifolia, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 58.—Afr. trop.
Sprucei, *Uline, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 84.—Ecuador.
stenophylla, *Uline, l. c.* 83.—Bras.
synandra, *Uline, l. c.* 86.—Bras.
thermarum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 17.—Chili.
thinophila, *R. Phil. l. c.* 10.—Chili.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 109, t. 55.—Afr. trop.
trichoneura, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 6.—Chili.
uliginosa, *R. Phil. l. c.* 12.—Chili.
urceolata, *Uline, in Engl. Jahrb.* xxii. 426.—Mexic.
violacea, *Uline, l. c.* 423.—Mexic.
warburgiana, *Uline, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 313, nomen.—Celebes.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 39.—Afr. trop.
yucatanensis, *Uline, in Field Columb. Mus. Bot.* i. 416.—Am. cent.

DIOSCOREOPHYLLUM, Engl. (Menisperm.).
strigosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 407.—Afr. trop.
tenerum, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

DIOSPYROS, Linn. (Eben.).
atropurpurea, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 67.—Afr. trop.
bipindensis, *Guerke, l. c.* 70.—Afr. trop.
gabunensis, *Guerke, l. c.* 72.—Afr. trop.
Hiernii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 521.—Celebes.

DIOSPYROS:—
humilis, *Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 352.—Ind. or.
kamerunensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 69.—Afr. trop.
Koordersii, *Hiern, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 521.—Celebes.
latifolia, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 63.—Afr. trop.
monbuttensis, *Guerke, l. c.* 66.—Afr. trop.
physocalycina, *Guerke, l. c.* 68.—Afr. trop.
Staudtii, *Guerke, l. c.* 65.—Afr. trop.
suaveolens, *Guerke, l. c.* 68.—Afr. trop.
tetramera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 75.—Bolivia.
tuberculosa, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 65.—Afr. trop.
usaramensis, *Guerke, l. c.* 64.—Afr. trop.
utilis, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 522.—Celebes.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 653.—Afr. trop.

DIOSTEA, Miers (Verben.).
chamaedryfolia, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7695 = juncea.
juncea, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxvii. 102.—Chili.

DIOTHONEA, Lindl. (Orchid.).
lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 489.—Ecuador.

DIPANAX, Seem. (Aral.).
dipyrena, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 870 (= *Heptapleurum dipyrenum*).—Ins. Sandw.
gymnocarpa, *A. A. Heller, l. c.* (= *Pterotropia gymnocarpa*).—Ins. Sandw.
kavaiensis, *A. A. Heller, l. c.* 871 (= *Heptapleurum kavaiense*).—Ins. Sandw.

DIPCADI, Medic. (Liliac.).
arenarium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 520.—Afr. trop.
elatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 449.—Afr. austr.
fesoghlense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 519.—Afr. trop.
firmifolium, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
gracillimum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 446.—Afr. austr.
magnum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 522.—Afr. trop.
megalanthum, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 21.—Afr. austr.
platyphyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 518.—Afr. trop.
polyphyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 446.—Afr. austr.
Readii, *Baker, l. c.* 447.—Afr. austr.
thollonianum, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 675.—Afr. trop.
vaginatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 523.—Afr. trop.
venenatum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 42.—Afr. austr.
viride, *Moench, Meth. Suppl.* 267.—Afr. trop. et austr.
volutum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 448.—Afr. austr.
wentzelianum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 362.—Afr. trop.
zambesiacum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 517.—Afr. trop.

DIPELTA, Maxim. (Caprifol.).
yunnanensis, *Franch. in Rev. Hortic.* 1891, 247.—China.

DIPERIUM, Desv. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).
cylindricum, Desv. Opusc. 76 = R. perforata.

DIPHASIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 68. *RUTACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* 70.—Afr. trop.

DIPLACHNE, Beauv. (Gramin.).
alba, Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 134 = fusca.
andropogonoides, Nees, Fl. Afr. Austr. 258 = Triraphis Rehmanni.
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 256 = fusca.
carinata, *Hack. ex F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xvi. repr. 32 (= *Atropis carinata*).—Reg. Argent.
Fleckii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 25.—Afr. trop.
Gatacrei, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 229.—Ind. or.
grandiglumis, Hack. in Engl. Jahrb. xi. 404 = Crossotropis grandiglumis.

DIPLACHNE:—
Halei, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 292.—Am. bor.
indica, Spreng. Syst. i. 351 = fusca.
latifolia, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 6 (= *Tricuspis latifolia*).—Reg. Argent.
livida, Nees, Fl. Afr. Austr. 254 = fusca.
mendocina, F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba, xv. 521 = Ipnum mendocinum.
nana, Nees, Fl. Afr. Austr. 259 = Triraphis nana.
pallida, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 387 = fusca.
paucinervis, *Hack. l. c.* iv. *App.* III. 25.—Afr. trop. et austr.
pungens, *Hack. l. c.*—Afr. trop.

DIPLACRUM, R. Br. (Cyperac.).
longifolium, C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill. ii. 153 = Pteroscleria longifolia.

DIPLACUS, Nutt. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).
Clevelandi, Greene, in Erythea, iv. 22 = M. Clevelandi.

DIPLADENIA, A. DC. (Apocyn.).
Myriophyllum, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 448.—Bras.
peduncularis, A. DC. in DC. Prod. viii. 482 = pastorum.
pendula, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. 234.—Bras.
Sanderi, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1896, II. 652.—Bras.
tenuifolia, A. DC. in DC. Prod. viii. 482 = pastorum.

DIPLANTHEMUM, K. Schum. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 234. *TILIACEAE*.
viridiflorum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

DIPLANTHERA, Banks & Soland. (Bignon.).
hirsuta, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 11.—Austral.

DIPLASANTHERA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 196, sphalm. = DIPLASANTHUM, Desv. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

DIPLASPIS, Hook. f. = **Huanaca**, Cav. (Umbell.).
Morenonis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 367 = H. Morenonis.

DIPLOLEGNON, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 29. *GESNERACEAE*.
riceanum, *Rusby, l. c.* 30.—Am. austr.

DIPLOLEPIS, R. Br. (Asclep.).
longirostrum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 725.—Ecuador.

DIPLOMERIS, D. Don (Orchid.).
Boxalli, *Rolfe, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 470.—Ind. or.
chinensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 203.—China.

DIPLOMORPHA, Meissn. = **Wikstroemia**, Endl. (Thymel.).
bicornuta, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 861 = W. bicornuta.
buxifolia, A. A. Heller, l. c. = W. Uva-ursi.
elongata, A. A. Heller, l. c. 859 = W. elongata.
Hanalei, A. A. Heller, l. c. 861 = W. Hanalei.
oahuensis, A. A. Heller, l. c. 860.—Ins. Sandw.
phillyraefolia, A. A. Heller, l. c. 861 = W. phillyreaefolia.
sandwicensis, A. A. Heller, l. c. = W. sandwichensis.
Uva-ursi, A. A. Heller, l. c. = W. Uva-ursi.
villosa, A. A. Heller, l. c. = W. villosa.

DIPLOPAPPUS, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
serrulatus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 86 = A. xylophyllus.

DIPLOSTEPHIUM, H. B. & K. (Compos.).
corymbosum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 8.—Am. cent.
paniculatum, *Donn. Sm. l. c.*—Am. cent.

DIPLOTHEMIUM, Mart. (Palmae).
Anizitzii, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 16.—Parag.
pectinatum, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 81.—Bras.

DIPLUSODON, Pohl (Lythrac.).
ciliiflorus, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 35.—Bras.
crulsianus, *Koehne, l. c.* 33.—Bras.
Glaziovii, *Koehne, l. c.* 32.—Bras.
humilis, *Koehne, l. c.* 33.—Bras.

DIPLUSODON:—
nigricans, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 34.—Bras.
panniculatus, *Koehne, l. c.* 30.—Bras.
pulchellus, *Koehne, l. c.* 32.—Bras.
retroimbricatus, *Koehne, l. c.* 34.—Bras.
sordidus, *Koehne, l. c.* 31.—Bras.

DIPODIUM, R. Br. (Orchid.).
elegans, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Arch. Mal.
pandanum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vi. 287.—N. Guin.

DIPTERACANTHUS, Nees = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).
elongatus, Nees, in DC. Prod. xi. 140 = Whitfieldia elongata.
genduanus, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. 680 = R. genduana.
pilosus, Nees, in Linnaea, xv. (1814) 353 = R. ovata.
subringens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 31 = R. subringens.

DIPTEROCARPUS, Gaertn. f. (Dipterocarp.).
pubescens, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* ii. 2.—Java.
Van-der-Hoevenii, *Koord. & Valet. l. c.* 3.—Java.

DIPTEROPELTIS, Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xvi. (1898) repr. 4. *CONVOLVULACEAE*.
poranoides, *Hallier f. l. c.* 5.—Afr. trop.

DIPTEROSIPHON, Huber, in Bol. Mus. Para. ii. (1898) 502. *BURMANNIACEAE*.
spelacicola, *Huber, l. c.*—Bras.

DIPYRENA, Hook. (Verben.).
dentata, Phil. in Linnaea, xxix. 22 = Diostea juncea.

DISA, Berg. (Orchid.).
alpina, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 220 = Brownleea alpina.
aperta, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 286.—Afr. trop.
atrorubens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 427.—Afr. austr.
aurantiaca, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 98 = ochrostachya.
auriculata, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 77.—Afr. austr.
bolusiana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 426.—Afr. austr.
Carsoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 277.—Afr. trop.
concinna, *N. E. Br. l. c.* 284.—Afr. trop.
forcipata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 428.—Afr. austr.
Forficaria, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 87.—Afr. austr.
goetzeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 178.—Afr. trop.
Leopoldi, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 218.—Afr. trop.
luxurians, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 369.—Afr. trop.
Macowani, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 106 = versicolor.
Princeae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 370.—Afr. trop.
robusta, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 282.—Afr. trop.
satyriopsis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 177.—Afr. trop.
Schimperi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 279.—Afr. trop.
Thodei, *Schlechter, ex Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 796.—Afr. trop.
zombica, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 278.—Afr. trop.

DISCARIA, Hook. (Rhamn.).
articulata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 38 (= *Colletia articulata*).—Chili.
discolor, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 153 (= *Colletia discolor*).—Patag.
dumosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 38 (= *Colletia dumosa*).—Chili.

DISCARIA:—
integrifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 502.—Patag.
prostrata, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 14 (= *Colletia nana*).—Chili.
trinervis, *Reiche, l. c.* (= *Colletia doniana*).—Chili.

DISCHIDIA, R. Br. (Asclep.).
amphorantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 511.—N. Guin.
Cominsii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2674.—Ins. Solomon.
Hollrungii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 510.—N. Guin.
Lauterbachii, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 511.—N. Guin.
maxima, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 534.—Celebes.
neurophylla, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 141.—N. Brit.
ruscifolia, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 511 (non Decne.).—N. Guin.

DISCHISMA, Choisy (Selagin.).
affine, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 187.—Afr. austr.
occludens, *Schlechter, l. c.* 188.—Afr. austr.
squarrosum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
tomentosum, *Schlechter, l. c.* 189.—Afr. austr.

DISCHISTOCALYX, Lindau = **Distichocalyx**, T. Anders. (Acanth.).
pubescens, Lindau, in Goetzen, Durch Afr. repr. 9.—Afr. trop.

DISCOLOBIUM, Benth. (Legum.).
paucijugum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 60.—Parag.

DISPARAGO, Gaertn. (Compos.).
hoffmanniana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 203.—Afr. austr.

DISPERIS, Sw. (Orchid.).
anomala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 333.—Afr. austr.
aphylla, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 71.—Afr. trop.
Bodkini, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 96.—Afr. austr.
bolusiana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 430.—Afr. austr.
comorensis, *Schlechter, l. c.* 429.—Ins. Comor.
Johnstoni, *Reichb. f. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. Bot.* Ser. II. ii. 349.—Afr. trop.
kamerunensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 431.—Afr. trop.
mozambicensis, *Schlechter, l. c.* 428.—Afr. trop.
papuana, *Michol. & Kraenzl. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 844.—Australas.
Preussii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 291 = kamerunensis.
togoensis, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 274, nomen.—Afr. trop.
virginalis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 431.—Afr. austr.

DISPERMA, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 79 (1899). *ACANTHACEAE*.
angolense, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
densiflorum, *C. B. Clarke, l. c.* 82.—Afr. trop.
dentatum, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
kilimandscharicum, *C. B. Clarke, l. c.* 80.—Afr. trop.
parviflorum, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
quadrangulare, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
quadrisepalum, *C. B. Clarke, l. c.* 80.—Afr. trop.

DISSOCHAETA, Blume (Melast.).
anomala, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* n. s. lxix. 55.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.*—Penins. Mal.

DISSOCHONDRUS, O. Kuntze, ex Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 41 (1897). *GRAMINEAE*.
biflorus, *O. Kuntze, l. c.*—Ins. Sandw.

DISSOTIS, Benth. (Melast.).
cincinnata, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 20.—Afr. trop.
cordata, *Gilg, l. c.* 17.—Afr. trop.
Elliotii, *Gilg, l. c.* 19.—Afr. trop.
falcipila, *Gilg, l. c.* 23.—Afr. trop.
Goetzei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 442.—Afr. trop.

DISSOTIS:—
macrocarpa, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 18.—Afr. trop.
magnifica, *Gilg, l. c.* 22.—Afr. trop.
minor, *Gilg, l. c.* 12.—Afr. trop.
penicillata, *Gilg, l. c.* 14.—Afr. trop.
Perkinsiae, *Gilg, l. c.* 21.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, l. c.* 16.—Afr. trop.
pulcherrima, *Gilg, l. c.* 20.—Afr. trop.
scabra, *Gilg, l. c.* 21.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Trothae, *Gilg, l. c.* 19.—Afr. trop.
violacea, *Gilg, l. c.* 22.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.

DISTEGIA, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 463. *COMPOSITAE.*
acida, *Klatt, l. c.* (=*Didelta tomentosa*).—Austral.

DISTICHELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 184. *LORANTHACEAE.*
Danceri, *Van Tiegh. l. c.* 185.—Ind. occ.
gracilis, *Van Tiegh. l. c.* (=*Dendrophthora gracilis*).—Ind. occ.
opuntioides, *Van Tiegh. l. c.* (=*Dendrophthora opuntioides*).—Ind. occ.

DISTICHLIS, Rafin. (Gramin.).
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 162.—Chili.
tenuifolia, *R. Phil. l. c.*—Chili.
texana, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 236 (=*Poa texana*).—Am. bor.
viridis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 163.—Chili.

DISTICHOCALYX, T. Anders. (Acanth.).
angustifolius, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 61.—Afr. trop.
brevifolius, *C. B. Clarke, l. c.* 62.—Afr. trop.
capitellatus, *C. B. Clarke, l. c.* 61.—Afr. trop.
grandifolius, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
hirsutus, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
laxiflorus, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 13 = Acanthopale laxiflora.
polyneurus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 61.—Afr. trop.
strobilinus, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

DISTICTIS, Mart. (Bignon.).
cinerea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 487 (=*Pithecoctenium cinereum*).—Mexic.
crassa, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 177 (=*Cremastus crassus*).—Bras.
elongata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 178 (=*Bignonia elongata*).—Am. austr.
Glaziovii, *Bureau & K. Schum. l. c.* 180 (=*Pithecoctenium Glaziovii*).—Bras.
granulosa, *Bureau & K. Schum. l. c.* 179 (=*P. granulosum*).—Guiana.
guianensis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 176 (=*P. guianense*).—Guiana.
laxiflora, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 486 (=*P. laxiflorum*).—Mexic.
racemosa, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 179.—Am. austr.

DITASSA, R. Br. (Asclep.).
apiculata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 21.—Bras.
odorata, *K. Schum. l. c.*—Bras.
racemosa, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 498.—Am. bor.
refractifolia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 22.—Bras.

DITAXIS, Vahl = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).
laevis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = A. laevis.
neomexicana, A. A. Heller, l. c. = A. neomexicana.
pilosissima, A. A. Heller, l. c. = A. pilosissima.
sericophylla, A. A. Heller, l. c. = A. sericophylla.
serrata, A. A. Heller, l. c. = A. serrata.

DJERATONIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 37 = **Carpodinus**, R. Br. (Apocyn.).

DOBERA, Juss. (Salvador.).
loranthifolia, *Warb. ex Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 282.—Afr. trop.

DODECATHEON, Linn. (Primul.).
acuminatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 304.—Am. bor.
cylindrocarpum, *Rydb. l. c.* 305.—Am. bor.

DODECATHEON:—
puberulentum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 311.—Am. bor.
pubescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 306.—Am. bor.
pulchrum, *Rydb. l. c.* 305.—Am. bor.
salinum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 131.—Am. bor.
uniflorum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 307.—Am. bor.

DODONAEA, Linn. (Sapind.).
Camfieldi, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,* xxii. 150.—Austral.

DOELLINGERIA, Nees = **Aster**, Linn. (Compos.).
humilis, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 392.—Am. bor.
infirma, Greene, Pittonia, iii. 52 = A. infirmus.
reticulata, Greene, l. c. 53 = A. reticulatus.
sericocarpoides, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 620.—Am. bor.

DOLIANTHUS, C. H. Wright, in Kew Bull. 1899, 106. *LOGANIACEAE.*
vaccinioides, *C. H. Wright, l. c.*—N. Guin.

DOLICHOLOBIUM, A. Gray (Rubiac.).
acuminatum, *Burkill, in Hook. Ic. Pl.* t. 2630.—Ins. Solomon.
Gertrudis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 553.—N. Guin.
oxylobum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 554.—N. Guin.

DOLICHOLUS, Medic. = **Rhynchosia**, Lour. (Legum.).
ambacensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 270.—Afr. trop.
americanus, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 111 = R. menispermoidea.
angolensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 266 = R. congensis.
angustifolius, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 60 = R. Senna.
Balansae, Kuntze, l. c. = R. Balansae.
calycinus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = R. congensis.
capensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 60 = R. glandulosa.
caribaeus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = R. caribaeus.
ciliatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 60 = R. puberula.
cinereus, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 112 = R. cinerea.
debilis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 269 = R. debilis.
Drummondii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 116 = R. tomentosa.
erectus, Vail, l. c. 115.—Am. sept.
filicaulis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268 = R. filicaulis.
Hauthalii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 60 = R. Hauthalii.
hirsutus, Kuntze, l. c. 61 = R. nervosa.
huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 271.—Afr. trop.
intermedius, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 115.—Am. sept.
Kuntzei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 61 = R. Kuntzei.
laetissimus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268 = R. latissima.
latifolius, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 61 = R. Orthodanum.
latifolius, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 114 = R. latifolia.
Lewtoni, Vail, l. c. 113.—Am. sept.
luteolus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 269.—Afr. trop.
melanostictus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 62 = R. melanostictus.
Memnonia, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = R. Memnonia.
Michauxii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 112 = R. Michauxii.
mollissimus, Vail, l. c. 116.—Am. sept.
parvifolius, Vail, l. c. 108 = R. parvifolia.
phaseolodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 62 = R. phaseoloides.
procurrens, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268.—Afr. trop.
puberulus, Hiern, l. c. 272 = R. puberula.
reticulatus, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 53 = R. reticulatus.
Schomburgkii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 62 = R. pallida.
Senna, Kuntze, l. c. = R. Senna.
simplicifolius, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 114.—Am. sept.
Swartzii, Vail, l. c. 108.—Ind. occ.; Am. trop.
texensis, Vail, l. c.—Am. bor. et austr.
tomentosus, Vail, l. c. 112 = R. tomentosa.
Torreyi, Vail, l. c. 113 = R. Torreyi.
totta, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 62 = R. totta.
venulosus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 271.—Afr. trop.
violaceus, Hiern, l. c. 269.—Afr. trop.
viscidulus, Hiern, l. c. 272 = R. viscidula.

DOLICHOS, Linn. (Legum.).
Anchietae, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 265.—Afr. trop.
Antunesii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 318.—Afr. trop.
Baumannii, *Harms, l. c.* 313.—Afr. trop.
bongensis, *Taub. ex Harms, l. c.* 316.—Afr. trop.
brachypus, *Harms, l. c.* 323.—Afr. trop.
Buchananii, *Harms, l. c.* 318.—Afr. trop.
cardiophyllus, *Harms, l. c.* xxviii. 410.—Afr. trop.
fimbriatus, *Harms, l. c.* xxvi. 319.—Afr. trop.
Fischeri, *Harms, l. c.* 317.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, l. c.* xxviii. 411.—Afr. trop.
longipes, *Buchw. ex Harms, l. c.* xxvi. 316.—Afr. trop.
longistipellatus, *Harms, l. c.* 314.—Afr. trop.
macrothyrsus, *Harms, l. c.* 320.—Afr. trop.
malosanus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.
nanus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 411.—Afr. trop.
paniculatus, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 327.—Afr. trop.
pseudopachyrhizus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 320.—Afr. trop.
reticulatus, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 219.—Afr. austr.
shuterioides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.
stenophyllus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 314.—Afr. trop.
tricostatus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 431.—Afr. trop.
trinervatus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.

DOLIOCARPUS, Roland. (Dillen.).
ferrugineus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 3.—Bolivia.

DOLOSANTHUS, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 472 (1896). *COMPOSITAE.*
silvaticus, *Klatt, l. c.* 473.—Afr. trop.

DOMBEYA, Cav. (Stercul.).
alascha, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 37.—Afr. trop.
bracteopoda, *K. Schum. l. c.* 23.—Ins. Comor.
calantha, *K. Schum. l. c.* 28.—Afr. trop.
damarana, *K. Schum. l. c.* 36.—Afr. trop.
Decus-silvae, *K. Schum. l. c.* 25.—Afr. austr.
elegans, *K. Schum. l. c.* 31 (non Cordem.).—Afr. austr.
Goetzenii, *K. Schum. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 5.—Afr. trop.
gracilis, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 30.—Afr. austr.
huillensis, *K. Schum. l. c.* 35.—Afr. trop.
Johnstonii, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 301.—Afr. trop.
lasiostylis, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 24.—Afr. trop.
laxiflora, *K. Schum. l. c.* 37.—Afr. trop.
Mupangae, *K. Schum. l. c.* 39.—Afr. trop.
myriantha, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 302.—Afr. trop.
parvifolia, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 30.—Afr. trop.
platypoda, *K. Schum. l. c.* 29.—Afr. trop.
polyphylla, *K. Schum. l. c.* 32.—Ins. Comor.
runsoroensis, *K. Schum. l. c.* 23.—Afr. trop.
sparmannioides, *K. Schum. l. c.* 26.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 302.—Afr. trop.
tanganyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 244.—Afr. trop.
umbraculifera, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 38.—Afr. trop.

DONACODES, Blume = **Amomum**, Linn. (Scitam.).
elongata, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. 380 = A. elongatum.

DONALDSONIA, Baker f. in Journ. Bot. 1896, 53. *PASSIFLORACEAE.*
stenopetala, *Baker f. l. c.*—Afr. trop.

DONDIA, Adans. = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).
americana, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 584.—Am. bor.
californica, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = S. californica.
conferta, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 280.—Am. bor.
depressa, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 585 = S. depressa.
diffusa, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = S. diffusa.
intermedia, A. A. Heller, l. c. = S. intermedia.

DONDIA:—
linearis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = S. linearis.
minutiflora, A. A. Heller, l. c. = S. minutiflora.
multiflora, A. A. Heller, l. c. = S. torreyana.
occidentalis, A. A. Heller, l. c. = S. occidentalis.
suffrutescens, A. A. Heller, l. c. = S. suffrutescens.

DONIOPHYTON, Wedd. (Compos.).
anomalum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 144 = andicolum.

DOPATRIUM, Buch.-Ham. (Scroph.).
luteum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 498.—Afr. trop.
tricolor, *Engl. l. c.* 499.—Afr. trop.

DORONICUM, Tourn. (Compos.).
calcareum, *Vierh. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 112.—Eur.
latifolium, Bub. Fl. Pyren. ii. 181 = D. Pardalianches.

DORSTENIA, Plum. (Urtic.).
arabica, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2503.—Arab.
caudata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 377.—Afr. trop.
crispa, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 27.—Afr. trop.
Debeerstii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 75.—Afr. trop.
dionga, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 377.—Afr. trop.
foetida, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 120 = obovata.
frutescens, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 12.—Afr. trop.
gabunensis, *Engl. l. c.* 14.—Afr. trop.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 378.—Afr. trop.
harmsiana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 286, nomen.—Afr. trop.
intermedia, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 17.—Afr. trop.
Klainei, *Heckel, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 260.—Afr. trop.
multiradiata, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 15.—Afr. trop.
mundamensis, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 286, nomen.—Afr. trop.
Phillipsiae, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7676.—Afr. trop.
ruahensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 377.—Afr. trop.
saxicola, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 22.—Madag.
Schlechteri, *Engl. l. c.* 23.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. l. c.* 13.—Afr. trop.
subtriangularis, *Engl. l. c.* 15.—Afr. trop.
variegata, *Engl. l. c.* 16.—Afr. trop.
variifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 376.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 14.—Afr. trop.

DORTIGUEA, Bub. Fl. Pyren. i. 305 (1897) = **Erinus**, Linn. (Scroph.).
alpestris, Bub. l. c. = E. alpinus.

DORTMANNA, Linn. = **Lobelia**, Linn. (Campan.).
bicalcarata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 186 = L. bicalcarata.
decurrentifolia, Kuntze, l. c. 187 = L. decurrentifolia.
lutea, Kuntze, l. c. = L. lutea.
stellariodes, Kuntze, l. c. 188 = L. stellarioides.
vanreenensis, Kuntze, l. c. = L. vanreenensis.

DOUGLASIA, Lindl. (Primul.).
biflora, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 277.—Am. bor.

DOVEA, Kunth (Restiac.).
aggregata, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 101.—Afr. austr.
cylindrostachya, *Mast. l. c.* 100.—Afr. austr.
nitida, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 6.—Afr. austr.
recta, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 101.—Afr. austr.
rigens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 7.—Afr. austr.

DRABA, Dill. (Crucif.).
alticola, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 103.—Turkestan.
Ameghiroi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 491.—Patag.
andina, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 352.—Am. bor.
argentina, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 13.—Reg. Argent.
crassa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 182.—Am. bor.
deflexa, *Greene, Pittonia*, iv. 20.—Am. bor.
helleriana, *Greene, l. c.* 17.—Am. bor.
integrifolia, *Greene, l. c.* 201.—Am. bor.
lonchocarpa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 181.—Am. bor.
longisiliqua, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 554.—Syria.
luteola, *Greene, Pittonia*, iv. 19.—Am. bor.

DRABA:—
melanopus, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. Index.—Turkestan.
menalopus, Kom. l. c. 102, sphalm. = melanopus.
monantha, *Gilg, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 4.—Patag.
neomexicana, *Greene, Pittonia*, iv. 18.—Am. bor.
oligosperma, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 593 = spegazziniana.
pallida, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 626.—Am. bor.
patens, *A. A. Heller, l. c.* 624.—Am. bor.
petrophila, *Greene, Pittonia*, iv. 17.—Am. bor.
physocarpa, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 102.—Turkestan.
pinetorum, *Greene, Pittonia*, iv. 18.—Am. bor.
praealta, *Greene, l. c.* iii. 306.—Am. bor.
rubricaulis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 626.—Am. bor.
saximontana, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 264.—Am. bor.
spectabilis, *Greene, Pittonia*, iv. 19.—Am. bor.
spegazziniana, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 177.—Reg. Magell.
surculifera, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 237.—Am. bor.
yellowstonensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 189.—Am. bor.

DRACAENA, Vand. (Liliac.).
acutissima, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 669.—Afr. trop.
breviflora, *Ridley, in Journ. Bot.* 1896, 165.—Malaya.
capitulifera, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 59.—Afr. trop.
cerasifera, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 663.—Afr. trop.
congolensis, *Hua, l. c.* 668.—Afr. trop.
elegans, *Hua, l. c.* 665.—Afr. trop.
Elliotii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 449.—Afr. trop.
gabonica, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 669.—Afr. trop.
Hanningtoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 438.—Afr. trop.
knerkiana, K. Koch, Wochenschr. iv. 394 = arborea.
Lecomtei, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 667.—Afr. trop.
mayumbensis, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
nitens, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 252 = reflexa.
Ombet, *Kotschy & Peyr. Pl. Tinn.* 47.—Afr. trop.
phanerophlebia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 448.—Afr. trop.
siamica, *Ridley, in Journ. Bot.* 1896, 166.—Siam.
silvatica, *Hua, in Bull. Soc. Nat. Hist. Autun*, x. 665.—Afr. trop.
singapurensis, *Ridley, in Journ. Bot.* 1896, 166.—Malaya.
thollonіana, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 662.—Afr. trop.
Thwaitesi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* i. 144.—Zeylan.
ugandensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 445.—Afr. trop.
yuccaefolia, *Ridley, in Journ. Bot.* 1896, 168.—Siam.

DRACONTIUM, Linn. (Arac.).
Pittieri, *Engl. in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 364.—Am. cent.
spinosum, Linn. Sp. Pl. 967 = Lasia aculeata.

DRACONTOMELON, Blume (Anacard.).
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 410, nomen.—Celebes.
duperreanum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 374 B.—Cochinch.
sinense, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2641.—As. trop.

DRACOPHYLLUM, Labill. (Epacrid.).
angustifolium, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 603.—N. Zel.
brachycladum, *Colenso, l. c.* xxxi. 275.—N. Zel.
brachyphyllum, *Colenso, l. c.* xxviii. 604.—N. Zel.
heterophyllum, *Colenso, l. c.* 605.—N. Zel.
pungens, *Colenso, l. c.* 602.—N. Zel.
varium, *Colenso, l. c.* 603.—N. Zel.
virgatum, *Colenso, l. c.* 605.—N. Zel.

DREGEA, E. Mey. (Asclep.).
pubescens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Wattakaka pubescens*).—Java.

DREJERELLA, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 222 (1900). *ACANTHACEAE.*
mirabilioides, *Lindau, l. c.* (= *Beloperone lamarckiana*).—Ind. occ.
nemorosa, *Lindau, l. c.* 223 (= *Adhatoda tetramera*).—Ind. occ.
origanoides, *Lindau, l. c.* 225 (= *Adhatoda origanoides*).—Ind. occ.

DREPANOCARPUS, G. F. W. Mey. (Legum.).
cuyabensis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 18.—Bras.

DRIMIA, Jacq. (Liliac.).
angustifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 440.—Afr. austr.
Bolusii, *Baker, l. c.* 443.—Afr. austr.
brevifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 527.—Afr. trop.
capitata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 442.—Afr. austr.
chlorantha, *Baker, l. c.* 443.—Afr. austr.
Coleae, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7565.—Afr. trop.
Fischeri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 526.—Afr. trop.
neriniformis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 442.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Baker, l. c.* 441.—Afr. austr.
zombensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 525.—Afr. trop.

DRIMIOPSIS, Lindl. & Paxt. (Liliac.).
humifusa, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 474.—Afr. austr.
maxima, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
Saundersiae, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
Stuhlmanni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 544.—Afr. trop.
Volkensii, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Woodii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 473.—Afr. austr.

DRIMYS, Forst. (Magnol.).
Traversii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxx. 379.—N. Zel.

DROGUETIA, Gaudich. (Urtic.).
iners, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 146 (= *Urtica iners*).—Hab.?

DROSERA, Linn. (Droserac.).
atra, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 269.—N. Zel.
ligulata, *Colenso, l. c.*—N. Zel.
ruahinensis, *Colenso, l. c.* xxviii. 593.—N. Zel.
stylosa, *Colenso, l. c.*—N. Zel.

DRUDEOPHYTUM, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 80. *UMBELLIFERAE.*
glaucum, *Coult. & Rose, l. c.* 82 (= *Velaea glauca*).—Am. bor.
Hartwegi, *Coult. & Rose, l. c.* 81 (= *Arracacia Hartwegi*).—Am. bor.
Howellii, *Coult. & Rose, l. c.* 82 (= *Velaea Howellii*).—Am. bor.
Kelloggii, *Coult. & Rose, l. c.* 81 (= *Arracacia Kelloggii*).—Am. bor.
Parishii, *Coult. & Rose, l. c.* 82 (= *Velaea Parishii*).—Am. bor.
vestitum, *Coult. & Rose, l. c.* 83 (= *Arracacia vestita*).—Am. bor.

DRUSA, DC. = **Bowlesia**, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
acutangula, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 126 = B. acutangula.

DRYAS, Linn. (Rosac.).
montana, Bub. Fl. Pyren. ii. 633 = octopetala.

DRYMARIA, Willd. (Caryoph.).
gracillima, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 132.—Mexic.
confusa, *Rose, l. c.* 133.—Mexic.
rotundifolia, *Hariot, in Journ. de Bot.* 1900, 150 (= *Stellaria rotundifolia*, Poir.).—Reg. Magell.
Townsendii, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 58.—Mexic.

DRYMOCALLIS, Fourr. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
arguta, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 192 = P. arguta.
ashlandica, Rydb. l. c. 200 = P. ashlandica.
convallaria, Rydb. l. c. 193 = P. convallaria.
cuneifolia, Rydb. l. c. 204.—Am. bor.
fissa, Rydb. l. c. 197 = P. fissa.
glabrata, Rydb. l. c. 201.—Am. bor.
glandulosa, Rydb. l. c. 198 = P. glandulosa.

DRYMOCALLIS:—
glutinosa, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 196 = P. glutinosa.
Hanseni, Rydb. l. c. 200 = P. Hanseni.
pseudorupestris, Rydb. l. c. 194 = P. pseudorupestris.
reflexa, Rydb. l. c. 203 = P. reflexa.
rhomboidea, Rydb. l. c. = P. rhomboidea.
wrangelliana, Rydb. l. c. 201 = P. wrangelliana.

DRYMONIA, Mart. (Gesnerac.).
lindmaniana, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5, 16.—Bras.

DRYMOPHLOEUS, Zipp. (Palmae).
mambare, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 202.—Austral.
montanus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 207.—N. Guin.
Reineckei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 590.—Ins. Samoa.
Schumannii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 207 (= *Actinophloeus Schumannii*).—N. Guin.

DRYPETES, Vahl (Euphorb.).
Picardae, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 334.—Ind. occ.

DUGALDIA, Cass. = **Helenium**, Linn. (Compos.).
Hoopesii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 425 = H. Hoopesii.

DUGUETIA, A. St. Hil. (Anonac.).
lucida, *Urb. Symb. Antill.* i. 308.—Ind. occ.

DUNBARIA, Wight & Arn. (Legum.).
bella, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 434.—Ind. or.
discolor, *Harms & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 369.—N. Guin.
glandulosa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 433 (= *Atylosia glandulosa*).—Ind. or.
Scortechinii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 44.—Penins. Mal.

DUPATYA, Vell. = **Paepalanthus**, Mart. (Eriocaul.).
albida, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 329 = P. albidus.

DURANDIA, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. (1896) 160. *CYPERACEAE.*
macrophylla, *Boeck. l. c.* 173.—Am. cent.

DURANTA, Linn. (Verben.).
Benthami, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 343.—Bolivia.
serratifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 251 = Lorenzii.
Sprucei, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 344.—Ecuador.

DUSENIA, O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. (1900) 246. *COMPOSITAE.*
patagonica, *O. Hoffm. l. c.* 247.—Patag.

DUVERNOYA, E. Mey. = **Adhatoda**, Nees (Acanth.).
Buchholzii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 43 = A. maculata.
Dewevrei, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 102 = Justicia extensa.
extensa, Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 372 = Justicia extensa.
haplostachya, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 324.—Afr. trop.
orbicularis, Lindau, l. c. xxii. 123 = A. orbicularis.
paniculata, Lindau, l. c. xx. 43 = Justicia laxa.
pumila, Lindau, l. c. 44 = Peristrophe usta.
pyramidata, Lindau, l. c. xxii. 124 = Justicia pyramidata.
salviiflora, Lindau, l. c. xx. 42 = Justicia salviiflora.
somalensis, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 81 = Justicia grisea.
speciosa, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 129 = Justicia Rendlei.
stachytarphetoides, Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 372 = Justicia stachytarphetoides.
Stuhlmanni, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 43 = Justicia extensa.

DYCKIA, Schult. f. (Bromel.).
boliviensis, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 524.—Bolivia.
conspicua, *Mez, l. c.* 513.—Parag.
elata, *Mez, l. c.* 508.—Bras.
elongata, *Mez, l. c.* 529.—Bras.
encholirioides, Mez, l. c. 507 = catharinensis.
ferox, *Mez, l. c.* 511.—Parag.
ferruginea, *Mez, l. c.* 533.—Bras.
gracilis, *Mez, l. c.* 516.—Bolivia.

DYCKIA:—
hilaireana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 530.—Bras.
kuntzeana, *Mez, l. c.* 523.—Bras.
meziana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 302.—Bolivia.
pedicellata, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 515.—Bras.
saxatilis, *Mez, l. c.* 518.—Bras.
sellowiana, *Mez, l. c.* 520.—Bras.
tomentosa, *Mez, l. c.* 515.—Bras.
uleana, *Mez, l. c.* 517.—Bras.

DYSCHORISTE, Nees (Acanth.).
capricornis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 76.—Afr. trop.
cunenensis, *C. B. Clarke, l. c.* 74.—Afr. trop.
depressa, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 81.—Ind. or.; Afr. trop.
Hildebrandtii, Lindau, ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 74 = nobilior.
kilimandscharica, Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 367 = Disperma kilimandscharica.
linifolia, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 76.—Afr. trop.
mollis, *C. B. Clarke, l. c.* 77.—Afr. trop.
mutica, *C. B. Clarke, l. c.* 73.—Afr. trop.
nobilior, *C. B. Clarke, l. c.* 74.—Afr. trop.
nudanthera, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
pedicellata, *C. B. Clarke, l. c.* 75.—Afr. trop.
radicans, *Nees, in DC. Prod.* xi. 106.—Afr. trop.
saltuensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 92.—Mexic.
somalensis, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 413 = Phillipsia fruticulosa.
subquadrangularis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 79.—Afr. trop.
tanganyikensis, *C. B. Clarke, l. c.* 77.—Afr. trop.
tenera, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 116 = Hemigraphis tenera.
tubicalyx, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 74.—Afr. trop.
verticillaris, *C. B. Clarke, l. c.* 75.—Afr. trop.
Volkensii, *C. B. Clarke, l. c.* 77.—Afr. trop.

DYSODIA, Cav. (Compos.).
Seleri, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 314.—Mexic.

DYSOLOBIUM, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. (1897) 425. *LEGUMINOSAE.*
dolichoides, *Prain, l. c.* 427 (= *Vigna dolichoides*).—Ind. or. et Malaya.
grande, *Prain, l. c.* (= *Phaseolus velutinus*).—Ind. or.
lucens, *Prain, l. c.* (= *Vigna lucens*).—Ind. or.
tetragonum, *Prain, l. c.*—Ind. or.

DYSOPHYLLA, Blume (Labiat.).
yatabeana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 55.—Japon.

DYSOXYLUM, Blume (Meliac.).
alatum, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 381.—N. Guin.
Bamleri, *Harms, l. c.* 380.—N. Guin.
biloculare, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 95.—Java.
cerebriforme, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 7.—Austral.
cochinchinense, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 350 A.—Cochinch.
Hasseltii, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 64.—Java.
harmandianum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 345 B.—Cochinch.
insulare, *Pierre, l. c.* 347 B.—Cochinch.
leschenaultianum, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 94.—Java.
Loureiri, Pierre, Fl. Cochinch. t. 352 A = Epicharis Loureiri.
Maota, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 643.—Ins. Samoa.
perryanum, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 352.—Cochinch.
purpureum, *Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 349.—Ind. or.
reticulatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 114.—Reg. Himal.
rubrocostatum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 348A.—Cochinch.
tpongense, *Pierre, l. c.* t. 349 B.—Cochinch.
translucidum, *Pierre, l. c.* 350 B.—Cochinch.
urens, *Valet. in Ic. Bogor.* t. 12 (= *Didymocheton urens*).—Malaya.
velutinum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 388, 636.—Celebes.

E

ECBOLIUM, Kurz (Acanth.).
Anisacanthus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 238.—Afr. trop.
auriculatum, *C. B. Clarke, l. c.* 237.—Afr. trop.
Clarkei, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1032.—Afr. trop.
hamatum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 239.—Afr. trop.
parvibracteatum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 379.—Afr. austr.
revolutum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 239.—Afr. trop.
subcordatum, *C. B. Clarke, l. c.* 237.—Afr. trop.
trinervium, *C. B. Clarke, l. c.* 239.—Afr. trop.

ECBOLIUM, Riv. = **Justicia**, Linn. (Acanth.).
chapadense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 248.—Bras.
Kuntzei, Kuntze, l. c. = J. Kuntzei.
lindavianum, Kuntze, l. c. = Dianthera hookeriana.
lorentzianum, Kuntze, l. c. = J. campestris.
minimiflorum, Kuntze, l. c. = J. parviflora.
oreadum, Kuntze, l. c. = J. oreadum.
velascanum, Kuntze, l. c. = J. velascana.
xylosteodes, Kuntze, l. c. = J. xylosteoides.

ECCOILOPUS, Steud. = **Spodiopogon**, Trin. (Gramin.).
andropogonoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 124 = S. cotulifer.

ECCREMOCARPUS, Ruiz & Pav. (Bignon.).
lobbianus, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xii. 103.—Bolivia.

ECDYSANTHERA, Hook. & Arn. (Apocyn.).
myrtifolia, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 398 (= *Dendrocharis myrtifolia*).—Malaya.
rubescens, *Boerl. l. c.* (= *Dendrocharis rubescens*).—Malaya.

ECHEVERIA, DC. = **Cotyledon**, Linn. (Crassul.).
Purpusi, K. Schum. in Wittm. Gartenfl. 1896, 608.—Calif.
velutina, Lem. Pl. Grasses, 46.—Hort.

ECHIDNOPSIS, Hook. f. (Asclep.).
Golathi, *Schweinf. ex Deflers, in Mem. Inst. Egypt*, iii. 267 (= *Boucerosia penicellata*).—Afr. trop.
quadrangula, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 113 (= *Stapelia quadrangula*).—Arab.

ECHINOCACTUS, Link & Otto (Cactac.).
ambiguus, *Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 311.—Am. austr.
Anisitsii, *K. Schum. in Blühende Kakt.* t. 3.—Parag.
chilensis, *Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 423.—Chili.
chrysacanthion, *K. Schum. l. c.* 396.—Am. austr.
clavatus, *Soehrens, in Monatsschr. Kakt.* x. 27.—Chili.
Coxii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 422.—Patag.
durangensis, *Runge, ex K. Schum. l. c.* 449.—Mexic.
erectocentrus, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 376.—Am. bor.
Geissei, *Pos. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 406.—Am. austr.
glaucus, *K. Schum. l. c.* 438.—Am. sept.
Hartmannii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* x. 170.—Parag.
intertextus, Phil. in Linnaea, xxxiii. 81 = Coxii.
Krausei, *Hildm. ex Mathss. in Monatsschr. Kakt.* 1897, 107.—Am. sept.
Leninghausii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1900, 134.—Hort.
limitus, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 374.—Am. bor.
megalothelos, *Sencke, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 415.—Parag.
microspermus, *Weber, in Bois, Dict. Hortic.* 469.—Reg. Argent.
minusculus, Weber, l. c. 467 = Rebutia minuscula.
Nidus, *Soehrens, in Monatsschr. Kakt.* x. 122.—Chili.
nigricans, *Dietr. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 420.—Hab.?
nigrispinus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 45.—Parag.
pampeanus, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 27.—Reg. Argent.
Peninsulae, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 361.—Calif.
Philippii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 427 (= *Cereus Philippii*).—Chili.
platensis, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 28.—Reg. Argent.

ECHINOCACTUS:—
schilinzkyanus, *Haage, ex K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1897, 108.—Parag.
Sileri, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 376.—Am. bor.
tabularis, *Cels. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 389.—Am. austr.

ECHINOCEREUS, Engelm. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
Hempelii, F. Fobe, in Monatsschr. Kakt. 1897, 187.—Mexic.
leptacanthus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 260 = C. pentalophus.
maritimus, K. Schum. l. c. 273 = C. maritimus.
Merkeri, Hildm. ex K. Schum. l. c. 277.—Mexic.
salmianus, Hort. ex K. Schum. l. c. 255 = C. salmdyckianus.
undulatus, Hildm. ex K. Schum. l. c. 261 = C. glycimorphus.

ECHINOCHLOA, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
dubia, Roem. & Schult. Syst. ii. 479 = P. Crus-galli.
hirtella, Schult. Mant. ii. 269 = Oplismenus Burmannii.
scabra, Roem. & Schult. Syst. ii. 479 = P. stagninum.
squarrosa, Roem. & Schult. l. c. = Chamaeraphis spinescens.
stagnina, Beauv. Agrost. 161 = P. stagninum.

ECHINOCYSTIS, Torr. & Gray (Cucurb.).
horrida, *Congd. in Erythea*, vii. 184.—Am. bor.

ECHINODORUS, Rich. (Alismac.).
Schinzii, Buchenau, in Bull. Herb. Boiss. iv. 413 = Rautanenia Schinzii.

ECHINOPEPON, Naud. = **Echinocystis**, Torr. (Cucurb.).
confusus, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 115.—Am. bor.
Coulteri, Rose, l. c. 116 = E. Coulteri.
floribundus, Rose, l. c. = E. floribunda.
jaliscanus, Rose, l. c. 117.—Mexic.
lanatus, Rose, l. c. = E. lanata.
longispina, Rose, l. c. = E. longispina.
Nelsoni, Rose, l. c.—Mexic.
parvifolius, Rose, l. c. 118.—Mexic.
Pringlei, Rose, l. c. 117.—Mexic.
pubescens, Rose, l. c. 118 = E. pubescens.
torquatus, Rose, l. c. = E. torquatus.
Wrightii, S. Wats. in Bull. Torr. Bot. Club, 1887, 158 = E. Wrightii.

ECHINOPS, Linn. (Compos.).
bromeliaefolius, *Baker, in Hook. Ic. Pl.* t. 2514.—Afr. trop.
foliosus, *Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 248.—Reg. Caucas.
lepetymnicus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 145.—Lesbos.
Philiae, *Candargy, l. c.*—Lesbos.
Steudneri, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 476.—Afr. trop.

ECHINOPSIS, Zucc. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
catamarcensis, Web. in Bois, Dict. Hortic. i. 471.—Reg. Argent.
Ducis-Pauli, Foerst. Handb. Cact. ed. II. 641.—Am. austr.
rhodotricha, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 147.—Parag.
Schickendantzii, Web. in Bois, Dict. Hortic. i. 473 = C. Schickendantzii.

ECHINOSPERMUM, Sw. (Borag.).
Skorpili, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 206.—Eur.

ECHITES, P. Br. (Apocyn.).
assimilis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 724.—Ecuador.
peduncularis, Stadelm. in Flora, 1841, I. Beibl. 54 = Dipladenia pastorum.
tenuifolia, Mikan, Del. Fl. et Faun. Bras. t. 14 = Dipladenia pastorum.

ECHIUM, Tourn. (Borag.).
maroccanum, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II. no. 7. (1898) 12.—Afr. bor.

ECKLONEA, Steud. (Cyperac.).
solitaria, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 759.—Afr. austr.

ECPOMA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 430. *RUBIACEAE.*
apocynaceum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

ECTADIOPSIS, Benth. (Asclep.).
suffruticosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 453.—Afr. trop.

ECTEINANTHUS, T. Anders. = **Isoglossa**, Oerst. (Acanth.).
grandiflorus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 233 = I. grandiflora.

EDWINIA, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 477. *SAXIFRAGACEAE.*
americana, *A. A. Heller, l. c.* (= *Jamesia americana*).—Am. bor.
Wrightii, *A. A. Heller, l. c.* 478.—Am. bor.

EENIA, Hiern & S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 373. *COMPOSITAE.*
damarensis, *Hiern & S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

EFULENSIA, C. H. Wright, in Hook. Ic. Pl. t. 2518 (1899). *PASSIFLORACEAE.*
clematoides, *C. H. Wright, l. c.*—Afr. trop.

EHRETIA, Linn. (Borag.).
Bakeri, *Britten, in Journ. Bot.* 1895, 88.—Afr. trop.
coerulea, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 312.—Afr. trop.
corylifolia, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 25.—China.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 311.—Afr. trop.
longistyla, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 43.—Afr. trop.
macrophylla, Baker, in Kew Bull. 1894, 29 = Bakeri.
rosea, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 461.—Afr. trop.
scrobiculata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 716.—Afr. trop.
tetrandra, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 311.—Afr. trop.
uhehensis, *Guerke, l. c.* 462.—Afr. trop.

EHRHARTA, Thunb. (Gramin.).
aemula, Schrad. in Goett. Gel. Anz. iii. 2077 = bulbosa.
avenacea, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1378 = longiflora.
capensis, *Thunb. in Vet.-Acad. Handl. Stockh.* 1779, 216.—Afr. austr.
cartilaginea, Sm. Pl. Ic. Ined. sub t. 33 = capensis.
delicatula, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 288.—Afr. austr.
Dodii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 670.—Afr. austr.
eckloniana, Schrad. in Schult. f. Syst. vii. 1376 = longiflora.
erecta, *Lam. Encyc.* ii. 347.—Afr. austr.
Mnemateia, Linn. f. Suppl. 209 = capensis.
nutans, Lam. Encyc. ii. 346 = capensis.
panicea, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 9 = erecta.
paniciformis, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. 64 = erecta.
Rehmannii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 288.—Afr. austr.
Schlechteri, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 380.—Afr. austr.
subspicata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 676.—Afr. austr.
tricostata, *Stapf, l. c.* 669.—Afr. austr.
varicosa, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. 65 = longifolia.
versicolor, Schrad. in Goett. Gel. Anz. iii. 2078 = calycina.

EICHLERODENDRON, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, ii. (1898) 77. *BIXACEAE.*
calophyllum, Briq. l.c. (= *Xylosma calophyllum*).—Bras.

EKEBERGIA, Sparrm. (Meliac.).
arborea, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 427.—Afr. trop.
Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 164.—Afr. trop.
sclerophylla, *Harms, l. c.* xxviii. 415.—Afr. trop.

ELACHANTHUS, F. Muell. (Compos.).
occidentalis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 196.—Austral.

ELACHOLOMA, F. Muell. & Tate, in Vict. Nat. xii. (1895) 14; et ex Tate, in Rep. Horn Exped. iii. (1896) 190. *SCROPHULARIACEAE.*
Horni, *F. Muell. & Tate, ll. cc.*—Austral.

ELAEAGNUS, Tourn. (Elaeagn.).
Bockii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 482.—China.
Henryi, *Warb. ex Diels, l. c.* 483.—China.
lanceolata, *Warb. l. c.*—China.

ELAEOCARPUS, Burm. (Tiliac.).
Baeuerleni, *Maiden & R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, x. 469.—Austral.

ELAEOCARPUS:—
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 366, 641.—Celebes.
fauroensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 159.—Ins. Solomon.
floridanus, *Hemsl. l. c.* 158.—Ins. Solomon.
hainanensis, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2462.—China.
rarotongensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 159.—Ins. Cook.
Teysmannii, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 368, nomen.—Celebes.

ELAEODENDRON, Jacq. f. (Celastr.).
Afzelii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 157.—Afr. trop.
Buchananii, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 223 (= *Cassine Buchananii*).—Afr. trop.
lacinulatum, *Loes. l. c.* (= *C. lacinulata*).—Afr. trop.
schlechterianum, *Loes. l. c.* (= *C. schlechteriana*).—Afr. trop.
schweinfurthianum, *Loes. l. c.* (= *C. schweinfurthiana*).—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 156.—Afr. trop.
subrotundum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 356.—Penins. Mal.

ELATINE, Linn. (Elatin.).
orientalis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. (196)—Japon.
rubella, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 260.—Am. bor.
Williamsii, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

ELATOSTEMA, Forst. (Urtic.).
ambiguum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia ambigua*).—Ind. or.
angustifolium, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 621.—Ins. Samoa.
australe, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia australis*).—Ind. occ.
basiandrum, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 622.—Ins. Samoa.
bicuspidatum, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 352.—Java.
brachyurum, *Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
brevifolium, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia brevifolia*).—China.
burmanicum, *Hallier f. l. c.* (= *Pellionia burmanica*).—Ind. or.
caudatum, *Hallier f. l. c.* 307.—Malaya.
Engleri, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 623.—Ins. Samoa.
falcatum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 305.—Borneo.
Funkii, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 623.—Ins. Samoa.
Graeffei, *Reinecke, l. c.* 621.—Ins. Samoa.
grandifolium, *Reinecke, l. c.* 620.—Ins. Samoa.
griffithianum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia griffithiana*).—Ind. or.
helferianum, *Hallier f. l. c.* (= *Pellionia helferiana*).—Ind. or.
heterolobum, *Hallier f. l. c.* (= *Pellionia heteroloba*).—Ind. or.
heyneanum, *Hallier f. l. c.* (= *Pellionia heyneana*).—Ind. or.
insigne, *Hallier f. l. c.* 304.—Malaya.
javanicum, *Hallier f. l. c.* 316 (= *Pellionia javanica*).—Malaya.
Kraemeri, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 621.—Ins. Samoa.
lignescens, *Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
machaerophyllum, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 355.—Sumatra.
mesargyreum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 305.—Borneo.
obliquifolium, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 622.—Ins. Samoa.
Paxii, *Reinecke, l. c.*—Ins. Samoa.
pictum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 300.—Malaya.
polioneurum, *Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
puberulum, *Hallier f. l. c.* nomen.—Celebes.
pulchrum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia pulchra*).—Cochinch.
radicans, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 624 (non Wedd.).—Ins. Samoa.
ramosissimum, *Reinecke, l. c.*—Ins. Samoa.

ELATOSTEMA:—
repens, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Polychroa repens*).—Cochinch.
robustum, *Hallier f. l. c.* 302.—Malaya.
samoense, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 625.—Ins. Samoa.
scabrum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia scabra*).—China.
scandens, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 353.—Java.
stenocarpum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia stenocarpa*).—Ind. or.
strictum, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 625.—Ins. Samoa.
vittatum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 303.—Borneo.

ELECTRA, Panz. = **Schismus**, Beauv. (Gramin.).
calycina, Panz. in Denkschr. Acad. Muench. iv. 299 = S. fasciculatus.

ELEGIA, Linn. (Restiac.).
ciliata, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 8.—Hab. ?
elongata, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 114.—Afr. austr.
exilis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 7.—Afr. austr.
fastigata, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
fusca, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 754.—Afr. austr.
Galpinii, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.
gracilis, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.
membranacea, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 474.—Afr. austr.
obtusiflora, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 112.—Afr. austr.
persistens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 8.—Afr. austr.
Rehmannii, *Mast. l. c.* 7.—Afr. austr.
thyrsifera, *Pers. Syn.* ii. 607.—Afr. austr.

ELEOCHARIS, R. Br. (Cyperac.).
aciculariformis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 566.—Mexic.
alta, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 17.—Java.
ambigua, Urb. Symb. Antill. ii. 166 = subtilis.
Arechavaletae, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 14.—Urug.
aurea, *Boeck. l. c.* 15.—Mexic.
bahamensis, *Boeck. l. c.* ii. 11.—Ins. Baham.
Berlandieri, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 162.—Ind. occ.
brasiliensis, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 13.—Bras.
brehmeriana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 33.—Bolivia.
caduca, Aschers, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 597 = capitata.
camptotricha, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 69.—Ind. occ.; Am. sept.
Chaetaria, Hance, in Journ. Bot. 1878, 112 = acicularis.
costaricensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 34.—Am. cent.
crispovaginata, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 206.—Ecuador.
cubensis, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 10.—Cuba.
Durandii, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 34.—Reg. Argent.
dussiana, *Boeck. l. c.* 54.—Ind. occ.
exilis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Mexic.
flaccida, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = ochreata.
gableana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Ind. or.
gahleana, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 370, sphalm. = praec.
gambleana, Auct. l. c. sphalm. = gableana.
glauco-virens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 13.—Bras.
hyalino-vaginata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 52.—Chili.
Kuntzei, Boeck. Cyper. Nov. i. 14 = afflata.
lanceolata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 493.—Am. bor.
lehmanniana, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 205.—Ecuador.
lepida, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 349.—Chili.
Lepta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
leptocaulos, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 349.—Chili.
leptostachys, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 13.—Bras.
loefgreniana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 12.—Bras.
Macounii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 497.—Am. bor.

ELEOCHARIS:—
Mendoncae, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 12.—Bras.
mesopotamica, *Boeck. l. c.* i. 17.—Reg. Argent.
Minarum, *Boeck. l. c.* ii. 12.—Bras.
minutiflora, *Boeck. in Engl. Jahrb.* vii. 274.—Ind. occ.
monticola, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 496.—Am. bor.
Niederleinii, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 13.—Reg. Argent.
oligantha, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 69.—Ind. occ.
pachystyla, *C. B. Clarke, l. c.* 72.—Ind. occ.; Am. trop.
paracicularis, Boeck. in Engl. Jahrb. vii. 275, in obs. = Scirpus paracicularis.
parvula, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 215 = Scirpus nanus.
pellucida, Presl, Rel. Haenk. i. 196 = afflata.
Pittieri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 35.—Am. cent.
punctata, *Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. 464.—Am. cent.
purpureo-vaginata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 34.—Reg. Argent.
quinquangularis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 15.—Reg. Argent.
Reichei, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Chili.
retroflexa, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = E. Chaetaria.
Schaffneri, *Boeck. in Engl. Jahrb.* vii. 274.—Mexic.
Schenckii, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 13.—Bras.
Schlechteri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
Sintenisii, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Ind. occ.
squamata, *Boeck. l. c.* ii. 11.—Bras.
striata, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 149 = palustris.
thermalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 69.—Am. bor.
Tuerkheimii, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Am. cent.
univaginata, *Boeck. l. c.* 14.—Chili.
Urbani, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 20.—Bras.
vincentina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 348.—Chili.
viridis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 17.—Bras.
Vulcani, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 206.—N. Granat.
wrightiana, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 12.—Ind. occ.
Wrightii, C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill. ii. 69 = oligantha.

ELEOGITON, Link = **Scirpus**, Linn. (Cyperac.).
fascicularis, Nees, in Linnaea, x. 165 = S. fluitans.

ELEPHANTELLA, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 362. *SCROPHULARIACEAE.*
groenlandica, *Rydb. l. c.* 363 (= *Pedicularis groenlandica*).—Am. bor.

ELEPHANTOPUS, Linn. (Compos.).
multisetus, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 31.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 540.—Afr. trop.

ELEPHANTORRHIZA, Benth. (Legum.).
suffruticosa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 117.—Afr. trop.

ELETTARIA, Maton (Scitamin.).
hemisphaerica, Blume, Enum. Pl. Jav. 51 = Amomum hemisphaericum.

ELETTARIOPSIS, Baker (Scitamin.).
latifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 154.—Penins. Mal.
multiflora, *Ridley, l. c.* 157.—Sumatra.
pubescens, *Ridley, l. c.* 155 (= *Amomum elettarioides*).—Penins. Mal.

ELEUSINE, Gaertn. (Gramin.).
blepharoglumis, Ind. Kew. Suppl. I. 151, errore = Eragrostis blepharoglumis.
brevifolia, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 3815.—Ind. or.
calycina, Roxb. Fl. Ind. i. 347 = Dinebra arabica.
cerealis, Salisb. Prod. 19 = indica.
coracana, Gaertn. Fruct. i. 8 = indica.
dura, Lam. Illustr. i. 203 = Sclerochloa dura.
falcata, Spreng. Syst. i. 349 = Harpechloa capensis.
glaucophylla, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 107 = aristata.
Robecchii, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 171.—Afr. trop.

ELEUSINE:—
somalensis, *Hack. in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 6.—Afr. trop.
sphaerosperma, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 149 = indica.
stolonifera, R. Br. in Salt, Abyss. App. 63 = flagellifera.
stricta, Roxb. Fl. Ind. i. 344 = indica.
Tocussa, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. 141 = indica.
Wallichii, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 295 = brevifolia.

ELIAEA, Cambess. (Hyperic.).
brevistyla, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1219.—Madag.

ELIONURUS, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
Hensii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 326.—Afr. trop.
muticus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 350 (= *Lycurus muticus*).—Am. austr.
pallidus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 326.—Afr. trop.
papuanus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 171.—N. Guin.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 137.—Afr. trop.

ELLIPANTHUS, Hook. f. (Connar.).
Beccarii, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 378.—Cochinch.
cinereus, *Pierre, l. c.* t. 378 C.—Cochinch.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 9.—Malaya.
gibbosus, *King, l. c.* 10.—Penins. Mal.
Kingii, *Boerl. & Koord. in Ic. Bogor.* t. 18.—Java.
Scortechini, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 8.—Penins. Mal.
subrufus, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 378 D.—Cochinch.

ELSHOLTZIA, Willd. (Labiat.).
aquatica, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 451.—Afr. trop.
barbinervia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 104 = Comanthosphace japonica.
calycocarpa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 560.—China.
Carsonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 450.—Afr. trop.
stellipila, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 103 = Comanthosphace japonica.
sublanceolata, Miq. l. c. = Comanthosphace japonica.

ELYMUS, Linn. (Gramin.).
alaicus, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 77, 102.—Turkestan.
albowianus, *F. Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 383.—Fuegia.
arenicolus, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Agrost. Circ.* ix. 7.—Am. bor.
arkansanus, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 45.—Am. bor.
australis, *Scribn. & Ball, l. c.* 46.—Am. bor.
barbatus, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xv. 522.—Reg. Argent.
brachystachys, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 47.—Am. bor.; Mexic.
Brownii, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 7.—Am. bor.
capitatus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 55.—Am. bor.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 632.—Patag.
ciliatus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 57.—Am. bor.
diversiglumis, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 48.—Am. bor.
flavescens, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 8.—Am. bor.
glabriflorus, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 49.—Am. bor.
Hanseni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 56.—Am. bor.
hirsutiglumis, *Scribn. l. c.* 58.—Am. bor.
intermedius, Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vi. 38 = hirsutiglumis.
jenisseensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. I. 64 = dasystachyus.
lanatus, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 102.—Turkestan.
leptostachyus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 631.—Patag.
nutans, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 72 = sibiricus.

ELYMUS:—
oreophilus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 347.—Chili.
Palenae, *R. Phil. l. c.* 348.—Chili.
patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 630.—Patag.
Pringlei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 30.—Mexic.
robustus, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 37.—Am. bor.
saxicolus, *Scribn. & J. G. Sm. l. c.* xi. 56.—Am. bor.
simplex, *Scribn. & Williams, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 57.—Am. bor.
Spegazzinii, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xvi. 259.—Reg. Argent.
Thompsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 374.—Ind. or.
uniflorus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 349.—Chili.
villosissimus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 326.—Am. bor.
virescens, *Piper, in Erythea*, vii. 101.—Am. bor.

ELYNANTHUS, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.).
tenerrimus, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 112.—Afr. austr.

ELYTRANTHE, Blume = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Adamsii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 126 = L. Adamsii.
Balansae, Engl. l. c. (= *Aciella Balansae*).—N. Caled.
Beccarii, Engl. l. c. = L. Beccarii.
Casuarinae, Engl. l. c. = L. linophyllus.
Colensoi, Engl. l. c. = L. Colensoi.
Cumingii, Engl. l. c. (= *Amylotheca Cumingii*).—Ins. Philipp.
decussata, Engl. l. c. = L. decussatus.
Deplanchei, Engl. l. c. (= *Aciella Deplanchei*).—N. Caled.
dictyophleba, Engl. l. c. = L. dictyophlebus.
evenia, Engl. l. c. = L. avenis.
Exocarpi, Engl. l. c. = L. Exocarpi.
flavida, Engl. l. c. = L. flavida.
formosa, Engl. l. c. = L. formosus.
forsteriana, Engl. l. c. = L. forsterianus.
Haastii, Engl. l. c. = L. Haastii.
Hollrungii, Engl. l. c. = L. Hollrungii.
insularum, Engl. l. c. = L. insularum.
lanceolata, Engl. l. c. (= *Aciella lanceolata*).—N. Caled.
lifuensis, Engl. l. c. (= *Aciella lifuensis*).—N. Caled.
Murrayi, Engl. l. c. = L. Murrayi.
Pancheri, Engl. l. c. (= *Aciella Pancheri*).—N. Caled.
polychroa, Engl. l. c. = L. polychrous.
pseudoperfoliata, Engl. l. c. = L. pseudoperfoliata.
punctata, Engl. l. c. = L. punctatus.
pyramidata, Engl. l. c. (= *Aciella pyramidata*).—N. Caled.
Ralphii, Engl. l. c. = L. Ralphii.
rubra, Engl. l. c. (= *Aciella rubra*).—N. Caled.
signata, Engl. l. c. = L. signatus.
sumbawensis, Engl. l. c. (= *Amylotheca sumbawensis*).—Austral.
tenuifolia, Engl. l. c. (= *Aciella tenuifolia*).—N. Caled.
tetrapetala, Engl. l. c. = L. tetrapetalus.
triflora, Engl. l. c. = L. triflorus.
uniflora, Engl. l. c. (= *Peroxilla uniflora*).—N. Zel.
vitiensis, Engl. l. c. = L. vitiensis.
Zollingerii, Engl. l. c. (= *Amylotheca Zollingeri*).—Austral.

ELYTRARIA, Michx. (Acanth.).
acaulis, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 304 (= *Justicia acaulis*).—Am. trop.
carolinensis, *Lindau, l. c.* (= *Anonymos carolinensis*).—Am. bor.
squamosa, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 299 (= *Verbena squamosa*).—Reg. trop.

ELYTROPAPPUS, Cass. (Compos.).
scaber, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 145 = ambigua.

EMBELIA, Burm. f. (Myrsin.).
Mujenja, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 446.—Afr. trop.
pauciflora, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 517.—China.
pellucida, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 390 (= *Pattara pellucida*).—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* (= *Pattara Welwitschii*).—Afr. trop.

EMERUS, Tourn. = **Coronilla**, Linn. (Legum.).
marginatus, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 7. 7 (= *Sesbania marginata*).—Am. trop.

EMICOCARPUS, K. Schum. & Schlechter, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) Beibl. lxvi. 21. *ASCLEPIADACEAE.*
fissifolius, *K. Schum. & Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

EMILIA, Cass. (Compos.).
albocostata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 596.—Afr. trop.
basifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.

EMMENANTHE, Benth. (Hydrophyll.).
salina, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 381.—Am. bor.
scopulina, *A. Nelson, l. c.* 380.—Am. bor.

EMPOGONA, Hook. f. (Rubiac.).
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 67.—Afr. austr.

EMPUSA, Lindl. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
paradoxa, Lindl. Bot. Reg. sub t. 825 = L. nervosa.

ENANTIA, Oliv. (Anonac.).
Kummeriae, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 57.—Afr. trop.

ENARTHROCARPUS, Labill. (Crucif.).
Chevallieri, *Baratte, ex L. Chevall. in Mém. Herb. Boiss.* no. 7, 2.—Afr. bor.

ENCELIA, Adans. (Compos.).
hirsuta, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 145.—Reg. Argent.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 573.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 43.—Ecuador.
tenuis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 94.—Mexic.

ENCEPHALARTOS, Lehm. (Cycad.).
lemarinelianus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 80.—Afr. trop.

ENCHOLIRIUM, Mart. = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.).
subsecundum, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 540 = D. spectabilis.

ENDIANDRA, R. Br. (Laurac.).
globosa, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 149.—Austral.
insignis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 80 (= *Cryptocarya insignis*).—Austral.
macrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 136 (= *Dictyodaphne macrophylla*).—Malaya.
micrantha, *Boerl. l. c.* (= *Dictyodaphne micrantha*).—Java.

ENDOSIPHON, T. Anders. (Acanth.).
obliquus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 50.—Afr. trop.

ENDRESSIA, J. Gay = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).
castellana, Coincy, in Journ. de Bot. 1898, 3.—Eur.

ENGLERIA, O. Hoffm. (Compos.).
decumbens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 591 (= *Adenogonum decumbens*).—Afr. trop.

ENGLEROPHOENIX, Kuntze = **Maximiliana**, Mart. (Palm.).
insignis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 322 = M. insignis.

ENHYDRIAS, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 69. *HYDROCHARIDACEAE.*
angustipetala, *Ridley, l. c.*—Malaya.

ENKIANTHUS, Lour. (Ericac.).
nipponicus, *Palib. Rev. Gen. Enkianthus*, 11.—Japon.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 509.—China.

ENNEAPOGON, Desv. (Gram.).
abyssinicum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 229.—Afr. trop.
benguellense, *Rendle, l. c.* 230.—Afr. trop.
brachystachyus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 654.—Afr. austr.
dipsaceus, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 301 = Pappophorum elegans.
mollis, *Lehm. Pugill.* iii. 40.—Afr. austr.
persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 71 = Pappophorum Aucheri.
pusillum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 229.—Afr. trop.
scaber, *Lehm. Pugill.* iii. 41.—Afr. austr.
scoparius, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 656.—Afr. austr.

ENSLENIA, Nutt. (Asclep.).
ligulata, *Benth. Pl. Hartw.* 290.—Mexic.
lingulata, Ind. Kew. i. 841, sphalm. = praec.

ENTADA, Adans. (Legum.).
arenaria, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 118.—Afr. trop.
borneensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 307.—Malaya.
spiralis, *Ridley, l. c.* 305.—Malaya.

ENTANDOPHRAGMA, C. DC. (Meliac.).
candolleana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 14.—Afr. trop.
Candollei, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 181.—Afr. trop.

ENTEROLOBIUM, Mart. (Legum.).
Saman, Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 252 = Pithecolobium Saman.

ENTEROPOGON, Nees (Gramin.).
muticus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 25.—Afr. trop.
ruspolianum, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 72.—Afr. trop.
somalense, *Chiov. l. c.* vi. 170.—Afr. trop.

ENTOPLOCAMIA, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 710 (1900). *GRAMINEAE.*
aristulata, *Stapf, l. c.* 711.—Afr. austr.
benguellensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 228.—Afr. trop.

EPACRIS, Forst. (Epacrid.).
Hamiltoni, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 102.—Austral.

EPHEBOPOGON, Nees & Meyen = **Pollinia**, Trin. (Gramin.).
gratus, Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II. i. 556 = P. grata.

EPHEDRA, Tourn. (Gnetac.).
gracilis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 518.—Chili.
nana, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 235.—Reg. Magell.
patagonica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 518.—Chili.

EPICHARIS, Blume (Meliac.).
hoaensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 349 A.—Cochinch.

EPIDENDRUM, Linn. (Orchid.).
altissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 471 (non Batem.).—N. Granat.
aporoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 501.—N. Granat.
arundinaceum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 471.—N. Granat.
atrorubens, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 46.—Mexic.
bolbophylloides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 463.—N. Granat.
brachybulbum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—N. Granat.
brassivolaeforme, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
Buenaventurae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 470.—N. Granat.
calyptratum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 473.—N. Granat.
chondrochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 467.—N. Granat.
cirrhochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 466.—Ecuador.
condylochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 459.—N. Granat.
confusum, *Rolfe, Orchid Review*, 1899, 197.—Guatem.
cornanthera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 463.—N. Granat.
Cuchibambae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 467.—Ecuador.
cupreum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 476.—Ecuador.
elegantissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 472.—Ecuador.
englerianum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 466.—Ecuador.
falcisepalum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 474.—Ecuador.
fractiflexum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 468 (non Rodrig.).—Am. cent.
globiflorum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 469.—Ecuador.
gracillimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 473 (non Reichb. f. & Warsc.).—Ecuador.

EPIDENDRUM:—
Harrisii, *Fawcett, in Urb. Symb. Antill.* i. 291.—Ind. occ.
intertextum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 466.—Ecuador.
Latro, *Reichb. f. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 82.—Bras.
leucopyramis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 459.—Ecuador.
Loefgrenii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 181.—Bras.
loxense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 469.—Ecuador.
macrothyrsis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 472.—Ecuador.
marsupiale, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 474.—Ecuador.
Medusae, *Siebert, in Gartenfl.* 1900, 516.—Hort.
modestissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 469.—N. Granat.
Mosenii, Barb. Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 144 = Rodriguezii.
Mosquerae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 472.—Ecuador.
oligophyllum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 477.—N. Granat.
organense, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 194.—Bras.
papyriferum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 543.—Am. cent.
paulense, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 159.—Bras.
pendulum, *Cogn. l. c.* 182.—Bras.
polyphyllum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 470 (non Vell.).—Ecuador.
popayanense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 475.—N. Granat.
porquerense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
prostratum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 112 (= *Physinga prostrata*).—Guiana.
quadridentatum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 459.—N. Granat.
Rodriguezii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 176.—Bras.
rolfeanum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 468.—N. Granat.
rupicolum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 153.—Bras.
sophronitoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 464.—Ecuador.
sphenoglossum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 460.—Ecuador.
stanhopeanum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, II. 29.—N. Granat.
tenuicaule, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 468.—Ecuador.
Tequendamae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 475.—N. Granat.
trachypus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
xipheroides, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 63.—Bras.
zosterifolium, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 474.—Ecuador.

EPILOBIUM, Dill. (Onagr.).
antarcticum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 97 = Lechleri.
athelespermum, Lév. in Monde des Plantes, vi. 22 = alpinum.
benguellense, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 378.—Afr. trop.
concinnum, *Congd. in Erythea*, vii. 184.—Am. bor.
elegans, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 422.—N. Zel.
Fauriei, *Lév. in Monde des Plantes*, v. 93.—Japon.
Hammondi, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 224.—Am. bor.
neriifolium, Lév. in Monde des Plantes, vi. 2 = angustifolium.
occidentale, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 275.—Am. bor.
perplexum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 170.—N. Zel.
pictum, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 538.—N. Zel.
rostratum, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 534.—N. Zel.
rouyanum, *Lév. in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1900, 210.—Japon.
vernicosum, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 535.—N. Zel.
wyomingense, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 194.—Am. bor.

EPINETRUM, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. (1896) 21. *MENISPERMACEAE.*
undulatum, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

EPIPACTIS, Adans. (Orchid.).
americana, Lindl. in Ann. Nat. Hist. iv. 385 = gigantea.
gigantea, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 202.—Am. bor.; As. temp.
royleana, Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal. 368 = gigantea.
somalensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 189.—Afr. trop.

EPIPHYSTIS, Trin. = **Torulinium**, Desv. (Cyper.).
ophiuroides, Trin. Fund. Agrost. 98 = T. filiforme.

EPIPREMNUM, Schott (Arac.).
crassifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 12.—Hort.
Dahlii, *Engl. l. c.* 11.—N. Brit.
falcifolium, *Engl. l. c.*—Hort.
foraminiferum, *Engl. l. c.*—Hort.
mooreense, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1899, 6.—Ins. Societ.

EPISCIA, Mart. (Gesner.).
longipetiolata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 152.—Am. cent.

EPISTEPHIUM, Kunth (Orchid.).
Regis-alberti, *Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 291.—N. Caled.

ERAGROSTIS, Host (Gramin.).
aethiopica, *Chiov. in Robecchi, Somalia*, 726; *et in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 173.—Afr. trop.
agrostoidea, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 240.—Afr. trop.
airaeformis, *Rendle, l. c.* 243.—Afr. trop.
andongensis, *Rendle, l. c.* 236.—Afr. trop.
Atherstonei, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 607.—Afr. austr.
atropurpurea, Steud. Syn. Pl. Gram. 267 = nigra.
aurea, Steud. l. c. = interrupta.
Barbeyi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 760.—Oriens.
barbulata, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 319.—Ind. or.
beroensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 241.—Afr. trop.
blepharoglumis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* 113.—Afr. trop.
blepharostachya, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 336.—Afr. trop.
brachyphylla, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 327.—Ind. or.
brevifolia, Benth. in Hook. Ic. Pl. sub t. 1368 = Eleusine brevifolia.
browneana, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 205 = elongata.
Brownei, Nees, Fl. Afr. Austr. 396 = elongata.
Burchellii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 608.—Afr. austr.
caesia, *Stapf, l. c.* 599.—Afr. austr.
caniflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 232.—Afr. trop.
Chapelieri, Peters, Reise Mossamb. Bot. 560 = seq.
Chapellieri, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 392.—Afr. austr.
coarctata, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 313.—Ind. or.
Collettii, *Stapf, l. c.* 326.—Ind. or.
Cumingii, Steud. Syn. Pl. Gram. 266 = elongata.
cylindrispica, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 252.—Afr. trop.
cynosuroides, Beauv. Agrost. 71 = Desmostachya bipinnata.
densiflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 244 (non Hack.).—Afr. trop.
dura, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 609.—Afr. austr.
echinochoidea, *Stapf, l. c.* 627.—Afr. austr.
elata, Munro, ex Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. 32 = superba.
elatior, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 617.—Afr. austr.
elegantula, Nees, ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 27 = stenophylla.
elegantula, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 266.—Ind. or.
emarginata, Hack. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxx. 238 = porosa.
enodis, Hack. l. c. 148 = cyperoides.
filiformis, Nees, in Linnaea, vii. 330 = curvula.
flaccida, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 17.—Bras.
flavicans, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 253.—Afr. trop.
flexuosa, Steud. Syn. Pl. Gram. 266 = major.

ERAGROSTIS:—
Frederici, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 246.—Afr. trop.
gangetica, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 266.—As. trop.; Afr. trop. et austr.
guingensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 254.—Afr. trop.
habrantha, *Rendle, l. c.* 246.—Afr. trop.
hararensis, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 163.—Afr. trop.
heteromera, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 610.—Afr. austr.
hierniana, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 237.—Afr. trop.
hirsuta, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 98 (= *Poa hirsuta*, Michx.).—Am. bor.
Hochstetteri, Steud. Syn. Pl. Gram. 268 = interrupta.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 242.—Afr. trop.
japonica, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 405 = interrupta.
laxa, Baker, Fl. Maurit. 456 = tenella.
laxiflora, Schrad. in Linnaea, xii. 451 = aspera.
Lehmannii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvii. 32.—Ecuador.
leioptera, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 325.—Ind. or.
lepida, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 424 = ciliaris.
Lindmani, *Hack. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 19.—Bras.
lobata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 396 = ciliaris.
lutescens, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Agrost. Circ.* ix. 7.—Am. bor.
luzoniensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 266 = gangetica.
Makinoi, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 725.—Formosa.
malayana, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 317.—Ind. or.
mangalorica, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 26 = tenella.
margaritacea, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 604.—Afr. austr.
microsperma, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 248.—Afr. trop.
minutiflora, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 274 = interrupta.
multiflora, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 401 = tremula.
namaquensis, *Nees, Ind. Sem. Vratisl.* 1835.—Afr. austr.
nardoides, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. i. 415.—Ind. or.
natalensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 28.—Afr. austr.
nebulosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 603.—Afr. austr.
nutans, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 563 = interrupta.
obtusiflora, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 10 (= *Brizopyrum obtusiflorum*).—Am. bor.
orientalis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. II. Suppl. 73 = ferruginea.
parviglumis, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 267 = tenuifolia.
passa, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 238.—Afr. trop.
phleoides, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 313 (non Hillebr.).—Ind. or.
platyphylla, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 239.—Afr. trop.
Poa, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 605.—Afr. austr.
procerior, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 235.—Afr. trop.
pubescens, Steud. Syn. Pl. Gram. 279 = elongata.
pulchella, Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 188 = ciliaris.
pusilla, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 27.—Afr. austr.
quadriflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 245.—Afr. trop.
racemosa, Steud. Syn. Pl. Gram. 271 = chalcantha.
rejuvenescens, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 250.—Afr. trop.
rigidifolia, Hochst. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 323 = papposa.
riparia, Steud. Syn. Pl. Gram. 265 = tenella.
rotifer, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 242.—Afr. trop.
Rottleri, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 321.—Ind. or.
rubens, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 26 = amabilis.
sabulicola, *Pilg. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 269, nomen.—Afr. trop.

ERAGROSTIS:—
secunda, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 264.—Ind. or.
sporoboloides, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 607 (non J. G. Sm. et Buch.).—Afr. austr.
stenophylla, *Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind.* ii. 27.—Ind. or.
stricta, Steud. Syn. Pl. Gram. 264 = interrupta.
subulata, Nees, Fl. Afr. Austr. 399 = curvula.
tenella, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 576.—Ind. or.
tenellula, Steud. Syn. Pl. Gram. 279 = interrupta.
terebinthacea, Kurz, ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 316 = tenella.
thraulostachys, K. Schum. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 325 = bifaria.
thunbergiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 271 = curvula.
unioloides, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 264 = amabilis.
vacillans, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 249.—Afr. trop.
variegata, *Welw. ex Rendle, l. c.* 251.—Afr. trop.
viscosa, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 51.—Am. bor.
viscosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 397 = tenella.
Walkeri, *Stapf, in Trim. Fl. Ceylon*, v. 298.—Zeylan.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 234.—Afr. trop.
willdenowiana, Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 252 = elongata.
willdenowiana, *Nees, in Wight Cat.* n. 1779, non alibi.—Ind. or.
Wilmsii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 606.—Afr. austr.

ERANTHEMUM, Linn. (Acanth.).
acanthophorum, Roem. & Schult. Syst. i. Mant. 154 = Barleria acanthophora.
ardisioides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 173.—Afr. trop.
aureo-reticulatum, Hort. in Hook. f. Bot. Mag. t. 7480 = reticulatum.
elegans, Roem. & Schult. Syst. i. 174 = Lankesteria elegans.
Hildebrandtii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 172.—Afr. trop.
hispidum, Nees, in DC. Prod. xi. 456 = Lankesteria parviflora.
Huegelii, *Burkill, in Proc. Camb. Phil. Soc.* ix. II. 96.—N. Brit.
Lindaui, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 173.—Afr. trop.
Mannii, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 172 = ludovicianum.
seticalyx, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
spinosum, Lour. Fl. Cochinch. i. 19 = Barleria acanthophora.
subviscosum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 173.—Afr. trop.
velutinum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 661 (= *Pseuderanthemum velutinum*).—Malaya.

ERECHTITES, Rafin. (Compos.).
missionum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 73.—Bras.
polypodioides, *Greene, Pittonia*, iii. 90 (= *Senecio gracilipes*).—Mexic.

EREMANTHUS, Less. (Compos.).
Descampsii, *Klatt, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. t. 50.—Afr. trop.
harmsianus, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 454.—Bras.
mattogrossensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 145.—Bras.
rivularis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 453.—Bras.

EREMOLEPIS, Griseb. (Loranth.).
Glaziovii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Basicarpus Glaziovii*).—Bras.

EREMOPHILA, R. Br. (Myopor.).
granitica, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 214.—Austral.
Margarethae, *S. Moore, l. c.* 211.—Austral.
metallicorum, *S. Moore, l. c.* 213.—Austral.
punicea, *S. Moore, l. c.* 212.—Austral.

EREMOSEMIUM, Greene, Pittonia, iv. (1900) 225 = **Grayia**, Hook. & Arn. (Chenopod.).
Brandegei, Greene, l. c. = G. Brandegii.
spinosum, Greene, l. c. = G. polygalioides.

EREMURUS, Bieb. (Liliac.).
Elwesii, *Micheli, in Rev. Hort.* 1897, 280.—Hort.

ERIA, Lindl. (Orchid.).
bidens, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 289.—Penins. Mal.
Brandisii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 589.—Burma.
brunea, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 297.—Penins. Mal.
caespitosa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 194.—China.
celebica, *Rolfe, l. c.* 1899, 128.—Celebes.
cepifolia, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 282.—Borneo.
clausa, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 121.—Ind. or.
crucigera, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 280.—Borneo.
cymbidifolia, *Ridl. in Journ. Bot.* 1898, 212.—Borneo.
dasystachys, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 296.—Penins. Mal.
densa, *Ridl. l. c.* 281.—Malaya.
dissitiflora, *Ridl. l. c.* xxxii. 292.—Penins. Mal.
elongata, *Ridl. l. c.* xxxi. 284 (non Blume).—Borneo.
Endymion, *Ridl. l. c.* xxxii. 295.—Penins. Mal.
fibuliformis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 336.—Ind. or.
formosana, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 194.—Formosa.
hispidissima, *Ridl. in Journ. Bot.* 1898, 213.—Malaya.
latibracteata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 293.—Penins. Mal.
latibracteata, *Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7605 (non Ridl.).—Borneo.
longerepens, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 282.—Malaya.
lorifolia, *Ridl. l. c.* xxxii. 296.—Penins. Mal.
megalopha, *Ridl. in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 23.—Borneo.
minutiflora, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 297 = Agrostophyllum pauciflorum.
neglecta, *Ridl. l. c.* xxxi. 283.—Malaya.
ornithoides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxv. 606.—Ins. Samoa.
paradoxa, *Kraenzl. l. c.*—Ins. Samoa.
parviflora, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 15.—N. Guin.
pensilis, *Ridl. in Journ. Bot.* 1898, 213.—Sumatra.
pilifera, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 299.—Penins. Mal.
poculata, *Ridl. l. c.* 305.—Penins. Mal.
Prainii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 210.—Ind. or.
pudica, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 294.—Penins. Mal.
shanensis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 589.—Burma.
suaveolens, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 292.—Penins. Mal.
sumatrensis, *Ridl. in Journ. Bot.* 1898, 212.—Sumatra.
tenuiflora, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 249, nomen (non Ridl.).—N. Guin.
tenuiflora, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 291.—Penins. Mal.
tricuspidata, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 128.—Celebes.

ERIACHNE, R. Br. (Gramin.).
ampla, Nees, Fl. Afr. Austr. 277 = Achneria ampla.
assimilis, Steud. Syn. Pl. Gram. 236 = Achneria Ecklonii.
aurea, Nees, Fl. Afr. Austr. 276 = Achneria aurea.
capensis, Steud. in Flora, 1829, 470 = Achneria capensis.
Ecklonii, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 273 = Achneria Ecklonii.
microphylla, Nees, l. c. 277 = Achneria microphylla.
Steudelii, Nees, l. c. 278 = Achneria capensis.
tuberculata, Nees, l. c. 274 = Achneria setifolia.

ERIANTHUS, Michx. (Gramin.).
aureus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 412 = Pollinia Cummingii.
elephantinus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 122.—Ind. or.
formosanus, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 228.—Formosa.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 122 = Saccharum Sara.
junceus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 324.—Afr. austr.
laxus, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 344.—Am. bor.
mishmeensis, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 124 = longisetosus.
mollis, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 92 = Pollinia mollis.

ERIANTHUS:—
nudipes, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 92 = Miscanthus nudipes.
sikkimensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 123.—Ind. or.
Smallii, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 429.—Am. bor.
speciosus, Debeaux, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, xxxii. 53 = Pollinia speciosa.
Tracyi, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 37.—Am. bor.
tristachyus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 241 = Pollinia argentea.

ERIBROMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1273. *STERCULIACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* 1275.—Afr. trop.

ERICA, Tourn. (Ericac.).
aspalathoides, *Guthrie & Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 173.—Afr. austr.
ciliata, Bub. Fl. Pyren. ii. 10 = ciliaris.
Maximiliani, *Guthrie & Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 173.—Afr. austr.
tenuifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 12 = cinerea.

ERIGERON, Linn. (Compos.).
accedens, *Greene, Pittonia*, iv. 155.—Am. bor.
angustifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 295.—Am. bor.
aphanactis, *Greene, Fl. Francisc.* 389.—Am. bor.
arenarius, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 121.—Am. bor.
arthrotrichus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 547.—Afr. trop.
Blochmanae, *Greene, Pittonia*, iii. 25.—Am. bor.
cervinus, *Greene, l. c.* 163.—Am. bor.
condensatus, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 511.—Am. bor.
consobrinus, *Greene, Pittonia*, iii. 186.—Am. bor.
conspicuus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 400.—Am. bor.
curvifolius, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 396.—Am. bor.
debilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 408.—Am. bor.
Drummondii, *Greene, Pittonia*, iii. 295.—Am. bor.
elatior, *Greene, l. c.* 163.—Am. bor.
elatus, *Greene, l. c.* 164.—Am. bor.
Elmeri, *Greene, Fl. Francisc.* 393 (= *Aster Elmeri*).—Am. bor.
Engelmanni, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 247.—Am. bor.
erianthus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 530.—Patag.
eximius, *Greene, Pittonia*, iii. 295.—Am. bor.
flabellifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 545.—Am. bor.
formosissimus, *Greene, l. c.* 1898, 121.—Am. bor.
frondeus, *Greene, Fl. Francisc.* 387.—Am. bor.
glaucifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 145.—Reg. Argent.
Gormani, *Greene, Pittonia*, iv. 156.—Am. bor.
gracilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 404.—Am. bor.
Grayi, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 628.—Am. bor.
inamoenus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 248.—Am. bor.
jucundus, *Greene, Pittonia*, iii. 165.—Am. bor.
Kindbergi, *Greene, l. c.*—Am. bor.
lassenianus, *Greene, Fl. Francisc.* 389.—Am. bor.
luteus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 33.—Am. bor.
MacDougalii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 591.—Am. bor.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 162.—Am. bor.
mariposanus, *Congd. in Erythea*, vii. 185.—Am. bor.
melanocephalus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 246.—Am. bor.
membranaceus, *Greene, Pittonia*, iii. 294.—Am. bor.
microlonchus, *Greene, l. c.* 293.—Am. bor.
minor, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 295.—Am. bor.
montanensis, *Rydb. l. c.* 296.—Am. bor.
multifidus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 402.—Am. bor.
Nelsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 294.—Am. bor.
Nuttallii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 628.—Am. bor.

ERIGERON :—
oblanceolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 294.—Am. bor.
peregrinus, *Greene, Pittonia*, iii. 166 (= *Aster peregrinus*).—Am. bor.
pinnatisectus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 246.—Am. bor.
plantagineus, *Greene, Pittonia*, iii. 292.—Am. bor.
platensis, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 33.—Reg. Argent.
porphyreticus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 33.—Am. bor.
pulcherrimus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 200.—Am. bor.
purpuratus, *Greene, Pittonia*, iv. 155.—Am. bor.
pygmaeus, *Greene, Fl. Francisc.* 390.—Am. bor.
robertianus, *Greene, Pittonia*, iii. 293.—Am. bor.
simplex, *Greene, Fl. Francisc.* 387.—Am. bor.
socorrensis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 4.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 20.—Ecuador.
sparsifolius, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 297.—Am. bor.
spathulifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 545.—Am. bor.
subcanescens, *Rydb. l. c.* 1897, 294.—Am. bor.
tenuissimus, *Greene, Pittonia*, iii. 25.—Am. bor.
tetrapleurus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 628.—Am. bor.
tunariensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 146.—Bolivia.
weddellianus, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 21.—Ecuador.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 548.—Afr. trop.
wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 248.—Am. bor.
yellowstonensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 198.—Am. bor.

ERIOCARPUM, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
megacephalum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 107.—Am. bor.
serratum, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 119.—Am. bor.
Wootonii, *Greene, l. c.* 120.—Am. bor.

ERIOCAULON, Linn. (Eriocaul.).
amboense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 35.—Afr. trop.
andongense, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 100.—Afr. trop.
Antunesii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 76.—Afr. trop.
Bauri, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 54.—Afr. austr.
bongense, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 75.—Afr. trop.
Buchananii, *Ruhl. l. c.* 83.—Afr. trop.
ciliisepalum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 98.—Afr. trop.
gilgianum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 84.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Koernicke, ex Ruhl. l. c.* 73.—Madag.
huillense, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.
huillense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 95.—Afr. trop.
Johnstonii, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 82.—Ins. Maurit.
lacteum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 99.—Afr. trop.
limosum, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 74.—Afr. trop.
longipetalum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 96.—Afr. trop.
mesanthemoides, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 79.—Afr. trop.
natalense, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 76.—Afr. austr.
piliflorum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 80.—Madag.
pseudocompressum, *Ruhl. in Urb. Symb. Antill.* i. 492.—Ind. occ.
Schimperi, *Koernicke, ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 80.—Afr. trop.
Schlechteri, *Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 74.—Afr. trop.
stoloniferum, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 101.—Afr. trop.
submersum, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. 291.—Austral.

ERIOCAULON :—
submersum, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 100.—Afr. trop.
Teusczii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 77.—Afr. trop.
transvaalicum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 54.—Afr. austr.
trilobatum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 81.—Madag.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 8.—Ind. or.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 97.—Afr. trop.
Woodii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 57.—Afr. austr.
zambesiense, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 75.—Afr. trop.

ERIOCEPHALUS, Linn. (Compos.).
xerophilus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 206.—Afr. austr.

ERIOCHLOA, H. B. & K. (Gramin.).
annulata, Kunth, Rév. Gram. i. 30 = polystachya.
decumbens, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 234.—Austral.
Nelsoni, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 12.—Mexic.
punctata, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 5 = polystachya.
succincta, Kunth, Enum. Pl. i. 73 = polystachya.
sundaica, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 606 = polystachya.

ERIOCHRYSIS, Beauv. = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).
pallida, Munro, in Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 440 = S. munroanum.

ERIOCOMA, Nutt. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
caduca, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 25 (= *Stipa caduca*).—Am. bor.

ERIODICTYON, Benth. (Hydrophyll.).
niveum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 130.—Am. bor.
Traskiae, *Eastw. l. c.* 131.—Am. bor.

ERIOGONUM, Michx. (Polygon.).
anemophilum, *Greene, Pittonia*, iii. 199.—Am. bor.
aridum, *Greene, l. c.* 200.—Am. bor.
Bloomeri, *Parish, in Erythea*, vi. 87.—Am. bor.
capillare, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 51.—Am. bor.
clavatum, *Small, l. c.* 50.—Am. bor.
clavellatum, *Small, l. c.* 48.—Am. bor.
cognatum, *Greene, Pittonia*, iii. 201.—Am. bor.
Covillei, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 42.—Am. bor.
croceum, *Small, l. c.* 43.—Am. bor.
curvatum, *Small, l. c.* 50.—Am. bor.
densum, *Greene, Pittonia*, iii. 17.—Am. bor.
depauperatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 40.—Am. bor.
dumosum, *Greene, Pittonia*, iii. 199.—Am. bor.
formosum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 456.—Am. bor.
glaucum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 51.—Am. bor.
Harfordii, *Small, l. c.* 47.—Am. bor.
latum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 121.—Am. bor.
luteolum, *Greene, Pittonia*, iii. 200.—Am. bor.
minimum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 47.—Am. bor.
nodosum, *Small, l. c.* 49.—Am. bor.
ochroleucum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 123.—Am. bor.
pallidum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 49.—Am. bor.
peninsulare, *Brandegee, in Erythea*, v. 79.—Am. bor.
Piperi, *Greene, Pittonia*, iii. 263.—Am. bor.
polyphyllum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 119.—Am. bor.
polypodum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 46.—Am. bor.
Porteri, *Small, l. c.* 41.—Am. bor.
pulvinatum, *Small, l. c.* 44.—Am. bor.
Purpusi, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 457.—Am. bor.
ramosissimum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 322.—Am. bor.

ERIOGONUM :—
rosulatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 46.—Am. bor.
siskiyouensis, *Small, l. c.* 44.—Am. bor.
Stokesae, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 39.—Am. bor.
subalpinum, *Greene, Pittonia*, iii. 18.—Am. bor.
tenue, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 44.—Am. bor.
trichotomum, *Small, l. c.* 43.—Am. bor.
trinervata, *Small, l. c.* 52.—Am. bor.
turbinatum, *Small, l. c.*—Am. bor.
vineum, *Small, l. c.* 45.—Am. bor.
Wetherillii, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 319.—Am. bor.

ERIOPHORUM, Linn. (Cyperac.).
paucinervum, *Eaton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 341.—Am. bor.

ERIOPHYLLUM, Lag. (Compos.).
aureum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 449.—Am. bor.
bahiaefolium, *Greene, Fl. Francisc.* 446 (= *Monolopia bahiaefolia*).—Am. bor.
Congdoni, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 449.—Am. bor.
grandiflorum, *Greene, Fl. Francisc.* 443.—Am. bor.
Heermanni, *Greene, l. c.* 445 (= *Monolopia Heermannii*).—Am. bor.
integrifolium, *Greene, l. c.* 444 (= *Trichophyllum integrifolium*).—Am. bor.
leucophyllum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 422.—Am. bor.
multiflorum, *Rydb. l. c.* (= *Trichophyllum multiflorum*).—Am. bor.
paleaceum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 450.—Am. bor.
pedunculatum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 270.—Am. bor.
ternatum, *Greene, Pittonia*, iii. 185.—Am. bor.

ERIOPSIS, Lindl. (Orchid.).
Helenae, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, II. 98.—Peruv.

ERIOSEMA, DC. (Legum.).
chrysadenium, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 195.—Afr. trop.
cryptanthum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 264.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 18.—Afr. trop.
monticola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 196.—Afr. trop.
togense, *Taub. l. c.* 195.—Afr. trop.

ERIOSPERMUM, Jacq. (Liliac.).
alcicorne, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 377.—Afr. austr.
bechuanicum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 472.—Afr. trop.
Burchellii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 372.—Afr. austr.
cernuum, *Baker, l. c.* 370.—Afr. austr.
Curròri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 474.—Afr. trop.
dissitiflorum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
elatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 471.—Afr. trop.
Fleckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 37.—Afr. austr.
Galpinii, *Schinz, l. c.* iv. 416.—Afr. austr.
Haygarthii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 370.—Afr. austr.
linearifolium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 473.—Afr. trop.
luteorubrum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 372.—Afr. austr.
microphyllum, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
natalense, *Baker, l. c.* 373.—Afr. austr.
ophioglossoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 283.—Afr. austr.
patentiflorum, *Schlechter, l. c.* 1898, 27.—Afr. austr.
Rautanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 522.—Afr. austr.
roseum, *Schinz, l. c.* iv. *App.* III. 38.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 534.—Afr. austr.
somalense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 416.—Afr. trop.

ERIOSPERMUM:—
sphaerophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 472.—Afr. trop.
sprengerianum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 416.—Hort.
tenellum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 377.—Afr. austr.
thyrsoideum, *Baker, l. c.* 375.—Afr. austr.
tulbaghioides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 164.—Afr. trop.
villosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 371.—Afr. austr.

ERITHALIS, P. Br. (Rubiac.).
acuminata, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 319.—Ind. occ.
quadrangularis, *Krug & Urb. l. c.* 320.—Ind. occ.

ERITRICHIUM, Schrad. (Borag.).
Howardii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 327 (= *Omphalodes Howardii*).—Am. bor.
pampeanum, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 44.—Reg. Argent.

ERODIUM, L'Hérit. (Geran.).
longirostrum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 208.—Eur.

EROTEUM, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).
hirsutum, G. Maza, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xix. 222.—Ind. occ.

ERUCA, Tourn. (Crucif.).
aurea, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 247.—Afr. bor.
Eruca, Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 362 = sativa.

ERUCARIA, Gaertn. (Crucif.).
myagroides, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 123 = aleppica.

ERYCIBE, Roxb. (Convolv.).
albiflora, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 1052.—Ind. or.
macrophylla, *Hallier f. l. c.* 741.—Java.
parvifolia, *Hallier f. l. c.* 739.—Sumatra.
ramiflora, *Hallier f. l. c.* 743.—Sumatra.

ERYNGIUM, Tourn. (Umbellif.).
amethystinodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 112.—Chili.
chubutense, *Neger, ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 254.—Patag.
columnare, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2510.—Mexic.
cryptanthum, *Hemsl. l. c.* t. 2509.—Mexic.
elongatum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 53.—Am. bor.
erosum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 14.—Bras.
Galeottii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2510.—Mexic.
Goldmani, *Hemsl. l. c.* t. 2638.—Mexic.
Goulartii, *Glaz. & Urb. ex Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 14.—Bras.
goyazense, *Urb. l. c.* 13.—Bras.
Jepsoni, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 54.—Am. bor.
leptopodum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2546.—Mexic.
longipetiolatum, *Hemsl. l. c.* t. 2504.—Mexic.
longistylum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 55.—Am. bor.
minimum, *Coult. & Rose, l. c.* 54.—Am. bor.
oblanceolatum, *Coult. & Rose, l. c.* 56.—Am. bor.
Parishii, *Coult. & Rose, l. c.* 57.—Am. bor.
paucisquamosum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2505.—Mexic.
reptans, *Hemsl. l. c.* t. 2543.—Am. cent.
Rosei, *Hemsl. l. c.* t. 2579.—Mexic.
Schaffneri, *Hemsl. l. c.* t. 2545.—Mexic.
sparganophyllum, *Hemsl. l. c.* t. 2508.—Am. bor.
spiculosum, *Hemsl. l. c.* t. 2507.—Mexic.
synchaetum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 44.—Am. bor.
tenuissimum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2580.—Mexic.
Tournefortii, Bub. Fl. Pyren. ii. 342 = Bourgati.

ERYSIMUM, Tourn. (Crucif.).
Babataghi, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 413.—Turkestan.
bisaccatum, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 79.—Eur.
hamosum, *Blanche, ex Post, Fl. Syria*, 75.—As. Min.
horizontale, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 154.—Lesbos.
moesiacum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 21.—Eur.
pamiricum, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. 88.—Turkestan.

ERYTHRAEA, Renealm. (Gentian.).
discolor, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 122.—Eur.
retusa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 38.—Mexic.

ERYTHRINA, Linn. (Legum.).
comosa, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 52.—Afr. trop.
constantiana, *Micheli, in Rev. Hort.* 1896, 524.—Eur.
Dybowskii, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 52.—Afr. trop.
hypaphorus, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 433.—Celebes.
insularis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 228.—Austral.
lanata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 81.—Mexic.
melanacantha, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 96.—Afr. trop.
phlebocarpa, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 368.—Austral.
Sacleuxii, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 54.—Afr. trop.
sigmoidea, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 327.—Afr. trop.
tholloniana, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 53.—Afr. trop.

ERYTHROCEPHALUM, Benth. (Compos.).
erectum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 472.—Afr. trop.
Goetzei, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 508.—Afr. trop.
humile, *O. Hoffm. l. c.* 509.—Afr. trop.
plantaginifolium, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

ERYTHROPHLEUM, Afzel. (Legum.).
Dinklagei, Taub. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. III. 386 = Calpocalyx Dinklagei.

ERYTHROXYLUM, P. Br. (Linac.).
costaricense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 240.—Am. cent.
goyazensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 440.—Bras.
hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 15.—Parag.
pauciflorum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 13.—Bolivia.

ERYTROPYXIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1265. *STYRACACEAE*.
scandens, *Pierre, l. c.* 1266.—Afr. trop.

ESCALLONIA, Mutis (Saxifrag.).
aculeata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 81.—Bolivia.
adscendens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 32.—Bolivia.
Bridgesii, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
poasana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 243.—Am. cent.

ESCOBEDIA, Ruiz & Pav. (Scrophul.).
grandiflora, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 231 = scabrifolia.

ESENBECKIA, H. B. & K. (Rutac.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 111.—Mexic.
cuspidata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 28.—Bras.
Glaziovii, *Engl. l. c.* 27.—Bras.
Hieronymi, *Engl. l. c.*—Bras.
litoralis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 242.—Am. cent.
macrantha, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 111.—Mexic.
venezuelensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 28.—Venez.

ETHULIA, Linn. (Compos.).
monocephala, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 514.—Afr. trop.

EUCALYPTUS, L'Hérit. (Myrtac.).
acaciaeformis, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 454.—Austral.
affinis, *Deane & Maiden, l. c.* xxv. 104.—Austral.
aggregata, *Deane & Maiden, l. c.* xxiv. 614.—Austral.
bridgesiana, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 164.—Austral.

EUCALYPTUS:—
Cambagei, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 106.—Austral.
Campaspe, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 193.—Austral.
camphora, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 298.—Austral.
conica, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 612.—Austral.
corrugata, *Luehm. in Vict. Nat.* xiii. 168.—Austral.
Dawsoni, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 295.—Austral.
delegatensis, *R. T. Baker, l. c.* xxv. 305.—Austral.
dextropinea, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 417.—Austral.
fastigata, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxi. 809.—Austral.
fraxinoides, *Deane & Maiden, l. c.* xxiii. 412.—Austral.
intertexta, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 308.—Austral.
laevopinea, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 414.—Austral.
Macarthuri, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 448.—Austral.
maculosa, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 598.—Austral.
Morrisii, *R. T. Baker, l. c.* xxv. 312.—Austral.
nova-anglica, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 616.—Austral.
oreades, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 596.—Austral.
paludosa, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 167.—Austral.
patentinervis, *R. T. Baker, l. c.* xxiv. 602.—Austral.
quadrangulata, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 451.—Austral.
rubida, *Deane & Maiden, l. c.* 456.—Austral.
Smithii, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 292.—Austral.
squamosa, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 561.—Austral.
torquata, *Luehm. in Vict. Nat.* xiii. 147.—Austral.
viridis, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 316.—Austral.
vitrea, *R. T. Baker, l. c.* 303.—Austral.

EUCEPHALUS, Nutt. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
Covillei, Greene, Pittonia, iii. 162.—Am. bor.
Engelmannii, Greene, l. c. 54 = A. Engelmannii.
formosus, Greene, l. c. iv. 156.—Am. bor.
glabratus, Greene, l. c. iii. 56.—Am. bor.
glaucescens, Greene, l. c.—Am. bor.
ledophyllus, Greene, l. c. 55.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. iv. 70.—Am. bor.
nemoralis, Greene, l. c. iii. 57 = A. nemoralis.
paucicapitatus, Greene, l. c. 56 = A. paucicapitatus.
serrulatus, Greene, l. c. 55.—Am. bor.
tomentellus, Greene, l. c. (= *Sericocarpus tomentellus*).—Am. bor.

EUCHAETIS, Bartl. & Wendl. (Rutac.).
longibracteata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 438.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 19.—Afr. austr.

EUCNIDE, Zucc. = **Mentzelia**, Linn. (Loasac.).
Watsoni, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 105.—Mexic.

EUCOMIS, L'Hérit. (Liliac.).
vittata, *Nutt. ex Hook. Cat. Hort. Glasgow* (1825) 26, nomen.—Hort.

EUCRYPTA, Nutt. = **Ellisia**, Linn. (Hydrophyll.).
chrysanthemifolia, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 253.—Calif.
Torreyi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = E. Torreyi.

EUCYPERUS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii. (1895) 568 = **Cyperus**, Mich. (Cyperac.).
alternifolius, Rikli, l. c. = C. alternifolius.
bruneovaginatus, Rikli, l. c. = C. brunneovaginatus.
diffusus, Rikli, l. c. = C. diffusus.
fuscus, Rikli, l. c. = C. fuscus.
gracilis, Rikli, l. c. = C. gracilis.
longifolius, Rikli, l. c. = C. longifolius.
longus, Rikli, l. c. = C. longus.
Luzulae, Rikli, l. c. = C. Luzulae.
martianus, Rikli, l. c. = C. martianus.
pungens, Rikli, l. c. = C. textilis.
Schaffneri, Rikli, l. c. = C. Schaffneri.
textilis, Rikli, l. c. = C. textilis.

EUGENIA, Mich. (Myrtac.).
aemula, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 76 (=*Jambosa aemula*).—Java.
Afzelii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 290.—Afr. trop.
ampliflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 5.—Java.
angolensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 288.—Afr. trop.
argutata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 146.—Java.
athroopoda, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1222.—Madag.
attenuata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 121 (=*Jambosa attenuata*).—Java.
axillaris, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 6.—Java.
bantamensis, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.
benguellensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 360.—Afr. trop.
Bernieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1221.—Madag.
brachyandra, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 15.—Austral.
Buchholzii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 291.—Afr. trop.
bukobensis, *Engl. l. c.* 289.—Afr. trop.
Bungadinnia, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 285.—Austral.
Chapelieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1222.—Madag.
Clavimyrtus, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 110 = ramosissima.
Conceptionis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 359 (=*Myrtus Conceptionis*).—Parag.
confertiflora, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 106.—Java.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 124.—Afr. trop.
corymbifera, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 98 (=*Jambosa corymbosa*).—Java.
costata, *Koord. & Valet. l. c.* 162 (=*Jambosa costata*).—Java.
cuprea, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 6.—Java.
decipiens, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.
densepunctata, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 125.—Afr. trop.
discophora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 6.—Java.
doligophylla, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 78 (=*Jambosa confusa*).—Arch. Mal.
Dusenii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 289.—Afr. trop.
fastigiata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 104 (=*Caryophyllus fastigiatus*).—Java.
fibrosa, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 662.—Austral.
firma, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 163 (=*Jambosa firma*).—Java.
glomerata, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 7, non alior.—Java.
guatemalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 245.—Am. cent.
Hauthalii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 359 (=*Myrtus Hauthalii*).—Parag.
Horsfieldii, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 77 (=*Jambosa Horsfieldii*).—Java.
hypericifolia, *Koord. & Valet. l. c.* 69 (=*Myrtus hypericifolia*).—Java.
intermedia, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 7 (non Berg.).—Java.
jamboloides, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 136 (=*Syzygium racemosum*).—Java.
javensis, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 7.—Java.
kameruniana, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 291.—Afr. trop.
Klampok, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 68.—Java.
kuranda, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 658.—Austral.
Laurentii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 288.—Afr. trop.
laxiflora, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 139 (=*Calyptranthes laxiflora*).—Malaya.
Macromyrtus, *Koord. & Valet. l. c.* 109 (=*Macromyrtus javanica*).—Java.

EUGENIA:—
magnoliaefolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 153 (=*Myrtus magnoliaefolia*).—Java.
Marquesii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 290.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.
melanosticta, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 159 (=*Jambosa melanosticta*).—Java.
microcyma, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 7.—Java.
mossambicensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 289.—Afr. trop.
myrciopsis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 359 (=*Myrtus myrciformis*).—Bolivia.
napiformis, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 7.—Java.
nodosa, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 290.—Afr. trop.
nyassensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
opaca, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 94 (non Berg.).—Java.
pachychlamys, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 333.—Am. cent.
paucipunctata, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 8.—Java.
Poggei, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 289.—Afr. trop.
polyneura, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 76 (=*Jambosa polyneura*).—Java.
punctulata, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 10.—Austral.
pyrifolia, Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 487 = salaccensis.
ruminata, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 8.—Java.
salaccensis, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 144 (=*Syzygium pyrifolium*).—Java.
salamensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 333.—Am. cent.
Scheffleri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
sexangulata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lx. 79 (=*Jambosa sexangulata*).—Java.
Soyauxii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 291.—Afr. trop.
striata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 145 (=*Syzygium truncatum*).—Java.
subglauca, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 8.—Java.
suringariana, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.
symphysipetala, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 161.—Java.
tenuicuspis, Koord. & Valet. l. c. 129 = cymosa.
teretiflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 9.—Java.
Teysmanni, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 164.—Java.
thymifolia, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 303.—Chili.
togoensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 288.—Afr. trop.
Tungo, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 362.—Afr. trop.
umbilicata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 62 (=*Jambosa tetragona*).—Java.
uninervia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 36.—Bolivia.
urophylla, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 360.—Afr. trop.
virens, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 113 (=*Jambosa virens*).—Java.
vrieseana, *Koord. & Valet. l. c.* 75 (=*Jambosa vrieseana*).—Java.
Zenkeri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 291.—Afr. trop.
zippeliana, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 142 (=*Syzygium zippelianum*).—Java.
zollingeriana, *Koord. & Valet. l. c.* 71 (=*Jambosa zollingeriana*).—Java.

EULALIA, Trin. = **Miscanthus**, Anderss. (Gramin.).
cotulifera, Munro, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 289 = Spodiopogon cotulifer.
nepalensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 333 = M. nepalensis.

EULOPHIA, R. Br. (Orchid.).
agrostophylla, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xi. 16.—Austral.

EULOPHIA:—
antennata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 334.—Afr. trop.
antennisepala, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 279 (=*Lissochilus antennisepalus*).—Afr. trop.
articulata, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 181 = Lissochilus purpuratus.
aurantiaca, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 67.—Afr. trop.
aurea, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 635.—Afr. austr.
Bainesii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 65.—Afr. trop.
bella, N. E. Br. in Gard. Chron. 1889, II. 210 = Lissochilus milanjianus.
bicolor, Reichb. f. & Sond. ex Reichb. in Flora, 1865, 186 = dichroma et Zeyheri.
biloba, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 335.—Afr. trop.
borneensis, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 289.—Borneo.
brachystyla, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 336.—Afr. austr.
brevipetala, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 53.—Afr. trop.
Buchanani, *Rolfe, l. c.* 64 (non alior.).—Afr. trop.
Carsoni, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
Coleae, *Rolfe, l. c.* 56.—Afr. trop.
collina, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 336.—Afr. trop.
congoensis, Cogn. in Journ. des Orch. vi. 155; et in Lindenia, xi. 15 = guineensis.
crinita, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 58 (non G. Don).—Afr. trop.
cyrtosioides, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 279, nomen.—Afr. trop.
dahliana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 243.—N. Brit.
dichroma, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 62.—Afr. trop.
dictyostegoides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 168.—Afr. trop.
dilecta, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 279 (=*Lissochilus dilectus*).—Afr. trop.
Elliottii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 54.—Afr. trop.
Faberi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 198.—China.
flavopurpurea, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 65.—Afr. trop.
galeoloides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 508.—Afr. trop.
gastrodioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 337.—Afr. trop.
geniculata, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 337.—Reg. Himal.
goetzeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 372.—Afr. trop.
graciliscapa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 418.—Afr. trop.
hereroensis, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 417.—Afr. trop.
Holubii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 60.—Afr. trop.
humilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 337.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 66.—Afr. trop.
junodiana, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 634.—Afr. austr.
Keithii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 333.—Penins. Mal.
Kirkii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 58.—Afr. trop.
lanceolata, *Rolfe, l. c.* 60.—Afr. trop.
lata, *Rolfe, l. c.* 67.—Afr. trop.
laurentiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 60.—Afr. trop.
leonensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 51.—Afr. trop.
Leopoldi, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 215.—Afr. trop.
lindleyana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 279 (=*Lissochilus lindleyanus*).—Afr. trop.
litoralis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 338.—Afr. austr.
lubbersiana, *Laurent & Th. Dur. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 135; *et in Rev. Hort. Belg.* xxvi. 3.—Afr. trop.
lujaana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 217.—Afr. trop.
macrantha, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 62.—Afr. trop.

EULOPHIA:—
manganjensis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 67.—Afr. trop.
milanjiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 372 = Lissochilus milanjianus.
monticola, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 60.—Afr. trop.
Nuttii, Rolfe, l. c. 63.—Afr. trop.
panganiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 169.—Afr. trop.
papillosa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 419 = chrysantha.
Pentheri, Schlechter, l. c. xxvi. 339.—Afr. trop.
Phillipseae, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 56.—Afr. trop.
quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 284 = guineensis.
Smithii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 54.—Afr. trop.
speciosa, Rolfe, l. c. 63 (non Bolus).—Afr. trop.
stricta, Rolfe, l. c. 51 (non Lindl.).—Afr. trop.
tainoides, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 339.—Afr. trop.
Tanganyikae, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 216.—Afr. trop.
tanganyikensis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 59.—Afr. trop.
tayloriana, Rolfe, l. c. 69.—Afr. trop.
Thomsoni, Rolfe, l. c. 66.—Afr. trop.
tuberifera, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 169.—Afr. trop.
virilis, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 132 = lurida.
Welwitschii, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 7330 = dichroma.
wendlandiana, Kraenzl. in Gard. Chron. 1897, II. 262.—Madag.
Woodfordii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 68.—Afr. trop.
Zeyheri, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 7330.—Afr. austr.

EULOPHIELLA, Rolfe (Orchid.).
peetersiana, Kraenzl. in Gard. Chron. 1897, I. 182.—Hab.

EULOPHUS, Nutt. (Umbellif.).
simplex, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 112.—Am. bor.

EUMORPHIA, DC. (Compos.).
sericea, Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 488.—Afr. austr.

EUNANUS, Benth. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).
angustatus, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 275.—Calif.
Bolanderi, Greene, l. c. 276.—Calif.
tricolor, Greene, l. c. 275.—Calif.

EUONYMUS, Linn. (Celastr.).
Bockii, Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 439.—China.
celebicus, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 395, 623 (= *Lophopetalum celebicum*).—Malaya.
cuspidata, Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 77.—Cochinch.
dielsiana, Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 440.—China.
flavescens, Loes. l. c. 437.—China.
Giraldii, Loes. l. c. 442.—China.
lutchuensis, Ito, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii. 372.—Ins. Luchu.
phellomana, Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 444.—China.
Rosthornii, Loes. l. c. 437.—China.
Rothschuhii, Loes. in Engl. Jahrb. xxiii. 125.—Am. austr.
sanguinea, Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 441.—China.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxv. 344.—Penins. Mal.

EUPATORIUM, Tourn. (Compos.).
adspersum, Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxv. 279.—Am. cent.
aegirophyllum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 329.—Mexic.
amblyolepis, Robinson, l. c. 330.—Mexic.
anomalum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 106.—Am. bor.
Balansae, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 778.—Parag.

EUPATORIUM:—
Bangii, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 56.—Bolivia.
barbacense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 750.—Am. austr.
Blumenavii, Hieron. l. c. 784.—Am. austr.
caaguazuense, Hieron. l. c. 760.—Parag.
capnoresbium, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 331.—Mexic.
cardiophyllum, Robinson, l. c.—Mexic.
chiapense, Robinson, l. c. 332.—Mexic.
chimborazense, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 7.—Ecuador.
cochabambense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 745.—Bolivia.
Commersonii, Hieron. l. c. 771 = bacleanum.
connivens, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 57.—Bolivia.
Conzatii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 574.—Am. cent.
crassipes, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 780.—Am. austr.
crassirameum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 332.—Mexic.
crenaeum, Robinson, l. c. 333.—Mexic.
crenulatum, Spreng. ex Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 776 (= *Baccharis crenulata*).—Am. austr.
critoniforme, Urb. Symb. Antill. i. 458.—Ind. occ.
decussatum, Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxv. 295 (non Sieber).—Am. cent.
desquamans, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 333.—Mexic.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. ii. 629 = Agrimonia Eupatorium.
entreriense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 767.—Am. austr.
eriocarpum, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 42.—Mexic.
euonymifolium, Greene, Pittonia, iii. 31.—Mexic.
foliatum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 748 (= *Osmia foliatum*).—Bras.
gardnerianum, Hieron. l. c. 758.—Bras.
geranifolium, Urb. Symb. Antill. i. 458.—Ind. occ.
glanduliferum, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 13.—Ecuador.
glandulosissimum, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxii. no. 5. 40.—Bras.
grandiflorum, André, in Rev. Hort. 1882, 384.—Hab.?
Harrisii, Urb. Symb. Antill. i. 460.—Ind. occ.
heterolepis, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 335.—Am. cent.
heydeanum, Robinson, l. c.—Am. cent.
Hoffmannii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 147.—Bolivia.
Hunzigeri, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 779.—Am. austr.
inaequidens, Urb. Symb. Antill. i. 460.—Ind. occ.
incisum, Chapm. Fl. S. U. S. ed. III. 216 = jucundum.
itatiayense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 764.—Am. austr.
jucundum, Greene, Pittonia, iii. 180.—Am. bor.
jujuiense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 744.—Am. austr.
Klattii, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 105.—Ind. occ.
koelliaefolium, Greene, Pittonia, iii. 31.—Mexic.
Kuntzei, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 766.—Bolivia.
lanicaule, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 336.—Mexic.
lecheaefolium, Greene, Pittonia, iii. 177.—Am. bor.
lilacinum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 757.—Am. austr.
lloense, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 11.—Ecuador.
Loesenerii, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 336.—Mexic.
Lorentzii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 787.—Am. austr.
mattogrossense, Hieron. l. c. 761.—Bras.
minasgeraesense, Hieron. l. c. 749.—Bras.
Nelsonii, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 337.—Mexic.
Niederleinii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 763.—Am. austr.
obscurifolium, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 9.—Ecuador.
obtusisquamosum, Hieron. l. c. 14.—Ecuador.
oreithales, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 308.—Mexic.
oresbium, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 337.—Mexic.
oyadense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 755.—Am. austr.

EUPATORIUM:—
paradanense, Parish, in Zoe, v. 75.—Am. bor.
paraguariense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 752.—Parag.
paucicapitulatum, Hieron. l. c. 756.—Am. austr.
paulense, Loefgr. in Bol. Commiss. Geogr. São Paulo, i. no. 12. 242.—Bras.
peninsulare, Brandegee, in Erythea, vii. 4.—Mexic.
petalodium, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 492.—Am. bor.
phoenicolepis, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 338.—Mexic.
photinum, Robinson, l. c.—Mexic.
picturatum, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxii. no. 5. 41.—Bras.
platyphyllum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 339.—Mexic.
polyodon, Urb. Symb. Antill. i. 462.—Ind. occ.
portoricense, Urb. l. c. 459.—Ind. occ.
pseudoglomeratum, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 8.—Ecuador.
pseudohirsutum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 758.—Mexic.
pseudoriganoides, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 10.—Ecuador.
pteropodum, Hieron. l. c. 15.—Ecuador.
Purpusi, Brandegee, in Erythea, vii. 3.—Mexic.
resinifluum, Urb. Symb. Antill. i. 461.—Ind. occ.
rupicola, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 42.—Mexic.
saltense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 786.—Am. austr.
santacruzense, Hieron. l. c. 762.—Bolivia.
saucechicoense, Hieron. l. c. 775.—Am. austr.
scabrellum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 339.—Mexic.
Schickendantzii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 769.—Am. austr.
selerianum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 340.—Mexic.
sitiense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 751.—Am. austr.
Smithii, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 340.—Mexic.
Sodiroi, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 12.—Ecuador.
squarroso-ramosum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 753.—Am. austr.
subscandens, Hieron. l. c. 742.—Bolivia.
tamboense, Hieron. l. c. 770.—Am. austr.
tenuiflorum, Hieron. l. c. 772 (= *Mikania tenuiflora*).—Am. austr.
tequendamense, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 6.—N. Granat.
tubaraoense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 784.—Am. austr.
Ulei, Hieron. l. c. 751.—Am. austr.
venosissimum, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club. vi. 57.—Bolivia.

EUPHORBIA, Linn. (Euphorb.).
albicaulis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 266.—Am. bor.
albiflora, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 442.—Bras.
alta, Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1900, 108.—Am. sept.
Ammak, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 319.—Arab.
amplophylla, Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 186.—Afr. trop.
Anderssonii, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 63.—Ins. Galap.
andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 943.—Afr. trop.
Andromedae, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 63.—Ind. occ.
Anthonyi, Brandegee, in Erythea, vii. 7.—Mexic.
apocynifolia, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 467.—Am. bor.
arenicola, Parish, in Erythea, vii. 93.—Am. bor.
aspericaulis, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 26.—Afr. austr.
atrococca, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i. 844.—Ins. Sandw.
Bachmanni, Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 535.—Afr. trop.
balsamea, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 951.—Afr. trop.
bellica, Hiern, l. c. 945.—Afr. trop.
benguelensis, Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi. 741.—Afr. austr.
Benthami, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 943.—Afr. trop.

EUPHORBIA :—
bermudiana, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 65.—Ind. occ.
Buchanani, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 27.—Afr. trop.
chaculana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 441.—Am. cent.
Chimaera, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis,* iv. 444.—Reg. Caucas.
ciliolata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 743.—Afr. austr.
clarionensis, *Brandegee, in Erythea,* vii. 7.—Mexic.
claytonioides, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 533.—Afr. trop.
coerulans, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 739.—Afr. austr.
Coghlani, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 12.—Austral.
confertiflora, *Volkens, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 266.—Afr. trop.
cozumelensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 61.—Am. cent.
crassinodis, *Urb. Symb. Antill.* i. 340.—Ind. occ.
Durandoi, *Chabert, in Journ. de Bot.* 1900, 70.—Alger.
Eggersii, *Urb. Symb. Antill.* i. 343.—Ind. occ.
enterophona, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 307.—Madag.
eriogonoides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 614.—Am. bor.
Flamandi, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 253.—Afr. bor.
Fleckii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 738.—Afr. austr.
fodhliana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 230.—Arab.
Galpini, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 742.—Afr. austr.
Gaumerii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 372.—Mexic.
glaucella, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 737.—Afr. austr.
glochidiata, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 187.—Afr. trop.
Goetzei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 420.—Afr. trop.
Helleri, *Millsp. in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 268.—Am. bor.
hirsuta, Wiegand, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 50 = Rafinesquii.
huillensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 27.—Afr. trop.
inarticulata, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 324.—Arab.
Intisy, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1900, 260.—Madag.
isaloensis, *Drake, l. c.* 1899, 307.—Madag.
Karoi, *Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 58.—Sibir.
Kelleri, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 739.—Afr. austr.
Laro, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 307.—Madag.
laxiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 286.—Afr. austr.
lehmanniana, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 508.—N. Granat.
Lehmbachii, *Pax, l. c.* xxviii. 27.—Afr. trop.
leiococca, *Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 108.—Am. bor.
longibracteata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 742 (non DC.).—Afr. austr.
Luciismithii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 36.—Mexic.
lugubris, *Chabert, in Journ. de Bot.* 1900, 71.—Eur.
macra, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 941.—Afr. trop.
marilandica, *Greene, Pittonia,* iii. 345.—Am. bor.
matabelensis, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 51.—Afr. austr.
mayana, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 304.—Mexic.
mexicana, *Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 105.—Am. sept.
moeringioides, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 507.—N. Granat.
multinodis, *Urb. Symb. Antill.* i. 341.—Ind. occ.
napoides, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 187.—Afr. trop.
Nelsii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 737.—Afr. austr.
Nelsonii, *Millsp. in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 268.—Am. bor.
nenensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 942.—Afr. trop.
Nuttallii, Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 371 = zygophylloides.
oaxacana, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 37.—Mexic.
olivacea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 613.—Am. bor.

EUPHORBIA :—
opuntioides, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 945.—Afr. trop.
parciramulosa, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 326.—Arab.
pergamena, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 615.—Am. bor.
Perieri, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 308.—Madag.
Pfeilii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 534.—Afr. trop.
Phlomos, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 156.—Lesbos.
pileoides, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 62.—Ind. occ.
pindicola, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xi. 63.—Eur.
popayanensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 507.—N. Granat.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 338.—Ind. occ.
Qarad, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 230.—Arab.
quinquecostata, *Volkens, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 266.—Afr. trop.
Rafinesquii, *Greene, Pittonia,* iii. 207.—Am. bor.
Reineckei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxv. 648.—Ins. Samoa.
Reinhardtii, *Volkens, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 263.—Afr. trop.
Riebeckii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 26.—Arab.
Rigoi, *Boiss. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 987.—Ins. Cyprus.
Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 186.—Afr. trop.
rivularis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud.* i. 846.—Ins. Sandw.
Robecchii, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 186.—Afr. trop.
robusta, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 381.—Am. bor.
Schinzii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 739.—Afr. austr.
schizacantha, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 187.—Afr. trop.
Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 26.—Afr. trop.
Seleri, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 441.—Am. cent.
serbica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 283.—Eur.
Serpicula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 941.—Afr. trop.
Sintenisii, *Boiss. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 986.—Eur.
somalensis, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 187.—Afr. trop.
sparsiflora, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud.* i. 846.—Ins. Sandw.
stipitata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 65.—Ind. occ.
Stuhlmanni, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 535.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *Schweinf. ex Volkens, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 267 (non Pax).—Afr. trop.
subcaerulea, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 37.—Mexic.
subfalcata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 948.—Afr. trop.
subsalsa, *Hiern, l. c.* 948.—Afr. trop.
tenella, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 738 (non H. B. & K.).—Afr. austr.
tetracantha, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 130.—Afr. trop.
Torralbasii, *Urb. Symb. Antill.* i. 339.—Ind. occ.
transvaalensis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
tricolor, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 479.—Mexic.
Troodii, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18. 100.—Eur.
uhehensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 420.—Afr. trop.
variegata, *Deflers, Voy. Yemen,* 198.—Arab.
verticillata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 740.—Afr. austr.
villosula, *Urb. Symb. Antill.* i. 340 (non Pax).—Ind. occ.
violacea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 480.—Mexic.
xbacensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 374.—Mexic.
xylopoda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 480.—Mexic.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 536.—Afr. trop.
zinniifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 615.—Am. bor.

EUPHORIANTHUS, Radlk. = **Euphoriopsis**, Radlk. (Sapind.).
obtusatus, Radlk. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 406, nomen.—Celebes.

EUPHRASIA, Linn. (Scrophul.).
alpina, Bub. Fl. Pyren. i. 275 = Bartsia alpina.
americana, *Wettst. Monogr. Euphr.* 127.—Am. bor.
Berggreni, *Wettst. l. c.* 265.—N. Zel.
Bicknelli, *Wettst. in Bickn. Fl. Bordigh.* 325.—Eur.
borealis, *Wettst. Monogr. Euphr.* 108.—Eur.
canadensis, *F. Towns. in Journ. Bot.* 1898, 1.—Am. bor.
Cheesemani, *Wettst. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 381.—N. Zel.
curta, *Wettst. Monogr. Euphr.* 128.—Eur.
debilis, *Wettst. l. c.* 275.—Chili.
Dyeri, *Wettst. l. c.* 267.—N. Zel.
Fagonii, *Bub. Fl. Pyren.* i. 275.—Eur.
flavescens, *Phil. ex Wettst. Monogr. Euphr.* 273.—Chili.
foulaensis, *Towns. ex Wettst. Monogr. Euphr.* 139 ; *et in Bot. Centralbl.* lxvii. 326.—Eur.
glacialis, *Wettst. Monogr. Euphr.* 259.—Austral.
hebecalyx, *Brenn. in Bot. Notiser,* 1898, 181.—Eur.
himalayica, *Wettst. Monogr. Euphr.* 180.—Reg. Himal.
Hookeri, *Wettst. l. c.* 268.—Tasman.
insignis, *Wettst. l. c.* 246.—Japon.
italica, *Wettst. l. c.* 242.—Eur. austr.
Jaeschkei, *Wettst. l. c.* 80.—Reg. Himal.
japonica, *Wettst. l. c.* 245.—Japon.
Marchesettii, *Wettst. ex Marchesetti, Fl. Trieste,* 411.—Eur.
marilaunica, *Kern. in Sched. Fl. Austr.-Hung.* viii. 31.—Eur.
mollis, *Wettst. Monogr. Euphr.* 141.—As. bor. ; Am. bor.
Muelleri, *Wettst. l. c.* 257.—Austral.
multifolia, *Wettst. l. c.* 126.—Japon.
Oakesii, *Wettst. l. c.* 142.—Am. bor.
occidentalis, *Wettst. l. c.* 135.—Eur.
paucifolia, *Wettst. l. c.* 198.—As. cent.
petiolaris, *Wettst. l. c.* 199.—As. austr.
polonica, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1897, 187.—Eur.
pygmaea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 279 (non C. Koch).—N. Zel.
pyrenaea, *Bub. Fl. Pyren.* i. 278.—Eur.
Regelii, *Wettst. Monogr. Euphr.* 81.—As. austr.
rubra, Bub. Fl. Pyren. i. 276 = Bartsia Odontites.
Schlagintweitii, *Wettst. Monogr. Euphr.* 181.—As. cent.
scottica, *Wettst. l. c.* 170.—Eur.
versicolor, Bub. Fl. Pyren. i. 274 = Bartsia Trixago.
zelandica, *Wettst. Monogr. Euphr.* 264.—N. Zel.

EUPRITCHARDIA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 323 (1898) = **Pritchardia**, Seem. & H. Wendl. (Palm.).
Gaudichaudii, Kuntze, l. c. = P. Gaudichaudi.
Hildebrandtii, Kuntze, l. c. = P. Hildebrandtii.
lanigera, Kuntze, l. c. = P. lanigera.
Martii, Kuntze, l. c. = P. Martii.
pacifica, Kuntze, l. c. = P. pacifica.
pericularum, Kuntze, l. c. = P. pericularum.
remota, Kuntze, l. c. = P. remota.
Thurstonii, Kuntze, l. c. = P. Thurstonii.
vluylstekeana, Kuntze, l. c. = P. vuylstekeana.

EUPTELEA, Sieb. & Zucc. (Magnol.).
Delavayi, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1900, 273.—China.
Francheti, *Van Tiegh. l. c.*—China.

EURYA, Thunb. (Ternstr.).
amplexicaulis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 168.—Ins. Philipp.
Tigang, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 447.—N. Guin.

EURYOPS, Cass. (Compos.).
decipiens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 212.—Afr. austr.
Evansii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 501.—Afr. austr.
montanus, *Schlechter, l. c.* 1898, 316.—Afr. austr.
namaquensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 212.—Afr. austr.
Osteospermum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 403.—Afr. trop.
rupestris, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 213.—Afr. austr.
somalensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 459.—Afr. trop.
transvaalensis, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 843.—Afr. austr.

EURYPTERA, Nutt. = **Peucedanum**, Linn. (Umbellif.).
Hassei, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 242 = P. Hassei.
Howellii, Coult. & Rose, l. c. 243 = P. Howellii.

EURYPTERA :—
insularis, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 242 = P. insulare.
pallida, Coult. & Rose, l. c. 242.—Am. bor.
parvifolia, Coult. & Rose, l. c. 241 = P. parvifolium.

EURYSOLEN, Prain, in Sci. Mem. Medic. Offic. India, xi. (1898) 43. *LABIATAE.*
gracilis, *Prain, l. c.* 44.—Ind. or.

EUSTACHYS, Desv. = **Chloris**, Sw. (Gramin.).
neglecta, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 450 = C. neglecta.

EUTRIANA, Trin. (Gramin.).
abyssinica, R. Br. ex Fresen. in Mus. Senckenb. ii. 142 = Gracilea royleana.

EVODIA, Forst. (Rutac.).
anisodora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 374.—N. Guin.
borbonica, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 119 (= *Zanthoxylum borbonicum*).—Ins. Bourbon.
Kingii, *Engl. l. c.* 121.—Malacca.
macrophylla, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 371, nomen.—Celebes.
Muelleri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 121.—Austral.
nervosa, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvii. 208.—Java.
rubra, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 375.—N. Guin.
tonkinensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 121.—Tonkin.

EVODIANTHUS, Oerst. = **Carludovica**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
Freyreissii, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvi. no. 8. 9.—Bras.
funifer, Lindm. l. c. 8 = C. funifera.

EVOLVULUS, Linn. (Convolv.).
commelinifolius, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 89.—Mexic.
elaeagnifolius, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 38.—Bras.
Glaziovii, *Damm. l. c.* 37.—Bras.
goyazensis, *Damm. l. c.*—Bras.
graminifolius, *Damm. l. c.* 38.—Bras.
hypocrateriflorus, *Damm. l. c.* 37.—Bras.
mollis, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 285.—Am. bor.
ovatus, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 89.—Am. bor.
rosmarinifolius, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 38.—Bras.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 175.—Arab.

EXCOECARIA, Linn. (Euphorb.).
Bodenbenderi, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 349 (= *Sapium Bodenbenderi*).—Reg. Argent.

EXCREMIS, Willd. (Liliac.).
scabra, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 316.—Bolivia.

EXECHOSTYLUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 67. *RUBIACEAE.*
flaviflora, *K. Schum. l. c.* 68.—Afr. trop.

EXOCHAENIUM, Griseb. = **Belmontia**, E. Mey. (Gentian.).
debile, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. 48 = B. debilis.
primulaeflorum, Welw. l. c. 47 = B. primulaeflora.

EXOSOLENIA, Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 46 = **Genipa**, Linn. (Rubiac.).

EXOSTEMMA, Rich. (Rubiac.).
elegans, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 423.—Ind. occ.
Picardae, *Krug & Urb. l. c.* 422.—Ind. occ.
subcordatum, *Krug & Urb. l. c.* 421.—Ind. occ.
Wrightii, *Krug & Urb. l. c.* 424.—Ind. occ.

F

FABIANA, Ruiz & Pav. (Solan.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 557.—Patag.

FACELIS, Cass. (Compos.).
capillaris, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 62.—Bolivia.

FADOGIA, Schweinf. (Rubiac.).
humilis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 252.—Afr. austr.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 481.—Afr. trop.

FAGARA, Linn. = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).
acuminata, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 593 = Z. acuminatum.
acutifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117.—Bras.
Afzelii, Engl. l. c. 118.—Afr. trop.
ailanthoides, Engl. l. c. = Z. ailanthoides.
amoyensis, Engl. l. c. 117 = Z. amoyense.
angolensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 148.—Afr. trop.
arenaria, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. arenarium.
articulata, Engl. l. c. = Z. articulatum.
Bachmannii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Afr. trop.
bijuga, Engl. l. c. xxi. Beibl. liv. 23.—Mexic.
bombacifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 567 = Z. bombacifolium.
brachyacantha, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. brachyacanthum.
camphorata, Engl. l. c. 117 = Z. camphoratum.
caribaea, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 562 = Z. caribaeum.
caroliniana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. caroliniana.
chalybea, Engl. l. c. 118 = Z. chalibeum.
ciliata, Engl. l. c. = Z. ciliatum.
cinerea, Engl. l. c. 117.—Bras.
Coco, Engl. l. c. = Z. Coco.
coriacea, Engl. l. c. = Z. coriaceum.
costaricensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 25.—Am. cent.
crassifolia, Engl. l. c. 21.—Mexic.
cujabensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. cujabense.
Culantrilo, Schult. Mant. iii. 224 = Z. Culantrilo.
cuspidata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. cuspidatum.
dimorphophylla, Engl. l. c. = Z. dimorphophylla.
Dinklagei, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 147.—Afr. trop.
dipetala, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. dipetalum.
dissita, Engl. l. c. 118 = Z. dissitum.
diversifolia, Warb. ex Engl. l. c.—Malaya.
domingensis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 586.—Ind. occ.
duplicipunctata, Krug & Urb. l. c. 573 = Z. duplicipunctatum.
echinocarpa, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. echinocarpum.
Ehrenbergii, Engl. l. c. 118.—Mexic.
Eichleri, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Bras.
elegans, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. elegans.
elegantissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 25.—Mexic.
elephantiasis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 564 = Z. elephantiasis.
emarginella, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. emarginellum.
falcifolia, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Mexic.
flava, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 571 = Z. flavum.
foliolosa, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. foliolosum.
furfuracea, Engl. l. c. 117 = Z. furfuraceum.
Gardneri, Engl. l. c. = Z. Gardneri.
glandulosa, Engl. l. c. 119 = Z. glandulosum.
glazioviana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 21.—Bras.
grandifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. grandifolium.
granulata, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 594.—Ind. occ.
hamiltoniana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. hamiltonianum.
Hartii, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 586.—Ind. occ.
hawaiensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. hawaiense.
hiemalis, Engl. l. c. 117 = Z. hyemale.
Hieronymi, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Reg. Argent.
juglandifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 587 = Z. juglandifolium.

FAGARA :—
juniperina, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. juniperinum.
kauaiensis, Engl. l. c. 119 = Z. kauaense.
khasyana, Engl. l. c. 118 = Z. khasianum.
latespinosa, Engl. l. c. 117 = Z. latespinosum.
Leprieurii, Engl. l. c. 118 = Z. Leprieurii.
liebmanniana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 20.—Mexic.
Limoncello, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. Limoncello.
macrophylla, Engl. l. c. 118 = Z. macrophyllum.
macrosperma, Engl. l. c. 117 = Z. macrospermum.
mauiensis, Engl. l. c. 119 = Z. maviense.
Mayu, Engl. l. c. 118 = Z. Mayu.
melanacantha, Engl. l. c. = Z. melanacanthum.
melanosticta, Engl. l. c. 117 = Z. melanostictum.
micrantha, Engl. l. c. 118 = Z. micranthum.
microcarpa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 570 = Z. microcarpum.
minutiflora, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. minutiflorum.
mollissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Mexic.
monogyna, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. monogynum.
montana, Engl. l. c. 118 = Z. montanum.
multiflora, Engl. l. c. 117.—Bras.
multifoliata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Afr. trop.
myriacantha, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. myriacanthum.
Naranjillo, Engl. l. c. 117 = Z. Naranjillo.
nemoralis, Engl. l. c. = Z. nemorale.
Niederleinii, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Reg. Argent.
nigra, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. nigrum.
nitida, Engl. l. c. = Z. nitidum.
oahuensis, Engl. l. c. 119 = Z. oahuense.
obscura, Engl. l. c. 117.—Bras.
olitoria, Engl. l. c. 118 = Z. olitorium.
ovalifolia, Engl. l. c. = Z. ovalifolium.
ovatifoliolata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 150.—Afr. trop.
parviflora, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. parviflorum.
pauciflora, Engl. l. c. 117 = Z. pauciflorum.
peckoltiana, Engl. l. c. = Z. peckoltianum.
pilosissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 26.—Mexic.
pilosiuscula, Engl. l. c. xxiii. 150.—Afr. trop.
pinnata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. Blackburnia.
pistacifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 573 = Z. pistacifolium.
podocarpa, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. podocarpum.
Poggei, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 146.—Afr. trop.
pohliana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. pohlianum.
polyacantha, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 148.—Afr. trop.
Pringlei, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117.—Mexic.
pumila, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 21.—Mexic.
quindiuensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. quinduense.
rhoifolia, Engl. l. c. 118 = Z. rhoifolium.
riedeliana, Engl. l. c. 117 = Z. riedelianum.
rigida, Engl. l. c. = Z. rigidum.
rugosa, Engl. l. c. = Z. rugosum.
ruiziana, Engl. l. c. = Z. obscurum.
sapindoides, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 587 = Z. sapindoides.
scandens, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 118 = Z. scandens.
schinifolia, Engl. l. c. = Z. schinifolium.
serrulata, Engl. l. c. = Z. serrulatum.
setosa, Engl. l. c. = Z. setosum.
spinosa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 590 Z. emarginatum.
Sprucei, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 117 = Z. Sprucei.
stenophylla, Engl. l. c. 118 = Z. stenophyllum.
Stuhlmannii, Engl. l. c. = Z. Stuhlmannii.
subserrata, Engl. l. c. 117 = Z. subserratum.
Swartzii, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 589 = Z. emarginatum.
syncarpa, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 116 = Z. syncarpum.

FAGARA:—
taediosa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 582 = Z. taediosum.
tenuifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VI. 117 = Z. tenuifolium.
tetrasperma, Engl. l. c. 118 = Z. tetraspermum.
thomasiana, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 583.—Ind. occ.
thomensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Bras.
torva, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. torvum.
tuberculata, Engl. l. c. 117 = Z. tuberculatum.
Uhdei, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Mexic.
usambarensis, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
venenifica, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 119 = Z. venenificum.
volubilis, E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 422.—China.
warmingiana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 23.—Bras.
Welwitschii, Engl. l. c. xxiii. 147.—Afr. trop.

FAGARAS, Burm. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 34 (1898) = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).
Fagara, Kuntze, l. c. = Z. Pterota.

FAGELIA, Schwencke = **Calceolaria**, Linn. (Scrophul.).
aquatica, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 231 = C. aquatica.
boliviana, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 24.—Am. austr.
falklandica, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 460.—Ins. Falkland.
Grisebachii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 231 = C. foliosa.
teucrioides, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 24 = C. teucrioides.
Volkmannii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 232 = C. Volkmannii.

FAGONIA, Tourn. (Zygophyll.).
Bischarorum, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 276.—Afr. trop.
Flamandi, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 249.—Afr. bor.
isotricha, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 54.—Afr. bor.
Jolyi, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 249.—Afr. bor.
Lahovarii, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 204.—Afr. trop.
soturbensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 276.—Afr. trop.

FAGRAEA, Thunb. (Logan.).
macroscypha, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.
Rodatzii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 499.—N. Guin.
spicata, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.

FAGUS, Tourn. (Cupulif.).
engleriana, *Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 285.—China.
longipetiolata, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 56.—China.
orientalis, *Lipsky, in Acta Hort. Petrop.* xiv. 300.—Reg. Caucas.
truncata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 280.—N. Zel.

FALCATA, J. F. Gmel. = **Amphicarpaea**, Ell. (Legum.).
ovalifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 63 = Cologania australis.

FARMERIA, Willis, ex Hook. f. in Trim. Fl. Ceyl. v. 386 (1900). *PODOSTEMACEAE.*
metzgerioides, *Willis, l. c.*—Zeylan.

FAROA, Welw. (Gentian.).
axillaris, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 158.—Afr. trop.

FASCICULARIA, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. 627 (1894), in nota; et in DC. Monog. Phan. ix. 7 (1896). *BROMELIACEAE.*
bicolor, *Mez, l. c.* 627; *l. c.* 9.—Chili.
litoralis, *Mez, l. c.*; *l. c.* 8.—Chili.
parviflora, *Mez, in DC. Monog. Phan.* 12.—Chili
pitcairniifolia, *Mez, in Mart. Fl. Bras.* iii. III. 627; *et l. c.* 10.—Chili.

FEGIMANRA, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. 458 (1896). *ANACARDIACEAE.*
africana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

FELICIA, Cass. (Compos.).
amelloides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 26.—Afr. austr.
bellidioides, *Schlechter, l. c.* 1897, 219.—Afr. austr.
ciliata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 201.—Afr. austr.
drakensbergensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 253.—Afr. austr.
lingulata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 831.—Afr. austr.
pinnatifida, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 253.—Afr. austr.
Schenckii, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 751.—Afr. austr.

FENDLERELLA, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 626. *SAXIFRAGACEAE.*
utahensis, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.

FERRARIA, Linn. (Irid.).
andongensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 27 = Moraea andongensis.
bechuanica, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 344.—Afr. trop.
Candelabrum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 27 (= *Moraea Candelabrum*).—Afr. trop.
glutinosa, *Rendle, l. c.* (= *Moraea glutinosa*).—Afr. trop.
viscaria, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 77.—Afr. trop.

FERULA, Tourn. (Umbellif.).
collina, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 25.—Oriens.
Cypria, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 94.—Cyprus.
latisegmenta, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 158.—Lesbos.

FERULAGO, Koch = **Ferula**, Linn. (Umbellif.).
kurdica, *Post, Fl. Syria*, 14.—Syria.

FESTUCA, Tourn. (Gramin.).
acuta, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 175.—Chili.
asthenica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 354.—Ind. or.
barbata, Linn. Amoen. Acad. iii. 400 = Schismus fasciculatus.
Basnia, Ham. ex Wall. Cat. n. 3805 C, D = Leptochila filiformis.
breviaristata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 717.—Ecuador.
bromoides, Linn. Sp. Pl. 75 = Vulpia bromoides.
calceolaris, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 211.—Reg. Caucas.
calycina, Loefl. It. Hisp. 116 = Schismus fasciculatus.
campestris, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 57.—Am. bor.
Cumminsii, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 349.—Ind. or.
dactyloides, Roth, Nov. Pl. Sp. 78 = Koeleria cristata.
Davilae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 176.—Chili.
Deasyi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 429.—Turkestan.
decumbens, Linn. Sp. Pl. 75 = Danthonia decumbens.
Duthiei, Hack. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 352 = altaica.
filiformis, Steud. Syn. Pl. Gram. 302 = Tripogon abyssinicus.
glaucescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 78 = Koeleria cristata.
glaucophylla, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 178.—Chili.
indica, Retz. Obs. iv. 21 = Diplachne fusca.
kashmiriana, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 351.—Ind. or.
leptopogon, *Stapf, l. c.* 354.—Ind. or.
Levingei, *Stapf, l. c.* 352.—Ind. or.
longearistata, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 212 (non Walp.).—Reg. Caucas.
longipes, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 721.—Afr. austr.
lucida, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 355.—Ind. or.
melangaea, Spreng. Syst. i. 352 = Lasiochloa longifolia.
monantha, *Stapf, in Kew Bull.* 1899, 117.—N. Guin.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 22 = Aeluropus villosus.
mysorensis, Heyne, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 600 = Tripogon bromoides.

FESTUCA:—
mysurensis, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 287 = praec.
natans, Ham. in Wall. Cat. n. 3823 = Myriostachya wightiana.
neesiana, Steud. Nomencl. ed. II. i. 631 = scabra.
nitidula, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 350.—Ind. or.
orthophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 717.—Peruv.
pampeana, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 73.—Reg. Argent.
papuana, *Stapf, in Kew Bull.* 1899, 117.—N. Guin.
pascua, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 176.—Chili.
patagonica, *R. Phil. l. c.* 174.—Chili.
polycolea, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 349.—Ind. or.
pungens, Vahl, Symb. Bot. i. 10 = Aeluropus villosus.
pyrogea, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 97.—Reg. Magell.
rigida, Kunth, Rév. Gram. i. 129 = Scleropoa rigida.
scaberrima, Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = Bromus asper.
sciuroides, Roth, Bot. Abh. 43 = Vulpia bromoides.
Serranoi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 179.—Chili.
Shuka, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 95.—Reg. Magell.
spaniantha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 174.—Chili.
Steudelii, *R. Phil. l. c.* 177.—Chili.
Stuebelii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 717.—Bolivia.
subandina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 177.—Chili.
sublimis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 718.—Ecuador.
undata, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 350.—Ind. or.
valesiaca, *Schleich. ex Gaudin, Agrost. Helv.* i. 242.—Ind. or.
vallicola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 57.—Am. bor.
ventanicola, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 72.—Reg. Argent.
wightiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = Bromus asper.

FEUILLÉEA, Kuntze = **Fevillaea**, Linn. 1735, gen. collect. (Legum.).
boliviana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 63 = Calliandra boliviana.
Feuilleei, Kuntze, l. c. = Inga Feuillei.
pithecolobioides, Kuntze, l. c. 64 = Inga pithecolobioides.
scalaris, Kuntze, l. c. = Pithecolobium scalare.

FEVILLEA, Linn. 1737 (Cucurb.).
Harmsii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 383 (= *Nhandiroba Harmsii*).—Bolivia.
pergamentacea, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 104.—Bolivia.

FICALHOA, Hiern, in Journ. Bot. 1898, 329. *ERICACEAE.*
laurifolia, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

FICARIA, Dill. = **Ranunculus**, Linn. (Ranunc.).
ficarioides, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 26 = R. ficarioides.

FICINIA, Schrad. (Cyper.).
aphylla, *Nees, in Endl. Prodr. Fl. Norf.* 23.—Afr. austr.
composita, Nees, in Linnaea, ix. 292 = brevifolia.
dasystachys, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 251.—Afr. austr.
gracilis, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 256 = tenuifolia.
lateralis, Kunth, l. c. 254 = aphylla.
latinux, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 252.—Afr. austr.
Ludwigii, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 15 = tenuifolia.
membranacea, Kunth, Enum. Pl. ii. 252 = Scirpus membranaceus.
micrantha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 240.—Afr. austr.
minutiflora, *C. B. Clarke, l. c.* 759.—Afr. austr.
Poiretii, Kunth, Enum. Pl. ii. 255 = gracilis.
rugulosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 241.—Afr. austr.
schinziana, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxix. 47 = Scirpus diabolicus.
subacuta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 244.—Afr. austr.

FICUS, Tourn. (Urtic.).
adelpha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 284.—N. Guin.
Aoa, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 615.—Ins. Samoa.
arbuscula, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 272.—N. Guin.
balicum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma balicum*).—Malaya.
bembicicarpa, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 269.—N. Guin.
brachylepis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1011.—Afr. trop.
brevicula, *Hiern, l. c.* 1009.—Afr. trop.
callescens, *Hiern, l. c.* 1001.—Afr. trop.
caulothyrsus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 286.—N. Guin.
ceylanica, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 293 = laevis.
Challa, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 144.—Arab.
chrysochlamys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 274.—N. Guin.
chrysolaena, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 279.—N. Guin.
ciliata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 615.—Ins. Samoa.
clethrophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1017.—Afr. trop.
Dahlii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 111.—N. Brit.
Diepenhorstii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma Diepenhorstii*).—Sumatra.
Du, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.
erythropareia, *K. Schum. & Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 277.—N. Guin.
Esmeralda, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 452.—Austral.
eulampra, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 279.—N. Guin.
Godeffroyi, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 613.—Ins. Samoa.
Goetzei, *Warb. l. c.* xxviii. 378.—Afr. trop.
Graeffei, *Warb. l. c.* xxv. 616.—Ins. Samoa.
Gul, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 278.—N. Guin.
Henryi, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 299.—China.
heteromorpha, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2533–4.—China.
Hollrungii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 287.—N. Guin.
Hulletii, *King, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 603.—Celebes.
hylophila, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.
hypoglauca, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 285.—N. Guin.
keyensis, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 270.—Malaya.
kingiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2535.—Formosa.
Klinkii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 271.—N. Guin.
Kunthii, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 298 = laurifolia.
lachnocarpa, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 288.—N. Guin.
lamprophylla, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 270.—N. Guin.
langkokensis, *Drake, in Journ. de Bot.* 1896, 215.—Tonkin.
leekensis, *Drake, l. c.* 213.—Tonkin.
lima, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 269.—N. Guin.
longecuspidata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 614.—Ins. Samoa.
macrorrhyncha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
magnolioides, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 47.—Hort.
mangiferifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 275.—N. Guin.
martinicensis, Willd. Sp. Pl. iv. 1137 = laurifolia.
Miquelii, *King, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 605.—Celebes.
mourilyanensis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 452.—Austral.
neriifolia, Reinw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 637 = laurifolia.

FICUS:—
pachyrrhachis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 282.—N. Guin.
pachystemon, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 274.—N. Brit.
palustris, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 288.—N. Guin.
phaeosyce, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 276.—N. Guin.
polyantha, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 288.—N. Guin.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 472.—Ind. occ.
praeruptorum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1004.—Afr. trop.
pseudoelastica, *Welw. ex Hiern, l. c.* 996.—Afr. trop.
pseudoribes, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 605.—Celebes.
pycnoneura, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 275.—N. Guin.
pygmaea, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1009.—Afr. trop.
pyrifolia, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma pyrifolium*).—Java.
ralumensis, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 112.—Afr. trop.
Rama-Varmae, *Bourdillon, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xiii. 155.—Ind. or.
Reineckei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 617.—Ins. Samoa.
rhododendrifolia, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 16 = laurifolia.
Rigo, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 235.—Austral.
schumanniana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
Schwarzii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 607, 644.—Celebes.
setistyla, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 286.—N. Guin.
sidifolia, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1018.—Afr. trop.
stenophylla, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2536.—China.
stenorrhyncha, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
stenothyrsus, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 285.—N. Guin.
subtrinervia, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 271.—N. Guin.
thynneana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 231.—Austral.
trachypison, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 280.—N. Guin.
tristipula, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 286.—N. Guin.
tuberculosa, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 999.—Afr. trop.
tuphapensis, *Drake, in Journ. de Bot.* 1896, 211.—China.
uniauriculata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 616.—Ins. Samoa.
urceolaris, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 1010.—Afr. trop.
virgata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma virgatum*).—Java?

FILAGO, Linn. (Compos.).
minor, Bub. Fl. Pyren. ii. 205 = minima.
nivea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 333 (= *Evax multicaulis*).—Am. sept.

FILIPENDULA, Tourn. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
occidentalis, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 185 = S. occidentalis.

FILLAEOPSIS, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 258. *LEGUMINOSAE*.
discophora, *Harms, l. c.* 259.—Afr. trop.

FIMBRISTYLIS, Vahl (Cyper.).
arenaria, Nees, in Linnaea, x. 146 = Bulbostylis humilis.
conspicua, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 56.—Bras.
glazioviana, *Boeck. l. c.* 77.—Bras.
glomerata, Urb. Symb. Antill. ii. 166 = spathacea.
Kingii, *Gamble, in Boeck. Cyper. Nov.* ii. 40.—Ind. or.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 52.—Zeylan.
tunquinensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 56.—Cochinch.
Woodrowi, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1898, 227.—Ind. or.

FIRMIANA, Marsigli = **Sterculia**, Linn. (Sterculiac.).
affinis, Terrac. in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 56 = S. affinis.
linearicarpa, Terrac. l. c. = S. linearicarpa.
populifolia, Terrac. l. c. 55 (= *Hildegardia populifolia*).—As. or.
Wallichii, Terrac. l. c. 56 (= *Scaphium Wallichii*).—Ind. or.

FITCHIA, Hook. f. (Compos.).
temariiana, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1897, 107.—Ind. occ.

FLAVERIA, Juss. (Compos.).
Bidentis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 148 = contrayerba.
vaginata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 48.—Mexic.

FLEMINGIA, Roxb. (Legum.).
praecox, *C. B. Clarke, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 439.—Ind. or.

FLINDERSIA, R. Br. (Meliac.).
chatawaiana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 240.—Austral.
Mazlini, *F. M. Bailey, l. c.*—Austral.

FLOERKEA, Willd. (Geraniac.).
Macounii, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 363 (= *Limnanthes Macounii*).—Am. bor.
occidentalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 268.—Am. bor.

FLORESTINA, Cass. (Compos.).
platyphylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49 (= *Schkuhria platyphylla*).—Mexic.

FLOSCOPA, Lour. (Commel.).
beirensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 319.—Afr. trop.

FLUGGEA, Willd. (Euphorb.).
capillipes, *Pax, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 427.—China.
keyensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 277 (= *Securinega keyensis*).—Malaya.

FORCHHAMMERIA, Liebm. (Euphorb.).
sphaerocarpa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 310.—Ind. occ.
trifoliata, *Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 399.—Mexic.

FORCIPELLA, Baill. (Acanth.).
cleistochlamys, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 40.—Madag.

FORCIPELLA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 150. *ILLECEBRACEAE*.
Rugelii, *Small, l. c.* (= *Siphonychia Rugelii*).—Am. bor.

FORESTIERA, Poir. (Oleac.).
cartaginensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 396.—Am. cent.

FORRESTIA, A. Rich. (Commelin.).
bicolor, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 360.—Sumatra.
monosperma, *C. B. Clarke, l. c.* 359.—Penins. Mal.
Preussii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 344.—Afr. trop.

FORSELLESIA, Greene = **Glossopetalon**, A. Gray (Celastr.).
arida, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7.—Am. bor.
meionandra, A. A. Heller, l. c. 8 = G. meionandra.
nevadensis, A. A. Heller, l. c. 7 = G. nevadensis.
pungens, A. A. Heller, l. c. 8 = G. pungens.

FORSKOHLEA, Linn. (Urticac.).
hereroensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 51.—Afr. trop.

FORSTERA, Linn. f. (Stylid.).
major, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 272.—N. Zel.

FORSTERONIA, G. F. W. Mey. (Apocyn.).
myriantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 435.—Am. cent.

FORSYTHIA, Vahl (Oleac.).
europaea, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 406.—Eur.

FOTHERGILLA, Murr. (Hamamel.).
monticola, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 374.—Am. bor.

FOURNIERA, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. (1897) 7. *GRAMINEAE.*
mexicana, *Scribn. l. c.* 8.—Mexic.

FRACASTORA, Adans. = **Sideritis**, Tourn. (Labiat.).
aculeata, Bub. Fl. Pyren. i. 455 = S. spinosa.
alpestris, Bub. l. c. 456 = S. hyssopifolia.
hirsuta, Bub. l. c. 453 = S. hirsuta.
linearifolia, Bub. l. c. 457 = S. pungens.
scordioides, Bub. l. c. 453 = S. scordioides.
spathulata, Bub. l. c. 458 = S. romana.

FRAGARIA, Tourn. (Rosac.).
bracteata, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 194.—Am. bor.
crinita, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 171.—Am. bor.
firma, *Rydb. l. c.* 184.—Am. bor.
glauca, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 56.—Am. bor.
Helleri, *Holz. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 36.—Am. bor.
pauciflora, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 183.—Am. bor.
platypetala, *Rydb. l. c.* 177.—Am. bor.
prolifica, *Baker & Rydb. ex Rydb. l. c.* 181.—Am. bor.
pumila, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
sibbaldifolia, *Rydb. l. c.* 176.—Am. bor.
Terrae-Novae, *Rydb. l. c.* 182.—Am. bor.
truncata, *Rydb. l. c.* 177.—Am. bor.

FRANKENIA, Linn. (Franken.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 497.—Patag.

FRASERA, Walt. (Gentian.).
ampla, *Greene, Pittonia*, iv. 186.—Am. bor.
fastigiata, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 312 = thyrsiflora.
macrophylla, *Greene, Pittonia*, iv. 186.—Am. bor.
venosa, *Greene, l. c.* 185.—Am. bor.

FRAXINUS, Tourn. (Oleac.).
biltmoreana, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 358.—Am. bor.
Eedenii, *Boerl. & Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned.-Ind.* lvi. 185.—Java.
malacophylla, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2598.—China.

FREYCINETIA, Gaudich. (Pandanac.).
australiensis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 32.—Austral.
Beccarii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 166.—Borneo.
candeliformis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 39.—Celebes.
caudata, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 167.—Ins. Fiji.
Creaghi, *Hemsl. l. c.*—Borneo.
ferox, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 33.—Ins. Philipp.
formosana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 166.—Formosa.
globiceps, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 30.—N. Guin.
Hemsleyi, *Warb. l. c.* 36.—Borneo.
Hollrungii, *Warb. l. c.* 30.—N. Guin.
humilis *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Ins. Solomon.
Jagorii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 39.—Ins. Philipp.
latispina, *Warb. l. c.* 33.—Celebes.
Lauterbachii, *Warb. l. c.* 34.—N. Guin.
marantifolia, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 164.—Ins. Solomon.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 267, 638.—Celebes.
Naumannii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 32.—N. Guin.
novocaledonica, *Warb. l. c.* 37.—N. Caled.
novoguineensis, *Warb. l. c.* 34.—N. Guin.
papuana, *Warb. l. c.* 42.—N. Guin.
philippinensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Ins. Philipp.
polystigma, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 42.—N. Guin.
pseudo-insignis, *Warb. l. c.* 33.—N. Guin.

FREYCINETIA:—
Reineckei, *Warb. ex Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 578.—Ins. Samoa.
rigidifolia, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Borneo.
samoensis, *Warb. ex Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 579.—Ins. Samoa.
Sarasinorum, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 35.—Celebes.
scabripes, *Warb. l. c.* 41.—Ins. Philipp.
sumatrana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 167.—Sumatra.
Vidalii, *Hemsl. l. c.* 166.—Ins. Philipp.

FREZIERA, Sw. (Ternstroem.).
Grisebachii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 542 (= *Eroteum hirsutum*).—Ind. occ.

FRITILLARIA, Tourn. (Liliac.).
Alfredae, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 101.—Syria.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 222.—China.
intermedia, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no. 9, 5.—Eur.
nobilis, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7500.—Armenia.
ophioglossifolia, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 183.—As. Min.
pollinensis, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no 9, 5.—Eur.
Skorpili, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 269.—Eur.
Souliei, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 221.—China.

FRITSCHIANTHA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 241 (1898) = **Seemannia**, Regel (Gesnerac.).
Benaryi, Kuntze, l. c. 242 = S. Benaryi.
cuneata, Kuntze, l. c. = S. cuneata.
major, Kuntze, l. c. = S. major.
nematanthodes, Kuntze, l. c. 241.—Bolivia.
purpurascens, Kuntze, l. c. = S. purpurascens.
silvatica, Kuntze, l. c. = S. silvatica.
uniflora, Kuntze, l. c. 242 = S. uniflora.

FROELICHIA, Moench (Amarant.).
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 63.—Parag.

FRUMENTUM, Krause, in Bot. Centralbl. lxxiii. (1898) 339 = **Triticum**, Linn. &c. (Gramin.).
arenarium, Krause, l. c. = Elymus arenarius.
Hordeum, Krause, l. c. = Hordeum vulgare.
junceum, Krause, l. c. = Agropyron junceum.
ovata, Krause, l. c. = Triticum ovatum.
pratense, Krause, l. c. = Hordeum secalinum.
repens, Krause, l. c. 340 = Agropyron repens.
sativum, Krause, l. c. 339 = Hordeum vulgare.
Secale, Krause, l. c. = Secale cereale.
silvaticum, Krause, l. c. = Elymus europaeus.
Triticum, Krause, l. c. = Triticum sativum.

FUCHSIA, Plum. (Onagrac.).
juntasensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 97.—Bolivia.
Pringsheimii, *Urb. Symb. Antill.* i. 375.—Ind. occ.
Sanctae-Rosae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 98.—Bolivia.
tunariensis, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.

FUIRENA, Rottb. (Cyper.).
Buchanani, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 20.—Afr. trop.
moritziana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 77.—Venez.

FUMARIA, Tourn. (Papav.).
bicolor, *Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. v. 111.—Eur.

FUMARIOLA, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. (1898) 403. *PAPAVERACEAE.*
turkestanica, *Korsh. l. c.* 404.—Turkestan.

FURCRAEA, Vent. (Amaryll.).
macrophylla, *Baker, in Hook. Ic. Pl.* t. 2501.—Ind. occ.?

G

GAERTNERA, Lam. (Logan.).
Dinklagei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 88.—Afr. trop.
plagiocalyx, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 322, nomen.—Afr. trop.

GAGEA, Salisb. (Liliac.).
Brentae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 88.—Eur.

GAHNIA, Forst. (Cyperac.).
boniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 141.—Cochinch.
gahniaeformis, A. A. Heller. in Minnes. Bot. Stud. i. 802 = Gaudichaudii.
stricta, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 142.—Cochinch.

GAILLARDIA, Fouger. (Compos.).
multiceps, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 512.—Am. bor.

GALACTIA, P. Br. (Legum.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 137.—Mexic.
albiflora, *Urb. Symb. Antill.* ii. 316.—Ind. occ.
bahamensis, *Urb. l. c.* 331.—Ind. occ.
Combsii, *Urb. l. c.* 319.—Ind. occ.
cruelsiana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 437.—Bras.
douradensis, *Taub. l. c.* 438.—Bras.
Eggersii, *Urb. Symb. Antill.* ii. 311.—Ind. occ.
formosana, *Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 424.—Formosa.
glaucophylla, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 64.—Reg. Argent.
laxifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 315.—Ind. occ.
lignosa, *Urb. l. c.* 332 (= *Sweetia lignosa*).—Ind. occ.
minutiflora, *Urb. l. c.* 325.—Ind. occ.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 438.—Bras.
revoluta, *Urb. Symb. Antill.* ii. 333.—Ind. occ.
rubra, *Urb. l. c.* 309 (= *Dolichos rubra*).—Ind. occ.
Schomburgkii, *Urb. l. c.* 328.—Ind. occ.
stenophylla, *Urb. l. c.* 313 (non Hook. & Arn.).—Ind. occ.
striata, *Urb. l. c.* 320 (= *Glycine striata*).—Ind. occ.
tomentosa, *Urb. l. c.* i. 472 (= *Odonia tomentosa*).—Ind. occ.
trinitensis, *Urb. l. c.* ii. 315.—Ind. occ.
uniflora, *Urb. l. c.* 325.—Ind. occ.

GALAGANIA, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900) 62. *UMBELLIFERAE.*
fragrantissima, *Lipsky, l. c.* 63.—As. cent.

GALANTHUS, Linn. (Amaryll.).
cilicicus, *Baker, in Gard. Chron.* 1897, I. 214.—As. Min.

GALEANDRA, Lindl. (Orchid.).
Bouliawongo, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 935 = Lissochilus Bouliawongo.
longibracteata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 133 = Lissochilus purpuratus.

GALEARIA, Zoll. & Mor. (Euphorb.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 584, 626.—Celebes.
filiformis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 282 (= *Bennettia filiformis*).—Java.

GALENIA, Linn. (Ficoid.).
namaensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 76.—Afr. austr.

GALEOLA, Lour. (Orchid.).
Faberi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.

GALEOPSIS, Linn. (Labiat.).
inermis, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 596.—Eur.

GALIPEA, Aubl. (Rutac.).
jasminiflora, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 164 = multiflora.

GALIUM, Linn. (Rubiac.).
arcuatum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 395.—Am. bor.
Autrani, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 757.—Oriens.
Bailloni, *Brandza, in Anal. Acad. Rom.* Ser. II. ii. 537.—Eur.
cochabambense, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 52.—Bolivia.
cordifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 119 (= *Rubia cordifolia*).—Geront. temp. et trop.
cymosum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 401.—Am. bor.
Degenii, *Bald. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 632.—Eur.

GALIUM:—
ephedrodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 119 (= *Rubia ephedroides*).—Bras.
Heldreichii, *Halacsy, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 94.—Eur.
hierochuntinum, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 596.—Syria.
hystricocarpum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 464.—Mexic.
kahelianum, *Deflers, Voy. Yemen*, 145.—Arab.
Kerneri, *Degen & Doerfler, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 723.—Eur.
lanatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 120 (non Boiss.).—Chili.
lanuginosum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. 432 = Autrani.
lovcense, *Urum. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 55.—Eur.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 460.—Mexic.
oresbium, *Greenm. l. c.* 462.—Mexic.
patagonicum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 120.—Patag.
platypodum, *Borbas, ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 310.—Eur.
praetermissum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 306.—Mexic.
Pringlei, *Greenm. l. c.* xxxiii. 458.—Mexic.
pseudointricatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 149.—Lesbos.
rumelicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 70.—Eur.
scabrellum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 113.—Afr. trop.
Seatonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 460.—Mexic.
Shepardi, *Post, Fl. Syria*, 15.—Lebanon.
Watsoni, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 627.—Am. bor.

GALLIARIA, Bub. Fl. Pyren. i. 184 (1897) = **Amaranthus**, Linn. (Amarant.).
adscendens, Bub. l. c. 186 = A. viridis.
albida, Bub. l. c. 185 = A. albus.
patula, Bub. l. c. 187 = A. patulus.
prostrata, Bub. l. c. 188 = A. deflexus.
scabra, Bub. l. c. 187 = A. retroflexus.
sylvestris, Bub. l. c. 186 = A. sylvestris.

GALPHIMIA, Cav. (Malpigh.).
glandulosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 137.—Mexic.

GALPINSIA, Britton = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
Fendleri, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 8 = O. Fendleri.
filifolia, A. A. Heller, l. c.—Am. bor.
Greggii, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 186 = O. Greggii.
Toumeyi, Small, l. c. 1898, 317.—Am. bor.
tubicula, Small, l. c. 1896, 186 = O. tubicula.

GAMOCARPHA, DC. = **Boopis**, Juss. (Calycer.).
selliana, Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 117.—Patag.

GAMOSEPALUM, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. (1897) 73. *CRUCIFERAE.*
alyssoides, *Hausskn. l. c.* 75.—Oriens.
confine, *Hausskn. l. c.* 74.—Oriens.
lepido-stellatum, *Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. l. c.* 73.—Oriens.
paphlagonicum, *Hausskn. l. c.* 74.—Oriens.

GARCINIA, Linn. (Guttif.).
Cherryi, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 103.—Austral.
comorensis, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1221.—Ins. Comor.
Imberti, *Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 349.—Ind. or.
kilossana, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 189.—Afr. trop.
usambarensis, *Engl. l. c.* iii. 84, nomen.—Afr. trop.
wentzeliana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 435.—Afr. trop.

GARDENIA, Ellis (Rubiac.).
imperialis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 442.—Afr. trop.
Keartlandi, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxi. 70.—Austral.
Lamingtonii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 155.—N. Guin.

GARDENIA:—
Lanutoo, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 684.—Ins. Samoa.
lateriflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 442.—Afr. trop.
leopoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 28.—Afr. trop.
pelenkahuana, *Teysm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 495, nomen.—Celebes.
tigrina, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 462.—Afr. trop.

GARNOTIA, Brongn. (Gramin.).
angustata, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 243 = stricta.
arundinacea, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
ascendens, Munro, ex Hook. f. l. c. = stricta.
Griffithii, Munro, ex Hook. f. l. c. = stricta.
scoparia, *Stapf, ex Hook. f. l. c.* 242.—Ind. or.
scoparia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 363 = Thwaitesii.
Schmidii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 242.—Ind. or.
tectorum, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
tenuiglumis, *Stapf, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
Thwaitesii, *Stapf, l. c.* 241.—Ind. or.

GARNOTIELLA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2494 (1896). *GRAMINEAE.*
philippinensis, *Stapf, l. c.*—Ins. Philipp.

GASTERIA, Duval (Liliac.).
elongata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 290.—Afr. austr.
prolifera, *Lem. Pl. Grasses*, 58.—Hort.

GASTONIA, Comm. (Aral.).
eupteronoides, *Teysm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 490.—Celebes.

GASTRIDIUM, Beauv. (Gramin.).
oblongum, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 338.—Eur.

GASTROCHILUS, Wall. (Scitamin.).
albo-sanguinea, *Ridl. in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 111.—Penins. Mal.
angustifolia, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 357.—Sumatra.
calophylla, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 115.—Penins. Mal.
clivalis, *Ridley, l. c.* 114.—Penins. Mal.
concinna, *Ridley, l. c.* 116 (= *Kaempferia concinna*).—Penins. Mal.
lancifolius, *Ridley, l. c.* 112.—Penins. Mal.
longipes, *King & Prain, ex Ridley, l. c.* 113.—Penins. Mal.
ochroleuca, *Ridley, l. c.* 110.—Siam.
oculata, *Ridley, l. c.* 117.—Penins. Mal.
pandurata, *Ridley, l. c.* 114.—Ind. or. ?
prainiana, *Ridley, l. c.* 115 (= *Kaempferia prainiana*).—Penins. Mal.
Scaphochlamys, *Ridley, l. c.* 112 (= *Scaphochlamys malaccana*).—Penins. Mal.

GASTRODIA, R. Br. (Orchid.).
africana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 179.—Afr. trop.
dyeriana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 342.—Reg. Himal.
ovata, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 13.—Austral.

GASTROLEPIS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 115. *OLACACEAE.*

GASTROLOBIUM, R. Br. (Legum.).
Boormani, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 143.—Austral.

GAULTHERIA, Kalm (Eric.).
calycina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 274.—N. Zel.
glandulosa, *Colenso, l. c.* xxviii. 600.—N. Zel.
humifusa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 300 = G. Myrsinites.
laxiflora, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 515.—China.

GAURA, Linn. (Onagr.).
filiformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 617.—Am. bor.
neomexicana, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 307.—Am. bor.

GAURELLA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 183. *ONAGRACEAE.*
guttulata, *Small, l. c.* (= *Oenothera guttulata*).—Am. bor.

GAUROPSIS, Cock. in Coult. Bot. Gaz. xxx. (1900) 351 = **Gaurella**, Small (Onagr.).
canescens, Cock. l. c. = G. guttulata.
guttulata, Cock. l. c. = G. guttulata.

GAYLUSSACIA, H. B. & K. (Vaccin.).
nana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 443.—Am. bor.

GAZANIA, Gaertn. (Compos.).
bracteata, N. E. Br. in Gard. Chron. 1894, I. 620 = pygmaea.
canescens, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 478 = pygmaea.

GEIGERIA, Griessel. (Compos.).
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 373.—Afr. trop.
Helmsiae, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 206.—Austral.
hoffmanniana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 572 (= *Thysanurus angolensis*).—Afr. trop.
linosyroides, *Welw. ex Hiern, l. c.* 570.—Afr. trop.
pubescens, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 374.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

GEISSASPIS, Wight & Arn. (Legum.).
bifoliolata, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 58.—Afr. trop.
Descampsii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 65.—Afr. trop.
drepanocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 260.—Afr. trop.
emarginata, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 405.—Afr. trop.

GEISSOMERIA, Lindl. (Acanth.).
tetragona, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 658.—Bras.

GEISSORHIZA, Ker-Gawl. (Irid.).
alpina, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 223 = Hesperantha alpina.
hesperanthoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 97.—Afr. austr.
pallidiflora, *Schlechter, l. c.* 98.—Afr. austr.
pubescens, *Wolley Dod, in Journ. Bot.* 1900, 171.—Afr. austr.
rupestris, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 98.—Afr. austr.
sulphurea, *Schlechter, l. c.* 99.—Afr. austr.

GELSEMINUM, Weinm. = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
amoenum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 245.—Bolivia.
araliacium, Kuntze, l. c. = T. araliacea.
Avellanedae, Kuntze, l. c. = Tabebuia Avellanedae.
Caraiba, Kuntze, l. c. = Tecoma Caraiba.
chrysotrichum, Kuntze, l. c. = T. chrysotricha.
Garrocka, Kuntze, l. c. = T. Garrocka.
nodosum, Kuntze, l. c. = Tabebuia nodosa.
speciosum, Kuntze, l. c. = Tecoma speciosa.

GENDARUSSA, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).
debilis, Nees, in Linnaea, xvi. 302 = Monechma bracteatum.
variegata, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 385 = J. trinervia.

GENIANTHUS, Hook. f. (Asclep.).
Blumei, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Toxocarpus Blumei*).—Java.
macrophyllos, *Boerl. l. c.* (= *Toxocarpus macrophyllus*).—Java.

GENIOSPORUM, Wall. (Labiat.).
congoense, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 312, nomen.—Afr. trop.
discolor, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 351.—Afr. trop.
indicum, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 367 = elongatum.
Mutamba, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 854.—Afr. trop.
paludosum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 352.—Afr. trop.

GENIOSPORUM:—
paniculatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 351.—Afr. trop.
strictum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 852.—Afr. trop.

GENIOSTOMA, Forst. (Logan.).
samoense, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 666.—Ins. Samoa.

GENIPA, Tourn. (Rubiac.).
cinerea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 93.—Mexic.
Exosolenia, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 46.—Madag.
lantziana, *Baill. ex Drake, l. c.* 47.—Madag.
lastelliana, *Drake, l. c.*—Madag.
Perieri, *Drake, l. c.* 45.—Madag.
Pervillei, *Drake, l. c.*—Madag.
Poivrei, *Drake, l. c.*—Madag.
ravinensis, *Baill. ex Drake, l. c.* 46.—Madag.
tubulosa, *Baill. ex Drake, l. c.* 47.—Madag.

GENISTA, Linn. (Legum.).
arborea, *Rouy, Fl. Fr.* v. 314 (= *Sarothamnus arboreus*).—Afr. bor.
catalaunica, *Rouy, l. c.* iv. 205 (= *Sarothamnus catalaunicus*).—Eur.
flagellaris, *Sommier & Levier, in Acta Hort. Petrop.* xvi. 109.—Reg. Caucas.
gaditana, *Rouy, Fl. Fr.* v. 314 (= *Sarothamnus gaditanus*).—Eur.
hirta, *Rouy, l. c.* iv. 212.—Eur.
minima, Bub. Fl. Pyren. ii. 455 = sagittalis.
nitida, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 112.—Eur.
ottomanica, *Form. l. c.* xxxviii. 235.—Eur.
postranensis, *Form. l. c.* 236.—Eur.
triflora, *Rouy, Fl. Fr.* iv. 208 (= *Cytisus triflorus*).—Eur.

GENLISEA, A. St. Hil. (Lentibul.).
guianensis, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2629.—Guian.

GENTIANA, Tourn. (Gentian.).
albido-coerulea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 323.—Bolivia.
anisosepala, *Greene, Pittonia*, iii. 309.—Am. bor.
Bangii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 324.—Bolivia.
Bangii, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 79 = albido-coerulea.
barbeyana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 310.—Peruv.
bellidifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 486.—China.
biloba, DC. Fl. Fr. iii. 653 = Burseri.
brachysepala, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 328.—Ecuador.
bracteosa, *Greene, Pittonia*, iv. 180.—Am. bor.
Bridgesii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 316.—Bolivia.
calanchoides, *Gilg, l. c.* 330.—Peruv.
campanuloides, *Gilg, l. c.* 320.—Reg. Argent.
centamalensis, *Gilg, l. c.* 334.—Peruv.
chrysoneura, *Ekstam & Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 124.—N. Zembla.
citrina, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 130.—Am. bor.
claytonioides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 318.—Reg. Argent.
cochabambensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 79.—Bolivia.
connectens, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 131.—Am. bor.
cordisepala, *Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 243—As. cent.
dacrydioides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 311.—N. Granat.
dasyantha, *Gilg, l. c.* 309.—N. Granat.
dechyana, *Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1896, 77.—Reg. Caucas.
decora, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 131.—Am. bor.
dielsiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 316.—Bolivia.
distegia, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Duclouxii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 305.—China.
elegans, *A. Nelson, Bull. Club*, 1898, 276.—Am. bor.
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 314.—N. Granat.
exacoides, *Gilg, l. c.* 329.—Peruv.
filipes, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
gageoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 320.—Bolivia.

GENTIANA:—
gentilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 491.—China.
gilioides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 314.—Ecuador.
Gilliesii, *Gilg, l. c.* 317.—Am. austr.
Giulianetti, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 106.—N. Guin.
gynophora, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 305.—Bolivia.
Hedini, *Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 241.—As. cent.
helianthemoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 321.—Reg. Argent.
Hieronymi, *Gilg, l. c.* 305.—Reg. Argent.
hypericoides, *Gilg, l. c.* 312.—Am. austr.
inaequicalyx, *Gilg, l. c.* 324.—Bolivia.
interrupta, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Kuntzei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 326.—Bolivia.
Kusnezowii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 492.—China.
Kusnezowii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 325.—Bolivia.
lancifolia, *Gilg, l. c.* 326.—Bolivia.
lateriflora, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
Lehmannii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 310.—Am. austr.
longibarbata, *Gilg, l. c.* 331.—Ecuador.
Macgregorii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 107.—N. Guin.
maeulchanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 488.—China.
major, Bub. Fl. Pyren. i. 527 = lutea.
Mandoni, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 80 = inaequicalyx.
Markowiczi, *Kusnez. ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 391.—Reg. Caucas.
multicaulis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 306 = Pavonii.
Murbeckii, *Kerner, Sched. Fl. Austr.-Hung.* vii. 73.—Eur.
myrioclada, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 487.—China.
napulifera, *Franch. l. c.* 488.—China.
Neilreichi, *Doerfl. & Wettst. ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. *Gen. Heft* 42.—Eur.
nevadensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 313.—N. Granat.
orobanchoides, *Gilg, l. c.* 333.—Bolivia.
parviflora, Gilg, l. c. 321 = Galanderi.
pascuorum, Bub. Fl. Pyren. i. 535 = campestris.
peruviana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 304 (non Griseb.).—Peruv.
Phob, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 493.—China.
praticola, *Franch. l. c.* 489.—China.
remota, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Reussi, *Tocl, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 13.—Eur.
rhodopea, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 20.—Eur.
Riojae, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 319.—Reg. Argent.
sabbatioides, *Gilg, l. c.* 328.—Ecuador.
samolifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 485.—China.
seminuda, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 81 = gynophora.
serbica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 20.—Eur.
silenoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 319.—Bolivia.
solstitialis, *Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 337.—Eur.
soratensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 332.—Bolivia.
Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 491.—China.
speciosissima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 325.—Peruv.
spectabilis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 80 = dielsiana.
stenosepala, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 331.—Bolivia.
Stuebelii, *Gilg, l. c.* 317.—Peruv.
sulphurea, *Gilg, l. c.* 308.—Ecuador.
tarapacana, *Gilg, l. c.* 305.—Chili.
tatsienensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 489.—China.
tizuensis, *Franch. l. c.* 494.—China.
tongolensis, *Franch. l. c.* 490.—China.
tradescantiifolia, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 545.—Am. bor.
tricholoba, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 490.—China.
tubulosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 315.—Reg. Argent.
Tupa, *Gilg, l. c.* 333.—Peruv.

GENTIANA:—
virgata, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 81 = Kusnezowii, *Gilg*.

GENYORCHIS, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 280 (1900). *ORCHIDEAE.*
pumila, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

GEOCHORDA, Cham. & Schlecht. (Scrophul.).
glechomodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 232 = cuneata.

GEONOMA, Willd. (Palm.).
altissima, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 6.—Bras.
caudulata, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxi. 423.—Bras.
chapadensis, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 4.—Bras.
pynaertiana, *Sander, in Gard. Chron.* 1898, I. 258.—Arch. Mal.

GEOPHILA, D. Don (Rubiac.).
picta, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 18.—Guiana.
renaris, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 29.—Afr. trop.
speciosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 466.—Afr. trop.

GEOSTACHYS, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1898) 157. *SCITAMINEAE.*
decurvata, *Ridley, l. c.* 158 (= *Alpinia decurvata*).—Malaya.
elegans, *Ridley, l. c.* 160.—Malacca.
penangensis, *Ridley, l. c.* 159.—Penins. Mal.
rupestris, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
secunda, *Ridley, l. c.* 158 (= *Alpinia secunda*).—Malaya.

GERANIOSPERMUM, Siegesb. Fl. Petrop. (1736); Kuntze, Rev. Gen. i. 93 = **Pelargonium**, L'Hérit. (Geran.).
Rehmanni, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 32 = P. Rehmanni.
sidifolium, Kuntze, l. c. = P. sidoides.

GERANIUM, Tourn. (Geran.).
acutilobum, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 56.—Eur.
aristatum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 587.—Eur.
atropurpureum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 195.—Am. bor.
Bicknellii, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 92.—Am. bor.
candidum, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 151.—Turkestan.
Langloisii, *Greene, Pittonia*, iii. 171.—Am. bor.
lemanianum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 83.—Eur.
molloides, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 343.—Eur.
nemorale, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 222.—Am. bor.
oreganum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 106.—Am. bor.
Parryi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 7.—Am. bor.
robustum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 32.—Afr. austr.
texanum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 198.—Am. bor.
thermale, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 478.—Am. bor.
vagans, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 246.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, l. c.* 1898, 302.—Afr. trop.
yemense, *Deflers, Voy. Yemen*, 118.—Arab.

GERARDIA, Linn. (Scrophul.).
Bangii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 233.—Bolivia.
brevifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 25.—Am. austr.
cereifera, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 98.—Am. cent.
decemloba, *Greene, Pittonia*, iv. 51.—Am. bor.
holmiana, *Greene, l. c.* 52.—Am. bor.
lancifolia, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
polyphylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 618.—Am. bor.
schwackeana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 51.—Bras.
splendida, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 234 (= *Esterhazya splendida*).—Bras.
viridis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 619.—Am. bor.

GERARDIINA, Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 507. *SCROPHULARIACEAE.*
angolensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

GERBERA, Gronov. (Compos.).
Cineraria, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 149 (=*Trichocline Cineraria*).—Bras.
crocea, Kuntze, l. c. = Burmannii.
Galpinii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 844.—Afr. austr.
Gerbera, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 149 = aspleniifolia.
incana, *Kuntze, l. c.* (=*Trichocline incanum*).—Bras.
Lasiopus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 156.—Afr. trop.
leiocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 220 (non Sch. Bip.).—Afr. austr.
plicata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 149 (=*Trichocline plicata*).—Chili.
pulvinata, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
tuberosa, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 845.—Afr. austr.

GERMAINIA, Balansa & Poitrass. (Gramin.).
lanipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 163.—Ind. or.

GERMANEA, Lam. = **Plectranthus**, L'Hérit. (Labiat.).
andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 862 = P. andongensis.
concinna, Hiern, l. c. 861 = Coleus concinnus.
cylindracea, Hiern, l. c. = P. cylindraceus.
herbacea, Hiern, l. c. = P. herbaceus.
horrida, Hiern, l. c. 863 = P. horridus.
laxiflora, Hiern, l. c. 861 = P. laxiflorus.

GERTRUDIA, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 454 (1900). *BIXACEAE.*
amplifolia, *K. Schum. l. c.* 455.—N. Guin.

GESNERIA, Linn. (Gesnerac.).
acuminata, *Urb. Symb. Antill.* i. 479.—Ind. occ.
citrina, *Urb. l. c.* 477.—Ind. occ.
incisa, *Urb. l. c.* 479.—Ind. occ.
pauciflora, *Urb. l. c.* 478.—Ind. occ.

GETHYLLIS, Plum. (Amaryll.).
pusilla, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 531.—Afr. austr.

GEUM, Linn. (Rosac.).
andicola, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 217 (= *Sieversia andicola*).—Chili.
aucklandicum, *Greene, Pittonia,* iv. 225.—N. Zel.
pusillum, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 538.—N. Zel.
oregonense, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 56.—Am. bor.
sericeum, *Greene, Pittonia,* iii. 172.—Am. bor.
sericeum, Kirk, Fl. N. Zeal. 129 = aucklandicum.
turbinatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 91.—Am. bor.

GEUNSIA, Blume (Verbenac.).
hexandra, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 559, nomen.—Celebes.

GHIKAEA, Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis, 214 (1898). *SCROPHULARIACEAE.*
spectabilis, *Volkens & Schweinf. l. c.*—Afr. trop.

GIBBESIA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, xxv. (1898) 621. *ILLECEBRACEAE.*
Rugelii, *Small, l. c.* (=*Forcipella Rugelii*).—Am. bor.

GIGALOBIUM, P. Br. = **Entada**, Adans. (Legum.).
abyssinicum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 305 = E. abyssinica.
scandens, Hiern, l. c. = E. scandens.

GIGANTHEMUM, Welw. = **Camoensia**, Welw. (Legum.).
scandens, Welw. Apont. 585 = C. maxima.

GIGANTOCHLOA, Kurz (Gramin.).
albociliata, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 555 = Oxytenanthera albociliata.
andamanica, Kurz, l. c. 556 = Oxytenanthera nigrociliata.
Kurzii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 65.—Ind. or.
latispiculata, *Gamble, l. c.* 67.—Ind. or.
ligulata, *Gamble, l. c.*—Ind. or.
nigrociliata, Kurz, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 226 = Oxytenanthera nigrociliata.
Scortechinii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 62.—Ind. or.
Wrayi, *Gamble, l. c.* 64.—Ind. or.

GILIA, Ruiz & Pav. (Polemon.).
attenuata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 278.—Am. bor.
caespitosa, A. Nelson, l. c. 546 = pungens.
calcaria, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 36.—Am. bor.
cephaloidea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 293.—Am. bor.
ciliata, Benth. Pl. Hartw. 325 = Loeselia ciliata.
Grayi, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 547 = caespitosa.
Hallii, *Parish, in Erythea,* vii. 94.—Am. bor.
hispida, *Piper, in Erythea,* vi. 30.—Am. bor.
klickitatensis, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
laxiflora, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 51.—Am. bor.
leptalea, *Greene, in Erythea,* iv. 58.—Am. bor.
ochroleuca, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 35.—Am. bor.
parvula, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 320.—Am. bor.
sedifolia, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Am. bor.
tenuiloba, *Parish, in Erythea,* vii. 95.—Am. bor.

GILIBERTIA, Ruiz & Pav. (Aral.).
cuneifolia, *Marchal, ex Urb. Symb. Antill.* i. 201 (=*Hedera cuneifolia*).—Ind. occ.
dentigera, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxix. 487.—China.
insularis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 83.—Mexic.
laurifolia, *Marchal, ex Urb. Symb. Antill.* i. 203.—Ind. occ.
nutans, *Marchal, l. c.* 201 (=*Dendropanax nutans*).—Ind. occ.
pendula, *Marchal, l. c.* 200 (=*Dendropanax pendulum*).—Ind. occ.
pruinosa, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 448.—Bras.
Rothschuhii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 126.—Am. cent.
samydifolia, *Marchal, ex Urb. Symb. Antill.* i. 201 (=*Sciadophyllum samydifolium*).—Ind. occ.

GILLETIELLA, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. (1900) 71. *ACANTHACEAE.*
congolana, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 72.—Afr. trop.

GILLETTIA, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 55. *COMMELINACEAE.*
sepalosa, *Rendle, l. c.* 56 (=*Aneilema sepalosum*).—Afr. trop.

GIRALDIA, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. iv. (1897) 431; et Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze, 1896–7, 167. *COMPOSITAE.*
Stapfii, *Baroni, ll. cc.*—China.

GISEKIA, Linn. (Ficoid.).
africana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 108 = G. Miltus.

GITHAGO, Adans. = **Lychnis**, Linn. (Caryoph.).
thessala, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 197.—Eur.

GIULIANETTIA, Rolfe, in Hook. Ic. Pl. t. 2616 (1899). *ORCHIDEAE.*
tenuis, *Rolfe, l. c.*—N. Guin.

GLADIOLUS, Tourn. (Irid.).
andongensis, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 269 = G. quartinianus.
angolensis, Baker, l. c. = G. quartinianus.
Antunesii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
aphanophyllus, *Baker, l. c.* 363.—Afr. trop.
aureus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 530.—Afr. austr.
cochleatus, Baker, in Journ. Bot. 1876, 333 = G. unguiculatus.
erectiflorus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 146.—Afr. austr.
Flanagani, *Baker, l. c.* 530.—Afr. austr.
fusco-viridis, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
Garnierii, Klatt, in Decken, Reisen Bot. iii. III. 73 = Antholyza watsonioides.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 365.—Afr. trop.

GLADIOLUS:—
Johnstoni, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
kilimandscharicus, Pax, in Engl. Hochgebirgsfl. Trop. Afr. 175 = G. quartinianus.
macrophlebius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
mosambicensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
oliganthus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
oreocharis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 504.—Afr. austr.
pallidus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
pretoriensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 308.—Afr. austr.
primulinus, Baker, in Gard. Chron. 1890, II. 122 = G. quartinianus.
prismatosiphon, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 102.—Afr. austr.
quilimanensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
saltatorum, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. 155 = G. quartinianus.
stenophyllus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. austr.
subulatus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
taubertianus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 103.—Afr. austr.
taylorianus, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. 405 = G. quartinianus.
tritoniaeformis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 308.—Afr. trop.
uhehensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 365.—Afr. trop.
venulosus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. trop.
vexillare, *Martelli, Monocot. Sard.* 101.—Eur.
watsonioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxx. 406 = Antholyza watsonioides.
Welwitschii, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 268 = quartinianus.
Whytei, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. trop.

GLECHON, Spreng. (Labiat.).
caparaonensis, *Taub. ex Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 4.—Bras.

GLEDITSCHIA, Clayton (Legum.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 433.—Celebes.

GLIRICIDIA, H. B. & K. (Legum.).
Michelii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 22.—Bolivia.

GLOBBA, Linn. (Scitam.).
albiflora, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 96.—Malaya.
brachyanthera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 329.—Borneo.
calophylla, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xxxii. 93.—Siam.
elegans, *Ridley, l. c.* 96.—Penins. Mal.
integra, *Ridley, l. c.* 94.—Siam.
Keithii, *Ridley, l. c.*—Siam.
malaccensis, *Ridley, l. c.* 93.—Malacca.
montana, *Ridley, l. c.* 92.—Penins. Mal.
perakensis, *Ridley, l. c.* 98.—Penins. Mal.
violacea, *Ridley, l. c.* 97.—Penins. Mal.

GLOBULARIA, Tourn. (Selag.).
gracilis, *Rouy & Richter, ex Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 245.—Eur.
majoricensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 134.—Eur.
oscensis, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1900, 112.—Eur.

GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.).
album, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 275 (=*Phyllanthus albus*).—Celebes; Ins. Philipp.
borneensis, *Boerl. l. c.* 276 (=*P. borneensis*).—Borneo.
fuscum, *Boerl. l. c.* (=*P. fuscus*).—Sumatra.
Gaudichaudii, *Boerl. l. c.* (=*P. Gaudichaudii*).—Malaya.
glomerulatum, *Boerl. l. c.* (=*P. glomerulatus*).—Sumatra.

GLOCHIDION:—
gracilentum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *Phyllanthus gracilentus*).—Java.
hypoleucum, *Boerl. l. c.* 275 (= *P. hypoleucus*).—Sumatra.
Korthalsii, *Boerl. l. c.* 276 (= *P. Korthalsii*).—Borneo.
Muelleri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 225.—Java.
oligotrichus, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *P. oligotrichus*).—Java.
quercinum, *Boerl. l. c.* (= *P. quercinus*).—Java.
Reinwardtii, *Boerl. l. c.* (= *P. Reinwardtii*).—Java.
rufoglaucum, *Boerl. l. c.* 275 (= *P. rufoglaucus*).—Java.
Salomonis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 226.—Ins. Solomon.
semicordatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *P. semicordatus*).—Java.
wagapense, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 226 (= *P. wagapensis*).—N. Caled.

GLOCKERIA, Nees (Acanth.).
monolopha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 439.—Am. cent.
ventricosa, *Donn. Sm. l. c.*—Am. cent.

GLOMERA, Blume (Orchid.).
papuana, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 111.—N. Guin.

GLORIOSA, Linn. (Liliac.).
minor, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 132.—Afr. trop.
virescens, *Lindl. in Bot. Mag.* t. 2539.—Afr. trop.

GLOSSOCALYX, Benth. (Monim.).
Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 384.—Afr. trop.

GLOSSOLEPIS, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 299. *SAPINDACEAE.*
macrobotrys, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

GLOSSONEMA, Decne. (Asclep.).
arabicum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 110.—Arab.

GLOSSOPETALON, A. Gray (Celastr.).
pungens, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 445.—Am. bor.

GLOSSOPHOLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 82. *MENISPERMACEAE.*
jollyana, *Pierre, l. c.* 85.—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, l. c.* 84.—Afr. trop.
macrophylla, *Pierre, l. c.* 82.—Afr. trop.

GLOXINIA, L'Hérit. (Gesnerac.).
reflexa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 94.—Bolivia.

GLUTA, Linn. (Anacard.).
cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 368 B.—Cochinch.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 482.—Penins. Mal.

GLYCERIA, R. Br. (Gramin.).
antarctica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 92.—Reg. Magell.
baltica, *Lindeberg, in Bot. Notiser*, 1898, 152.—Eur.
borealis, *Batchelder, in Proc. Manchester, U. S. A. Inst.* i. 158, fide *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 601 (= *Panicularia borealis*).—Am. bor.
Borreri, Bab. in English Bot. Suppl. t. 2797 = Atropis Borreri.
Duseni, *Lindeberg, in Bot. Notiser*, 1898, 153.—Eur.
explanata, *Lindeberg, l. c.* 151.—Eur.
fuegiana, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 91.—Fuegia.
leptostachys, *Speg. l. c.* 94.—Fuegia.
Neesii, Steud. Syn. Pl. Gram. 286 = Atropis Borreri.
poaeoides, *Stapf, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 348.—Ind. or.
reptans, *Krok. in Bot. Notiser*, 1899, 137.—Eur.
rigida, Sm. Engl. Fl. i. 120 = Scleropoa rigida.
rivularis, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 346 = tonglensis.
scaberrima, Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = Melica scaberrima.
songarica, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 1 = Poa persica.
Thomsoni, *Stapf, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 347.—Ind. or.

GLYCINE, Linn. (Legum.).
Buettneri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. trop.
digitata, *Harms, l. c.* xxviii. 408.—Afr. trop.
holophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 194 (= *Eriosema holophyllum*).—Afr. trop.
Wilmsii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. austr.

GLYCOSMIS, Correa (Rutac.).
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 115.—Afr. trop.

GLYPTOPETALUM, Thw. (Celastr.).
quadrangulare, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 345.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.*—Penins. Mal.

GNAPHALIUM, Linn. (Compos.).
amplum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Helichrysum amplum*).—Afr. austr.
andicola, *Kuntze, l. c.* (= *Lucilia chilensis*).—Chili.
Andrewsii, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
angustifolium, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 357.—Am. bor.
anomalum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Helichrysum anomalum*).—Afr. austr.
Arnotti, *Kuntze, l. c.* (= *Lucilia argentea*).—Urug.
athrixifolium, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum athrixiifolium*).—Afr. austr.
bicolor, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 411 (non Bioletti).—China.
caffrum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 151 (= *Helichrysum longifolium*).—Afr. trop.
chimborazense, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 30.—Ecuador.
chrysocephalum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 412.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 409.—China.
gnaphaliodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 151 (= *Lucilia gnaphalioides*).—Reg. Argent.
Hoffmannii, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum cephaloideum*).—Afr. austr.
Jamesonii, *Kuntze, l. c.* 152 (= *Lucilia Jamesonii*).—Reg. Argent.
kunthianum, *Kuntze, l. c.* (= *Conyza kunthiana*).—Bolivia.
Kuntzei, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum Kuntzei*).—Afr. austr.
lagopodioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 416.—Am. bor.
Lessingii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Lucilia nitens*).—Bras.
likiangense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 410.—China.
linearifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 308.—Mexic.
mixtum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 152 (= *Helichrysum mixtum*).—Afr. austr.
pellucidum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 411.—China.
plantaginifoliatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 153 (= *Helichrysum plantaginifolium*).—Afr. austr.
pulviniforme, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum pulvinatum*).—Afr. austr.
pusillum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 163.—Eur.
rosulatum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 156.—N. Granat.
sesamodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum sesamoides*).—Afr. austr.
setosum, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum setosum*).—Afr. austr.
Simonsii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 157.—N. Granat.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 30.—Ecuador.
subcordatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum hypoleucum*).—Afr. austr.
sulphurescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 415.—Am. bor.
Thapsus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum Thapsus*).—Afr. austr.
thermale, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 121.—Am. bor.
tunariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155.—Bolivia.
versatile, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 62.—Bolivia.
virescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155 (= *Lucilia Lundii*).—Reg. Argent.

GNAPHALIUM:—
weddellianum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155 (= *Gamochaeta humilis*).—Bolivia.
yunnanense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 410.—China.

GNEPHOSIS, Cass. (Compos.).
intonsus, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 197.—Austral.

GNETUM, Linn. (Gnetac.).
karstenianum, *Warb. Monsunia*, i. 196.—Ins. Molucc.
Kerstingii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 157.—N. Guin.
philippense, *Warb. Monsunia*, i. 196.—Ins. Philipp.

GNIDIA, Linn. (Thymel.).
dekindtiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 205.—Afr. trop.
denudata, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 97 (non Lindl.).—Afr. trop.
fruticulosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 207.—Afr. trop.
Gilbertae, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1218.—Madag.
heterophylla, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 98.—Afr. trop.
huillensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 206.—Afr. trop.
Kuntzei, *Gilg, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 280.—Afr. austr.
Newtonii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 205.—Afr. trop.
Passargei, *Gilg, l. c.* 206.—Afr. trop.
phaeotricha, *Gilg, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 281.—Afr. austr.
polyclada, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
Pretoriae, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
Rendlei, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 924.—Afr. trop.
Rivae, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 98.—Afr. trop.
somalensis, *Gilg, l. c.* (= *Arthrosolen somalensis*).—Afr. trop.
stenophylloides, *Gilg, l. c.* 97.—Afr. trop.
violacea, *Gilg, l. c.* 98.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 923.—Afr. trop.

GOCHNATIA, H. B. & K. (Compos.).
Smithii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.

GODETIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
bingensis, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xviii. 88.—Am. bor.

GOLDBACHIA, DC. (Crucif.).
verrucosa, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 78.—Turkestan.

GOMPHANDRA, Wall. (Olac.).
serrata, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 169.—Ind. or.

GOMPHIA, Schreb. (Ochnac.).
discolor, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 159.—Afr. trop.

GOMPHICHIS, Lindl. (Orchid.).
alba, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 500.—N. Granat.

GOMPHOCARPUS, R. Br. (Asclep.).
sphacelatus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 233.—Afr. trop.

GOMPHOSTEMMA, Wall. (Labiat.).
furfuraceum, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 351.—Malaya.
inopinatum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 172.—Ind. or.

GOMPHOSTIGMA, Turcz. (Logan.).
virgatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 201 = scoparioides.

GOMPHRENA, Linn. (Amarant.).
Caleyi, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 216.—Austral.
insignis, *Briq. l. c.* 215.—Austral.

GONGORA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
sanderiana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 456.—Peruv.

GONGRONEMA, Decne. (Asclep.).
membranifolium, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 140.—N. Brit.

GONGROTHAMNUS, Steetz (Compos.).
angolensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 592.—Afr. trop.
conyzoides, *Hiern, l. c.* 591.—Afr. trop.

GONIOCHETON, Blume = **Dysoxylum**, Blume (Meliac.).
insularis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 347 B = D. insulare.

GONIOTHALAMUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
fasciculatus, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 59.—Arch. Mal.
grandiflorus, *Boerl. l. c.* i. 136 (= *Beccariodendron grandiflorus*).—N. Guin.
inaequilatera, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 322.—N. Guin.
macranthus, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 137 (= *Melodorum macranthum*).—Burma.
myrmeciocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 321.—N. Guin.
peduncularis, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 284.—Ind. or.
uniovulatus, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 115.—N. Brit.
viridiflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 322.—N. Guin.

GONOCARYUM, Miq. (Inc. sed.).
monostachyum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 415.—N. Guin.

GONOLOBUS, Michx. (Asclep.).
Brittonii, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 500.—Am. bor.
chrysanthus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 299.—Mexic.
ciliatus, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 282.—Ind. occ.
grisebachianus, *Schlechter, l. c.* 287.—Ind. occ.
macranthus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 731 (non Kuntze).—Ecuador.
membranaceus, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 285.—Ind. occ.
Sintenisii, *Schlechter, l. c.* 288.—Ind. occ.
variifolius, *Schlechter, l. c.* 286.—Ind. occ.

GONYSTYLUS, Teijsm. & Binn. (Thymel.).
bancanus, *Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 232.—Malaya.
borneensis, *Gilg, l. c.* (= *Asclerum borneense*).—Borneo.
calophyllus, *Gilg, l. c.*—Borneo.
Forbesii, *Gilg, l. c.*—Sumatra.

GONZALEA, Pers. (Rubiac.).
ovatifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 336.—Am. cent.

GOODENIA, Sm. (Goodeniac.).
glomerata, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 647.—Austral.
horniana, *Tate, in Rep. Horn Exped.* iii. 189.—Austral.
Larupinta, *Tate, l. c.*—Austral.
mimuloides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 167.—Austral.

GOODYERA, R. Br. (Orchid.).
Andersonii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 127.—Reg. Himal.
fertilis, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 498.—Ecuador.
grandis, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 284.—Ind. or.
habenarioides, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 499.—N. Granat.
hemsleyana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 342.—Reg. Himal.
Henryi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 201.—China.
lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 498.—N. Granat.
ochroleuca, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 15.—N. Guin.

GOORINGIA, Williams, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 530. *CARYOPHYLLACEAE.*
Littledalei, *Williams, l. c.* (= *Arenaria Littledalei*).—Tibet.

GOTHOFREDA, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).
Kuntzei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 199 = O. Kuntzei.
paraguayensis, Kuntze, l. c. = O. paraguayense.

GOUANIA, Jacq. (Rhamn.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 382.—Ins. Andaman.
pallida, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 138.—Mexic.

GOUINIA, Fourn. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).
latifolia, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 10 (= *Tricuspis latifolia*).—Reg. Argent.
mexicana, Scribn. l. c. (= *Leptochloa mexicana*).—Mexic.
virgata, Scribn. l. c. = F. fournieriana.

GOULARDIA, Husnot, Gram. Fr. Belg. 83 (1899). *GRAMINEAE.*
biflora, *Husnot, l. c.* (= *Agropyrum biflorum*).—Eur.
canina, *Husnot, l. c.* (= *Agropyrum caninum*).—Eur.

GOULDIA, A. Gray (Rubiac.).
arborescens, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i. 896 = macrocarpa.
elongata, *A. A. Heller, l. c.* 897.—Ins. Sandw.
lanceolata, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.
sambucina, *A. A. Heller, l. c.* 898.—Ins. Sandw.

GOVENIA, Lindl. (Orchid.).
barbata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 5 = Eulophia Woodfordii.

GOYAZIA, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. (1896) 451. *GESNERACEAE.*
rupicola, *Taub. l. c.*—Bras.

GRACILEA, Koen. (Gramin.).
nutans, *Koen. ex Rottl. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 218.—Ind. or.
royleana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 284.—Ind. or.

GRADERIA, Benth. (Scroph.).
speciosa, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 128.—Afr. trop.

GRAMMATOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
seegerianum, Hort. in Hook. f. Bot. Mag. t. 7507 = rumphianum.

GRANTIA, Boiss. (Compos.).
flabellata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 158.—Arab.

GRATIOLA, Rupp. (Scroph.).
hispida, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 157 = subulata.

GRAVISIA, Mez = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
brassicoides, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 173 = A. brassicoides.

GREENEOCHARIS, Guerke & Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Regist. (1899) 460 = **Krynitzkia**, Fisch. & Mey. (Borag.).

GREIGIA, Reg. (Bromel.).
albo-rosea, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 47.—Venez.
Pearcei, *Mez, l. c.* 46.—Chili.

GREVILLEA, R. Br. (Proteac.).
aculeolata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 222.—Austral.
extorris, *S. Moore, l. c.* 221.—Austral.
Helmsiae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 195.—Austral.
helmsiana, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 362.—Austral.
Sarissa, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 222.—Austral.

GREWIA, Linn. (Tiliac.).
albiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 428.—Afr. trop.
avellana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 94.—Afr. trop.
batangensis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 158.—Afr. trop.
caducisepala, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 428.—Afr. trop.
goetzeana, *K. Schum. l. c.* 430.—Afr. trop.
herbacea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 96.—Afr. trop.
krebsiana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 26.—Afr. austr.
lasioclada, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 94.—Afr. trop.
microcarpa, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 190.—Afr. trop.
microdelphys, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 299, nomen.—Afr. trop.

GREWIA:—
miniata, *Mast. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 95.—Afr. trop.
nagensium, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 168.—Ind. or.
oncopetala, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 429.—Afr. trop.
palustris, *K. Schum. l. c.* 431.—Afr. trop.
platyclada, *K. Schum. l. c.* 430.—Afr. trop.
salicifolia, *Schinz, in Abh. Senckenb. Ges.* xxi. 87.—Ins. Aldabra.
Schlechteri, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 299, nomen.—Afr. trop.

GREWIOPSIS, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. (1900) 176. *TILIACEAE.*
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 177.—Afr. trop.
globosa, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 178.—Afr. trop.

GRINDELIA, Willd. (Compos.).
boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 60.—Bolivia.
Brownii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 315.—Am. bor.
decumbens, *Greene, Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
erecta, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 356.—Am. bor.
fastigiata, *Greene, Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
glandulosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 575.—Am. cent.
inornata, *Greene, Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
macrophylla, *Greene, l. c.* 297.—Am. bor.
perennis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 355.—Am. bor.
platylepis, *Greene, Pittonia*, iii. 297.—Am. bor.
oxylepis, *Greene, l. c.* iv. 42.—Am. bor.
scabra, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 120.—Am. bor.
stylosa, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 293.—Am. bor.
subalpina, *Greene, Pittonia*, iii. 297.—Am. bor.
subincisa, *Greene, l. c.* iv. 154.—Am. bor.
Volkensii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 156.—Reg. Argent.

GRISEBACHIA, Klotzsch (Eric.).
lauterbachiana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 206.—N. Guin.

GRONOVIA, Houst. (Loasac.).
grandiflora, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 13.—Mexic.
longiflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.

GROSSULARIA, Tourn. = **Ribes**, Linn. (Saxifr.).
alpestris, Bub. Fl. Pyren. ii. 716 = R. alpinum.
petraea, Bub. l. c. 717 = R. petraeum.

GRUMILEA, Gaertn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).
blepharostipula, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 495.—Afr. trop.
catetensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 494.—Afr. trop.
chaunothyrsus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 496.—Afr. trop.
comorensis, K. Schum. l. c. 102.—Ins. Comor.
dermatophylla, K. Schum. l. c. 101.—Afr. trop.
diplococca, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 583.—N. Guin.
diploneura, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 496.—Afr. trop.
elachistantha, K. Schum. l. c. 497.—Afr. trop.
euchrysantha, K. Schum. l. c. 496.—Afr. trop.
flaviflora, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 495.—Afr. trop.
Goetzei, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 497.—Afr. trop.
hypoleuca, K. Schum. l. c. 102.—Afr. trop.
Lehmbachii, K. Schum. l. c. 101.—Afr. trop.
macrantha, K. Schum. l. c. 102.—Afr. trop.
malacorrhax, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 582.—N. Guin.
micralabastra, K. Schum. & Lauterb. l. c. 580.—N. Guin.
micrococca, K. Schum. & Lauterb. l. c. 581.—N. Guin.
moninensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 496.—Afr. trop.
oblanceolata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 103.—Afr. trop.
pallidiflora, K. Schum. l. c. 497.—Afr. trop.
phaeochlamys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 581.—N. Guin.

GRUMILEA:—
Portus-Finschii, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 583.—N. Guin.
pubera, K. Schum. & Lauterb. l. c. 580.—N. Guin.
stricta, K. Schum. & Lauterb. l. c. = P. stricta.
subsuccosa, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 495.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 496.—Afr. trop.

GUADUA, Kunth (Gramin.).
tomentosa, *Hack. & Lindm. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 20.—Bras.

GUARDIOLA, Cerv. (Compos.).
angustifolia, *Robinson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 235.—Mexic.
arguta, *Robinson, l. c.* 234.—Mexic.
carinata, *Robinson, l. c.* 233.—Mexic.
odontophylla, *Robinson, l. c.* 234.—Mexic.
Rosei, *Robinson, l. c.* 233.—Mexic.

GUAREA, Allem. (Meliac.).
glomerulata, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 159.—Afr. trop.
leptotricha, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 265.—Afr. trop.
Rusbyi, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 17 (= *Sycocarpus Rusbyi*).—Am. bor.
Staudtii, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 180.—Afr. trop.
Zenkeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 158.—Afr. trop.

GUATTERIA, Ruiz & Pav. (Anonac.).
dolichopoda, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 2.—Am. cent.
glazioviana, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 19.—Bras.
longicuspis, *R. Fries, l. c.* 18.—Bras.
oliviformis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 1.—Am. cent.
Pondok, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 380.—Sumatra.
Poudook, Ind. Kew. i. 1070, sphalm. = praec.
sessilis, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 17.—Bras.

GUAZUMA, Plum. (Stercul.).
Guazuma, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 24 = ulmifolia.

GUELDENSTAEDTIA, Fisch. (Legum.).
Giraldii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 413.—China.

GUERKEA, K. Schum. (Apocyn.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 94.—Afr. trop.
floribunda, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. II. 180 = Baissea floribunda.
gracillima, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 228 = Baissea gracillima.
schumanniana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 128.—Afr. trop.
uropetala, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 228 = Baissea uropetala.

GUETTARDA, Linn. (Rubiac.).
albicaulis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 47.—Bolivia.
Krugii, *Urb. Symb. Antill.* i. 431.—Ind. occ.
laevis, *Urb. l. c.* 433.—Ind. occ.
ovalifolia, *Urb. l. c.* 432.—Ind. occ.
pungens, *Urb. l. c.* 434.—Ind. occ.

GUILIELMA, Mart. = **Bactris**, Jacq. (Palm.).
mattogrossensis, Barb. Rodr. Palm. Mattogross. 33.—Bras.

GUIOA, Cav. = **Cupania**, Linn. (Sapind.).
geminata, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 420.—N. Guin.

GUIZOTIA, Cass. (Compos.).
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 153.—Afr. trop.

GUNNERA, Linn. (Halorag.).
boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 33.—Bolivia.

GURANIA, Cogn. (Cucurb.).
hirsuta, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxiii. 131.—Am. cent.

GUTENBERGIA, Sch. Bip. (Compos.).
araneosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 153.—Afr. trop.
foliosa, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 462.—Afr. trop.

GUTIERREZIA, Lag. (Compos.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 527.—Patag.
divergens, *Greene, Pittonia,* iv. 58.—Am. bor.
diversifolia, *Greene, l. c.* 53.—Am. bor.
fasciculata, *Greene, l. c.* 56.—Am. bor.
filifolia, *Greene, l. c.* 55.—Am. bor.
glomerella, *Greene, l. c.* 54.—Am. bor.
Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 156.—Patag.
juncea, *Greene, Pittonia,* iv. 56.—Am. bor.
lepidota, *Greene, l. c.* 57.—Am. bor.
longifolia, *Greene, l. c.* 54.—Am. bor.
lucida, *Greene, Fl. Francisc.* 361 (= *Xanthocephalum lucidum*).—Am. bor.
serotina, *Greene, Pittonia,* iv. 57.—Am. bor.
spathulata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 156 = Gilliesii.
tenuis, *Greene, Pittonia,* iv. 55.—Am. bor.

GUYONIA, Naud. (Melast.).
intermedia, *Cogn. in Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol.* 30.—Afr. trop.

GUZMANIA, Ruiz & Pav. (Bromel.).
acorifolia, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 945 (= *Tillandsia acorifolia*).—Venez.
andreana, *Mez, l. c.* 936 (= *Caraguata andreana*).—N. Granat.
angustifolia, *Mez, l. c.* 905 (= *Caraguata angustifolia*).—Am. cent.
Bakeri, *Mez, l. c.* 933 (= *Caraguata Bakeri*).—N. Granat.
balanophora, *Mez, l. c.* 918.—Am. cent.
beleana, *André, ex Mez, l. c.* 944 (= *Caraguata beleana*).—Hort.
berteroana, *Mez, l. c.* 904 (= *Caraguata berteroana*).—Ind. occ.
brachycephala, *Mez, l. c.* 902 (= *Tillandsia brachycephala*).—Peruv.
bracteosa, *André, ex Mez, l. c.* 908 (= *Caraguata bracteosa*).—Ecuador.
calamifolia, *André, ex Mez, l. c.* 931 (= *Caraguata acorifolia*).—N. Granat.
calothyrsus, *Mez, l. c.* 910 (= *Tillandsia calothyrsus*).—Peruv.
Candelabrum, *André, ex Mez, l. c.* 935 (= *Caraguata Candelabrum*).—N. Granat.
capituligera, *Mez, l. c.* 926 (= *Tillandsia capituligera*).—Ind. occ.
compacta, *Mez, l. c.* 947.—Am. cent.
conifera, *André, ex Mez, l. c.* 911 (= *Caraguata conifera*).—Ecuador.
coriostachya, *Mez, l. c.* 914 (= *Caraguata coriostachya*).—Venez.
Cornuaulti, *André, ex Mez, l. c.* 925 (= *Tillandsia Cornuaulti*).—N. Granat.
Dussii, *Mez, l. c.* 923.—Ind. occ.
Eduardi, *André, ex Mez, l. c.* 947 (= *Caraguata morreniana*).—Ecuador.
fastuosa, *André, ex Mez, l. c.* 926 (= *Tillandsia fastuosa*).—N. Granat.
Fawcettii, *Mez, l. c.* 951.—Ind. occ.
gloriosa, *André, ex Mez, l. c.* 922 (= *Caraguata gloriosa*).—Ecuador.
goudotiana, *Mez, l. c.* 942.—N. Granat.
gracilior, *Mez, l. c.* 937.—N. Granat.
Harrisii, *Mez, l. c.* 927.—Ind. occ.
hygrometrica, *Mez, l. c.* 919 (= *Caraguata hygrometrica*).—N. Granat.
insignis, *Mez, l. c.* 916 (= *Pepinia insignis*).—Am. cent.
lehmanniana, *Mez, l. c.* 934 (= *Caraguata lehmanniana*).—N. Granat.
lepidota, *André, ex Mez, l. c.* 941 (= *Caraguata lepidota*).—Ecuador.
Lindeni, *Mez, l. c.* 933 (= *Caraguata Lindeni*).—Peruv.
lingulata, *Mez, l. c.* 899 (= *Caraguata lingulata*).—Am. trop.
longipetala, *Mez, l. c.* 919 (= *Tillandsia longipetala*).—N. Granat.
megastachya, *Mez, l. c.* 928 (= *Tillandsia megastachya*).—Ind. occ.
minor, *Mez, l. c.* 901.—Am. cent.
monostachya, *Rusby, ex Mez, l. c.* 905 (= *Tillandsia monostachya*).—Ind. occ.; Am. cent. et austr.

GUZMANIA:—
morreniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 932 (= *Caraguata morreniana*).—Ecuador.
Mosquerae, *Mez, l. c.* 924 (= *Caraguata Mosquerae*).—N. Granat.
mucronata, *Mez, l. c.* 912 (= *Tillandsia mucronata*).—Venez.
multiflora, *André, ex Mez, l. c.* 939 (= *Caraguata multiflora*).—N. Granat.
musaica, *Mez, l. c.* 898 (= *Caraguata musaica*).—N. Granat.
ororiensis, *Mez, l. c.* 917.—Am. cent.
osyana, *Mez, l. c.* 914 (= *Caraguata osyana*).—Ecuador.
palustris, *Mez, l. c.* 923 (= *Caraguata palustris*).—N. Granat.
Peacockii, *Mez, l. c.* 915 (= *Caraguata Peacockii*).—Reg. Andin.?
pleiosticha, *Mez, l. c.* 930 (= *Tillandsia pleiosticha*).—Venez.
Plumieri, *Mez, l. c.* 950 (= *Pitcairnea Plumieri*).—Ind. occ.
Poortmani, *André, ex Mez, l. c.* 922.—Ecuador.
Roezlii, *Mez, l. c.* 948 (= *Caraguata virescens*).—Guiana.
sanguinea, *André, ex Mez, l. c.* 901 (= *Caraguata sanguinea*).—N. Granat.
scherzeriana, *Mez, l. c.* 949.—Am. cent.
Sintenisii, *Mez, l. c.* 920 (= *Caraguata Sintenisii*).—Ind. occ.
sphaeroidea, *André, ex Mez, l. c.* 942 (= *Caraguata sphaeroidea*).—N. Granat.
Splitgerberi, *Mez, l. c.* 931.—Guiana.
straminea, *Mez, l. c.* 937 (= *Caraguata straminea*).—Hab.?
strobilantha, *Mez, l. c.* 913 (= *Tillandsia conantha*).—Peruv.
urbaniana, *Mez, l. c.* 920.—Ind. occ.
Van-volxemi, *André, ex Mez, l. c.* 938 (= *Caraguata Van-volxemi*).—N. Granat.
ventricosa, *Mez, l. c.* 929 (= *Tillandsia ventricosa*).—Venez.
virescens, *Mez, l. c.* 943 (= *Caraguata virescens*).—Peruv.
vittata, *Mez, l. c.* 946 (= *Caraguata vittata*).—Am. trop.
Wittmackii, *André, ex Mez, l. c.* 921 (= *Thecophyllum Wittmackii*).—N. Granat.
Zahnii, *Mez, l. c.* 940 (= *Caraguata Zahnii*).—Am. cent.

GYMINDA, Sarg. = **Myginda**, Jacq. (Celastr.).
Tonduzii, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 98.—Am. cent.

GYMNACRANTHERA, Warb. (Myrist.).
apiculata, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 359 (= *Myristica apiculata*).—Borneo.
canarica, *Warb. l. c.* 368 (= *Myristica canarica*).—Ind. or.
contracta, *Warb. l. c.* 360 (= *Myristica contracta*).—Borneo.
crassinervis, *Warb. l. c.* 362 (= *Myristica crassinervis*).—Borneo.
farquhariana, *Warb. l. c.* 365 (= *Myristica farquhariana*).—Malaya.
Forbesii, *Warb. l. c.* 363.—Malaya.
Murtoni, *Warb. l. c.* 357 (= *Myristica Murtoni*).—Penins. Mal.
paniculata, *Warb. l. c.* 370 (= *Myristica paniculata*).—Malaya.
stenophylla, *Warb. l. c.* 364 (= *Myristica stenophylla*).—Penins. Mal.
suluensis, *Warb. l. c.* 373 (= *Myristica suluensis*).—Ins. Philipp.
zippeliana, *Warb. l. c.* 372 (= *Myristica zippeliana*).—N. Guin.

GYMNADENIA, R. Br. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
Bulbinella, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 560 (= *Brachycorythis Bulbinella*).—Afr. austr.
Gerrardi, Kraenzl. l. c. 562 (= *Brachycorythis Gerardi*).—Afr. austr.
macrantha, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 279 = Platanthera helleborina.
rhodopea, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 42.—Eur.
virginea, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 562 (= *Platanthera virginea*).—Afr. austr.
Zeyheri, Kraenzl. l. c. (= *Schizochilus Zeyheri*).—Afr. austr.

GYMNANTHELIA, Anderss. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
lanigera, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 300 = A. laniger.

GYMNANTHERA, R. Br. (Asclep.).
hypoleuca, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 435 (= *Dicerolepis hypoleuca*).—Malaya.

GYMNARTOCARPUS, Boerl. in Icon. Bogor. tt. 24–5 (1897). *URTICACEAE*.
venenosa, *Boerl. l. c.*—Java.

GYMNOLOMIA, H. B. & K. (Compos.).
annua, *Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxix. 93.—Mexic.
cruciata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 480.—N. Granat.
hispida, *Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxix. 93.—Mexic.
longifolia, *Robinson & Greenm. l. c.* 92.—Mexic.
megacephala, *Robinson & Greenm. l. c* 102.—Mexic.
serrata, *Robinson & Greenm. l. c.* 99.—Mexic.

GYMNOPOGON, Beauv. (Gramin.).
digitatus, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 713 = Chloris incompleta.
rigidus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 372 = Dichaetaria Wightii.

GYMNOSIPHON, Blume (Burmann.).
squamatum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 281.—Afr. trop.

GYMNOSPORIA, Benth. & Hook. f. (Celastr.).
Antunesii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 152.—Afr. trop.
benguelensis, *Loes. l. c.* 151.—Afr. trop.
borumensis, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 430.—Afr. trop.
botsabelensis, *Loes. l. c.* 429.—Afr. austr.
Buchananii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 153.—Afr. trop.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 353.—Siam.
ferruginea, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 8.—Afr. trop.
harveyana, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 430.—Afr. austr.
heterophylla, *Loes. l. c.* 429 (= *Celastrus heterophyllus*).—Afr. austr.
rubra, *Loes. l. c.* 430 (= *Celastrus ruber*).—Afr. austr.
senegalensis, *Loes. l. c.* (= *Celastrus senegalensis*).—Afr. trop.
Trothae, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 150.—Afr. trop.

GYMNOSTACHYUM, Nees (Acanth.).
Listeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 171.—Ind. or.
variegatum, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 209.—Sumatra.

GYMNOSTERIS, Greene, Pittonia, iii. (1898) 303. *POLEMONIACEAE*.
nudicaulis, *Greene, l. c.* 304 (= *Collomia nudicaulis*).—Am. bor.
pulchella, *Greene, l. c.*—Am. bor.

GYMNOTRIX, Beauv. = **Pennisetum**, Pers. (Gramin.).
cenchroides, Roem. & Schult. Syst. ii. 499 = P. macrurum.
hordeiformis, Nees, in Linnaea, vii. 276 = P. macrurum.
flaccida, Munro, ex Aitchis. Cat. Punjab Pl. 163 = P. flaccidum.
longiglumis, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 85 = P. dichotomum.
purpurascens, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2072 = P. Thunbergii.
nigricans, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 315 = P. compressum.
Thouarsii, Steud. Nom. ed. I. 386 = P. borbonicum.
Thuarii, Beauv. Agrost. 60 = P. borbonicum.

GYNERIUM, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
argenteum, Nees, Agrost. Bras. 462 = Cortaderia argentea.
columbianum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 31.—N. Granat.
dioicum, Dallière, Pl. Ornam. i. t. 42 = Cortaderia argentea.

GYNERIUM:—
jubatum, Lemoine, ex Carr. in Rev. Hort. 1878, 449 = Cortaderia Quila.
nanum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 155.—Chili.
nitidum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 31 (= *Arundo nitida*).—Ecuador.
purpureum, Carr. in Rev. Hort. 1866, 419 = Cortaderia argentea.
Quila, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 153 = Cortaderia Quila.
speciosum, Nees, in Meyen, Reise, i. 407 = Cortaderia speciosa.

GYNOPOGON, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).
olivaeformis, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i. 877 = A. olivaeformis.
torresianus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 504 = A. torresiana.

GYNOXYS, Cass. (Compos.).
chimborazensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 66.—Ecuador.
corazonensis, *Hieron. l. c.* 65.—Ecuador.
glabriuscula, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 68.—Bolivia.
Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 156.—Bolivia.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 64.—Ecuador.

GYPSOPHILA, Linn. (Caryoph.).
pseudoverticillata, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 123.—Turkestan.
tubulosa, *Post, Fl. Syria*, 5.—Lebanon.

GYRINOPS, Gaertn. (Thymel.).
moluccana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Lachnolepis moluccana*).—Ins. Molucc.

GYROSTACHIS, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
Cogniauxii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 299 (= *Stenorrynchus comosus*).—Bolivia.
constricta, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 609.—Am. bor.
Reverchonii, Small, l. c. 610.—Am. bor.
stricta, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 107.—Am. bor.
triloba, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 610.—Am. bor.

H

HAASTIA, Hook. f. (Compos.).
Greenii, *Hook. f. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 296.—N. Zel.

HABENARIA, Willd. (Orchid.).
albo-marginata, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 322.—Ind. or.
ambigua, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 175.—Afr. trop.
antunesiana, *Kraenzl. l. c.* 174.—Afr. trop.
arabica, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 184.—Arab.
bakeriana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 132.—Reg. Himal.
bambusetorum, *Kraenzl. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1897, 107.—Java.
Barbertoni, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 199.—Afr. austr.
biermanniana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 343.—Reg. Himal.
boiviniana, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 238.—Ins. Comor.
buchwaldiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 503 = buchananiana.
byeriana, Auct. ex Just, Jahresb. xxiv. II. 370, sphalm. = dyeriana.
calcarata, *Benth. ex Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 211.—Afr. trop.
calva, *Rolfe, l. c.* 226.—Afr. trop.
clarencensis, *Rolfe, l. c.* 216.—Afr. trop.
clavaeformis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 138.—Penins. Mal.
cogniauxiana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 463.—Am. trop.
Columbae, *Ridley, in Gard. Chron.* 1900, II. 390.—Siam.

HABENARIA:—
confusa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 241.—Afr. trop.
conspicua, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 100.—Am. bor.
crocea, Schweinf. ex Reichb. f. in Otia Bot. Hamb. i. 57 = Platycoryne crocea.
Cumingii, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 262.—Ins. Philipp.
cumminsiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 343.—Reg. Himal.
dahliana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 466.—N. Guin.
debeerstiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 67.—Afr. trop.
delessertiana, *Kraenzl. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1897, 108.—Ins. Philipp.
dilatatiformis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 189.—Am. sept.
dyeriana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 133.—Reg. Himal.
Elwesii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7478.—Ind. or.
Erythraeae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 215.—Afr. trop.
Faberi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 201.—China.
fallax, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 325 (= *Herminium fallax*).—Reg. Himal.
flammea, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 173.—Afr. trop.
Fordii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 202.—China.
glaucescens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 412.—Penins. Malay.
goetzeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 173.—Afr. trop.
Guingangae, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 179 = Platycoryne Guingangae.
Hancockii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 202.—China.
Havilandi, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 427.—Borneo.
hawkesiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 603.—Burma.
helleborina, Nichols. Dict. Gard. ii. 107 = Platanthera helleborina.
Henryi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 202.—China.
hochstetteriana, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 210.—Afr. trop.
Holubii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 249.—Afr. trop.
humidicola, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 202.—China.
incompta, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 462.—Afr. trop.
insignis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 234 = mirabilis.
Johnsoni, *Rolfe, l. c.* 571.—Afr. trop.
juncea, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 132.—Reg. Himal.
lastelleana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 357.—Madag.
Lauterbachii, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 239, nomen.—N. Guin.
leptobrachiata, Ridl. in Journ. Bot. 1886, 293 = antennifera.
linearis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 602.—Burma.
longistigma, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 248.—Afr. trop.
Lugardii, *Rolfe, l. c.* 228.—Afr. trop.
lykipiensis, *Rolfe, l. c.* 243.—Afr. trop.
macrandra, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 139 = Podandria macrandra.
Maingayi, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 604.—Singapore.
marmarophila, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 304.—Borneo.
massoniana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 601.—Burma.
mesophylla, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 204.—Austral.
Michaeli, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay*, 306.—Calif.
micholitziana, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 233.—N. Guin.
mirabilis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 572.—Afr. trop.
monticola, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 413.—Penins. Mal.
mosambicensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 331.—Afr. trop.
neglecta, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 603.—Ind. or.
Nicholsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 571.—Afr. trop.
omeiensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 203.—China.

HABENARIA:—
paludosa, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 139 = Platycoryne paludosa.
paludosa, Reichb. f. in Flora, 1865, 178 = Platycoryne Protearum.
pantlingiana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 892.—Reg. Himal.
platyanthera, Reichb. f. in Linnaea, xxii. 860 = Roeperocharis platyanthera.
platantheropsis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 172.—Ind or.
pleistadenia, Reichb. f. ex Oliv. in Journ. Linn. Soc. xxi. 404 = Cynorchis Volkensii.
polytricha, *Rolfe, in Hook. Ic. Pl.* t. 2496.—Formosa.
Prazeri, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 602.—Burma.
Protearum, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 57 = Platycoryne Protearum.
psiloceras, *Welw. ex Reichb. f. in Flora*, 1867, 99.—Afr. trop.
pseudophrys, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 133.—Reg. Himal.
pungens, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 299.—Bolivia.
Rendlei, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 213.—Afr. trop.
replicata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 296 = hochstetteriana.
rhopalostigma, *Rolfe, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 342.—Afr. trop.
Rivae, *Kraenzl. l. c.* 238.—Ins. Comor.
saundersioides, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. l. c.* 181.—Afr. austr.
Schinzii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 219.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 58 = cirrhata.
Selerorum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 539.—Am. cent.
singapurensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 410.—Penins. Mal.
sondaica, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 382.—Java.
staudtiana, *Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. l. c.* 320.—Afr. trop.
Staudtii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 221 = staudtiana.
stenoloba, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 274, nomen.—Afr. trop.
stricta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 189.—Am. bor.
subauriculata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 34.—Mexic.
tosaensis, *Makino, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 427.—Japon.
trilobulata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 332.—Afr. trop.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, iv. 233.—Zeylan.
villosa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 228.—Afr. trop.
warburgiana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 467.—Ins. Philipp.
wilmsiana, *Kraenzl. l. c.* 464.—Afr. austr.
xanthochila, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 411.—Penins. Mal.

HABRACANTHUS, Nees (Acanth.).
cyaneus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 668.—N. Granat.
diversicolor, *Lindau, l. c.* 669.—Venez.; N. Granat.
macrochilus, *Lindau, l. c.*—N. Granat.

HABRANTHUS, Herb. = **Hippeastrum**, Herb. (Amaryll.).
Bakeri, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 150.—Chili.
flavus, R. Phil. l. c. xxvii. 333 = H. Solisi.

HAEMACANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 63. *ACANTHACEAE.*
coccineus, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

HAEMADICTYON, Lindl. = **Prestonia**, R. Br. (Apocynac.).
Lindmanii, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 10, 31.—Bras.

HAEMANTHUS, Tourn. (Amaryll.).
brachyandrus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 391.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 56.—Afr. trop.
eetveldeanus, *Wildem. & Th. Dur. l. c.*—Afr. trop.

HAEMANTHUS:—
Nelsonii, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 310.—Afr. trop.
Nicholsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 392.—Afr. trop.
zambesiacus, *Baker, l. c.* 387.—Afr. trop.

HAEMOCHARIS, Salisb. = **Laplacea**, H. B. & K. (Ternstroem.).
alpestris, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 547 = L. alpestris.
curtyana, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 430 = L. curtyana.
integerrima, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 294 = Gordonia integerrima.
portoricensis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 548 = L. portoricensis.
serrata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 296.—Java.

HAKEA, Schrad. (Proteac.).
suberea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 223.—Austral.

HALERPESTES, Greene, Pittonia, iv. (1900) 207. *RANUNCULACEAE.*
Cymbalaria, *Greene, l. c.* (= *Ranunculus Cymbalaria*).—Am. bor.
salsuginosa, *Greene, l. c.* (= *Ranunculus salsuginosus*).—Am. bor.
tridentata, *Greene, l. c.* 208 (= *Ranunculus Cymbalaria*).—Am. bor.

HALGANIA, Gaudich. (Borag.).
rigida, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 204.—Austral.
viscosa, *S. Moore, l. c.*—Austral.

HALIMUS, Rumpf = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid.).
mesembrianthemoides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 413 = S. crystallinus.

HALOPYRUM, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2448 (1896). *GRAMINEAE.*
mucronatum, *Stapf, l. c.*—Ind. or.

HALORAGIS, Forst. (Halorag.).
cartilaginea, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* 1896, 390.—N. Zel.

HAMADRYAS, Comm. (Ranunc.).
Delfini, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, i. 23.—Chili.

HANSEMANNIA, K. Schum. (Legum.).
gogolensis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 343.—N. Guin.

HAPLOCHILUS, Endl. = **Zeuxine**, Lindl. (Orchid.).
amboinense, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 2.—Malaya.

HAPLOCHOREMA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 331. *ZINGIBERACEAE.*
extensum, *K. Schum. l. c.* 333.—Borneo.
gracilipes, *K. Schum. l. c.* 332.—Borneo.
polyphyllum, *K. Schum. l. c.*—Borneo.
uniflorum, *K. Schum. l. c.*—Borneo.

HAPLOPAPPUS, Endl. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
Moyanoi, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 609.—Patag.
patagonicus, Speg. l. c. 528.—Patag.
Struthionum, Speg. l. c. 529.—Patag.

HARIOTA, Adans. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).
lindbergiana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 107 = R. lindbergiana.
sarmentacea, Kuntze, l. c. = R. sarmentacea.
tucumanensis, Kuntze, l. c. = R. tucumanensis.

HARMANDIA, Pierre (Olac.).
congoensis, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 570 (= *Lecomtea congoensis*).—Afr. trop.

HARMSIA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 240 (1897); et in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 35. *STERCULIACEAE.*
sidoides, *K. Schum. ll. cc.*—Afr. trop.

HARMSIELLA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 291 (1897) = **Chartocalyx**, Regel (Labiat.).

HARMSIOPANAX, Warb. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. I. 166 (1897) = **Horsfieldia**, Bl. (Aral.).

HARPAECARPUS, Nutt. (Compos.).
minimus, Greene, Fl. Francisc. 417 = Hemizonia minima.
parvulus, Greene, l. c. 416 = Hemizonella Durandi.

HARPALYCE, Moç. & Sesse (Legum.).
lepidota, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 436.—Bras.
speciosa, *Taub. l. c.* 435.—Bras.

HARPECHLOA, Kunth (Gramin.).
altera, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. 57 = Microchloa altera.

HARPULLIA, Roxb. (Sapind.).
cauliflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 424.—N. Guin.

HARRISONIA, R. Br. (Simarub.).
occidentalis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 218.—Afr. trop.

HARTMANNIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
speciosa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 181 = O. speciosa.
tetraptera, Small, l. c. = O. tetraptera.

HARVEYA, Hook. (Scrophul.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 780.—Afr. trop.
Bolusii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 234 = capensis.
Buchwaldii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 517.—Afr. trop.
cathcartensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 234.—Afr. austr.
euryantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 184.—Afr. austr.
hirtiflora, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 780.—Afr. trop.
laxiflora, *Hiern, ex Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 344.—Afr. austr.
pumila, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 344.—Afr. austr.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol.* 35.—Afr. trop.

HASELHOFFIA, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 305 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 316. *ACANTHACEAE.*
leucophthalma, *Lindau, ll. cc.*—Afr. trop.

HAVILANDIA, Stapf (Borag.).
papuana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 107.—N. Guin.

HAWORTHIA, Dunal (Liliac.).
Cassytha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 337.—Afr. austr.
sessiliflora, *Baker, l. c.* 353.—Afr. austr.
xiphiophylla, *Baker, l. c.* 354; *et in Bot. Mag.* t. 7505.—Afr. austr.

HAZARDIA, Greene = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
obtusa, Greene, Fl. Francisc. 375.—Calif.
Whitneyi, Greene, Pittonia, iii. 43 = A. Whitneyi.

HEBENSTRETIA, Linn. (Selag.).
glaucescens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 185.—Afr. austr.
Holubii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 266.—Afr. trop.
leucostachys, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 186.—Afr. austr.
macrostylis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 317.—Afr. austr.
stenocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 186.—Afr. austr.

HEBESTIGMA, Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 289. *LEGUMINOSAE.*
cubense, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

HECASTE, Soland. = **Bobartia**, Linn. (Irid.).
spathacea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 309 = B. indica.

HECHTIA, Klotzsch (Bromel.).
bracteata, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 550.—Mexic.
capituligera, *Mez, l. c.* 546.—Mexic.
desmetiana, *Mez, l. c.* 551.—Mexic.
gamopetala, *Mez, l. c.* 549.—Mexic.
montana, *Brandegee, in Erythea*, vii. 9.—Mexic.
morreniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 547.—Mexic.
podantha, *Mez, l. c.* 549.—Mexic.
sphaeroblasta, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 323.—Mexic.
suaveolens, *Morr. ex Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 550.—Mexic. ?

HECKELDORA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1286. *MELIACEAE.*
angustifolia, *Pierre, l. c.* 1287.—Afr. trop.
latifolia, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

HEDEOMA, Pers. (Labiat.).
bicolor, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 185 = Poliomintha bicolor.
blepharodonta, *Greene, Pittonia*, iii. 339.—Am. bor.
coccinea, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 295 = Keithia coccinea.
denudata, Briq. l. c. = Keithia denudata.
diffusa, *Greene, Pittonia*, iii. 338.—Am. bor.
glabrescens, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 294 = Poliomintha glabrescens.
Glaziovii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 185.—Bras.
gracilis, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 295 = Keithia gracilis.
Greggii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 185 = Poliomintha Greggii.
longiflora, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 294 = Poliomintha longiflora.
marifolia, Briq. l. c. = Poliomintha marifolia.
nana, *Greene, Pittonia*, iii. 339.—Am. bor.
nana, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 294 = thymoides.
nitida, Briq. l. c. 295 = Keithia nitida.
permixta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 183.—Mexic.
Pringlei, *Briq. l. c.* 182.—Mexic.
rubiacea, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 294 = Keithia rubiacea.
sancta, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 287.—Am. bor.
serpyllifolia, *Small, l. c.*—Am. bor.
villosa, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 295 = Keithia villosa.

HEDEOMOIDES, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 295 (1896). *LABIATAE.*
serpylloides, *Briq. l. c.* (= *Pogogyne serpylloides*).—Am. sept.
tenuiflora, *Briq. l. c.* (= *Pogogyne tenuiflora*).—Ind. occ.
ziziphoroides, *Briq. l. c.* (= *Pogogyne zizyphoroides*).—Calif.

HEDONA, Lour. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).
Davidi, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 433 = L. Davidi.

HEDRAEANTHUS, Griseb. = EDRAIANTHUS, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).
montenegrinus, Horák, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1900, 163.—Eur.

HEDYCHIUM, Koen. (Scitamin.).
aureum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 340.—Celebes.
collinum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 103.—Siam.
denticulatum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 102.—Penins. Mal.
flavescens, *Carey, ex Rosc. Scitam.* t. 50.—Zeylan.
macrorrhizum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 102.—Penins. Mal.
microchilum, *Ridley, l. c.* 101.—Java.

HEDYOSMOS, Mitchell = **Cunila**, Linn. (Labiat.).
Arechevaletae, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 194 = C. Arechevaletae.

HEDYOSMUM, Sw. (Chloranth.).
maximum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 345.—Bolivia.

HEDYPNOIS, Tourn. (Compos.).
annua, Bub. Fl. Pyren. ii. 49 = Rhagadiolus Hedypnois.

HEDYSARUM, Tourn. (Legum.).
baldshuanicum, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 258.—Turkestan.
Bellevii, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 756 (= *Onobrychis Bellevii*).—Afghan.
Brotherusi, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 19.—Oriens.
candidissimum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 607.—Austria.
candidum, Freyn et Sint. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1892, 80 = candidissimum.
carnosulum, *Greene, Pittonia*, iii. 212.—Am. bor.
cinerascens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 257.—Am. bor.
cymbostegium, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 22.—Oriens.
ferganense, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. no. 4, 93.—Turkestan.
korzinskyanum, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 257.—Turkestan.
lancifolium, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 256.—Am. bor.
leucanthum, *Greene, Pittonia*, iii. 213.—Am. bor.
marginatum, *Greene, l. c.* iv. 138.—Am. bor.
occidentale, *Greene, l. c.* iii. 19.—Am. bor.
Poncinsii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—As. cent.
sulphurescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 251.—Am. bor.
tanguticum, *Fedtsch. in Bot. Centralbl.* lxxxiv. 274.—China.
tuberosum, *Fedtsch. l. c.* 275.—China.

HEERIA, Meissn. = **Anaphrenium**, E. Mey. (Anacard.).
arenophila, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 748.—Afr. trop.
benguellensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 499.—Afr. trop.
crassinervia, Engl. l. c. 500 = A. crassinervium.
Schinzii, Engl. l. c.—Afr. trop.

HEINSENIA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 453. *RUBIACEAE.*
diervilleoides, *K. Schum. l. c.* 454.—Afr. trop.

HEINSIA, DC. (Rubiac.).
tomentosa, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 455.—Afr. trop.

HEISTERIA, Jacq. (Olac.).
biflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 18.—Bolivia.
Silviani, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 3.—Bras.
yapacaniensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 360.—Bolivia.
Zimmereri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 288.—Afr. trop.

HEISTERIA, Linn. = **Muraltia**, Neck. (Polygal.).
Heistera, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 10 = M. Heisteria.

HEKATEROSACHNE, Steud. = **Oplismenus**, Beauv. (Gramin.).
elatior, Steud. Syn. Pl. Gram. 118 = O. compositus.

HELEASTRUM, DC. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
Chapmanii, Greene, Pittonia, iii. 49 = A. eryngiifolius.
paludosum, Greene, l. c. 50 = A. paludosus.
spinulosum, Greene, l. c. = A. spinulosus.

HELENIASTRUM, Mill. = **Helenium**, Linn. (Compos.).
glaucum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157 = Cephalophora glauca.
rivulare, Greene, Fl. Francisc. 435.—Am. sept.
tinctorium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157 = Cephalophora aromatica.

HELENIUM, Linn. Syst. ed. I. (1735) = **Inula**, Linn. (Compos.).
vulgare, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = I. Conyza.

HELEOCHARIS, Lestib. = **Eleocharis**, R. Br. (Cyperac.).

HELIA, Mart. = **Lisianthus**, Aubl. (Gentian.).
loeseneriana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 346.—Bras.
micrantha, Gilg, l. c. 347.—Parag.

HELIANTHUS, Linn. (Compos.).
campestris, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157 = Flourensia campestris.
glaucus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 480.—Am. bor.
Lehmanni, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 39.—Ecuador.
polyphyllus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 480.—Am. bor.
pseudoverbesinoides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 40.—Ecuador.
riparia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157 = Flourensia riparia.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 41.—Ecuador.
subrhomboideus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 419.—Am. bor.
verticillatus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 479.—Am. bor.

HELICHRYSUM, Vaill. (Compos.).
agrostophilum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 833.—Afr. austr.
amboense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 561.—Afr. trop.
amplum, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150.—Afr. austr.
araneosum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 834.—Afr. austr.
athrixiifolium, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150.—Afr. austr.
Bachmannii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 459.—Afr. austr.
benguellense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 564.—Afr. trop.
calocephalum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 834.—Afr. austr.
Cassiope, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 199.—Austral.
citrinum, Bub. Fl. Pyren. ii. 207 = H. Stoechas.
concinnum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 269.—Afr. austr.
confertifolium, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 835.—Afr. austr.
congolanum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 324, nomen.—Afr. trop.
Danaë, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 371.—Afr. austr.
elodes, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 377, sphalm. = helodes.
floccosum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 836.—Afr. austr.
glomeratum, *Klatt, l. c.* 460.—Afr. austr.
helodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 561.—Afr. trop.
hoepfnerianum, *Vatke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 460.—Afr. trop.
homilochrysum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 371.—Afr. austr.
infaustum, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 351.—Afr. austr.
involucratum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 461.—Afr. austr.
Kuntzei, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 152.—Afr. austr.
lanceolatum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 311 (= *Ozothamnus lanceolatus*).—N. Zel.
luteo-rubellum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 149.—Afr. trop.
marmarolepis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 370.—Afr. austr.
Mimetes, *S. Moore, l. c.* 372.—Afr. austr.
mixtum, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 152.—Afr. austr.
monocephalum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 149.—Afr. trop.
nanum, *Baker, l. c.* 150.—Afr. trop.
nanum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 461.—Afr. austr.
nyasicum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 150.—Afr. trop.
opacum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 836.—Afr. austr.
oreophilum, *Klatt, l. c.* 837.—Afr. austr.
patulifolium, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 150.—Afr. trop.
plantaginifolium, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 153.—Afr. austr.

HELICHRYSUM :—
poycladum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 837.—Afr. austr.
praecinctum, *Klatt, l. c.* 838.—Afr. austr.
pulvinatum, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 153. —Afr. austr.
puteale, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 198.—Austral.
rhodolepis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 150.—Afr. trop.
Sibthorpii, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 313.—Eur.
somalense, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 60.—Afr. trop.
Steetzii, O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter. xiii. 25 = Achyrocline batocana.
stramineum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 563.—Afr. trop.
sulfureum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 144.—Lesbos.
sulphureo-fuscum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 151.—Afr. trop.
syncephalum, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Thapsus, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154.—Afr. austr.
xanthosphaerum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 151.—Afr. trop.

HELICIA, Lour. (Proteac.).
grandis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2631.—China.
incisa, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 10 ; *et in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 317.—Java.
lanceolata, *Koord. & Valet. l. c.* 10 ; *et l. c.* 320.—Java.

HELICONIA, Linn. (Scitamin.).
Sanderi, *Sand. in Gard. Chron.* 1899. I. 365.—Hort.

HELICOPHYLLUM, Schott (Aroid.).
hastatum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 179.—As. Min.

HELICTERES, Pluk. (Stercul.).
coccocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25 = Mahernia coccocarpa.
erodiodes, Kuntze, l. c. = Mahernia erodioides.
natalensis, Kuntze, l. c. = Mahernia natalensis.

HELICTONEMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 73. *CELASTRACEAE.*
klaineanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

HELIOCARPUS, Linn. (Tiliac.).
glanduliferus, *Robinson, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 127.—Am. cent.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 128.—Mexic.
nodiflorus, *Donn. Sm. & Rose, ex Rose, l. c.* 126.—Am. cent.
occidentalis, *Rose, l. c.* 127.—Mexic.
pallidus, *Rose, l. c.* 128.—Mexic.
reticulatus, *Rose, l. c.*—Mexic.

HELIOPHILA, Burm. f. (Crucif.).
arabidea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 133.—Afr. austr.
arenosa, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
capensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 5 = callosa.
Dodii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 314.—Afr. austr.
exilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 133.—Afr. austr.
lactea, *Schlechter, l. c.* 134.—Afr. austr.
leptophylla, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
linoides, *Schlechter, l. c.* 135.—Afr. austr.
macowaniana, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
macra, *Schlechter, l. c.* 136.—Afr. austr.
Maximiliani, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
namaquana, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 16.—Afr. austr.
nubigena, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 136.—Afr. austr.
polygaloides, *Schlechter, l. c.* 137.—Afr. austr.
rosea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
sabulosa, *Schlechter, l. c.* 138.—Afr. austr.
sarcostyla, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
scabrida, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 314.—Afr. austr.
sisymbrioides, *Schlechter, l. c.* 1897, 340.—Afr. austr.
squamata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 139.—Afr. austr.
stenocarpa, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
tricuspidata, *Schlechter, l. c.* 140.—Afr. austr.

HELIOTROPIUM, Tourn. (Borag.).
anchusanthum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 718.—Afr. trop.
axillare, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 483.—Mexic.
Bottae, *Deflers, Voy. Yemen*, 172, t. 5.—Arab.
crispiflorum, *Urb. Symb. Antill.* i. 394.—Ind. occ.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. i. 508 = europaeum.
guanicense, *Urb. Symb. Antill.* i. 395.—Ind. occ.
Kuntzei, *Guerke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 205.—Afr. austr.
mexicanum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 484.—Mexic.
reversiferum, *Wright, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 433.—Ind. occ.

HELIPTERUM, DC. (Compos.).
Marlothii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 430.—Afr. austr.
microglossum, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1897, 151.—Austral.
oppositifolium, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 165.—Austral.
verecundum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 200. —Austral.
Zacchaeus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 166.—Austral.

HELLMUTHIA, Steud. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).
restioides, Steud. Syn. Pl. Cyp. 90 = S. membranaceus.

HELMIA, Kunth = **Dioscorea**, Linn. (Dioscor.).
dregeana, Kunth, Enum. Pl. v. 437 = D. dregeana.
dumetorum, Kunth, l. c. 436 = D. dumetorum.

HELOPUS, Trin. = **Eriochloa**, H. B. & K. (Gramin.).
acrotrichus, Steud. Syn. Pl. Gram. 100 = E. polystachya.
annulatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 124 = E. polystachya.
laevis, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 49 = E. polystachya.

HELXINE, Bub. Fl. Pyren. i. 76 (1897) = **Parietaria**, Tourn. (Urtic.).
Bocconi, Bub. l. c. 77 = P. lusitanica.
Dioscoridis, Bub. l. c. 76 = P. officinalis.

HEMARTHRIA, R. Br. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).
capensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. ii. 248 = R. compressa.
caudiculata, Steud. Syn. Pl. Gram. 359 = R. compressa.
coromandelina, Steud. l. c. 358 = R. compressa.
fasciculata, Kunth, Rév. Gram. i. 153 = R. compressa.
hamiltoniana, Steud. Syn. Pl. Gram. 358 = R. protensa.
laxa, Steud. l. c. = R. compressa.
perforata, Kunth, Rév. Gram. i. 153 = R. perforata.
protensa, Steud. Syn. Pl. Gram. 359 = R. protensa.

HEMEROCALLIS, Linn. (Liliac.).
citrina, *Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze*, (1896-7) 145 ; *et in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. (1897) 305.—China.

HEMIBOEA, C. B. Clarke (Gesnerac.).
gracilis, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 124, fide *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 535.—China.

HEMICOA, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1896) 371, sphalm. = seq.

HEMIEVA, Rafin. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifrag.).
violacea, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 71 (= *Suksdorfia violacea*).—Am. bor.

HEMIGENIA, R. Br. (Labiat.).
exilis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 216.—Austral.
Macphersoni, *Luehmann, in Vict. Nat.* xv. 20.—Austral.

HEMIGRAPHIS, Nees (Acanth.).
abyssinica, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 58. —Afr. trop.
angustifolia, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 203. —Malaya.
aspera, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 = Strobilanthes scaber.
bicolor, *Boerl. l. c.* (= *Ruellia bicolor*).—Java.
blumeana, Boerl. l. c. = alternata.
borneensis, *Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 555.—Borneo.

HEMIGRAPHIS :—
buruensis, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 204. —Malaya.
colorata, *Hallier f. l. c.* 199 (= *Ruellia colorata*).—Java.
discolor, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia discolor*).—Java.
junghuhniana, *Boerl. l. c.* (= *Ruellia junghuhniana*). —Java.
lithophila, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 544.—N. Guin.
nemorosa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia nemorosa*).—Java.
Petola, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 206.—Malaya.
prostrata, *Hallier f. l. c.* 202.—Celebes.
rapifera, *Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 555.—Celebes.
ravaccensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia ravaccensis*).—Malaya.
repanda, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 198 (= *Ruellia repanda*).—Malaya.
Schweinfurthii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 58.—Afr. trop.
serpens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia serpens*).—Java.
stenophylla, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 203. —Malaya.
sumatrensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia sumatrensis*).—Sumatra.
tenera, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 58.—Afr. trop.
tonkinensis, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 649.—Cochinch.
trichotoma, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 658 (= *Ruellia trichotoma*).—Java.

HEMIHEISTERIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 126. *OLACACEAE.*
pentandra, *Van Tiegh. l. c.* (= *Heisteria pentandra*).—Am. austr.

HEMIMERIS, Linn. f. (Scrophul.).
gracilis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 375.—Afr. austr.

HEMIORCHIS, Kurz (Scitamin.).
Pantlingii, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 163.—Reg. Himal.

HEMIPILIA, Lindl. (Orchid.).
amethystina, *Rolfe, ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7521.—Burma.
brevicalcarata, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 420. —China.
cruciata, *Finet, l. c.* 421.—China.
Henryi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 203.—China.

HEMIPOGON, Decne. (Asclep.).
exaltatus, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 18.—Bras.
laxifolius, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 20.—Bras.

HEMISACRIS, Steud. = **Schismus**, Beauv. (Gramin.).
gonatodes, Steud. in Flora, 1829, 490 = S. fasciculatus.

HEMITOMES, A. Gray = **Newberrya**, Torr. (Monotrop.).
spicatum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = N. spicata.
subterraneum, A. A. Heller, l. c. = N. subterranea.

HEMIZONIA, DC. (Compos.).
clementina, *Brandegee, in Erythea*, vii. 70.—Am. bor.
Congdonii, *Robinson & Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 169.—Am. bor.

HEMIZYGIA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 368 (1897). *LABIATAE.*
bracteosa, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 248 = Ocimum bracteosum.
Junodi, *Briq. l. c.* 249.—Afr. trop.
teucriifolia, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 369 (= *O. teucriifolium*).—Afr. austr.
tuberosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 852.—Afr. trop.

HENRIETTELLA, Naud. (Melast.).
tuberculosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 335. —Am. cent.

HENSLOWIA, Blume (Santal.).
plurinervis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 181.—Arch. Mal.

HEPTACYCLUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 415. *MENISPERMACEAE.*
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

HEPTAPLEURUM, Gaertn. (Aral.).
affine, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 54.—Malaya.
Curtisii, *King, l. c.* 56.—Malaya.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 307.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 306.—China.
grandifolium, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 40.—Java.
Hullettii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 54.—Malaya.
laeve, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 42.—Java.
latifoliolatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 51.—Malaya.
lawranceanum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 293.—Ind. or.
luridum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 48.—Malaya.
nervosum, *King, l. c.* 55.—Malaya.
Ridleyi, *King, l. c.* 54.—Malaya.
Scortechinii, *King, l. c.* 49.—Malaya.
subracemosum, *King, l. c.*—Malaya.
triste, *King, l. c.* 48.—Malaya.
Wrayi, *King, l. c.* 55.—Malaya.

HERACLEUM, Linn. (Umbell.).
colchicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 276.—Reg. Caucas.
hemsleyanum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 503.—China.

HERBERTIA, Sweet (Irid.).
Hauthalii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 331.—Parag.

HERMANNIA, Linn. (Stercul.).
adenotricha, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 306.—Afr. austr.
alhiensis, *K. Schum. l. c.* 303.—Afr. trop.
asbestina, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 373.—Afr. austr.
auricoma, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 67 = Mahernia auricoma.
brachymalla, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
coccocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25 = Mahernia coccocarpa.
cyclophylla, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 303.—Afr. trop.
depressa, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. austr.
Dinterii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 748.—Afr. austr.
erecta, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. austr.
erodiodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25 = Mahernia erodioides.
galpiniana, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 435 = grandifolia.
grandistipula, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 63 = Mahernia grandistipula.
lanceolata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 436 = montana.
macrobotrys, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 51.—Afr. trop.
natalensis, K. Schum. l. c. 75 = Mahernia natalensis.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. trop.
parviflora, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 71 = Mahernia parviflora.
pedunculata, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
Pfeilii, *K. Schum. l. c.* 304.—Afr. trop.
phaulochroa, *K. Schum. l. c.* 303.—Afr. austr.
Rautanenii, *Schinz, ex K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 66.—Afr. trop.
Rehmannii, K. Schum. l. c. 76 = Mahernia Rehmannii.
saccifera, K. Schum. l. c. 71 = Mahernia saccifera.
schlechteriana, *Schinz, ex K. Schum. l. c.* 75.—Afr. austr.
staurostemon, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
stenopetala, *K. Schum. l. c.* 304.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 50.—Afr. trop.
tephrocapsa, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 304.—Afr. austr.

HERMANNIA:—
transvaalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 437.—Afr. austr.
vernicata, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 64 = Mahernia vernicata.
violacea, K. Schum. l. c. 69 = Mahernia violacea.
viscosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 89.—Afr. trop.
Volkensii, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 52.—Afr. trop.
Woodii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 437.—Afr. austr.

HERMINIUM, Linn. (Orchid.).
angustilabre, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 131.—Reg. Himal.
cymoidea, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 336, sphalm. = Cynosorchis sigmoidea.
gracile, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 131.—Reg. Himal.
jaffreyanum, *King & Pantl. l. c.* 130.—Reg. Himal.
quinquelobum, *King & Pantl. l. c.*—Reg. Himal.
Steudneri, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 109 = Peristylus Steudneri.

HERMSTAEDTIA, Reichb. (Amarant.).
Welwitschii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 278.—Afr. trop.

HERNANDIA, Plum. (Laurin.).
drakeana, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1899, 4.—Ins. Societ.
Temarii, *Nadeaud, l. c.* 1897, 114.—Ins. Societ.

HERNIARIA, Tourn. (Illecebr.).
densiflora, *Williams, ex Post, Fl. Syria,* 7; *et in Bull. Herb. Boiss.* iv. 562.—Syria.
hebecarpa, *Gay, ex Williams, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 563.—Alger.
mauritanica, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 47.—Alger.

HERPESTIS, Gaertn. f. (Scrophul.).
decumbens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 91.—Mexic.
occultans, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 394.—Afr. trop.

HERSCHELIA, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).
bachmanniana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 805.—Afr. trop.
Baurii, Kraenzl. l. c. 804 = D. Baurii.
charpentieriana, Kraenzl. l. c. 807 = D. charpentieriana.
forcipata, Kraenzl. l. c. = D. forcipata.
hamatopetala, Kraenzl. l. c. 803 = D. hamatopetala.
lugens, Kraenzl. l. c. 806 = D. lugens.
purpurascens, Kraenzl. l. c. 803 = D. purpurascens.
venusta, Kraenzl. l. c. 805 = D. venusta.

HERTIA, Neck. = **Othonnopsis**, Jaub. & Spach (Compos.).
Kuntzei, O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157.—Afr. austr.
natalensis, O. Hoffm. l. c.—Afr. austr.

HESPERALOE, Engelm. (Liliac.).
Davyi, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 226.—Calif.?

HESPERANTHA, Ker-Gawl. (Irid.).
alpina, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 703 (= *Geissorhiza alpina*).—Afr. trop.
erecta, *Benth. & Hook. f. l. c.* (= *Geissorhiza erecta*).—Afr. austr.
lutea, *Benth. & Hook. f. l. c.* (= *Geissorhiza lutea*).—Afr. austr.
subexserta, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 62.—Afr. austr.

HESPEREVAX, A. Gray = **Evax**, Gaertn. (Compos.).
acaulis, Greene, Fl. Francisc. 402.—Calif.
brevifolia, Greene, l. c.—Calif.
humilis, Greene, l. c. 401.—Calif.
sparsiflora, Greene, l. c. 402.—Calif.

HESPERIS, Linn. emend. ex Kuntze = gen. collect. Crucif.
florida, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 5 = Sisymbrium floridum.
intricatissima, Kuntze, l. c. = Draba intricatissima.
linearifolia, Kuntze, l. c. 6 = Sisymbrium linifolium.

HESPEROGENIA, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1899) 203. *UMBELLIFERAE.*
Stricklandi, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

HESPEROSCORDUM, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
hyacinthium, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 = B. hyacinthina.
lacteum, Lindl. l. c. t. 1639 = B. hyacinthina.
Lewisii, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 185 = B. hyacinthina.

HESSEA, Herb. (Amaryll.).
bachmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 812.—Afr. austr.
brachyscypha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 191.—Afr. austr.
Schlechteri, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 310.—Afr. austr.

HETAERIA, Blume (Orchid.).
alba, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 404.—Penins. Mal.
connata, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 241, nomen.—N. Guin.
nitida, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 404.—Penins. Mal.
samoensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 199.—Ins. Samoa.

HETERANTHERA, Ruiz & Pav. (Ponteder.).
kotschyana, *Fenzl, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 205.—Afr. trop.

HETERIXIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 177. *LORANTHACEAE.*
amentacea, *Van Tiegh. l. c.* 178 (= *Viscum articulatum*).—N. Caled.
geminata, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. geminatum*).—Borneo.
Lindsayi, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. Lindsayi*).—N. Zel.

HETERODRABA, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 14 (1894). *CRUCIFERAE.*
unilateralis, *Greene, l. c.* (= *Draba unilateralis*).—Calif.

HETEROLEPIS, Ehrenb. = **Chloris**, Sw. (Gramin.).
elegans, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. v. 554 = C. virgata.

HETEROLYTRON, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. 676, sphalm. = HETERELYTRON, Jungh. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).

HETEROMELES, M. Roem. = **Photinia**, Lindl. (Rosac.).
arbutifolia, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 111.—Calif.

HETEROMMA, Benth. (Compos.).
simplicifolia, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 488.—Afr. austr.

HETEROPOGON, Pers. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
acuminatus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 254 = A. melanocarpus.
Allionii, Roem. & Schult. Syst. ii. 835 = A. contortus.
contortus, Beauv. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 836 = A. contortus.
firmus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 334 = A. contortus.
glaber, Pers. Syn. ii. 533 = A. contortus.
grandiflorus, Rendle, in Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 153 = A. grandiflorus.
hirsutus, Beauv. Agrost. 134 = A. contortus.
hirtus, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 310 = A. hirtus.
hirtus, Pers. Syn. ii. 533 = A. contortus.
hispidissimus, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = A. contortus.
Hohenackeri, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 24 = A. contortus.
insignis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 437 = A. triticeus.
melanocarpus, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 71 = A. melanocarpus.
messanensis, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 164 = A. contortus.
polystachyus, Nees, Agrost. Bras. 364 = A. contortus.
polystictus, Hochst. in Flora, 1856, 28 = A. melanocarpus.
pubescens, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 310 = A. hirtus.
Roxburghii, Arn. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 183 = A. contortus.
Roylei, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = A. melanocarpus.
scrobiculatus, Fourn. ex Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 268 = A. melanocarpus.

HETEROPTERIS, H. B. & K. (Malpigh.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 139.—Mexic.
acutifolia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 181.—Urug.
Bellonis, *Urb. Symb. Antill.* i. 330.—Ind. occ.
corumbensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 28.—Bras.
yucatanensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 369.—Am. cent.

HETEROPTERYS, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 139 = praec.

HETEROPYXIS, Harv. (Lythrar.).
transvaalensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 439 = canescens.

HETEROSTEMMA, Wight & Arn. (Asclep.).
chrysanthum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Symphysicarpus chrysanthus*).—Java.

HETEROTHALAMUS, Less. (Compos.).
alienus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 158 = brunioides.
tenellus, Kuntze, l. c. = Baccharis tenella.

HEUCHERA, Linn. (Saxifrag.).
caespitosa, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 426.—Calif.
ciliata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 196.—Am. bor.
cuneata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 203.—Am. bor.
grossulariifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 196.—Am. bor.
macrorhiza, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 466.—Am. bor.
saxicola, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* 1900, 118.—Am. bor.

HEVEA, Aubl. (Euphorb.).
confusa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub tt. 2573–4.—Guiana.
janeirensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 706 = brasiliensis.
minor, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2572.—Bras.
similis, *Hemsl. l. c.* t. 2576.—Bras.

HEXADESMIA, Brongn. (Orchid.).
boliviensis, *Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 122.—Bolivia.

HEXAPTERA, Hook. (Crucif.).
Nordenskjoldi, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 172.—Reg. Magell.

HEXISEA, Lindl. (Orchid.).
tenuissima, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 300.—Hab. ?

HIBBERTIA, Andr. (Dillen.).
Bennettii, *Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 463.—Austral.
exasperata, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 218 = Candollea exasperata.
Pancheri, Briq. l. c. 217 = coriacea.

HIBISCUS, Linn. (Malvac.).
Acetosella, *Welw. ex Fic. in Bol. Soc. Geogr. Lisb.* Ser. II. 608.—Afr. trop.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 70.—Afr. trop.
argentinus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 19 (= *Cienfuegosia argentina*).—Reg. Argent.
Carsoni, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 244.—Afr. trop.
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 359, 632.—Celebes.
Corneti, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 18.—Afr. trop.
Debeerstii, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 21.—Afr. trop.
Dinteri, *Hochr. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 20; *et in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 80.—Afr. trop.
eetveldeanus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 24.—Afr. trop.
elongatifolius, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 117.—Afr. trop.
fugosioides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 76.—Afr. trop.
haenkeanus, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 152 (= *Abelmoschus haenkeanus*).—Ins. Luzon.

HIBISCUS:—
hereroensis, *Hochr. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 20; *et in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 164.—Afr. trop.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 76.—Afr. trop.
integrifolius, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 135 = semilobatus.
lancibracteatus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 25.—Afr. trop.
lepidospermus, Mast. in Oliv. Fl. Trop. Afr. i. 197 = squamosus.
liebrechtsianus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 22.—Afr. trop.
Lindmanii, *Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 180.—Parag.
loandensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 69.—Afr. trop.
lobata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 19 = H. Solandra.
mastersianus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 71.—Afr. trop.
masuianus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 20.—Afr. trop.
papuanus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 438.—N. Guin.
petraeus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 76.—Afr. trop.
platychlamys, *F. Muell. ex Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 71.—Austral.
pseudoferox, *Hochr. l. c.* 123.—Am. trop.
rhodesicus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 424.—Afr. trop.
saxatilis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 350.—Afr. austr.
Schinzii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 127.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 240.—Afr. trop.
squamosus, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 165.—Afr. trop.
sublobatus, *Hochr. l. c.* 156 (= *Abelmoschus sublobatus*).—Polynes.
Waimeae, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies,* i. 851.—Ins. Sandw.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 75.—Afr. trop.
Zenkeri, *Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 241.—Afr. trop.
Zeyheri, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 97.—Afr. austr.

HICORIUS, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).
pallida, Ashe, in Gard. & For. x. (1897) 304.—Am. bor.

HIDALGOA, La Llave (Compos.).
Wercklei, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7684.—Ind. occ.

HIERACIUM, Tourn. (Compos.).
Pro speciebus, subspeciebus varietatibusque europaeis perplurimis criticis vide opera infra citata:—
Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1897, 90–104; 1899, 27–28.
Arv.-Touv. & Gaut. in Gaut. Fl. Pyren. Or. 272–280.
Arv.-Touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boiss. v. 477–480, 717–735, 785–790.
Blocki, in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 175; 1897.
Brenn. in Act. Soc. Faun. Fl. Fenn. xiii. I. 6–65; xvi. I. 6–20; xvi. IV. 252–253.
Briq. & Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 126–146.
Dahlst. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxi. no. 1, 17–26.
Dahlst. in Bot. Tidsskr. xx. 355–356.
Dahlst. ex Johanss. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxix. no. 1, 95–104.
Dahlst. ex Jonsson, in Bot. Tidsskr. xxii. 202–205.
Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlvi. (1896) 81–88.
Grecescu, Consp. Fl. Roman. 368–375.
Johanss. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxv. no. 7, 8–61.
Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. xvi.
Omang, in Nyt Mag. Nat. Christiania, xxxviii. 81–83.
Pernhoffer, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 118, 157, 196–197.
A. Peter, in Nachr. Gesells. Göttingen, 1898, I. 26–46.
Porcius, in Anal. Acad. Roman. Ser. II. xiv. 159–184.
Rehm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1897, 278–311.
Sagorski, in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv.
Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 218–271.
Stenström, in Bot. Notiser, 1896, 30–31.
Stenström, in Bot. Tidsskr. xx. 194–229.

HIERACIUM:—
Stenström, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxii. no. 7, 7–38.
anomalum, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 798.—Austria.
argyraeum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 148.—Am. bor.
barbigerum, *Greene, Pittonia,* iii. 228.—Am. bor.
beckianum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. 669 = Managettae.
boliviense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 159 = Crepis boliviensis.
caucasiense, *Arv.-Touv. ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis,* iv. 375.—Reg. Caucas.
chubutense, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 617.—Patag.
circinatum, *Fries, ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis,* iv. 375.—Reg. Caucas.
cymbifolium, *Purchas, in Journ. Bot.* 1899, 421.—Angl.
dollianum, *Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 140.—Eur.
dolopicum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 785.—Oriens.
ecuadoriense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 376.—Ecuador.
eriobasis, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 787.—Oriens.
euboeum, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlix. 189.—Graecia.
euchaetiiforme, *Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 118.—Eur.
fulvisetum, Bub. Fl. Pyren. ii. 84 = hybridum.
Greenei, Porter & Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1893, 120 = Traillii.
griseum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 293.—Eur.
griseum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 464.—Am. bor.
Managettae, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 986.—Armen.
narecense, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvi. 51.—Eur.
odorans, *Borb. in Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 2.—Eur.
Ogweni, *Linton, in Journ. Bot.* 1897, 407.—Angl.
Philippii, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata,* vii. 377.—Fuegia.
Richenii, *Jos. Murr, in Jahres-Kat. Wien. Bot. Tauschanst.* 1900, 132.—Eur.
rumelicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvi. 50.—Eur.
sermonikense, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 790.—Oriens.
soratense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 375.—N. Granat.
Stuebelii, *Hieron. l. c.* 374.—N. Granat.
subgermanicum, *Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 117.—Eur.
tacense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 375.—Bolivia.
thessalum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 292.—Eur.
thuringorum, *Sagorski, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 201.—Eur.
Traillii, *Greene, in Pittonia,* iv. 226.—Am. sept.
trebevicianum, *Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov.* 1900, 550.—Eur.
vagense, *Ley, in Journ. Bot.* 1900, 5.—Angl.
Villarii, Balb. ex Bub. Fl. Pyren. ii. 85 = saxatile.
villosoides, *Doerfl. ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. Gen. Heft, 40.—Eur.

HIEROCHLOË, S. G. Gmel. (Gramin.).
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 223.—Ind. or.
dregeana, Nees, ex Trin. Phalar. 37 = Anthoxanthum dregeanum.
Dregii, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 9 = Anthoxanthum dregeanum.
Ecklonii, Nees, l. c. 7 = Anthoxanthum Ecklonii.
flexuosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 222.—Ind. or.
gracillima, *Hook. f. l. c.* 223.—Ind. or.
Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
khasiana, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
tenuis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 798 = Anthoxanthum Tongo.

HIGINBOTHAMIA, Uline, in Field Columb. Mus. Bot. i. (1899) 414. *DIOSCOREACEAE.*
synandra, *Uline, l. c.* 415.—Am. cent.

HILDEBRANDTIA, Vatke (Convolv.).
obcordata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 406.—Afr. trop.
undulata, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

HIMANTOCHILUS, T. Anders. (Acanth.).
sessiliflorus, T. Anders. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1117 = Anisotes sessiliflorus.
sessilifolius, Lindau, in Engl. Pfl. Ost.-Afr. C. 372 = Anisotes sessiliflorus.
Zenkeri, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 60 = Anisotes Zenkeri.

HIPPEASTRUM, Herb. (Amaryll.).
Ananuca, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 150.—Chili.
andinum, R. Phil. l. c. 158 = H. Rhodolirion.
angustifolium, *R. Phil. l. c.*—Chili.
araucanum, *R. Phil. l. c.* 152.—Chili.
Arechavaletae, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 226.—Urug.
bonariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 311.—Reg. Argent.
Canterai, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 285.—Urug.
colonum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 148.—Chili.
consobrinum, *R. Phil. l. c.* 152.—Chili.
gayanum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 311.—Chili.
Harrisoni, Hook. f. Bot. Mag. t. 7737 = Arechavaletae.
laetum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 151.—Chili.
Moelleri, *R. Phil. l. c.* 154.—Chili.
popetanum, *R. Phil. l. c.* 156.—Chili.
purpuratum, *R. Phil. l. c.*—Chili.
Solisi, *R. Phil. l. c.* 155.—Chili.
splendens, *R. Phil. l. c.* 153.—Chili.
tenuifolium, *R. Phil. l. c.* 154.—Chili.
teretiflorum, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1900, II. 142.—Urug.

HIPPIA, Linn. (Compos.).
cotulodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 159 = gracilis.

HIPPOCRATEA, Linn. (Celastr.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 359.—Ins. Andaman.
cymosa, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 67.—Afr. trop.
ferruginea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 357.—Penang.
pauciflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
seleriana, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 561.—Am. cent.
utilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.

HIPPOCREPIS, Linn. (Legum.).
cyclocarpa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 80.—Afr. bor.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 568 = unisiliquosa.

HIRAEA, Jacq. (Malpigh.).
parviflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 139.—Mexic.
pulcherrima, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 15.—Parag.

HISINGERA, Hellen. (Bixin.).
caledonica, Panch. ex Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 58 = Myroxylon caledonicum.

HITOA, Nadeaud, in Journ. de Bot. 1899, 2. *RUBIACEAE.*
mooreensis, *Nadeaud, l. c.*—Ins. Societ.

HOFFMANNIA, Sw. (Rubiac.).
phoenicopoda, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 276.—Am. cent.
tetrastigma, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 336.—Am. cent.

HOFFMANNIELLA, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 325 (1900). *COMPOSITAE.*
silvatica, *Schlechter, l. c.*, nomen.—Afr. trop.

HOHENBERGIA, Schult. f. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
antillana, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 137 = A. lingulata.
eriostachya, Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 255.—Ind. occ.
Fawcettii, Mez, l. c. 254.—Ind. occ.

HOHENBERGIA :—
oligosphaera, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 124 = A. oligosphaera.
penduliflora, Mez, l. c. 135 = Pitcairnea penduliflora.
polycephala, Mez, l. c. 133 = A. polycephala.
portoricensis, Mez, l. c. 136.—Ind. occ.
ramageana, Mez, l. c. 127.—Bras.
sellowiana, Mez, l. c. 132.—Bras.
spinulosa, Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 253.—Ind. occ.
urbaniana, Mez, l. c.—Ind. occ.

HOIRIRI, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 303 (1898) = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
bromeliaefolia, Kuntze, l. c. = A. bromeliaefolia.
kuntzeana, Kuntze, l. c. = A. kuntzeana.
polystachya, Kuntze, l. c. = A. Glaziovii.

HOITZIA, Juss. (Polemon.).
lupulina, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 441 = Gilia ciliata.

HOLARRHENA, R. Br. (Apocyn.).
congolensis, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 306.—Afr. trop.
floribunda, Durand & Schinz, Études Fl. Congo, 190 = africana.

HOLBOELLIA, Wall. (Berberid.).
chinensis, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 343 = Parvatia chinensis.
coriacea, *Diels, l. c.* 342.—China.

HOLCUS, Linn. (Gramin.).
asper, Thunb. Prod. Pl. Cap. 20 = Pentaschistis aspera.
caerulescens, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 411 = Andropogon micranthus.
Caffrorum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 20 = Andropogon Sorghum.
Calamucha, Ham. ex Wall. Cat. n. 8778 F = Andropogon halepensis.
Carar, Ham. l. c. n. 8792 A = Andropogon Hamiltonii.
cernuus, Arduini, in Saggi Padov. i. (1786) 128 = Andropogon Sorghum.
ciliatus, Roxb. Fl. Ind. i. 321 = Andropogon agrostoides.
decolorans, Willd. Sp. Pl. iv. 931 = Andropogon halepense.
Dochna, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 174 = Andropogon Sorghum.
Gryllus, R. Br. Prod. 199 = Andropogon Gryllus.
halepensis, Linn. Sp. Pl. 1047 = Andropogon halepense.
montanus, Ham. ex Wall. Cat. n. 8805 C = Andropogon intermedius.
natans, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 62 = Chamaeraphis spinescens.
nervosus, Roxb. Fl. Ind. i. 320 = Arundinella brasiliensis.
pallidus, R. Br. Prod. 199 = Andropogon Gryllus.
paniciformis, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 82 = Pennisetum typhoideum.
parviflorus, R. Br. Prod. 199 = Andropogon micranthus.
quinqueflorus, Ham. ex Wall. Cat. n. 8778 G = Andropogon serratus.
racemosus, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 175 = Pennisetum typhoideum.
saccharatus, Linn. Sp. Pl. i. 1047 = Andropogon Sorghum.
setifolius, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 110 = Achneria setifolia.
Sorghum, Linn. Sp. Pl. 1047 = Andropogon Sorghum.
Virana, Ham. ex Wall. Cat. n. 8759 = Andropogon squarrosus.

HOLOCARPHA, Greene, Fl. Francisc. 426 (1897). *COMPOSITAE.*
macradenia, *Greene, l. c.* (= *Hemizonia macradenia*).—Calif.

HOLODISCUS, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
ariaefolia, Howell, Fl. N.W. Amer. i. 184 = S. discolor.
australis, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 194.—Am. bor.
dumosa, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = S. discolor.

HOLOSTEUM, Dill. (Caryophyll.).
praeumbellatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 156.—Lesbos.

HOLOTHRIX, Rich. (Orchid.).
Buchananii, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 447; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 330.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 47.—Afr. trop.
Lastii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 195.—Afr. trop.

HOLOTHRIX :—
lithophila, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 446; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 331.—Afr. austr.
medusa, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 154.—Afr. trop.
Nyasae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 193.—Afr. trop.
praecox, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 108 = Deroemera praecox.
Randii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 208.—Afr. trop.
Richardii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 191.—Afr. trop.
rupicola, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 419.—Afr. austr.
Schimperi, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 108 = Deroemera Schimperi.
schlechteriana, *Kraenzl. ex Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 21; *et in Orch. Gen. et Sp.* i. 588—Afr. austr.
squamata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 119 = Deroemera squamata.
unifolia, Reichb. f. l. c. = Deroemera unifolia.

HOMALANTHUS, A. Juss. (Euphorb.).
longistilus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 407.—N. Guin.
novoguineensis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

HOMALIUM, Jacq. (Samyd.).
arboreum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 53.—N. Caled.
calodendron, *Gilg, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
decurrens, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 50 (= *Blackwellia decurrens*).—N. Caled.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 126.—Afr. trop.
frutescens, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. 22 = H. Cordylanthus.
gracile, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 55 = axillare.
Guillainii, *Briq. l. c.* 51.—N. Caled.
intermedium, *Briq. l. c.*—N. Caled.
javanicum, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 11.—Java.
kanaliense, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 53.—N. Caled.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 20.—Malaya.
mathieuanum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 51.—N. Caled.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
montanum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 54.—N. Caled.
myrianthum, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.
polystachyum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 54.—N. Caled.
rivulare, *Briq. l. c.*—N. Caled.
sarcopetalum, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 119.—Afr. trop.
undulatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 23.—Malaya.
Vieillardi, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 50.—N. Caled.

HOMALOBUS, Nutt. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
aboriginorum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 246 = A. aboriginorum.
aculeatus, Rydb. l. c. 249 = A. aculeatus.
Bourgovii, Rydb. l. c. 247 = A. Bourgovii.
glabriusculus, Rydb. l. c. 246 = A. glabriusculus.
hypophilus, Rydb. l. c. 247.—Am. bor.
montanus, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 306 = A. Kentrophyta.
Palliseri, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 248 = A. Palliseri.
serotinus, Rydb. l. c. = A. serotinus.
stenophyllus, Rydb. l. c. 249 = A. stenophyllus.
tenellus, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 305 = A. multiflorus.
vexiliflexus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 249 = A. pauciflorus.

HOMALOCENCHRUS, Mieg. = **Leersia**, Soland. (Gramin.).
lenticularis, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost vii. 92 = L. lenticularis.

HOMALOMENA, Schott (Aroid.).
pygmaea, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 18 = Chamaecladon pygmaeum.

HOMALOPETALUM, Rolfe, in Hook. Ic. Pl. t. 2461 (1896). *ORCHIDEAE.*
jamaicense, *Rolfe, l. c.*—Jamaica.

HOMALOSTACHYS, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 37. *CYPERACEAE.*
sinensis, *Boeck. l. c.* 38.—China.

HOMERIA, Vent. (Irid.).
brachygyne, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 94.—Afr. austr.
Maximiliani, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
ramosissima, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
rhopalocarpa, *Schlechter, l. c.* 95.—Afr. austr.
simulans, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 529.—Afr. austr.
tenuis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 95.—Afr. austr.

HOMILACANTHUS, S. Moore = **Isoglossa**, Oerst. (Acanth.).
Gregorii, S. Moore, in Journ. Bot. 1894, 129 = I. Gregorii.

HOMOGLOSSUM, Salisb. = **Antholyza**, Linn. (Irid.).
pulchrum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 453.—Afr. austr.

HOMOPLITIS, Trin. = **Pogonatherum**, Beauv. (Gramin.).
crinita, Trin. Fund. Agrost. 166 = P. crinitum.

HONDBESSEN, Adans. (Rubiac.).
olens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 121 = Lygodisodia foetida.

HOOKERA, Salisb. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
filifolia, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 138 = B. filifolia.
leptandra, Greene, Pittonia, i. 74 = B. leptandra.
Orcutti, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 138 = B. Orcutti.
rosea, Greene, l. c. 137 = B. rosea.

HOPLESTIGMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 116. *BIXACEAE.*
klaineanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

HORDEUM, Tourn. (Gramin.).
apertum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 345.—Chili.
boreale, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 24.—Am. bor.
brachyatherum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 346.—Chili.
caespitosum, *Scribn. ex Pammel, in Contrib. Bot. Dep. Iowa*, xv. 245.—Am. sept.
capense, Thunb. Prod. Pl. Cap. 23 = secalinum.
coleophorum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 346.—Chili.
decaisneanum, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 372 = spontaneum.
distichon, Linn. Sp. Pl. 85 = vulgare.
heterostachyon, Beauv. Agrost. 114 = vulgare.
hexastichon, Linn. Sp. Pl. 85 = vulgare.
ithaburense, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 70 = spontaneum.
nudum, Arduini, ex Schult. Mant. ii. 437 = vulgare.
spontaneum, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. 430.—Ind. or.

HORKELIA, Cham. & Schlecht. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
argyrocoma, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 144.—Am. bor.
Baileyi, Rydb. l. c. 154 = P. Baileyi.
campestris, Rydb. l. c. 147.—Am. bor.
caruifolia, Rydb. in Howell, Fl. N. W. Amer. i. 181.—Am. bor.
chaetophora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 543.—Am. bor.
Clevelandii, Rydb. l. c. 1898, 54 = P. Clevelandii.
Congdonis, Rydb. l. c. 1899, 543.—Am. bor.
daucifolia, Rydb. l. c. 1898, 55 = P. daucifolia.
elata, Rydb. l. c. 54 = P. elata.
eremica, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 147 = P. eremica.
flavescens, Rydb. l. c. 138.—Am. bor.
frondosa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 54 = P. frondosa.
Hendersoni, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 180.—Am. bor.
Howellii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = P. Howellii.
Kingii, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 148 = P. Kingii
laxiflora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = P. laxiflora.

HORKELIA :—
lycopodioides, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 151 = P. Gordoni.
Micheneri, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 54 = P. Micheneri.
Muirii, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 148 = P. Muirii.
mutabilis, Brandegee, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 446.—Am. bor.
Parryi, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 129.—Am. bor.
Pickeringii, Rydb. l. c. 145 = P. Pickeringii.
pinetorum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55.—Am. bor.
platycalyx, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 131.—Am. bor.
platypetala, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = P. Parryi.
pseudocapitata, Rydb. in Howell, Fl. N. W. Amer. i. 180.—Am. bor.
puberula, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = P. puberula.
pygmaea, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 152 = P. decipiens.
saxosa, Rydb. l. c. 155 = P. saxosa.
scandularis, Rydb. l. c. 150.—Am. bor.
sericea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 56.—Am. bor.
sericoleuca, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 144.—Am. bor.
Shockleyi, Rydb. l. c. 153 = P. nubigena.
tenella, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55.—Am. bor.
unguiculata, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 146 = P. unguiculata.
utahensis, Rydb. l. c. 150 = P. utahensis.
Webberi, Rydb. l. c. 149 = P. Webberi.

HORKELIA, Reichb. = **Wolffia**, Horkel (Lemnac.).
arrhiza, Druce, Fl. Berks. 511 = W. arrhiza.

HORMIDIUM, Lindl. (Orchid.).
pseudopygmaeum, *Finet, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 121.—Am. cent.
tripterum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. v. 29 = uniflorum.

HORNEMANNIA, Benth. in DC. Prod. x. 428 (1846) = **Moseleya**, Hemsl. (Scrophul.).
pinnata, Benth. l. c. = M. pinnata.

HORNEMANNIA, Vahl (Vaccin.).
boliviensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 191.—Bolivia.

HORNSTEDTIA, Retz. = **Amomum**, Linn. (Scitamin.).
affinis, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 143.—Malaya.
albomarginata, Ridley, l. c. 145.—Penins. Mal.
conica, Ridley, l. c. 142.—Penins. Mal.
fulgens, Ridley, l. c. 149.—Penins. Mal.
grandis, Ridley, l. c. 141.—Penins. Mal.
imperialis, Ridley, l. c. 148 (= *Phaeomeria imperialis*).—Penins. Mal.
lycostoma, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 228 = A. lycostomum.
macrochilus, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 147 = A. macrocheilos.
Maingayi, Ridley, l. c. 150 = A. Maingayi.
megalochilus, Ridley, l. c. 146 = A. megalocheilos.
metriochilus, Ridley, l. c. 147 = A. metriocheilos.
Ophiuchus, Ridley, l. c. 141 = A. Ophiuchus.
pauciflora, Ridley, l. c. 144.—Penins. Mal.
pusilla, Ridley, l. c. 143.—Penins. Mal.
triorgyale, Ridley, l. c. 144.—Penins. Mal.
velutina, Ridley, l. c. 146.—Malaya.
venusta, Ridley, l. c. 149.—Penins. Mal.

HORSFIELDIA, Willd. = **Myristica**, Linn. (Myristicac.).
amygdalina, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 310 = M. amygdalina.
ardisiifolia, Warb. l. c. 274 = M. ardisiaefolia.
aruensis, Warb. l. c. 284 = M. aruensis.
batjanica, Warb. l. c. 275 = M. batjanica.
brachiata, Warb. l. c. 325 = M. brachiata.
canarioides, Warb. l. c. 294 = M. canarioides.
carnosa, Warb. l. c. 348 = M. carnosa.
costulata, Warb. l. c. 350 = M. costulata.
crassifolia, Warb. l. c. 323 = M. crassifolia.
crassithyrsa, Warb. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 87 = M. crassithyrsa.

HORSFIELDIA :—
flocculosa, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 297 = M. flocculosa.
glabra, Warb. l. c. 313 = M. glabra.
glabrescens, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 325.—N. Guin.
globularia, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 288 = M. globularia.
grandis, Warb. l. c. 301 = M. grandis.
Hellwigii, Warb. l. c. 343 = M. Hellwigii.
Irya, Warb. l. c. 317 = M. Irya.
Iryaghedhi, Warb. l. c. 332 = M. Horsfieldia.
Kingii, Warb. l. c. 308 = M. Kingii.
Labillardieri, Warb. l. c. 283 = M. Labillardieri.
laevigata, Warb. l. c. 351 = M. laevigata.
Lauterbachii, Warb. l. c. 285.—N. Guin.
lemanniana, Warb. l. c. 326 = M. lemanniana.
leptocarpa, Warb. l. c. 346 = M. leptocarpa.
macrocoma, Warb. l. c. 299 = M. macrocoma.
macrothyrsa, Warb. l. c. 307 = M. macrothyrsa.
majuscula, Warb. l. c. 315 = M. majuscula.
Minahassae, Warb. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 570 = M. Minahassae.
Motleyi, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 304 = M. Motleyi.
nesophila, Warb. l. c. 282.—Malaya.
novae-lauenburgiae, Warb. l. c. 278.—Malaya.
novoguineensis, Warb. l. c. 271.—Malaya.
oligocarpa, Warb. l. c. 354 = M. oligocarpa.
olivaeformis, Warb. l. c. 352 = M. olivaeformis.
pachythyrsa, Warb. l. c. 618 = M. pachythyrsa.
papillosa, Warb. l. c. 291 = M. papillosa.
paucinervis, Warb. l. c. 345 = M. paucinervis.
polyantha, Warb. l. c. 281 = M. polyantha.
Prainii, Warb. l. c. 292 = M. Prainii.
pulverulenta, Warb. l. c. 342 = M. pulverulenta.
racemosa, Warb. l. c. 347 = M. racemosa.
ralunensis, Warb. l. c. 336.—Malaya.
reticulata, Warb. l. c. 304 = M. reticulata.
ridleyana, Warb. l. c. 331 = M. ridleyana.
Roxburghii, Warb. l. c. 277 = M. Roxburghii.
Smithii, Warb. l. c. 270 = M. Smithii.
subglobosa, Warb. l. c. 328 = M. subglobosa.
subtilis, Warb. l. c. 286 = M. subtilis.
sucosa, Warb. l. c. 322 = M. sucosa.
superba, Warb. l. c. 295 = M. superba.
sylvestris, Warb. l. c. 337 = M. sylvestris.
tomentosa, Warb. l. c. 302 = M. tomentosa.
tuberculata, Warb. l. c. 279 = M. tuberculata.
valida, Warb. l. c. 349 = M. valida.
Wallichii, Warb. l. c. 305 = M. Wallichii.

HOSACKIA, Dougl. (Legum.).
oaxacana, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 309.—Mexic.
rosea, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 4 .—Calif.
venusta, *Eastw. l. c.* Ser. III. i. 103.—Am. bor.

HOSTA, Tratt. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).
japonica, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 133 = F. subcordata.
plantaginea, Aschers. l. c. = F. subcordata.

HOUSTONIA, Gronov. (Rubiac.).
parviflora, *Holzinger, ex Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 284.—Am. sept.
pulvinata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 289.—Am. bor.
rupicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 286.—Am. bor.
saxicola, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 291.—Am. bor.
serpyllacea, *C. L. Sm. ex Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 284 = Hedyotis serpyllacea.

HOYA, R. Br. (Asclep.).
celebica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 440 (= *Cyrtoceras micranthum*).—Celebes.
dimorpha, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 156.—N. Guin.
elegans, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 440 (= *Cyrtoceras elegans*).—Borneo.
Hellwigii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 512.—N. Guin.
Hollrungii, *Warb. l. c.*—N. Guin.
javanica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 440 (= *Cyrtoceras laurifolium*).—Java.
Lamchytoniae, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 372, sphalm. = seq.

HOYA:—
Lamingtoniae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 156.—N. Guin.
Lauterbachii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1896, 7. —N. Guin.
megalaster, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 513.—N. Guin.
mucronulata, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
pachyphylla, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
papillantha, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 142.—N. Brit.
pubescens, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 669.—Ins. Samoa.
Sana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 229. —Austral.
upoluensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 669.—Ins. Samoa.

HUANACA, Cav. (Umbell.).
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 113.—Patag.

HUERNIA, R. Br. (Asclep.).
somalica, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 309.—Afr. trop.

HUGONIA, Linn. (Linac.).
pentagyna, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 373 = Ancistrocladus pentagynus.

HULSEA, Torr. & Gray (Compos.).
carnosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 423.—Am. bor.

HUMEA, Sm. (Compos.).
gracillima, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 367.—Austral.
tenerrima, *F. Muell. & Tate, l. c.* 368.—Austral.

HUNTERIA, Roxb. (Apocyn.).
ambiens, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 223.—Afr. trop.
breviloba, *Hallier f. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 306, nomen; *et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 189.—Afr. trop.
camerunensis, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 187.—Afr. trop.
pleiocarpa, *Hallier f. l. c.* 193 (= *Pleiocarpa mutica*). —Afr. trop.
pycnantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 222.—Afr. trop.
rostrata, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 194 (= *Pleiocarpa rostrata*).—Afr. trop.
umbellata, *Hallier f. l. c.* 190 (= *Carpodinus umbellata*).—Afr. trop.

HUTTONAEA, Harv. (Orchid.).
oreophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 420.—Afr. austr.

HUTTONELLA, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxix. (1897) 505; et Fl. N. Zeal. (1899) 115. *LEGUMINOSAE*.
compacta, *T. Kirk, l. c.* 507; *l. c.* 115 (= *Carmichaelia compacta*).—N. Zel.
curta, *T. Kirk, l. c.* 507; *l. c.* 116 (= *Carmichaelia curta*).—N. Zel.
juncea, *T. Kirk, ll. cc.* (= *Carmichaelia juncea*).—N. Zel.
prona, *T. Kirk, ll. cc.* (= *Carmichaelia prona*).—N. Zel.

HYACINTHUS, Tourn. (Liliac.).
Gawleri, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 472.—Afr. austr.

HYALOCYSTIS, Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1898) 227. *CONVOLVULACEAE*.
viscosa, *Hallier f. l. c.* 228.—Afr. trop.

HYBANTHUS, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violac.).
strigoides, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 445.—Bras.
yucatanensis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 404.—Mexic.

HYBOSPERMA, Urb. Symb. Antill. i. 358 (1899). *RHAMNACEAE*.
spinosum, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

HYDASTYLUS, Dryand. = **Sisyrinchium**, Linn (Irid.).
borealis, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 378.—Am. bor.
brachypus, Bickn. l. c. 379.—Am. bor.
cernuus, Bickn. l. c. 384.—Mexic.
Elmeri, Bickn. l. c. 380 = S. Elmeri.
longipes, Bickn. l. c. 382.—Am. sept.
parvus, Bickn. l. c. 384.—Mexic.

HYDASTYLUS:—
rivularis, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 381.—Am. bor.
Schaffneri, Bickn. l. c. 383 = S. Schaffneri.
serrulatus, Bickn. l. c. 385.—Mexic.
subcernuus, Bickn. l. c.—Calif.
translucens, Bickn. l. c. 386.—Calif.

HYDNOCARPUS, Gaertn. f. (Bixac.).
ilicifolia, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 130.—Malaya.

HYDNORA, Thunb. (Cytin.).
Hanningtoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 55.—Afr. trop.

HYDRANGEA, Gronov. (Saxifrag.).
cinerea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 148.—Am. bor.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 373.—China.
hemsleyana, *Diels, l. c.* 376.—China.
mandarinorum, *Diels, l. c.* 372.—China.
Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 290. —Ind. or.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 374.—China.
xanthoneura, *Diels, l. c.* 373.—China.

HYDRIASTELE, H. Wendl. & Drude (Palm.).
costata, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 129.—Austral.
douglasiana, *F. M. Bailey, l. c.* i. 232.—Austral.

HYDRILLA, Rich. (Hydrochar.).
dregeana, Presl, Bot. Bemerk. 112 = Lagarosiphon muscoides.
muscoides, Planch. in Ann. Sci. Nat. Sér. III. xi. 79 = Lagarosiphon muscoides.
ovalifolia, *Rich. in Mém. Inst. Par.* xii. (1811) II. 76. —Zeylan.

HYDROCHARIS, Linn. (Hydrochar.).
stolonifera, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 297 = Limnolobium Boscii.

HYDROCHLOA, Beauv. (Gramin.).
fluitans, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 98 = caroliniensis.

HYDROCOTYLE, Tourn. (Umbell.).
arbuscula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 172.—Afr. austr.
australis, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 28.—Am. bor.
cuneata, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.
hydrophila, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 425.—N. Zel.
robusta, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 189.—N. Zel.
ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 444.—Afr. trop.
yucatanensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 81.—Am. cent.

HYDROLEA, Linn. (Hydrophyll.).
mollis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 78.—Parag.
paraguayensis, *Chod. l. c.*—Parag.

HYDROPHYLLUM, Linn. (Hydrophyll.).
albifrons, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 267.—Am. bor.
congestum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 136.—Am. bor.
tenuipes, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 582.—Am. bor.

HYDROSME, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).
Baumannii, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 420.—Afr. trop.
gallaensis, Engl. l. c. 422.—Afr. trop.
Goetzei, Engl. l. c. xxviii. 355.—Afr. trop.
Hohenackeri, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 59 = Raphiophallus Hohenackeri.
leonensis, Engl. l. c. = A. leonensis.
Staudtii, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 420.—Afr. trop.
Zenkeri, Engl. l. c. 421.—Afr. trop.

HYDROSTACHYS, Thou. (Podost.).
angustisecta, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 391.—Afr. trop.
laciniata, *Warm. in Danske Vid. Selsk. Skrift.* Ser. VI. ix. 152.—Madag.

HYERONIMA, Allem. (Euphorb.).
Fendleri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 227.—Venez.

HYGROCHILUS, Pfitzer, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 112 (1897). *ORCHIDEAE*.
Parishii, *Pfitzer, l. c.* (= *Vanda Parishii*).—Burma.

HYGROPHILA, R. Br. (Acanth.).
abyssinica, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 22 = Hemigraphis abyssinica.
acutisepala, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 34.—Afr. trop.
brasiliensis, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 183 = costata.
ciliata, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 35.—Afr. trop.
crenata, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 6 = Disperma quadrisepalum.
Gigas, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 36.—Afr. trop.
glandulosa, Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 367 = Dyschoriste verticillaris.
gracillima, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 36.—Afr. trop.
lindaviana, *Burkill, l. c.* 509.—Afr. trop.
linearis, *Burkill, l. c.* 35.—Afr. trop.
parviflora, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 7 = Disperma parviflorum.
pilosa, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 35.—Afr. trop.
quadrangularis, Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 367, partim = Disperma quadrangulare.
rhodesiana, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 201.—Afr. trop.
subquadrangularis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 314. —Afr. trop.
Volkensii, Lindau, l. c. xix. Beibl. xlvii. 46 = Dyschoriste Volkensii.

HYLINE, Herb. (Amaryll.).
Worsleyi, *Mallett, in Gard. Chron.* 1899, II. 102.—Bras.

HYMENACHNE, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
interrupta, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 377 = P. interruptum.
phalarioides, Nees, Agrost. Bras. 276 = P. indicum.

HYMENAEA, Linn. (Legum.).
chapadensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 23.—Bras.
correana, *Barb. Rodr. l. c.* 21.—Bras.

HYMENANTHERA, R. Br. (Violac.).
chathamica, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 514.—N. Zel.

HYMENATHERUM, Cass. (Compos.).
micropoides, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 8 = H. Gnaphalopsis.

HYMENOCALLIS, Salisb. (Amaryll.).
cordifolia, *Micheli, in Rev. Hort.* 1899, 444.—Mexic.
schizostephana, *Worsley, in Gard. Chron.* 1899, I. 386. —Bras.

HYMENOCRATER, Fisch. & Mey. (Labiat.).
Michauxii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 107.—Persia.

HYMENODICTYON, Wall. (Rubiac.).
bracteatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 424.—Afr. trop.
Perieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 48.—Madag.

HYMENOLAENA, DC. = **Pleurospermum**, Hoffm. (Umbell.).
darwasica, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 72.—As. cent.

HYMENOLOPHUS, Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v. (1900) 13. *APOCYNACEAE*.
Romburghii, *Boerl. l. c.* 14.—Sumatra.

HYMENOPAPPUS, L'Hérit. (Compos.).
arenosus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 200.—Am. bor.
cinereus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 634.—Am. bor.
gloriosus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 551.—Am. bor.

HYMENOPAPPUS:—
integer, *Greene, Pittonia*, iii. 249.—Am. bor.
ligulaeflorus, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyoming*, 135. —Am. sept.
lugens, *Greene, Pittonia*, iv. 43.—Am. bor.
macroglottis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 636. —Am. bor.
obtusifolius, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 551.—Am. bor.
scaposus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 634. —Am. bor.
tomentosus, *Rydb. l. c.* 633.—Am. bor.

HYMENOSTEGIA, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 193 (1897). *LEGUMINOSAE.*
Afzelii, *Harms, l. c.* (= *Cynometra Afzelii*).—Afr. trop.
floribunda, *Harms, l. c.* (= *Cynometra floribunda*).—Afr. trop.
laxiflora, *Harms, l. c.* (= *Cynometra laxiflora*).—Afr. trop.

HYOSCYAMUS, Tourn. (Solan.).
leptocalyx, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2446.—As. cent.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 351 = niger.

HYOSERIS, Linn. (Compos.).
radiatifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 50 = radiata.

HYPAELYPTUM, Vahl = **Hypolytrum**, Rich. (Cyper.).

HYPARRHENIA, Anderss. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
finitima, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 300 = A. filipendula.
umbrosa, Anderss. l. c. = A. Cymbarius.

HYPERBAENA, Miers = **Pachygone**, Miers (Menisperm.).
angustifolia, Urb. Symb. Antill. i. 305.—Ind. occ.
axilliflora, Urb. l. c. = Anomospermum axilliflorum.
cubensis, Urb. l. c. = P. cubensis.
laurifolia, Urb. l. c. 304 = Cissampelos laurifolia.

HYPERICUM, Tourn. (Hyperic.).
apocynifolium, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 616.—Am. bor.
Baldaccii, Keller, ex Baldacci, in Malpighia, ix. 68 = Kellerii.
byzantinum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 166.—Turcia.
Crux-Andreae, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 254.—Neog. trop.
Fauriei, *Keller, l. c.* v. 637.—Japon.
flaccidum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 241.—Japon.
galiiforme, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 4.—Armen.
galioides, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. 103 = galiiforme.
glomeratum, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 281. —Am. bor.
ilicianum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 342.—Eur.
insulare, *Foucaud & Mand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 89.—Corsica.
Kellerii, *Baldacci, in Malpighia*, ix. 67.—Ins. Cret.
mororanense, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 640.—Japon.
mutiloides, *Keller, l. c.* 638.—Japon.
natalensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 487.—Afr. austr.
otaruense, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 641.—Japon.
paradoxum, *Keller, l. c.*—Japon.
Piriai, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (*Fl. Urug.* 108).—Urug.
Plasonii, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 76.—Graecia.
procumbens, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 639.—Japon.
pseudopetiolatum, *Keller, l. c.* 638.—Japon.
pumilio, *Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 14.—As. Min.
rivulare, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (*Fl. Urug.* 109).—Urug.
sikokumontanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 9.—Japon.
stenocarpum, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1219. —Madag.
ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 434.—Afr. trop.

HYPHAENE, Gaertn. (Palm.).
Goetzei, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 354.—Afr. trop.
Wendlandii, *Damm. l. c.* 353.—Afr. trop.

HYPOCHOERIS, Linn. (Compos.).
graminea, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 374.—Peruv.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 159.—Eur.
Philippii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 159.—Reg. Argent.
setosa, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 164; *et in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. (1897) 197.—Eur.
stenocephala, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 160.—Peruv.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 373.—Ecuador.
uniflora, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 160 = taraxacoides.

HYPOCYRTA, Mart. (Gesner.).
maculata, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 10. —Bras.

HYPODISCUS, Nees (Restiac.).
alboaristatus, *Mast. in Journ. Linn. Soc.* viii. 255.—Afr. austr.
eximius, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 17.—Afr. austr.
gracilis, *Mast. l. c.* 16.—Afr. austr.
protractus, *Mast. l. c.* 17.—Afr. austr.
rigidus, *Mast. l. c.* 18.—Afr. austr.
tristachyus, *Mast. l. c.* 17.—Afr. austr.
Zeyheri, *Mast. l. c.*—Afr. austr.

HYPOËSTES, Soland. (Acanth.).
adoënsis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 162 = triflora.
annua, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 791 = Forskalei.
callicoma, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 41 = cancellata.
ciliata, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 51 = triflora.
consanguinea, Lindau, l. c. 50 = rosea.
glandulosa, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 24, nomen = Monothecium glandulosum.
inaequalis, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 50 = triflora.
kilimandscharica, Lindau, l. c. xix. Beibl. xlvii. 47 = phaylopsoides.
mlanjensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 250. —Afr. trop.
radicans, *Deflers, Voy. Yemen*, 183, t. 5.—Arab.
Rothii, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 49 = Forskalei.
simensis, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 111 = triflora.
tanganyikensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 252.—Afr. trop.
uniflora, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 24 = microphylla.
violaceotincta, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 323.—Afr. trop.

HYPOLAENA, R. Br. (Restiac.).
Bachmannii, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 15.—Afr. austr.
browniana, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 132.—Afr. austr.
conspicua, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 15. —Afr. austr.
decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 755.—Afr. austr.
diffusa, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 132.—Afr. austr.
foliosa, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 14.—Afr. austr.
hyalina, *Mast. l. c.* 13.—Afr. austr.
incerta, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 133.—Afr. austr.
membranacea, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 14.—Afr. austr.
Schlechteri, *Mast. l. c.* 15.—Afr. austr.
subtilis, *Mast. l. c.*—Afr. austr.

HYPOLYTRUM, Rich. (Cyper.).
berterianum, Schult. Mant. ii. 133 = Rynchospora berteroanum.
Berterii, Spreng. Neue Entdeck. i. 241 = Rynchospora berteroanum.
buchholzianum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 22.—Afr. trop.
congense, *C. B. Clarke, ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 115.—Afr. trop.
heterophyllum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 22.—Afr. trop.
macrophyllum, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 78. —Bras.
maculata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 335 = Lipocarpha humboldtiana.
microstachyum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 23.—Bras.
oligostachyum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 190.—Ins. Carolin.
parvibractea, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

HYPOLYTRUM:—
sellowiana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 335 = Lipocarpha sellowiana.

HYPOXIS, Linn. (Amaryll.).
brevifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 183.—Afr. austr.
camerooniana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577. —Afr. trop.
Flanagani, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 179.—Afr. austr.
Galpini, *Baker, l. c.* 188.—Afr. austr.
gracilipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 88.—Afr. austr.
kilimanjarica, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 378.—Afr. trop.
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
Maximiliani, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 89.—Afr. austr.
monophylla, *Schlechter, ex Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 531; *et in Engl. Jahrb.* xxiv. 453.—Afr. austr.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
oligophylla, *Baker, l. c.*—Madag.
parvifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 183.—Afr. austr.
rubella, *Baker, l. c.* 531.—Afr. austr.
Schnitzleinia, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 31 = Vellozia Schnitzleinia.
umbraticola, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 90.—Afr. austr.

HYPTIANDRA, Hook. f. = **Samadera**, Gaertn. (Simarub.).
Bidwillii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. i. 294 = S. Bidwillii.

HYPTIS, Jacq. (Labiat.).
alopecuroides, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 201.—Am. cent.
amaurocaulis, *Briq. l. c.* 211.—Bras.
axillaris, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
barbarensis, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 31.—Parag.
Biolleyi, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 200.—Am. cent.
brachiata, *Briq. l. c.* 215.—Am. cent.
celebica, *Zipp. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 561.—Celebes.
chacapoyensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 204.—Peruv.
chapalensis, *Briq. l. c.* 203.—Mexic.
constricta, *Briq. l. c.* 217.—Am. cent.
costulata, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 797.—Bras.
diaphora, *Briq. l. c.* 786.—Bras.
dyscheres, *Briq. l. c.* 794.—Parag.
elata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 346.—Bras.
elegans, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 19; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 335.—Parag.
elliptica, *Briq. l. c.* 25; *l. c.* 341.—Parag.
floribunda, *Briq. l. c.* 18; *l. c.* 335.—Parag.
Gardneri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 230.—Bras.
gymnodonta, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 795.—Bolivia.
hygrobia, *Briq. l. c.* 789.—Bras.
idiocephala, *Briq. l. c.* 792.—Bolivia.
Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 219.—Mexic.
kuntzeana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 787.—Bolivia.
lanceifolia, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 261 = brevipes.
leucochlora, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 196.—Bras.
longifrons, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 793.—Bolivia.
macrosiphon, *Briq. l. c.* 785.—Bras.
macrotera, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 210.—Bras.
macrotricha, *Briq. l. c.* 195.—Bras.
madrensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
Mariannarum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 343.—Polynes.
Michelii, Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, xxxii. no. 10, 29 = cinerea.
mutabilis, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 788 = spicata.
neglecta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 228.—Bras.
Nelsonii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 566.—Mexic.

HYPTIS:—
paraguayensis, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 30.—Parag.
penaeoides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 450.—Bras.
Pittieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 220.—Am. cent.
plagiostoma, *Briq. l. c.* 197.—Bras.
poliodes, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 35; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 346.—Parag.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
rhypidiophylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 242.—Bras.
Rothschuhii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 100.—Am. cent.
savannarum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 216.—Am. cent.
sclerophylla, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 340.—Bras.
siderotricha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 791.—Bras.
sidifolia, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 204 = polyantha.
stereocaulos, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 26.—Parag.
subnuda, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 231.—Bras.
subviolacea, *Briq. l. c.* 222.—Bras.
tenella, *Briq. & Spruce, ex Briq. l. c.* 223.—Peruv.
trachychroa, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 790.—Bolivia.
trichocalyx, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 21; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 339.—Parag.
trichoneura, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 28.—Parag.
Vauthieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 199.—Bras.
velascana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 798.—Bolivia.
venosa, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 344 = neglecta.

HYSSOPUS, Tourn. (Labiat.).
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 408 = officinalis.

HYSTRINGIUM, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11 (1841) = **Lasiochloa**, Kunth (Gramin.).
acuminatum, Trin. l. c. = L. ciliaris.

I

IBERIS, Dill. (Crucif.).
epirota, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 106.—Graecia.

ICHNANTHUS, Beauv. (Gramin.).
foliolosus, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 61 = Panicum foliolosum.
lanceolatus, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 36.—Mexic.

ICHTHYOTHERE, Mart. (Compos.).
Ulei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.

ICOMUM, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. (1897) 329. *LABIATAE.*
lineare, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 270.—Afr. trop.
paradoxum, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 329.—Afr. trop.
salicifolium, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 270.—Afr. trop.
subacaule, *Burkill, l. c.* 271.—Afr. trop.

IFLOGA, Cass. (Compos.).
pilulifera, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 204.—Afr. austr.

IGUANURA, Blume (Palm.).
speranskyana, *Bois, in Journ. Hort. Soc. Fr.* 1899, 665.—Bras.

ILEX, Tourn. (Ilic.).
amara, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 221.—Bras.
amplifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 20.—Bolivia.
arnhemensis, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 218 = Byronia arnhemensis.
Beadlei, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 377.—Am. bor.

ILEX:—
brasiliensis, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 220 = pubiflora.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 255.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
Harrisii, *Loes. in Urb. Symb. Antill.* i. 346.—Ind. occ.
Nemotoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1900, 33.—Japon.
nipponica, *Makino, l. c.* 34.—Japon.
ovalis, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 219 = I. Paltoria.
pseudo-godajam, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 256.—China.
quitensis, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 219 = bumelioides.
sandwicensis, Loes. l. c. 218 = Byronia sandwicensis.
suber, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxi. 443.—Bras.
umbellulata, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 218 = I. Godajam.

ILLICIUM, Linn. (Magnol.).
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 323.—China.

ILLIPE, F. Muell. = **Bassia**, Koenig (Sapotac.).
burckiana, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 518, 640.—Celebes.
May, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 272 = B. May.
obovata, Engl. l. c. = B. obovata.

ILYSANTHES, Rafin. (Scrophul.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 765.—Afr. trop.
attenuata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 297.—Am. bor.
dubia, Barnhart, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 376 = riparia.
nana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 505.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 504.—Afr. trop.
stictantha, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 765.—Afr. trop.
tridentata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 297.—Mexic.
Welwitschii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 504.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. l. c.* xxvi. 123.—Afr. austr.

IMHOFIA, Heist. = **Nerine**, Herb. (Amaryll.).
duparquetiana, Baill. in Bull. Linn. Soc. Par. ii. 1132 = N. duparquetiana.
laticoma, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 46 = N. lucida.

IMPATIENS, Riv. (Geran.).
aurantiaca, *Teysm. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix 369, nomen.—Celebes.
Batesii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 159.—Afr. trop.
blepharosephala, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 455.—China.
Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 185.—Afr. trop.
dolichoceras, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 456.—China.
Flanaganae, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2540.—Afr. austr.
fulvopilosa, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 298, nomen.—Afr. trop.
grandiflora, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2655.—Madag.
Hancockii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 21.—China.
Henryi, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 456.—China.
longialata, *E. Pritz. l. c.* 454.—China.
pallide-rosea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 426.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, l. c.* 425.—Afr. trop.
stenosepala, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 453.—China.
taprobanica, Hiern, in Journ. Bot. 1900, 88 = glandulifera.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Pl. Thonn. Congol.* 24.—Afr. trop.
Turrialbana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 241.—Am. cent.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.

INDIGOFERA, Linn. (Legum.).
achyranthoides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 180.—Afr. trop.

INDIGOFERA:—
ambelacensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 237.—Afr. trop.
antunesiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 285.—Afr. trop.
arenophila, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 524.—Afr. austr.
bella, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 355.—Burma.
Buchneri, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 180.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 11.—Afr. trop.
cuernavacana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
Dewevrei, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 54.—Afr. trop.
Dupuisii, *Micheli, l. c.* 55.—Afr. trop.
Evansii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 429.—Afr. austr.
fruticosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
fuscosetosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 12.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Guthriei, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 22.—Afr. austr.
hamulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 443.—Afr. austr.
heptaphylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 209.—Afr. trop.
jaubertiana, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 245.—Oriens.
karongensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 255.—Afr. trop.
kisantuensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 13.—Afr. trop.
Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 51.—Afr. trop.
Kurtzii, *Harms, l. c.*—Reg. Argent.
lonchocarpifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
lupulina, *Baker, l. c.* 254.—Afr. trop.
macra, *Baker, l. c.* 255.—Afr. trop.
macrantha, *Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 91.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
microcalyx, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
microscypha, *Baker, l. c.* 255.—Afr. trop.
mischocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 149.—Afr. austr.
natalensis, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 23.—Afr. austr.
nigrescens, *Kurz, ex King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 286.—As. or. extratrop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 254.—Afr. trop.
oligantha, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 291, nomen.—Afr. trop.
patula, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 255.—Afr. trop.
Poggei, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. III. 260; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 284.—Afr. trop.
polysperma, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 14.—Afr. trop.
Preladoi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 284.—Afr. trop.
pretoriana, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 52.—Afr. austr.
psammotropha, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 22.—Afr. austr.
psilocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 148.—Afr. austr.
rostrata, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 23.—Afr. austr.
salmoniflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
sangana, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 292, nomen.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 181.—Afr. trop.
squalida, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 355.—Burma.
tenuisiliqua, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 241.—Afr. trop.
tetraptera, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 181.—Afr. trop.
trimorphophylla, *Taub. l. c.* 182.—Afr. trop.
uhehensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Woodii, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 24.—Afr. austr.

INDOVETHIA, Boerl. in Ic. Bogor. t. 1 (1901). *VIOLACEAE.*
calophylla, *Boerl. l. c.*—Borneo.

INGA, Scop. (Legum.).
Hartii, *Urb. Symb. Antill.* i. 311.—Ind. occ.
pallida, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 30.—Bolivia.
pithecolobioides, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 64.—Parag.

INTSIA, Thou. = **Afzelia**, Sm. (Legum.).
cambodiensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 388 A = A. cambodensis.

INULA, Linn. (Compos.).
ambigua, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 160.—Eur.
attica, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 713.—Eur.
barthiana, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 160.—Eur.
cuanzensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 568 = Porphyrostemma cuanzensis.
engleriana, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—Afr. trop.
Grombczewskyi, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 149.—Turkestan.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 567.—Afr. trop.
Klingii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—Afr. trop.
magnifica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 282.—Reg. Caucas.
poggeana, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 471.—Afr. trop.
pterocaula, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 383.—China.
saxatilis, *Form. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 194.—Eur.
sericophylla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 383.—China.
Stuhlmannii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—Afr. trop.
subauriculata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 161.—Eur.
vernonioides, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 473.—Afr. trop.
Welwitschii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 25.—Afr. trop.

INYONIA, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. (1898) 42. *COMPOSITAE.*
dysodioides, *M. E. Jones, l. c.*—Am. bor.

IOCHROMA, Benth. (Solanac.).
flavum, *André, in Rev. Hort.* 1898, 360.—N. Granat.

IODANTHUS, Torr. & Gray (Crucif.).
dentatus, Greene, Pittonia, iii. 254 = Arabis dentata.

IODES, Blume (Olacin.).
ferruginea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 418.—N. Guin.
kamerunensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 481.—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1321.—Afr. trop.

IODINA, Hook. & Arn. (Santal.).
bonariensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 283 = cuneifolia.

IONACTIS, Greene, Pittonia, iii. (1897) 245. *COMPOSITAE.*
alpina, *Greene, l. c.* (= *Aster scopulorum*).—Am. bor. occ.
linariifolia, *Greene, l. c.* (= *Aster linariifolius*).—Am. bor.
stenomeres, *Greene, l. c.* 246 (= *Aster stenomeres*).—Am. bor. occ.

IONE, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
Andersoni, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 159.—Ind. or.
intermedia, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxv. 120.—Reg. Himal.
scabrosa, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 336, sphalm. = seq.
scariosa, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 161 (= *Sunipia scariosa*).—Reg. Himal.; Burma.

IONIDIUM, Vent. (Violac.).
hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 13.—Parag.
modestum, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* ix. (*Fl. Urug.* 63).—Urug.
sessiliflorum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 368.—Bolivia.

IONOPSIDIUM, Reichb. = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).
heterospermum, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 256.—Alger.
Prolongoi, Battand. l. c. 259 (= *Thlaspi Prolongi*).—Hispan.

IOXYLON, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).
Mora, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 294 = M. Mora.

IPHIGENIA, Kunth (Liliac.).
bechuanica, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 562.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 28.—Afr. austr.
strumosa, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 562.—Afr. trop.

IPOMOEA, Linn. (Convolv.).
ampullacea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 89.—Mexic.
antillana, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 84 = sidaefolia.
arenaria, Steud. Nom. ed. II. i. 815 = Steudeli.
astrotrichota, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 40.—Bras.
aurifolia, *Damm. l. c.* 39.—Bras.
britteniana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 38.—Afr. trop.
calyptrata, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 40.—Bras.
cephalantha, *Damm. l. c.* 39.—Bras.
chiliantha, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 50.—Parag.
chondrosepala, *Hallier f. l. c.* 49.—Parag.
chrysosperma, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 234.—Afr. trop.
citrina, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 547.—Afr. austr.
crinigera, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2437.—Arab.
dammarana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 36.—Afr. trop.
decasperma, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 386.—Mexic.
decipiens, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 40.—Bras.
dimorphophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 482.—Mexic.
Donaldsoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 37.—Afr. trop.
erioleuca, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 33.—Afr. trop.
filipedunculata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 150.—Am. austr.
galactorrhoea, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 33.—Afr. trop.
Ghikae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 209.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 36.—Afr. trop.
Glaziovii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 40.—Bras.
glutinosa, *Damm. l. c.* 39.—Bras.
gossypina, *Deflers, Voy. Yemen*, 174.—Arab.
gossypina, *Deflers, ex Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 231.—Afr. trop.; Arab.
Greenstockii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 38.—Afr. austr.
hirsuticaulis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. trop.
hypoleuca, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 449.—Bras.
lasiophylla, *Hallier f. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 94; *et in Engl. Jahrb.* xxviii. 32.—Afr. trop.
leucotricha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 10.—Am. cent.
limbata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 511 = hederacea.
longituba, *Hallier f. in Akad. Wiss. Wien*, cvii. (1898) *Abth.* I. 1.—Afr. trop.
macrocalyx, Hallier f. in Engl. Jahrb. xxviii. 51 = Argyreia Hanningtoni.
magnifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 84.—Bolivia.
marmorata, *Britten & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 36.—Afr. trop.
mattogrossensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 383.—Bras.
maypurensis, *Spruce, ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvi. 36 (= *Merremia maypurensis*).—Guiana.

IPOMOEA:—
mesenterioides, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 544.—Afr. austr.
micrantha, *Hallier f. l. c.* 541.—Afr. austr.
microsticta, *Hallier f. l. c.* vii. 411.—Am. cent.
neurocephala, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvi. 40.—Bolivia.
nyikensis, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 53.—Afr. trop.
operosa, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 275.—Afr. trop.
opulifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 150.—Am. austr.
Papilio, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 543.—Afr. austr.
Paulitschkei, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis*, 210.—Afr. trop.
perringiana, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 460; *et in Gard. Chron.* 1897, II. 410.—Afr. trop.
populifolia, Hallier f. in Engl. Jahrb. xxviii. 52 = Argyreia populifolia.
pseudomina, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 383.—Bolivia.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 449.—Bras.
ruber, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 86 = setifera.
saccata, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 48.—Afr. trop.
spathulata, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 234.—Afr. trop.
stenosiphon, *Hallier f. in Akad. Wiss. Wien*, cvii. (1898) *Abth.* I. 3.—Afr. trop.
Steudeli, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 86.—Ind. occ.
Tashiroi, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 75.—Ins. Luchu.
tentaculifera, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 482.—Mexic.
versicolor, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 220.—Mexic.

IRESINE, P. Br. (Amarant.).
arbuscula, *Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 350.—Am. cent.
completa, *Uline & Bray, l. c.* 349.—Am. cent.
discolor, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 477.—Mexic.
Hartmanii, *Uline, in Field Columb. Mus. Bot.* i. 422.—Mexic.
jaliscana, *Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 351.—Mexic.
nigra, *Uline & Bray, l. c.* 350.—Am. trop.

IRIS, Tourn. (Irid.).
albo-purpurea, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7511.—Japon.
erirrhiza, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 269.—Austria.
fibrosa, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 182.—Persia.
Heldreichii, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7734 = stenophylla.
iyoana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899 (111).—Japon.
Loczyi, *Kan. in Szech. Keletazsiai Utj.* ii. 843.—China.
Manissadjiani, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 180.—As. Min.
obtusifolia, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7701.—Reg. Casp.
planifolia, Fiori & Paoletti, Fl. Ital. i. 227 = alata.
pseudo-variegata, *Leichtlin, in Garden*, lv. (1899) 418.—Hort.
Purdyi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 78.—Am. bor.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
sabina, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v. 7.—Eur.
sofarana, *Foster, in Gard. Chron.* 1899, II. 389.—Lebanon.
speciosa, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v. 4.—Eur.
stenophylla, *Hausskn. ex Baker, in Gard. Chron.* 1900, I. 170.—As. Min.
Straussii, *Leichtlin, ex Micheli, in Rev. Hort.* 1899, 363.—Persia.
suaveolens, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v. 10.—Eur.
tubergeniana, *Foster, in Gard. Chron.* 1899, I. 225.—Hab.?
urmiensis, *Hoog, in Gard. Chron.* 1900, II. 373.—Persia.
Watsoniana, *Purdy, in Erythea*, v. 128.—Calif.

IRYANTHERA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 126. *MYRISTICACEAE.*
Hostmanni, *Warb. l. c.* 157 (= *Myristica Hostmanni*).—Am. austr. extratrop.

IRYANTHERA :—
macrophylla, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. (1897) 155 (=*Myristica macrophylla*).—Bras.
paradoxa, *Warb. l. c.* 160 (=*Myristica paradoxa*).—Bras.
sagotiana, *Warb. l. c.* 158 (=*Myristica sagotiana*).—Guian.

ISACHNE, R. Br. (Gramin.).
adstans, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 461=miliacea.
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 166.—Afr. trop.
brachyglumis, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 271=Coelachne pulchella.
Clarkei, *Hook. f. l. c.* 24.—Ind. or.
elatior, *Hook. f. l. c.* 22.—Ind. or.
elegans, *Dalzell, ex Hook. f. l. c.* 23.—Ind. or.
geniculata, Griff. Notul. iii. 41=miliacea.
Hackelii, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 11.—Bras.
himalaica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 23.—Ind. or.
Lisboae, *Hook. f. l. c.* 22.—Ind. or.
meneritana, Poir. Encyc. Suppl. iii. 185=miliacea.
Metzii, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 21=kunthiana.
minutula, Kunth, Rév. Gram. ii. t. 117=miliacea.
multiflora, *Trim. Cat. Ceyl. Pl.* 104.—Ind. or.
obscurans, *Woodrow, in Gard. Chron.* 1898, I. 161.—Ind. or.
polygonoides, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 273=miliacea.
pulchella, Roth, Nov. Pl. Sp. 58=Sphaerocaryum elegans.
scabrosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 23.—Ind. or.
stigmatosa, Griff. Notul. iii. 42=miliacea.
tricarinata, Roth, Nov. Pl. Sp. 57=Panicum ovalifolium.

ISATIS, Tourn. (Crucif.).
Aitchisoni, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. IV. 90.—Turkestan.
arenaria, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 138.—Eur.
hispida, *Post, Fl. Syria*, 97.—Syria.
turcomanica, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. IV. 89.—Turkestan.

ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.).
abbreviatum, Ham. ex Wall. Cat. n. 8688 E=Panicum Crus-galli.
corrugatum, Ham. l. c. n. 8864 E=rugosum.
crinitum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 298=Pogonatherum crinitum.
denticulatum, Ham. ex Wall. Cat. n. 8857=Apocopis royleanus.
diplopogon, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 129.—Ind. or.
ensiforme, Ham. ex Wall. Cat. n. 8878=Vossia procera.
geniculatum, Roxb. Fl. Ind. i. 324=ciliare.
glabrescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 31=Panicum Crus-galli.
glaucostachyum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 328.—Afr. austr.
hirsutum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361=Elionurus hirsutus.
involucratum, Russ. ex Wall. Cat. n. 8794 A=Apluda varia.
involutum, Forst. f. Prodr. 73=Thuarea sarmentosa.
Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 129.—Ind. or.
leersioides, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. 363=Eremochloa leersioides.
Lisboae, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 133.—Ind. or.
mastrucatum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 298=Elionurus hirsutus.
molle, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 128.—Ind. or.
montanum, Russ. ex Wall. Cat. n. 8818 A=laxum.
papposum, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 301=Pappophorum elegans.
pectinatum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 296=Eremochloa muricata.
robustum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 139.—Ind. or.
sparteum, Ham. ex Wall. Cat. n. 8845 C=angustifolium.
spathiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 138.—Ind. or.
speciosum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 375=Rottboellia speciosa.
tenue, Ham. ex Wall. Cat. n. 8866 A=ciliare.
timorense, Kunth, Rév. Gram. i. 369.—Ind. or.; Malaya; Polynes.

ISCHNOCHLOA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 2466 (1896). *GRAMINEAE.*
Falconeri, *Hook. f. l. c.*—Reg. Himal.

ISEILEMA, Anderss. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 250 (Gramin.).
arguta, *Anderss. l. c.* 252.—Ind. or.
Wightii, *Anderss. l. c.* 251.—Ind. or.

ISERTIA, Schreb. (Rubiac.).
reticulata, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 46.—Bolivia.

ISNARDIA, Linn.=**Ludwigia**, Linn. (Onagrac.).
natans, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 177=L. natans.
spathulata, Small, l. c.=L. spathulata.

ISOCHORISTE, Miq. (Acanth.).
africana, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 309=Asystasia africana.

ISODENDRION, A. Gray (Violac.).
subsessilifolium, *Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 856.—Ins. Hawaii.

ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).
barlerioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1877, 70=Ecbolium barlerioides.
flava, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 125=lactea.
floribunda, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 233.—Afr. trop.
grandiflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
membranacea, *C. B. Clarke, l. c.* 230.—Afr. trop.
mossambicencis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 324.—Afr. trop.
nervosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 229.—Afr. trop.
parvifolia, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 411.—Afr. trop.
somalensis, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 82.—Afr. trop.
strigosula, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 231.—Afr. trop.
substrobilina, *C. B. Clarke, l. c.* 232.—Afr. trop.
violacea, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 125=lactea.

ISOLEPIS, R. Br.=**Scirpus**, Linn. (Cyperac.).
arcuata, Ecklon, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 254=Ficinia aphylla.
arenaria, Nees, in Linnaea, ix. 291=Bulbostylis humilis.
bergiana, Drège, Zwei Pfl. Docum. 120=S. dregeanus.
breviculmis, Kunth, Enum. Pl. ii. 207=Bulbostylis breviculmis.
fascicularis, Kunth, l. c. 188=S. fluitans.
filamentosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 113=Bulbostylis filamentosa.
humilis, Kunth, Enum. Pl. ii. 207=Bulbostylis humilis.
membranacea, Nees, in Linnaea, ix. 291=S. membranaceus.
Pseudoschoenus, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 103=Ficinia albicans.

ISOLOMA, Decne. (Gesnerac.).
flexuosa, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 28.—Am. austr.
parviflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 97.—Bolivia.
patentipilosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 242.—Bolivia.
Sprucei, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 97.—Bolivia.
urticifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 28.—Am. austr.

ISOLONA, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 161 (1897). *ANONACEAE.*
Heinsenii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
hexalola, *Engl. l. c.* (=*Monodora hexalola*).—Afr. trop.
madagascariensis, *Engl. l. c.* (=*Monodora madagascariensis*).—Ins. Madag.
Zenkeri, *Engl. l. c.* (=*Monodora Zenkeri*).—Afr. trop.

ISONEMA, R. Br. (Apocyn.).
infundibuliflorum, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 306.—Afr. trop.

ISOPYRUM, Linn. (Ranunc.).
auriculatum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 220.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 222.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 194.—China.
Fauriei, *Franch. l. c.* 218.—Japon.

ISOSTIGMA, Less. (Compos.).
foliosum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 66.—Bras.
Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 160.—Bolivia.

ITEA, Gronov. (Saxifr.).
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 268.—China.

IVA, Linn. (Compos.).
caudata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 290.—Am. bor.

IXIA, Linn. (Irid.).
Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 14.—Afr. trop.

IXIOLIRION, Fisch. (Amaryll.).
karateginum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 108.—As. cent.

IXOPHORUS, Schlecht.=**Setaria**, Beauv. (Gramin.).
Pringlei, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 6.—Mexic.

IXORA, Linn. (Rubiac.).
amplexifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 572.—N. Guin.
anemodesma, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 86.—Afr. trop.
asteriscus, *Hallier f. l. c.*—Afr. trop.
coleopoda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 573.—N. Guin.
erythrocarpa, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 571.—N. Guin.
Grevei, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1308.—Madag.
Hildebrandti, *Drake, l. c.* 1309.—Madag.
Humbloti, *Drake, l. c.* 1306.—Madag.
Kerstingii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 571.—N. Guin.
linearifolia, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1307.—Madag.
malacophylla, *Drake, l. c.* 1309.—Madag.
microphylla, *Drake, l. c.* 1307.—Madag.
narcissodora, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
orohenensis, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1897, 106.—Ins. Tahiti.
parvifolia, Boivin, ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1307=microphylla.
rotundifolia, *Drake, l. c.*—Madag.
spiranthera, *Drake, l. c.* n. s. i. 43.—Madag.
thouarsiana, *Drake, l. c.*—Madag.
uniflora, *Drake, l. c.* 44.—Madag.

J

JABOROSA, Juss. (Solanac.).
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 17.—Chili.
magellanica, P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 131=Himeranthus magellanicus.

JACARANDA, Juss. (Bignon.).
bracteata, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 369.—Bras.
cauliflora, *Bureau & K. Schum. l. c.* 373.—Peruv.
crystallana, *Bureau & K. Schum. l. c.* 384.—Bras.
cuspidifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 246.—Bolivia.
glabra, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 394 (=*Pteropodium glabrum*).—Bras.
heteroptila, *Bureau & K. Schum. l. c.* 378.—Bras.
lasiogyne, *Bureau & K. Schum. l. c.* 385.—N. Granat.
longiflora, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 73.—Bolivia.
macrocarpa, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 372.—Bras.
Mendoncaei, *Bureau & K. Schum. l. c.* 383.—Bras.
rachidoptera, *Bureau & K. Schum. l. c.* 374.—Peruv.
simplicifolia, *K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 414.—Bras.
Ulei, *Bureau & K. Schum. l. c.* 383.—Bras.

JACOBINIA, Moric. (Acanth.).
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 79.—Bolivia.
suberecta, *E. André, in Rev. Hortic.* 1900, 210.—Urug.
tenuistachys, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 105.—Bolivia.

JACQUEMONTIA, Choisy (Convolv.).
acuminata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 84.—Bolivia.
densiflora, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 151.—Am. austr.

JACQUEMONTIA :—
fruticulosa, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 45.—Parag.
grandifolia, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 41.—Bras.
hewittacea, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 383. —Bras.
itatiayensis, *K. Schum. l. c.*—Bras.
Lorentzii, *Peter, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 213.—Reg. Argent.
multivalvis, Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xv. 42 = Convolvulus parviflorus.
pedunculata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 85.—Bolivia.
rufa, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 41.—Bras.
sphaerostigma, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 151 = hirsuta.
uleana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvi. 31. —Bras.

JACQUINIA, Linn. (Myrsin.).
brevifolia, *Urb. Symb. Antill.* i. 379.—Ind. occ.
brunnescens, *Urb. l. c.* 378.—Ind. occ.
Eggersii, *Urb. l. c.* 380.—Ind. occ.
incrustata, *Urb. l. c.* 377.—Ind. occ.
stenophylla, *Urb. l. c.* 378.—Ind. occ.

JAEGERIA, H. B. & K. (Compos.).
petiolaris, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 316 = Sabazia glabra.
purpurascens, *Robinson, l. c.*—Mexic.

JAMBOSA, DC. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).
dolichophylla, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 471.—N. Guin.
glabra, Zoll. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 68 = Eugenia Klampok ?.
glomerata, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 470 = E. glomerata.
hylophila, K. Schum. & Lauterb. l. c. 471.—N. Guin.
Jambos, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 80 = Eugenia Jambos.
megalosperma, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 472.—N. Guin.
pachyclada, K. Schum. & Lauterb. l. c. 474.—N. Guin.
pilgeriana, K. Schum. & Lauterb. l. c. 473.—N. Guin.
pteropoda, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.
synaptoneura, K. Schum. & Lauterb. l. c. 475.—N. Guin.

JANUSIA, A. Juss. (Malpigh.).
prolixa, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 186.—Urug.

JARACATIA, Marcg. (Passifl.).
corumbensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 101.—Bras.

JASIONE, Linn. (Campan.).
euphrasiaefolia, *Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto*, Ser. III. ii. (1896) 214.—Hispan.

JASMINUM, Tourn. (Oleac.).
dicranolepidiforme, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 450. —Afr. trop.
excellens, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 169.—Ind. or.
gilgianum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 496.—N. Guin.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 534.—China.
goetzeanum, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 451.—Afr. trop.
gratissimum, *Deflers, Voy. Yemen*, 162.—Arab.
mossamedense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 655.—Afr. trop.
nitidum, *Skan, in Kew Bull.* 1898, 225.—Ins. Admir.
Pospischilii, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 183. —Afr. trop.

JATROPHA, Linn. (Euphorb.).
Batawe, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 420.—Afr. trop.
ferox, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 185; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 212.—Afr. trop.
heterophylla, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 25.—Afr. trop.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 287.—Reg. Argent.
Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 229.—Mexic.
latifolia, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 531.—Afr. austr.
mollis, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 184.—Afr. trop.

JATROPHA :—
pedatipartita, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 287.—Bolivia.
Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 30.—Afr. trop.
portoricensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 59.—Ind. occ.
Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 185; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 212.—Afr. trop.
Robecchii, *Pax, l. c.* 184; *et l. c.* 212.—Afr. trop.
Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 24.—Afr. trop.
Woodii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 287.—Afr. austr.
yucatanensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 230.—Mexic.

JAUMEA, Pers. (Compos.).
congensis, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 33.—Afr. trop.
elata, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 506.—Afr. trop.
Johnstoni, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 153.—Afr. trop.
mimuloides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 52. —Ecuador.

JENMANIA, Rolfe, in Kew Bull. 1898, 198 = **Rolfea**, Zahlbr. (Orchid.).
elata, Rolfe, l. c. = R. elata.

JEPSONIA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 18. *SAXIFRAGACEAE.*
malvaefolia, *Small, l. c.* 19 (= *Saxifraga malvaefolia*). —Calif.
Parryi, *Small, l. c.* 18 (= *Saxifraga Parryi*).—Am. bor. occ.

JOLLYDORA, Pierre, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 217. *CONNARACEAE.*
duparquetiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1233 (= *Connarus duparquetianus*).—Afr. trop.
Elimaboura, *Pierre, ex Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 218, nomen.—Afr. trop.
Pierrei, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

JOUVEA, Fourn. (Gramin.).
pilosa, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 143.—Am. bor.

JRYAGHEDI, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 275 (1898) = **Myristica**, Linn. (Myristic.).
Jryaghedi, Kuntze, l. c. = M. Horsfieldia.

JUBUBA, Bub. Fl. Pyren. i. 376 (1897). *RHAMNACEAE.*
mediterranea, *Bub. l. c.* (= *Zizyphus vulgaris*).—Eur.

JUNCELLUS, C. B. Clarke (Cyperac.).
minutus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 224.—Afr. trop.

JUNCUS, Tourn. (Juncac.).
arizonicus, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 517.—Am. bor.
brachyphyllus, *Wiegand, l. c.* 519.—Am. bor.
Buchenaui, *Svedelius, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiii. no. 6, 9.—Bras.
Cephalotes, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 66.—Afr. austr.
confusus, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington*, x. 127.—Am. bor.
Dudleyi, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 524. —Am. bor.
guadeloupensis, *Buchen. & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 496.—Ind. occ.
interior, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 516. —Am. bor.
Kraussii, Hochst. in Flora, xxvii. (1845) 342 = maritimus.
lesbiacus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 1897, 140.—Lesbos.
occidentalis, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 521.—Am. bor.
oxycarpus, *E. Meyer, ex Kunth, Enum. Pl.* iii. 336.—Afr. austr.
Schlechteri, *Buchen. in Engl. Jahrb.* xxiv. 459.—Afr. austr.
setchuensis, *Buchen. l. c.* xxix. 238.—China.
spretus, Schult. f. Syst. vii. 1656, in obs. = maritimus.
Suksdorfii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 541.—Am. bor.
Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 90.—Am. bor.

JUNGIA, Linn. f. (Compos.).
coarctata, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 81.—Ecuador.
divaricata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 71.—Bolivia.
fistulosa, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 83.—Ecuador.
pubescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 161 = floribunda.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 82.—Ecuador.

JUNIPERUS, Tourn. (Conif.).
Knightii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 198.—Am. sept.
monosperma, *Sargent, Silva N. Am.* x. 89.—Am. bor.
sabinoides, Sargent, l. c. 91 = mexicana.
Sanderi, *Bois, in Journ. Hort. Fr.* 1899, 665.—Tibet.

JUNODIA, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 22. *EUPHORBIACEAE.*
triplinervia, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

JURINEA, Cass. (Compos.).
kilaea, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 172.—Turcia.
polycephala, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 299.—Eur.

JUSSIEUA, Linn. (Onagrac.).
Fauriei, *Léveillé, in Monde des Plantes*, vi. 51.—Japon.
geminiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 246. —Am. cent.
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 71. —Parag.
japonica, *Léveillé, in Monde des Plantes*, vi. 51.—Japon.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 71.—Parag.
Parmentieri, *Léveillé, in Monde des Plantes*, vi. 51.—Japon.
philippiana, *Léveillé, l. c.*—Japon.

JUSTENIA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 451 (1898). *RUBIACEAE.*
orthopetala, *Hiern, l. c.* 452.—Afr. trop.

JUSTICIA, Houst. (Acanth.).
andongensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 185.—Afr. trop.
Anisacanthus, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. 678 = Ecbolium Anisacanthus.
ansellianа, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 44.—Afr. trop.
arenicola, Engl. in Engl. Jahrb. x. 264 = Monechma arenicola.
areysiana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 225.—Arab.
aridicola, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 410.—Afr. trop.
asymetrica, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 310.—Am. cent.
aurea, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 675 = Tetramerium aureum.
Balansae, *Lindau, l. c.* 671.—Cochinch.
baravensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 189.—Afr. trop.
Barteri, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 39 = Monechma depauperatum.
betonicoides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 184.—Afr. trop.
blepharostegia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 195 = Monechma bracteatum.
boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 104.—Bolivia.
bracteata, Zarb, Cat. Spéc. Bot. Pfund, 32 = Monechma bracteatum.
breviflora, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 78 = Dianthera breviflora.
Buettneri, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 68 = Monechma hispidum.
calcarata, *Hochst. in Flora*, xxvi. (1843) 73, in obs.—Afr. trop.
calyculata, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 224.—Arab.
ciliaris, Linn. f. Suppl. 84 = Monechma hispidum.
ciliata, Jacq. Hort. Vindob. ii. 47 = Monechma hispidum.
cleomoides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 313 = Monechma cleomoides.
Clinopodium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 304.—Mexic.
crassiradix, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 210.—Afr. trop.

JUSTICIA:—
cynanchifolia, R. Br. in Salt, Abyss. Append. 63 = cordata.
debilis, Vahl, Symb. ii. 15 = Monechma bracteatum.
depauperata, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 40 = Monechma depauperatum.
Desertorum, Engl. in Engl. Jahrb. x. 263 = Monechma Desertorum.
dyschoristeoides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 197.—Afr. trop.
elegans, Beauv. Fl. Owar. i. 84 = Lankesteria elegans.
elegantula, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 204.—Afr. trop.
Elliotii, *S. Moore, l. c.* 466.—Afr. trop.
engleriana, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 62 = Adhatoda engleriana.
exigua, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 204.—Afr. trop.
fasciata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 160 = flava.
filibracteolata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 673.—N. Granat.
Funckii, *Lindau, l. c.* 674.—Venez.
Galeopsis, *T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 196.—Afr. trop.
genistifolia, Engl. in Engl. Jahrb. x. 264 = Monechma genistifolium.
gesneriflora, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 414.—Afr. trop.
gesnerifolia, Rendle, l. c. 398 = gesneriflora.
Gilligani, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 157.—N. Guin.
glischrantha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 49.—Bras.
Goetzei, *Lindau, l. c.* xxviii. 484.—Afr. trop.
Gregorii, S. Moore, in Journ. Bot. 1894, 138 = Monechma bracteatum.
grisea, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 205.—Afr. trop.
hereroensis, Engl. in Engl. Jahrb. x. 264 = Monechma hereroense.
hispida, Willd. Sp. Pl. i. 84 = Lankesteria parviflora.
interrupta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 207.—Afr. trop.
karschiana, Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. 40 = insularis.
laetevirens, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 409 = Fischeri.
Lindaui, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 199.—Afr. trop.
linearispica, *C. B. Clarke, l. c.* 192.—Afr. trop.
lolioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 310 = Monechma lolioides.
longiacuminata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 78.—Bolivia.
Lorteae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 379.—Afr. trop.
maculata, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda maculata.
major, T. Anders. l. c. 39 = flava.
marginata, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 73 = Monechma scabridum.
masaiensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 207.—Afr. trop.
Matthewsii, *Rusby, ex Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 30.—Parag.
membranifolia, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 663 (= *Rhaphidospora membranifolia*).—Java.
metallica, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 311.—Am. cent.
minor, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 39 = flava.
Mollugo, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 200.—Afr. trop.
monechmoides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 311 = Monechma Welwitschii.
mossamedea, S. Moore, l. c. 312 = Monechma Nepeta.
nana, *Ehrenb. ex Hempr. & Ehrenb. Symb. Phys.* 39, t. 16.—Arab.
Nepeta, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 312 = Monechma Nepeta.
Nuttii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 210.—Afr. trop.
ovata, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 237 = Dianthera ovata.
patenti-ciliata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 673.—Mexic.
paucinervia, *T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 186.—Afr. trop.
peploides, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 238 = Dianthera peploides.

JUSTICIA:—
Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 378.—Afr. trop.
phyllostachys, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 188.—Afr. trop.
Physogaster, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 672.—Bras.
pilosocordata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 207.—Afr. trop.
pinguior, *C. B. Clarke, l. c.* 197.—Afr. trop.
Pittieri, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 312.—Am. cent.
plicata, Vahl, Enum. i. 156 = flava.
polymorpha, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 203 = odorata.
Preussii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 204.—Afr. trop.
pycnophylla, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 49.—Bras.
pyramidata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 206.—Afr. trop.
Regnellii, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 672.—Bras.
reisensis, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 79.—Bolivia.
Rendlei, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 204.—Afr. trop.
robusta, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 223 = Adhatoda robusta.
Romaniae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 217.—Afr. trop.
rostellarioides, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 69 = insularis.
rugeliana, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 244 = Dianthera rugeliana.
ruwenzoriensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 185.—Afr. trop.
Salsola, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 340 = Monechma Salsola.
salviiflora, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 205.—Afr. trop.
Sanctae-Martae, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxi. 377.—N. Granat.
sarothroides, *Lindau, l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 50.—Bras.
scabrida, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 310 = Monechma scabridum.
schimperiana, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda schimperiana.
sexsulcata, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 67 = Monechma depauperatum.
shebelensis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 409.—Afr. trop.
simplex, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 349 = diffusa.
simplicispica, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 188.—Afr. trop.
spectabilis, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 204 = Preussii.
stachytarphetoides, *C. B. Clarke, l. c.* 194.—Afr. trop.
Steingroeveri, Schinz, ex Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 349 = Monechma arenicola.
Stuebelii, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxi. 378.—Peruv.
subsessilis, Oliv. in Trans. Linn. Soc. xxix. 129 = Monechma subsessile.
tanaensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 193.—Afr. trop.
tenella, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 663 (= *Rhaphidospora tenella*).—Java.
thomeensis, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 126 = J. Galeopsis.
Tonduzii, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 313.—Am. cent.
tristis, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda tristis.
tunicata, Afz. Remed. Guin. iii. 17 = Eranthemum nigritianum.
ukambensis, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 69 = Monechma ukambense.
uncinulata, Oliv. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 226 = Rhinacanthus sidorensis.
versicolor, *C. B. Clarke, l. c.* 186.—Afr. trop.
vittata, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 211.—Sumatra.

K

KADUA, Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
elatior, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 899.—Ins. Sandw.

KAEMPFERIA, Linn. (Scitamin.).
aethiopica, *Ridley, in Journ. Bot.* 1887, 131.—Afr. trop.
anomala, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 357.—Borneo.
Carsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 296.—Afr. trop.
decus-silvae, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 321.—Malaya.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 142.—Afr. trop.
Ethelae, *J. M. Wood, in Gard. Chron.* 1898, I. 94.—Afr. trop.
glauca, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 107.—Siam.
macrosiphon, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 296.—Afr. trop.
oligosperma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 337.—Borneo.
pulchra, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 107.—Siam.
spectabilis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 297 (= *Cadalvena spectabilis*).—Afr. trop.

KALANCHOË, Adans. (Crassul.).
Cuisini, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 122.—Afr. trop.
flammea, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 266.—Afr. trop.
kelleriana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 814.—Afr. trop.
Pentheri, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 341.—Afr. austr.

KALLSTROEMIA, Scop. = **Tribulus**, Linn. (Zygophyll.).
brachystylis, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 206.—Am. sept.
parviflora, Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 153.—Am. bor.

KALMIA, Linn. (Ericac.).
microphylla, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 581.—Am. bor.

KALOPANAX, Miq. = **Acanthopanax**, Decne. (Aral.).
sciadophylloides, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 51 = A. sciadophylloides.

KARLEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1271. *STYRACACEAE.*
berchemioides, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

KAYEA, Wall. (Guttif.).
Curtisii, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 144.—Penang.
Manii, *King, l. c.*—Singapore et Ins. Andaman.

KELLERONIA, Schinz (Zygophyll.).
Gillettii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 6.—Afr. trop.

KELSEYA, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 207. *ROSACEAE.*
uniflora, *Rydb. l. c.* (= *Eriogynia uniflora*).—Am. sept.

KENNEDYA, Vent. (Legum.).
exaltata, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 79.—Austral.

KENOPLEURUM, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 158. *UMBELLIFERAE.*
virosum, *Candargy, l. c.* 159.—Lesbos.

KENTIA, Blume (Palm.).
kersteniana, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1898, II. 357, fig. 113.—Hort.?
microcarpa, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 207.—N. Guin.
microspadix, *Warb. l. c.* 206.—N. Guin.

KENTROCHROSIA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 506 (1900). *APOCYNACEAE.*
monocarpa, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

KENTROSPHAERA, Volkens, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 153 (1897). *AMARANTACEAE.*
prostrata, *Volkens, l. c.*—Afr. trop.

KIBARA, Endl. (Monim.).
angustifolia, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxv. 577.—Arch. Mal.
macrophylla, *Perkins, l. c.* 578.—Java.

KIBARA:—
Perkinsiae, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 330.—N. Guin.
polyantha, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxv. 575.—Siam.
serrulata, *Perkins, l. c.*—Java.
tomentosa, *Perkins, l. c.* 571.—Java.
trichantha, *Perkins, l. c.* 572.—Java.
xanthophylla, *Perkins, l. c.* 574.—Ins. Nicobar.

KIBESSIA, DC. (Melast.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 466, 633.—Celebes.

KICKXIA, Blume (Apocyn.).
elastica, *Preuss, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 353.—Afr. trop.
latifolia, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
Scheffleri, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 81.—Afr. trop.
Wigmani, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 528.—Celebes.
Zenkeri, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 81.—Afr. trop.

KICKXIA, Dum. = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).
cirrhosa, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 492 = L. cirrhosa.
commutata, Fritsch, l. c. = L. Elatine.
lasiopoda, Fritsch, l. c. = L. Elatine.

KIELMEYERA, Mart. (Ternstroem.).
paniculata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 9.—Bolivia.

KINGIODENDRON, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 194 (1897). *LEGUMINOSAE.*
pinnatum, *Harms, l. c.* (= *Hardwickia pinnata*).—Ind. or.

KIRKIA, Oliver (Simarub.).
Wilmsii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 25.—Afr. austr.

KLAINEDOXA, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 227; et in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1235. *SIMARUBACEAE.*
gabonensis, *Pierre, ll. cc.*—Afr. trop.

KLEINIA, Linn. (Compos.).
Grantii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7691.—Afr. trop.
pendula, *DC. Prod.* vi. 339.—Afr. trop.; Arab.

KLOTZSCHIA, Cham. (Umbellif.).
Glaziovii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 12.—Bras.

KNAUTIA, Linn. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
lemaniana, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 109.—Eur.
midzorensis, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xvi. 19.—Eur.
perfoliata, Vel. Fl. Bulg. Suppl. I. 149.—Eur.
serbica, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 308.—Eur.
sixtina, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 109.—Eur.
succisoides, Briq. l. c. 108.—Eur.

KNEIFFIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
Alleni, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 177 = O. fruticosa.
longipedicellata, Small, l. c. 178.—Am. bor.
Pilosella, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 8 = O. fruticosa.
spachiana, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 179 = O. spachiana.
subglobosa, Small, l. c. 177.—Am. bor.

KNEMA, Lour. = **Myristica**, Linn. (Myristic.).
angustifolia, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 561 = M. erratica.
attenuata, Warb. l. c. 590 = M. attenuata.
Cantleyi, Warb. l. c. 554 = M. Cantleyi.
cinerea, Warb. l. c. 611 = M. cinerea.
conferta, Warb. l. c. 578 = M. conferta.
coriacea, Warb. l. c. 614 = M. coriacea.
Curtisii, Warb. l. c. 567 = M. Curtisii.
elegans, Warb. l. c. 615 = M. elegans.
furfuracea, Warb. l. c. 581 = M. furfuracea.
geminata, Warb. l. c. 604 = M. geminata.
glauca, Warb. l. c. 594 = M. glauca.

KNEMA:—
globularia, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 601 = M. microcarpa.
heterophylla, Warb. l. c. 573 = M. heterophylla.
hookeriana, Warb. l. c. 551 = M. hookeriana.
intermedia, Warb. l. c. 564 = M. intermedia.
Korthalsii, Warb. l. c. 557 = M. Korthalsii.
Kunstleri, Warb. l. c. 568 = M. Kunstleri.
latifolia, Warb. l. c. 610.—Malaya.
laurina, Warb. l. c. 606 = M. laurina.
lenta, Warb. l. c. 584 = M. lenta.
linifolia, Warb. l. c. 558 = M. longifolia.
malayana, Warb. l. c. 570 = M. glaucescens.
Mandaharan, Warb. l. c. 553 = M. Mandaharan.
missionis, Warb. l. c. 602 = M. missionis.
oblongifolia, Warb. l. c. 586 = M. oblongifolia.
palembanica, Warb. l. c. 592 = M. glaucescens.
pectinata, Warb. l. c. 556 = M. pectinata.
peltata, Warb. l. c. 599 = M. peltata.
Pierrei, Warb. l. c. 585.—Cochinch.
pulchra, Warb. l. c. 600 = M. pulchra.
retusa, Warb. l. c. 612 = M. retusa.
rufa, Warb. l. c. 556 = M. rufa.
stenocarpa, Warb. l. c. 577 = M. stenocarpa.
tomentella, Warb. l. c. 588 = M. tomentella.
umbellata, Warb. l. c. 609 = M. umbellata.
Vidalii, Warb. l. c. 615.—Ins. Philipp.
Wrayi, Warb. l. c. 572 = M. Wrayi.

KNIPHOFIA, Moench (Liliac.).
Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 281.—Afr. austr.
Evansii, *Baker, l. c.* 278.—Afr. austr.
fibrosa, *Baker, l. c.* 533.—Afr. austr.
Galpini, *Baker, l. c.* 281.—Afr. austr.
insignis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 131.—Afr. trop.
Krooki, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 14.—Afr. austr.
multiflora, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 353.—Afr. austr.
primulina, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 533.—Afr. austr.
rufa, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7706.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 10.—Afr. austr.
Sumarae, *Deflers, Voy. Yemen*, 210.—Arab.
Thodei, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 533.—Afr. austr.

KNOWLTONIA, Salisb. (Ranuncul.).
filia, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 12 (= *Anemone filia*).—Afr. austr.
glabricarpellata, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 423.—Afr. austr.

KOBRESIA, Willd. (Cyperac.).
brunnescens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 40.—Tibet.
hyalinolepis, *Boeck. l. c.* 39.—Tibet.
macrantha, *Boeck. l. c.*—Tibet.
myosuroides, Fiori & Paoletti, Fl. Ital. i. 125 = scirpina.
persica, *Kuek. & Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 133.—Persia.

KOCHIA, Roth (Chenopod.).
glomerifolia, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 345.—Austral.

KOELERIA, Pers. (Gramin.).
Alopecurus, Nees, in Linnaea, vii. 320 = cristata.
aristata, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 66 = Avena subspicata.
brevifolia, Spreng. Pugill. ii. 21 = Eleusine brevifolia.
calycina, DC. Fl. Fr. vi. 271 = Schismus fasciculatus.
capensis, Nees, in Linnaea, vii. 321 = cristata.
Gerardi, Munro, ex Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 1184 = Stilburus alopecuroides.
glauca, DC. Cat. Hort. Monsp. 116 = cristata.
Kurtzii, *Hack. ex Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xvi. repr. 40.—Reg. Argent.
lagopoides, Panz. ex Spreng. Syst. i. 332 = Eleusine brevifolia.
lobata, Roem. & Schult. Syst. ii. 620 = cristata.
Rohlfsii, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. no. 1, (1900) 16.—Tunis.
spicata, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 72 = Avena subspicata.
subspicata, Mart. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 49, 140 = Avena subspicata.
valesiaca, Gaud. in Alpina, iii. 47 = cristata.
vallesiana, Aschers. & Graebn. Mitteleur. Fl. ii. 354 = valesiaca.

KOELLIA, Moench = **Pycnanthemum**, Mich. (Labiat.).
Beadlei, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 470.—Am. bor.
dubia, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 310 = P. Tullia.

KOELREUTERIA, Laxm. (Sapind.).
minor, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2642.—China.

KOENIGIA, Linn. = **Polygonum**, Tourn. (Polygonac.).
fuegiana, P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 191.—Reg. Magell.

KOHLERIA, Regel = **Isoloma**, Decne. (Gesner.).
elegans, Loes. in Bull. Herb. Boiss. vii. 574 = I. elegans.
patentipilosa, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 386 = I. patentipilosa.

KOHLERIANTHUS, Fritsch, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 300 (1897). *GESNERACEAE.*
Fritschii, *Fritsch, l. c.* (= *Fluckigeria Fritschii*).—Bolivia.

KOKOONA, Thw. (Celastr.).
coriacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 347.—Perak.
Scortechinii, *King, l. c.*—Perak.

KOLOBOCHILUS, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica, viii. (1900) 307. *ACANTHACEAE.*
blepharorachis, *Lindau, l. c.* 309.—Am. cent.
leiorachis, *Lindau, l. c.* 308.—Am. cent.

KOLOBOPETALUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 410. *MENISPERMACEAE.*
auriculatum, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

KOOMPASSIA, Maing. (Legum.).
parvifolia, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 166.—Perak.

KOORDERSIODENDRON, Engl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. (1898) 410. *ANACARDIACEAE.*
celebicum, *Engl. l. c.*—Celebes.

KOPSIA, Blume (Apocyn.).
albiflora, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 395 (= *Calpicarpum albiflorum*).—Malaya.

KORSHINSKIA, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900) 59. *UMBELLIFERAE.*
Olgae, *Lipsky, l. c.*—As. cent.

KORTHALSELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 83. *LORANTHACEAE.*
amentacea, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Heterixia amentacea*).—N. Zel.
aoraiensis, *Engl. l. c.* (= *Bifaria aoraiensis*).—Ins. Tahiti.
complanata, *Engl. l. c.* (= *Bifaria complanata*).—Ins. Sandw.
cylindrica, *Engl. l. c.* (= *Bifaria cylindrica*).—Ins. Sandw.
dichotoma, *Engl. l. c.* (= *Bifaria dichotoma*).—N. Caled.
disticha, *Engl. l. c.* (= *Bifaria disticha*).—Ins. Norfolk.
divaricata, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164.—Ins. Sandw.
geminata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Heterixia geminata*).—Borneo.
horneana, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164.—Ins. Sandw.
howensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Bifaria howensis*).—Ins. Dom. How.
Humblotii, *Engl. l. c.* (= *Bifaria Humbloti*).—Ins. Comor.
japonica, *Engl. l. c.* (= *Bifaria japonica*).—As. or.
Lindsayi, *Engl. l. c.* (= *Heterixia Lindsayi*).—N. Zel.
platycaula, *Engl. l. c.* (= *Bifaria platycaula*).—Ins. Tahiti.
remyana, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 86.—Ins. Sandw.
Richardii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Bifaria Richardii*).—Bourbon.
rubra, *Engl. l. c.* (= *Bifaria rubra*).—Austral.

KORTHALSELLA:—
salicornioides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164.—N. Zel.
taenioides, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 138 (= *Bifaria taenioides*).—Bourbon.
vitiensis, *Engl. l. c.* (= *Bifaria vitiensis*).—Ins. Fiji.
Wawrae, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164. —Ins. Sandw.

KOSTYCZEWA, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. IV. (1896) 91. *LEGUMINOSAE.*
ternata, *Korsh. l. c.* 92.—Turkestan.

KRASCHENINIKOVIA, Turcz. = **Stellaria**, Linn. (Caryophyll.).
himalaica, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. (1898) 40.—Reg. Himal.
japonica, Korsh. l. c.—Japon.
raphanorhiza, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. I. 42 = S. rhaphanorrhiza.

KRAMERIA, Loefl. (Polygal.).
Ishamii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 48.—Ind. occ.

KRAUNHIA, Rafin. = **Wistaria**, Nutt. (Legum.).
macrostachys, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 134 = W. speciosa.

KUHNIA, Linn. (Compos.).
Kuhnia, Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 28 = eupatorioides.

KUHNISTERA, Lam. = **Petalostemon**, Mich. (Legum.).
Gattingeri, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 121 = P. Gattingeri.
microphylla, A. A. Heller, l. c. 122 = P. microphyllum.
obovata, A. A. Heller, l. c. = P. obovatus.
oligophylla, A. A. Heller, l. c. = P. candidus.
pulcherrima, A. A. Heller, Contr. Herb. Franklin & Marshall Coll. i. 50 = P. pulcherrima.
Reverchoni, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 124 = P. Reverchoni.
sabinalis, A. A. Heller, l. c. = P. sabinalis.
tenuis, A. A. Heller, l. c. = P. tenue.

KUNDMANNIA, Scop. (Umbellif.).
insulana, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 122.—Eur.

KUNSTLERIA, Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. (1897) 109. *LEGUMINOSAE.*
Curtisii, *Prain, l. c.* 110.—Penins. Mal.
Derryi, *Prain, l. c.* 112.—Penins. Mal.
Forbesii, *Prain, l. c.* 111.—Penins. Mal.
Kingii, *Prain, l. c.* 110.—Penins. Mal.
Ridleyi, *Prain, l. c.* 111.—Penins. Mal.

KYLLINGA, Rottb. (Cyperac.).
albiceps, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 106.—Afr. trop.
appendiculata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 338.—Afr. trop.
aurata, Nees, in Linnaea, x. 139 = erecta.
Buchanani, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 155.—Afr. austr.
consanguinea, Kunth, Enum. Pl. ii. 135 = erecta.
erecta, *Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 42.—Afr. trop. et austr.
macrocephala, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 225 = appendiculata.
parvula, *C. B. Clarke, ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 103.—Afr. trop.
pellucido-albida, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 1.—Urug.

L

LACELLIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 396 (1900) = **Laserpitium**, Linn. (Umbellif.).
cuneata, Bub. l. c. 400 = L. gallicum.
latifoliata, Bub. l. c. 398 = L. latifolium.
montana, Bub. l. c. 399 = L. Siler.
Nestleri, Bub. l. c. = L. Nestleri.
prutenica, Bub. l. c. 401 = L. prutenicum.

LACHENALIA, Jacq. (Liliac.).
Bowkeri, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 427.—Afr. austr.
rhodantha, *Baker, l. c.* 430.—Afr. austr.
Youngii, *Baker, l. c.* 433.—Afr. austr.

LACHNAEA, Linn. (Thymel.).
Marlothii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 503.—Afr. austr.
micrantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 451.—Afr. austr.

LACHNAGROSTIS, Trin. (Gramin.).
ciliata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 193 = Calamagrostis pilosula.
Griffithiana, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 263 = Calamagrostis griffithiana.
hookeriana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 192 = Calamagrostis royleana.

LACIMARIA, Ind. Kew. ii. (1894) 19, sphalm. = Lacinaria, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).

LACINARIA, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).
cymosa, Nees, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 21.—Am. bor.
flabellata, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 472.—Am. bor.
Halei, Small, l. c. 1900, 281.—Am. bor.
lancifolia, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 118. —Am. bor.
laxa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 472.—Am. bor.
microcephala, Small, l. c. 473.—Am. bor.
platylepis, Small, l. c. 1900, 281.—Am. bor.
Regimontis, Small, l. c. 1898, 473.—Am. bor.

LACTUCA, Tourn. (Compos.).
agrestis, Bub. Fl. Pyren. ii. 113 = virosa.
amorgina, *Heldr. & Orph. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 188.—Graecia.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 622.—Afr. trop.
brachyrrhyncha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 578.—Am. cent.
campestris, *Greene, Pittonia*, iv. 37.—Am. bor.
chelidonifolia, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 47. —Japon.
Deasyi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 428.—China.
imbricata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 620.—Afr. trop.
macroseris, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
Morssii, *Robinson, in Rhodora*, 1899, 12.—Am. bor.
multifida, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 484.—Am. bor.
petrensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 619.—Afr. trop.
sagittata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 213.—Eur.
spicata, Hitchcock, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 276 = alpina.
sylvatica, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 486.—Am. bor.
watsoniana, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897, 127.—Ins. Azor.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 160.—Arab.

LAELIA, Lindl. (Orchid.).
domingensis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 32 = Broughtonia lilacina.
lucasiana, Rolfe, in Orchid Rev. i. 265 = longipes.

LAGASCEA, Cav. (Compos.).
tomentosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Mexic.

LAGENARIA, Ser. (Cucurb.).
leucantha, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 43 = vulgaris.

LAGENOPHORA, Cass. (Compos.).
Barkeri, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 257.—N. Zel.
nudicaulis, P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 98 = Commersonii.
purpurea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 257.—N. Zel.

LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrac.).
Balansae, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 35. —Cochinch.

LAGGERA, Sch. Bip. (Compos.).
alata, *Sch. Bip. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 94.—As. et Afr. trop.
arabica, *Deflers, Voy. Yemen*, 149 (= *Conyza arabica*). —Arab.
aurita, *Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 151. —As. et Afr. trop.

LAGOTIS, J. Gaertn. (Selag.).
crassifolia, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 63.—Reg. Himal.
pharica, *Prain, l. c.* 62.—As. cent.

LAGUNA, Cav. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
Schinzii, Guerke, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. 180 = H. Schinzii.

LALDA, Bub. Fl. Pyren. ii. 44 (1900) = **Lapsana**, Linn. (Compos.).
communis, Bub. l. c. = L. communis.

LAMELLISEPALUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 229 (1897); et in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 19. *RHAMNACEAE.*
Hildebrandtii, *Engl. ll. cc.*—Afr. trop.

LAMIUM, Tourn. (Labiat.).
vulgare, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 472 = L. Galeobdolon.
Wettsteinii, *Rechinger, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 132.—Eur.

LAMOUROUXIA, H. B. & K. (Scrophul.).
Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 312.—Mexic.

LANDOLPHIA, Beauv. (Apocyn.).
crassifolia, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 370 = scandens.
delagoensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 15. —Afr. austr.
eminiana, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 88.—Afr. trop.
Foreti, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxiv. 1541.—Afr. trop.
henriquesiana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 97 (= *Clitandra henriquesiana*).—Afr. trop.
humilis, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 306, nomen.—Afr. trop.
Klainii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 15.—Afr. trop.
ochracea, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 86.—Afr. trop.
Perieri, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxix. 350.—Madag.
polyantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 452.—Afr. trop.
pyramidata, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 89 = Aphanostylis pyramidata.
reticulata, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 87.—Afr. trop.
watsoniana, *Vogtherr, in Koehl. Medizinalpfl.* iii. t. 14. —Afr. trop.
Watsonii, Vogtherr, l. c. = praec.

LANGLOISIA, Greene, Pittonia, iii. (1896) 30. *POLEMONIACEAE.*
Matthewsii, *Greene, l. c.*—Am. bor. occ.
Schottii, *Greene, l. c.* (= *Gilia setosissima*).—Calif.
setosissima, *Greene, l. c.* (= *Gilia setosissima*).—Calif.

LANIUM, Lindl. (Orchid.).
subulatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 46.—Bras.

LANKESTERIA, Lindl. (Acanth.).
batangana, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 311 = Physacanthus inflatus.

LANNEA, A. Rich. = **Odina**, Roxb. (Anacard.).
Afzelii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 494.—Afr. trop.
alata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 214.—Afr. trop.
ambacensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 497 (= *Colesiam ambacensis*).—Afr. trop.
amboensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 341, sphalm. = praec.
antiscorbutica, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 499 (= *Colesiam antiscorbutica*).—Afr. trop.
aspleniifolia, Engl. l. c. = O. aspleniifolia.

LANNEA:—
Barteri, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 213 = O. Barteri.
Buettneri, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 494.—Afr. trop.
cinerea, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 214.—Afr. trop.
cuneifoliolata, Engl. l. c.—Afr. trop.
discolor, Engl. l. c. 213 = O. discolor.
edulis, Engl. l. c. = O. edulis.
fruticosa, Engl. l. c. = O. fruticosa.
fulva, Engl. l. c.—Afr. trop.
grandis, Engl. l. c. = O. Wodier.
humilis, Engl. l. c. = O. humilis.
nana. Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496.—Afr. trop.
obcordata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 214.—Afr. trop.
obovata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496 = O. obovata.
ornifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 213.—Afr. trop.
rubra, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496 (= *Colesiam rubra*).—Afr. trop.
rufescens, Engl. l. c. 495.—Afr. trop.
Ruspollii, Engl. l. c. 494.—Afr. trop.
Schimperi, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 213 = O. Schimperi.
Schweinfurthii, Engl. l. c. 214.—Afr. trop.
Stuhlmannii, Engl. l. c.—Afr. trop.
tomentosa, Engl. l. c. 213.—Afr. trop.
triphylla, Engl. l. c. = O. triphylla.
Welwitschii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 498 = Colesiam Welwitschii.

LANTANA, Linn. (Verbenac.).
Czermakii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 164.—Bras.
Reineckii, *Briq. l. c.* 165.—Bras.
subtracta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 828.—Afr. trop.

LAPATHUM, Tourn. = **Rumex**, Linn. (Polygon.).
alpestre, Bub. Fl. Pyren. i. 157 = R. montanus.
montanum, Bub. l. c. 156 = R. alpinus.
thyrsoideum, Bub. l. c. 158 = R. thyrsoides.
tingitanum, Bub. l. c. 160 = R. tingitanus.

LAPEYROUSIA, Pourr. (Irid.).
angustifolia, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 104.—Afr. austr.
arenicola, *Schlechter, l. c.* 105.—Afr. austr.
edulis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 49.—Afr. austr.
euryphylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 366.—Afr. trop.
graebneriana, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
macrospatha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 94.—Afr. austr.
Monteiroi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 355.—Afr. trop.
porphyrosiphon, *Baker, l. c.* 353.—Afr. trop.
serrulata, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 432.—Afr. austr.
speciosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 105.—Afr. austr.

LAPHAMIA, A. Gray (Compos.).
cernua, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 122.—Am. bor.
fastigiata, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Am. bor.
intricata, *Brandegee, l. c.* 450.—Am. bor.

LAPIEDRA, Lag. (Amaryll.).
chilensis, *F. Phil. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 144.—Chili.

LAPORTEA, Gaudich. (Urtic.).
cordata, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 290.—N. Guin.
giraldiana, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 301.—China.
grossedentata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 474.—China.
longifolia, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2559–60.—N. Guin.
murrayana, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 189.—Ins. Christmas.
pedunculata, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 290.—N. Guin.
sinensis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 474.—China.

LAPPA, Tourn. = **Arctium**, Linn. (Compos.).
Palladini, Marcowicz, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 220.—Reg. Caucas.

LAPPAGO, Schreb. = **Tragus**, Hall. (Gramin.).
decipiens, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin, Ser. II. xiv. 389 = T. racemosus.
occidentalis, Nees, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 97 = T. racemosus.
phleoides, Fig. & De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. 373 = T. racemosus.
setacea, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 9, 12 = Lasiochloa longifolia.
setiformis, Spreng. l. c. 9, 11 = Lasiochloa longifolia.

LAPPULA, Moench = **Echinospermum**, Sw. (Borag.).
americana, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 294.—Am. bor.
caerulescens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 328.—Am. bor.
cenchrusoides, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 243.—Am. bor.
collina, Greene, Pittonia, iv. 96.—Am. bor.
coronata, Greene, l. c. 94.—Am. bor.
desertorum, Greene, l. c. 95.—Am. bor.
erecta, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 268.—Am. bor.
Fremontii, Greene, Pittonia, iv. 96 = cenchroides.
heterosperma, Greene, l. c. 94.—Am. bor.
leptophylla, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 329.—Am. bor.
montana, Greene, Pittonia, iv. 96.—Am. bor.
occidentalis, Greene, l. c. 97.—Am. bor.
occidentalis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 329 = E. Redowskii.
patula, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 573 = E. patulum.
texana, Greene, Pittonia, iv. 94 = E. Redowskii.

LAPSANA, Linn. (Compos.).
olympica, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 147.—Graecia.

LARIX, Tourn. (Conif.).
chinensis, *Beissner, in Mitth. Dendrol. Ges.* 1896, 68.—China.
Potanini, *Batal. in Mitth. Dendrol. Ges.* 1899, 112.—China.
thibetica, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 262.—China.

LARREA, Cav. (Zygophyll.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 499.—Patag.

LASERPITIUM, Linn. (Umbell.).
glaucum, *Post, Fl. Syria*, 376.—Syria.

LASIA, Lour. (Aroid.).
crassifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 15.—Borneo.
Hermanni, Schott, in Bonplandia, v. 125 = aculeata.

LASIAGROSTIS, Link = **Stipa**, Linn. (Gramin.).
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 167 = S. dregeana.
elongata, Nees, l. c. 168 = S. dregeana.
splendens, Kunth, Rév. Gram. i. 58 = S. splendens.
tremula, Rupr. Sert. Tiansch. 35 = S. purpurea.

LASIANTHUS, Jack (Rubiac.).
batangensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 107.—Afr. trop.
glomeruliflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Hartii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 209.—China.
lanceolatus, Urb. Symb. Antill. i. 449 = Moralesii.
macrocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 499.—Afr. trop.
microcalyx, *K. Schum. l. c.* 108.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 496, nomen.—Celebes.
tortistilus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 108.—Afr. trop.
xanthospermus, *K. Schum. l. c.* 499.—Afr. trop.

LASIOCHLOA, Kunth (Gramin.).
adscendens, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = ciliaris.
alopecuroides, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 393 = Stiburus alopecuroides.
hirta, Kunth, Rév. Gram. ii. 559 = longifolia.
hispida, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = longifolia.
laevis, Kunth, l. c. = Festuca scabra.

LASIOCHLOA:—
ovata, Nees, Fl. Afr. Austr. 431 = obtusifolia.
serrata, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = Festuca scabra.
ustuloides, E. Meyer, in Drège, Zwei Pfl. Docum. 92 = utriculosa.

LASIOCORYS, Benth. (Labiat.).
Eenii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 469.—Afr. trop.
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, iv. 271 = Leucas Pechuelii.

LASIODISCUS, Hook. f. (Rhamnac.).
marmoratus, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 248.—Afr. trop.
usambarensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

LASIORRHIZA, Lag. = **Leuceria**, Lag. (Compos.).
anthemidifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 161 = L. anthemidifolia.
fuegina, Kuntze, l. c. = L. fuegina.
glomerulata, Kuntze, l. c.—Chili.
leontopodiodes, Kuntze, l. c.—Patag.

LASIOSPORA, Cass. = **Scorzonera**, Tourn. (Compos.).
eriolaena, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 147.—Lesbos.

LASIOSTELMA, Benth. (Asclep.).
Gerrardi, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1899, 61 (= *Brachystelmaria Gerrardi*).—Afr. austr.
somalense, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

LASIURUS, Boiss. = **Elionurus**, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
hirsutus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 146 = E. hirsutus.

LASSA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 19 = **Pavonia**, Cav. (Malvac.).
argentina, Kuntze, l. c. = P. argentina.
cordifolia, Kuntze, l. c. = P. Mutisii.
fruticosa, Kuntze, l. c. = P. Typhalaea.
glechomodes, Kuntze, l. c. = P. glechomoides.
hastata, Kuntze, l. c. = P. hastata.
Hieronymi, Kuntze, l. c. = P. Hieronymi.
humifusa, Kuntze, l. c. = P. humifusa.
leucantha, Kuntze, l. c. = P. leucantha.
macrophylla, Kuntze, l. c. 20 = P. kraussiana.
microphylla, Kuntze, l. c. = P. Dregei.
paniculata, Kuntze, l. c. = P. paniculata.
praemorsa, Kuntze, l. c. = Hibiscus praemorsa.
ruderalis, Kuntze, l. c. = P. ruderalis.
sagittata, Kuntze, l. c. = P. sagittata.
sepium, Kuntze, l. c. = P. sepium.
sidifolia, Kuntze, l. c. = P. sidaefolia.
spinifex, Kuntze, l. c. = P. spinifex.

LASTARRIACA, Ind. Kew. ii. 36, sphalm. = seq.

LASTARRIAEA, Remy (Polygon.).
linearis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 501.—Chili.
stricta, *R. Phil. l. c.* 500.—Chili.

LATACE, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. (1896) 274. *LILIACEAE*.
Volkmanni, *R. Phil. l. c.*—Chili.

LATHYRUS, Tourn. (Legum.).
algericus, *Ginz. in Sitz. Acad. Wien*, cv. I. 337.—Reg. Medit.
brachyodon, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 77.—Afr. bor.
colchicus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 261.—Reg. Caucas.
dielsianus, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 417.—China.
digitatus, *Fiori & Paoletti, Fl. Ital.* ii. 105.—Ital.
gracillimus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 198.—Chili.
intricatus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
laevigatus, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 346 = Orobus laevigatus.
lanceolatus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 158.—Am. bor.
lancifolius, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 198.—Chili.
laurifolius, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 354, sphalm. = praec.
Linnaei, Rouy, Fl. Fr. v. 267 = montanus.
malosanus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
miniatus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 162.—Lesbos.
Mulkak, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 49.—As. cent.

LATHYRUS:—
occidentalis, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 346.—Austria.
Sandbergi, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 160.—Am. bor.
Shaffneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 258.—Am. bor.
Sibthorpii, Baker, in Gard. Chron. 1890, I. 704 = undulatus.
venetus, *Rouy, Fl. Fr.* v. 274.—Eur.
vicioides, Bub. Fl. Pyren. ii. 549 = L. Clymenum.

LATOUCHEA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 212. *GENTIANACEAE.*
fokienensis, *Franch. l. c.*—China.

LAURENTIA, Michx. (Campan.).
hedyotidea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 197.—Afr. austr.
micrantha, Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 386 = Lobelia parviflora.
secunda, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 188 = erinoides.

LAURUS, Tourn. (Laurac.).
iteophylla, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 43.—Hort.

LAUTERBACHIA, Perkins, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 330 (1900). *MONIMIACEAE.*
novoguineensis, *Perkins, l. c.* 331.—N. Guin.

LAVALLEOPSIS, Van Tiegh. ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 148 (1897). *OLACACEAE.*
densivenia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
grandifolia, Van Tiegh. ex Engl. l. c. = Strombosia grandifolia.
klaineana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
longifolia, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 186.—Afr. trop.

LAVANDULA, Tourn. (Labiat.).
angustifolia, Bub. Fl. Pyren. i. 381 = L. Spica.
canescens, *Deflers, Voy. Yemen*, 186.—Arab.

LAVATERA, Linn. (Malvac.).
bicolor, *Rouy, in Journ. de Bot.* 1897, 86.—Reg. Medit.

LAVAUXIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
primiveris, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 182 = O. primiveris.
Wrightii, Small, l. c. 183 = O. Wrightii.

LAVOISIERA, DC. (Melast.).
goyazensis, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 447.—Bras.
Senaei, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 3.—Bras.
suberosa, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 447.—Bras.

LEANDRA, Raddi (Melast.).
depauperata, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 94.—Bras.

LEBECKIA, Thunb. (Legum.).
leucoclada, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 143.—Afr. austr.
lotonoides, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
obovata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 126.—Afr. austr.
schlechteriana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. 865.—Afr. austr.

LEBIANTHUS, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1898) 378, sphalm. = **Helianthus**, Linn. (Compos.).

LECHEA, Kalm (Cistac.).
juniperina, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 88.—Am. bor.

LECOMTEA, Pierre, ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 570. *OLACACEAE.*
congoensis, *Pierre, l. c.* (= *Harmandia congoensis*).—Afr. trop.

LECYTHIS, Loefl. (Myrtac.).
andinus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 37.—Bolivia.

LEEA, Royen (Ampelid.).
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 416.—Perak.
gigantea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 432.—N. Guin.

LEEA:—
heterodoxa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 431.—N. Guin.
macropus, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 130.—N. Brit.
Micholitzii, *Sander, Cat.* 1899, 20.—N. Guin.
pauciflora, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 412.—Perak.
Smithii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 622.—Celebes.

LEERSIA, Soland. (Gramin.).
capensis, C. Muell. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 345 = hexandra.
ciliaris, Griff. Notul. iii. 2 = hexandra.
ferox, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xiv. 319 = hexandra.
griffithiana, C. Muell. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 345 = hexandra.
mauritanica, Salzm. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. 174 = hexandra.
parviflora, Desv. Opusc. 61 = hexandra.

LEIBERGIA, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. (1896) 575. *UMBELLIFERAE.*
orogenioides, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

LEICHTLINIA, Ross, Ic. Pl. Hort. Panorm. 7 (1896). *AMARYLLIDACEAE.*
protuberans, *Ross, l. c.* 8. t. 3.—Mexic.

LEIOTHYLAX, Warming, in Danske Vid. Selsk. Skrift. Ser. VI. ix. (1899) 145. *PODOSTEMACEAE.*
quangensis, *Warming, l. c.* 147.—Afr. trop.
Warmingii, *Warming, l. c.* 150 (= *Dicraea Warmingii*).—Afr. trop.

LELEBA, Rumph. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. 20 (1866) = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).
lineata, Rumph. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 393 = B. lineata.
rumphiana, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. 20 = B. lineata.

LEMBERTIA, Greene, Fl. Francisc. (1897) 441. *COMPOSITAE.*
Congdoni, *Greene, l. c.* (= *Eatonella Congdoni*).—Calif.

LEONOTIS, R. Br. (Labiat.).
africana, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 246 = pallida.
Elliotii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 492.—Afr. trop.
Melleri, *Baker, l. c.* 491.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 465.—Afr. trop.
rugosa, Benth. in DC. Prodr. xii. 535 = velutina.

LEONTICE, Linn. (Berberid.).
robustum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 337 = Caulophyllum robustum.

LEONTODON, Linn. (Compos.).
arenarium, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 376 = Hypochoeris arenaria.
asperifolius, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 187.—Eur.
Autrani, *Chabert, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 360.—Ital.
Bauhini, Bub. Fl. Pyren. ii. 57 = hirtus.
calvatus, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 189.—Eur.

LEONTONYX, Cass. (Compos.).
Pumilio, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 162.—Afr. austr.
ramosissimus, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. austr.

LEONTOPODIUM, R. Br. (Compos.).
brachyactis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 420.—Reg. Himal.
gnaphalioides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 29.—Ecuador.

LEONURUS, Linn. (Labiat.).
ambigium, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 319.—Japon.

LEPECHINIA, Willd. (Labiat.).
coccinea, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 292 = Dekinia coccinea.

LEPERVENCHEA, Cordem. in Rev. Gén. de Bot. xi. (1899) 415. *ORCHIDEAE.*
tenuifolia, *Cordem. l. c.* 416 (= *Angraecum tenuifolium*).—Bourbon.

LEPIAGALIA, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 340 = seq.

LEPIAGLAIA, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 334 = seq.

LEPIAGLIA, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 337 = seq.

LEPIDAGLAIA, Pierre, Fl. Cochinch. t. 334 (1896). *MELIACEAE.*
Bailloni, *Pierre, l. c.* t. 352 B.—Cochinch.
Montrouzieri, *Pierre, l. c.* 340 A (= *Aglaia Montrouzieri*).—Cochinch.
pyramidata, *Pierre, l. c.* t. 334 A (= *Aglaia pyramidata*).—Cochinch.
tetrapetala, *Pierre, l. c.* 337 A (= *Aglaia tetrapetala*).—Cochinch.

LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.).
ampliata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 123.—Afr. trop.
angustifolia, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
diversa, *C. B. Clarke, l. c.* 126.—Afr. trop.
fimbriata, *C. B. Clarke, l. c.* 125.—Afr. trop.
Fischeri, *C. B. Clarke, l. c.* 123.—Afr. trop.
justicioides, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 76.—Bolivia.
lanatoglabra, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 124.—Afr. trop.
longisepala, *C. B. Clarke, l. c.* 125.—Afr. trop.
perglabra, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
scabra, *C. B. Clarke, l. c.* 129.—Afr. trop.
sparsiceps, *C. B. Clarke, l. c.* 124.—Afr. trop.

LEPIDESMIA, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 479. *COMPOSITAE.*
squarrosa, *Klatt, l. c.*—Ind. occ.

LEPIDIUM, Linn. (Crucif.).
acutidens, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 64.—Am. bor.
Banksii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 35.—N. Zel.
Eastwoodiae, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 258.—Am. bor.
ferganense, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. (1898) 417.—Turkestan.
idahoense, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 312.—Am. bor.
pubicarpum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 189.—Am. bor.
ramosissimum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 124.—Am. bor.
ramosum, *A. Nelson, l. c.* 125.—Am. bor.
reticulatum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 64.—Am. bor.
simile, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 312.—Am. bor.
subalpinum, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 108.—Turkestan.
Thurberi, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 259.—Am. bor.

LEPIDOPETALUM, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
micans, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 423.—N. Guin.

LEPIDOPHYLLUM, Cass. (Compos.).
teretiusculum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 162.—Am. austr.

LEPIDOSPERMA, Labill. (Cyperac.).
Brehmeri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 113.—Afr. austr.
Dregei, *Boeck. l. c.*—Afr. austr.

LEPIRONIA, Rich. (Cyperac.).
compressa, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 78.—Hongkong.

LEPISANTHES, Blume (Sapind.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 428.—Ins. Andaman.
Kunstleri, *King, l. c.* 427.—Perak.
Scortechinii, *King, l. c.* 429.—Perak.

LEPISTEMON, Blume (Convolv.).
intermedius, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 31.—Formosa.

LEPTACTINA, Hook. f. (Rubiac.).
delagoensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 60.—Afr. austr.
euclinioides, *K. Schum. l. c.* xxiii. 431.—Afr. trop.

LEPTACTINA:—
formosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 431.—Afr. trop.
lanceolata, *K. Schum. l. c.* 433.—Afr. trop.
latifolia, *K. Schum. l. c.* 432.—Afr. trop.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 27.—Afr. trop.
oxyloba, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 488.—Afr. trop.

LEPTADENIA, R. Br. (Asclep.).
ephedriformis, *Deflers, Voy. Yemen*, 166.—Arab.

LEPTILON, Rafin. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
canadense, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 391 = E. canadensis.

LEPTOCARPUS, R. Br. (Restiac.).
brachiatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 9. —Afr. austr.
cymosus, *Mast. l. c.* 10.—Afr. austr.
divaricatus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.
festucaceus, *Mast. l. c.* 8.—Afr. austr.
fruticosus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.
rigidus, *Mast. l. c.* 10.—Afr. austr.
rigoratus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.

LEPTOCARYDION, Hochst. (Gramin.).
Vulpiastrum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 648.—Afr. austr.

LEPTOCHLOA, Beauv. (Gramin.).
aquatica, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 26.—Mexic.
bipinnata, Hochst. in Flora, xxxviii. 422 = Eragrostis cynosuroides.
chinensis, *Nees, in Syll. Ratisb.* i. 4.—Ind. or.
falcata, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 386 = Pogonarthria falcata.
filiformis, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 580.—Ind. or.
filiformis, Beauv. Agrost. 71 = cynosuroides.
grandiglumis, Nees, Fl. Afr. Austr. 252 = Crossotropis grandiglumis.
Halei, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 27 = Diplachne Halei.
Marlothii, Hack. in Engl. Jahrb. xi. 404 = Pogonarthria falcata.
monostachya, Roem. & Schult. Syst. ii. 580 = Chloris monostachya.
Neesii, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 108 = polystachya.
panicoides, Wight, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 62 = Arundinella leptochloa.
plumosa, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 557 = Leptocarydion Vulpiastrum.
spicata, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vii. 229 = Diplachne simplex.
wightiana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 209 = Myriostachya wightiana.

LEPTODERMIS, Wall. (Rubiac.).
mongolica, *Buhse, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. IV. 126, nomen.—Mongol.
Potanini, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 319.—China.

LEPTOLEPIS, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 31. *CYPERACEAE.*
tibetica, *Boeck. l. c.*—Tibet.

LEPTONYCHIA, Turcz. (Stercul.).
chrysocarpa, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 242.—Afr. trop.
echinocarpa, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
lasiogyne, *K. Schum. l. c.* 241.—Afr. trop.
macrantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
multiflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
pallida, *K. Schum. l. c.* 242.—Afr. trop.
subtomentosa, *K. Schum. l. c.* 241.—Afr. trop.
usambarica, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

LEPTORCHIS, Thou. (Orchid.).
vexillifera, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 300 = Liparis vexillifera.

LEPTORHABDOS, Schrenk (Scrophul.).
glutinosa, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 797.—Persia.

LEPTOSPERMUM, Forst. (Myrtac.).
Sinclairii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 158.—N. Zel.

LEPTOSTACHYA, Nees (Acanth.).
virens, Nees, in DC. Prod. xi. 378 = Rhinacanthus communis.

LEPTOSYNE, DC. (Compos.).
insularis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 5.—Mexic.

LEPTOTAENIA, Nutt. = **Ferula**, Tourn. (Umbellif.).
foliosa, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 198.—Am. bor.
humilis, Coult. & Rose, l. c. 200.—Am. bor.
Leibergii, Coult. & Rose, l. c. 202.—Am. bor.
salmoniflora, Coult. & Rose, l. c. 201 (= *Peucedanum salmoniflorum*).—Am. bor.

LEPTURUS, R. Br. (Gramin.).
aciculatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 357 = repens.
fasciculatus, Trin. Fund. Agrost. 123 = Rottboellia compressa.

LESPEDEZA, Michx. (Legum.).
diversifolia, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2625.—China.

LESQUERELLA, Wats. (Crucif.).
aurea, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 260.—Am. bor.
condensata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 238.—Am. bor.
curvipes, *A. Nelson, l. c.* 1898, 205.—Am. bor.
ovalifolia, *Rydb. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 137.—Am. bor.
prostrata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club.* 1899, 124.—Am. bor.
rosulata, *A. Nelson, l. c.* 1898, 205.—Am. bor.
spatulata, *Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 486.—Am. bor.
valida, *Greene, Pittonia*, iv. 68.—Am. bor.

LESSERTIA, DC. (Legum.).
Schlechteri, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 458.—Afr. austr.
stipulata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 430.—Afr. trop.

LESSINGIA, Cham. (Compos.).
hololeuca, *Greene, Fl. Francisc.* 377.—Calif.
parvula, *Greene, l. c.* 376.—Calif.
pectinata, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 548.—Am. bor.

LEUCADENDRON, Berg. (Proteac.).
aemulum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 113.—Afr. austr.
schinzianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
sericocephalum, *Schlechter, l. c.* 114.—Afr. austr.

LEUCADENDRON, Linn. = **Protea**, Linn. (Proteac.).
angolense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 917 = P. angolensis.
conchiforme, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 364 = P. conchiforme.
leucoblepharum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 919.—Afr. trop.
micans, Hiern, l. c. 918 = P. micans.
paludosum, Hiern, l. c. 919 = P. paludosa.
petiolare, Hiern, l. c. 920 = P. petiolaris.
Welwitschii, Hiern, l. c. 918 = P. Welwitschii.
xanthoconus, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 364 = P. xanthoconus.

LEUCAENA, Benth. (Legum.).
brachycarpa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 265.—Mexic.
glabrata, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
laxifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 266.—Mexic.
microcarpa, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
stenocarpa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 266.—Mexic.
trichandra, Urb. l. c. 267 = diversifolia.

LEUCAS, Burm. (Labiat.).
abyssinica, Briq. ex Guerke, in Engl. Jahrb. xxii. 136 = Lasiocorys abyssinica.
argyrophylla, Briq. l. c. 135 = Lasiocorys argyrophylla.
Bakeri, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 877.—Afr. trop.
Brownii, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 251 = indica.
Carsonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 487.—Afr. trop.

LEUCAS:—
cephalantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 475.—Afr. trop.
concinna, *Baker, l. c.* 481.—Afr. trop.
cuneifolia, *Baker, l. c.* 476.—Afr. trop.
decurvata, *Baker, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 876. —Afr. trop.
Descampsii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 59. —Afr. trop.
Eenii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 878 = Lasiocorys Eenii.
Elliotii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 477.—Afr. trop.
fasciculata, *Baker, l. c.* 487.—Afr. trop.
franchetiana, Guerke, in Engl. Jahrb. xxii. 135 = Lasiocorys argyrophylla.
indica, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1875, 95 = somaliensis.
Junodii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 109.—Afr. trop.
kondowensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 489.—Afr. trop.
lamioides, *Baker, l. c.* 484.—Afr. trop.
lanata, *Baker, l. c.* 481.—Afr. trop.
leucotricha, *Baker, l. c.* 486.—Afr. trop.
Mackinderi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 206.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 162.—Afr. trop.
megasphaera, *Baker, l. c.* 163.—Afr. trop.
menthaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 475.—Afr. trop.
microscypha, *Baker, l. c.* 477.—Afr. trop.
mollis, *Baker, l. c.* 489.—Afr. trop.
myriantha, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 163.—Afr. trop.
nepetoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 483.—Afr. trop.
paucicrenata, Vatke, in Linnaea, xliii. 98 = neufliseana.
Pechuelii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 477.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 464.—Afr. trop.
royleoides, Guerke, in Engl. Jahrb. xxii. 136 = Lasiocorys arabica.
shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 483.—Afr. trop.
stachydiformis, Briq. ex Guerke, in Engl. Jahrb. xxii. 136 = Lasiocorys stachydiformis.
stricta, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 484.—Afr. trop.
velutina, *C. H. Wright, ex Baker, l. c.* 488.—Afr. trop.
venulosa, *Baker, l. c.* 477.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, l. c.* 489.—Afr. trop.

LEUCELENE, Greene, Pittonia, iii. (1896) 147. *COMPOSITAE.*
alpina, Greene, Fl. Francisc. 384 = Aster scopulorum.
alsinoides, *Greene, Pittonia*, iv. 99.—Am. bor.
arenosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 8.—Am. bor.
ericoides, *Greene, Pittonia*, iii. 148 (= *Aplopappus ericoides*).—Calif.

LEUCERIA, Lag. (Compos.).
glomerulata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 378. —Reg. Argent.
gracilis, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 375.—Fuegia.
Hoffmanni, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 116.—Reg. Magell.
lanata, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 374.—Fuegia.
lanigera, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 115.—Reg. Magell.
leontopodioides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 378.—Patag.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 538. —Patag.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 372.—Peruv.

LEUCOBARLERIA, Lindau = **Neuracanthus**, Nees (Acanth.).
nivea, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 77 = N. Lindaui.
polyacantha, Lindau, l. c. = N. polyacanthus.
Robecchii, Lindau, l. c. 78 = N. Robecchii.

LEUCOCORYNE, Lindl. (Liliac.).
appendiculata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 270. —Chili.
connivens, *R. Phil. l. c.* 273.—Chili.

LEUCOCORYNE:—
coquimbensis, *F. Phil. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 273.—Chili.
foetida, *R. Phil. l. c.* 272.—Chili.
incrassata, *R. Phil. l. c.*—Chili.
montana, *R. Phil. l. c.* 269.—Chili.
oxypetala, *R. Phil. l. c.* 270.—Chili.
pauciflora, *R. Phil. l. c.* 269.—Chili.
violascens, *R. Phil. l. c.* 271.—Chili.

LEUCONOTIS, Jack (Apocyn.).
crassifolia, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 9.—Borneo.
gigantea, *Boerl. l. c.* 8.—Borneo.
intermedia, *Boerl. l. c.* 7.—Borneo.
subavenis, *Boerl. l. c.* 9.—Borneo.

LEUCOPHRYS, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 193 (1899). *GRAMINEAE.*
mesocoma, *Rendle, l. c.* 194 (=*Panicum mesocomum*).—Afr. trop.

LEUCOPOGON, R. Br. (Epacrid.).
Fletcheri, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 152.—Austral.
papuanus, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 104.—N. Guin.

LEUCOSPERMUM, R. Br. (Proteac.).
glaberrimum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 111.—Afr. austr.
lemmerzianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
stenanthum, *Schlechter, l. c.* 112.—Afr. austr.

LEUCOSPHAERA, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 152 (1897). *AMARANTACEAE.*
Bainesii, *Gilg, l. c.* 153.—Afr. austr.
Pfeilii, *Gilg, l. c.*; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 328.—Afr. austr.

LEUCOSYRIS, Greene, Fl. Francisc. 384 (1897). *COMPOSITAE.*
carnosa, *Greene, l. c.* (=*Aster carnosus*).—Am. bor. occ.
spinosa, *Greene, Pittonia*, iii. 244 (=*Aster spinosus*).—Am. bor.; Mexic.

LEUCOTHOË, D. Don (Ericac.).
elongata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 284.—Am. bor.

LEUCOTODON, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1900) 482, sphalm. = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

LEVISTICUM, Riv. (Umbell.).
caucasicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 271.—Reg. Caucas.
persicum, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 619.—Persia.

LEWISIA, Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. I. 266 (1897) = **Calandrinia**, H. B. & K. (Portul.).
columbiana, Robinson, l. c. 269 = C. columbiana.
Cotyledon, Robinson, l. c. 268 = C. Cotyledon.
Howellii, Robinson, l. c. = C. Howellii.
leana, Robinson, l. c. 269 = C. leana.
nevadensis, Robinson, l. c. 268 = C. nevadensis.
oppositifolia, Robinson, l. c. = C. oppositifolia.
pygmaea, Robinson, l. c. = C. pygmaea, *A. Gray.*
triphylla, Robinson, l. c. 269 = Claytonia triphylla.
Tweedyi, Robinson, l. c. 268 = C. Tweedyi.

LEYCESTERIA, Wall. (Caprifol.).
sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2633.—China.

LIABUM, Adans. (Compos.).
coriaceum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 58.—Ecuador.
cusalaguense, *Hieron. l. c.* 55.—Ecuador.
fulvotomentosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.
glandulosum, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
Hallii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 57.—Ecuador.
hirtum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.
nigropilosum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 59.—Ecuador.
nonoense, *Hieron. l. c.*—Ecuador.
pallatangense, *Hieron. l. c.* 60.—Ecuador.
pichinchense, *Hieron. l. c.* 56.—Ecuador.
pinnatipartitum, *Hieron. l. c.* 62.—Ecuador.
pinnulosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.

LIABUM:—
Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 61.—Ecuador.

LIATRIS, Schreb. (Compos.).
flabellata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 378 (=*Lacinaria flabellata*).—Am. bor.
laxa, *K. Schum. l. c.* (=*Lacinaria laxa*).—Am. bor.
microcephala, *K. Schum. l. c.* (=*Lacinaria microcephala*).—Am. bor.
Regimontis, *K. Schum. l. c.* (=*Lacinaria Regimontis*).—Am. bor.

LIBADION, Bub. Fl. Pyren. i. 539 (1897) = **Erythraea**, Renealm. (Gentian.).
maritimum, Bub. l. c. = E. maritima.
spiciferum, Bub. l. c. 542 = E. spicata.
variabile, Bub. l. c. 540 = E. Centaurium.

LICANIA, Aubl. (Rosac.).
araneosa, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 428.—Bras.
Ulei, *Taub. l. c.*—Bras.

LICUALA, Thunb. (Palm.).
Lauterbachii, *Damm. & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 199.—N. Guin.
montana, *Damm. & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.* 200.—N. Guin.
polyschista, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 199.—N. Guin.
robusta, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

LIDBECKIA, Berg. (Compos.).
integrifolia, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 840.—Afr. austr.

LIGHTFOOTIA, L'Hérit. (Campan.).
capitata, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 158.—Afr. trop.
corymbosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 188.—Afr. austr.
leptophylla, *C. H. Wright, in Hook. Ic. Pl.* t. 2659.—Afr. trop.

LIGUSTICUM, Linn. (Umbell.).
albomarginatum, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 212 = simplex.
apiodorum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 132.—Am. bor.
californicum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.
Cusickii, *Coult. & Rose, l. c.* 138.—Am. bor.
decipiens, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 205 (=*Angelica decipiens*).—N. Zel.
dissectum, *T. Kirk, l. c.* 202.—N. Zel.
flabellatum, *T. Kirk, l. c.* 205.—N. Zel.
Goldmani, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 146.—Mexic.
Leibergi, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 134.—Am. bor.
Nelsoni, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 147.—Mexic.
oreganum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 138.—Am. bor.
patulum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 203.—N. Zel.
politum, *T. Kirk, l. c.* 202.—N. Zel.
Pringlei, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 138.—Am. bor.
purpureum, *Coult. & Rose, l. c.* 137.—Am. bor.
simulans, *Coult. & Rose, l. c.* 135.—Am. bor.

LIGUSTRUM, Tourn. (Oleac.).
delavayanum, *Hariot, in Journ. de Bot.* 1900, 172.—China.
myrianthum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 533.—China.
patulum, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 156.—Korea.

LILAEOPSIS, Greene = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).
carolinensis, Coult. & Rose, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 48.—Am. bor.
chinensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 114 = C. lineata.
occidentalis, Coult. & Rose, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 48.—Am. bor.
schaffneriana, Coult. & Rose, l. c.—Am. cent.; Chili.

LILIUM, Tourn. (Liliac.).
apertum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 220.—China.
Bakerii, *Purdy, in Erythea*, v. 104.—Am. bor.
Brownii, *Poit. in Rev. Hortic.* Sér. II. ii. (1844) 496.—China.
Henrici, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 220.—China.

LILIUM:—
lophophorum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 221 (=*Fritillaria lophophora*).—China.
Masseyi, *Hyams, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 431.—Am. bor.
montanum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 6.—Am. bor.
occidentalis, *Purdy, in Erythea*, v. 103.—Am. bor.
odorum, Planch. Fl. des Serres, Sér. I. ix. 53. tt. 876–7 = Brownii.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 243.—China.
rubellum, *Baker, in Gard. Chron.* 1898, II. 321.—Japon.
villosum, *Cavara, in Malpighia*, xii. 445.—Italia.

LILLOA, Speg. Pl. Nov. Argent. iii. (1897) 10. *ARACEAE.*
Puki, *Speg. l. c.* 11.—Reg. Argent.

LIMACIA, Lour. (Menisperm.).
funifera, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 47 (=*Hypserpa funifera*).—Afr. trop.
monilifera, *Burkill, in Hook. Ic. Pl.* t. 2585.—Ins. Solomon.

LIMACIOPSIS, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 414. *MENISPERMACEAE.*
loangensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LIMEUM, Linn. (Ficoid.).
glaberrimum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 108 (non Pax).—Afr. austr.

LIMNANTHES, R. Br. (Geran.).
floccosa, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 108.—Am. bor.
gracilis, *Howell, l. c.*—Am. bor.
Macounii, *Trel. in Mem. Bost. Soc. Nat. Hist.* iv. 85.—Am. bor.
pumila, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 108.—Am. bor.

LIMNOCHARIS, Humb. & Bonpl. (Alismac.).
mattogrossensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 324.—Bras.

LIMNORCHIS, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 104. *ORCHIDEAE.*
dilatatiformis, *Rydb. l. c.* 105 (=*Habenaria dilatatiformis*).—Am. bor.
hyperborea, *Rydb. l. c.* 104 (=*Habenaria hyperborea*).—Eur.; Am. bor.
leucostachys, *Rydb. l. c.* 106 (=*Habenaria leucostachys*).—Am. bor. occ.
stricta, *Rydb. l. c.* 105 (=*Platanthera stricta*).—Am. bor.

LIMODORUM, Tourn. (Orchid.).
articulatum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 399 = Lissochilus purpuratus.
bidens, Afzel. ex Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1800, 243; Pers. Syn. ii. 521 = Listrostachys bidens.
cristatum, Afzel. ex Sw. l. c.; et Pers. l. c. = Lissochilus purpuratus.
cucullatum, Afzel. ex Sw. l. c.; et Pers. l. c. = Lissochilus arenarius.
emarginatum, Afzel. ex Sw. l. c.; et Pers. l. c. = Angraecum imbricatum.
imbricatum, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 87 = Mystacidium distichum.
multiflorum, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 23 (=*Calopogon multiflorus*).—Am. bor.
pallidum, *Mohr, l. c.* (=*Calopogon pallidus*).—Am. bor.

LIMONIA, Linn. (Rutac.).
gabunensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 190.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LIMONIUM, Tourn. = **Statice**, Linn. (Plumbag.).
angustatum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 488.—Am. bor.
californicum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = S. Limonium.
limbatum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 317.—Am. bor.
Nashii, Small, l. c. 1897, 491.—Am. bor.

LIMOSELLA, Linn. (Scrophul.).
longiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 235.—Afr. austr.
major, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 122.—Afr. austr.

LINARIA, Tourn. (Scrophul.).
aurata, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 167.—Hispan.
decipiens, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 322.—Afr. bor.
dolopica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 74.—Turcia.
fragilis, Bub. Fl. Pyren. i. 315 = multicaulis.
intricata, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1900, 109.—Hispan.
Jattae, *Palanza, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1899, 131.—Italia.
joppensis, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 612.—Oriens.
minuscula, *Merino, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxviii. 20.—Eur.
odoratissima, *Bub. Fl. Pyren.* i. 323.—Hispan.
olympica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 315.—Eur.
paradoxa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II. no. 7 (1898) 19.—Afr. bor.
Pellicieri, Bub. Fl. Pyren. i. 313 = pelisseriana.
proxima, *Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 829.—Hispan.
pseudoviscosa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II. no. 7 (1898) 21.—Afr. bor.
ruthenica, *Blonski, in Wszechswiat*, 1895, 347.—Eur.
segetum, Bub. Fl. Pyren. i. 312 = spuria.
thibetica, *Franch. in Bull Soc. Bot. Fr.* xlvii. 11.—China.
tzujarensis, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1897, 46.—Hispan.

LINDAUEA, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 411. *ACANTHACEAE.*
speciosa, *Rendle, l. c.* 412.—Afr. trop.

LINDERA, Adans. = **Myrrhis**, Scop. (Umbell.).
odorata, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 536 = M. odorata.

LINDERA, Thunb. (Laurac.).
bibracteata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 146 (= *Daphnidium bibracteatum*).—Java.
caudata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 352.—China.
cuspidata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Aperula cuspidata*).—Celebes.
densiflora, *Boerl. l. c.* (= *Aperula densiflora*).—Sumatra.
erythrocarpa, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1897, 219.—Japon.
gemmiflora, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Daphnidium gemmiflorum*).—Java.
grandis, *Boerl. l. c.* 146 (= *Polyadenia grandifolia*).—Java.
insignis, *Boerl. l. c.* 147 (= *Aperula insignis*).—Sumatra.
lanceolata, *Boerl. l. c.* (= *Aperula lanceolata*).—Java.
lucida, *Boerl. l. c.* (= *Polyadenia lucida*).—Arch. Mal.
macrophylla, *Boerl. l. c.* (= *Aperula macrophylla*).—Java.
pedunculata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 350.—China.
pipericarpa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Polyadenia pipericarpa*).—Sumatra.
polyantha, *Boerl. l. c.* (= *Polyadenia polyantha*).—Java.
puberula, *Boerl. l. c.* (= *Polyadenia puberula*).—Java.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 350.—China.
salicifolia, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Polyadenia salicifolia*).—Java.
Thunbergii, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1900, 184 = erythrocarpa.

LINDERNIA, All. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).
abyssinica, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 503.—Afr. trop.
Dinteri, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20, 27.—Afr. trop.
montana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 764.—Afr. trop.
Newtonii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 503.—Afr. trop.
senegalensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 763 = V. senegalensis.
uvens, Hiern, l. c.—Afr. trop.

LINDMANIA, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 535 (1896). *BROMELIACEAE.*
albicans, *Mez, l. c.* 537 (= *Cottendorfia albicans*).—Reg. Argent.
guyanensis, *Mez, l. c.* (= *C. guianensis*).—Guiana.
neogranatensis, *Mez, l. c.* 538 (= *C. neogranatensis*).—N. Granat.
Pearcei *Mez, l. c.* 537 (= *C. Pearcei*).—Am. austr. trop.
weddelliana, *Mez, l. c.* 538 (= *C. weddelliana*).—Bolivia.

LINGOUM, Adans. = **Pterocarpus**, Linn. (Legum.).
cambodianum, Pierre, Fl. Cochinch. t. 383 B = P. cambodianus.

LINGOUM:—
dalbergioides, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 383 = P. dalbergioides.
glaucinum, Pierre, l. c. = P. glaucinus.
gracile, Pierre, l. c. = P. gracilis.
oblongum, Pierre, l. c. = P. oblongus.
parvifolium, Pierre, l. c. = P. parvifolius.
pedatum, Pierre, l. c. = P. pedatus.

LINNAEA, Gronov. (Caprifol.).
adenotricha, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. 144 = Abelia adenotricha.
angustifolia, Graebn. l. c. 135 = Abelia angustifolia.
aschersoniana, *Graebn. l. c.* 139 (sphalm. *achersoniana*).—China.
Buchwaldii, *Graebn. l. c.* 133.—Japon.
corymbosa, Graebn. l. c. 136 = Abelia corymbosa.
Dielsii, *Graebn. l. c.* 140.—China.
engleriana, *Graebn. l. c.* 132.—China.
gymnocarpa, *Graebn. & Buchw. ex Graebn. l. c.* 134.—Japon.
koehneana, *Graebn. l. c.* 132.—China.
macrotera, *Graebn. & Buchw. ex Graebn. l. c.* 131.—China.
onkocarpa, *Graebn. l. c.* 140.—China.
parvifolia, Graebn. l. c. 129 = Abelia parvifolia.
Schumannii, *Graebn. l. c.* 130.—China.
serrata, Graebn. l. c. 133 = Abelia uniflora.
spathulata, Graebn. l. c. 142 = Abelia spathulata.
tereticalyx, *Graebn. & Buchw. ex Graebn. l. c.* 130.—China.
umbellata, *Graebn. & Buchw. ex Graebn. l. c.* 143.—China.
Zanderi, *Graebn. l. c.* 142.—China.

LINNAEOPSIS, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 483. *GESNERACEAE.*
heckmanniana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LINOCIERA, Sw. (Oleac.).
ferruginea, *Gilg, ex Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 35.—Bras.
Glaziovii, *Gilg, l. c.*—Bras.
pallida, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 497.—N. Guin.

LINOPHYLLUM, Bub. Fl. Pyren. i. 125 (1897) = **Thesium**, Linn. (Santal.).
alpinum, Bub. l. c. = T. alpinum.
Clusii, Bub. l. c. 127 = T. intermedium.
divaricatum, Bub. l. c. = T. divaricatum.
humifusum, Bub. l. c. = T. humifusum.
pratense, Bub. l. c. 126 = T. pratense.

LINOSPADIX, Becc. (Palm.).
hellwigiana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 206.—N. Guin.
petrickiana, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1898, II. 298, fig. 87.—Hab. ?

LINOSTYLIS, Fenzl = **Dyschoriste**, Nees (Acanth.).
fasciculiflora, Fenzl, ex Sond. in Linnaea, xxiii. 95 = D. Perrottetii.
ovata, Sond. l. c. 94 = D. depressa.

LINUM, Tourn. (Linac.).
australe, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 627.—Am. bor.
bithynicum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 167.—Turcia.
medium, *Britton, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 349.—Am. bor.
Petryi, *Beyer, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xl. p. xci.—Eur.
puberulum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 627.—Am. bor.
vernale, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 452.—Am. bor.
Vernalii, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 354, sphalm. = praec.

LIPARIS, Rich. (Orchid.).
araneola, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 265.—Borneo.
assamica, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 36.—Ind. or.
comosa, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 229.—Penins. Mal.
furcata, Ridley, l. c. 226 = Microstylis furcata.
hemipilioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 341.—Afr. trop.

LIPARIS:—
Henryi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—Formosa.
Maingayi, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 226 = Microstylis Maingayi.
morobulana, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 337, sphalm. = seq.
mowbulana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 197.—Austral.
Nugentae, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 11.—Austral.
odorata, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 26 = nervosa.
paradoxa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 218 = nervosa.
parvula, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 226 = Microstylis parvula.
pauciflora, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—China.
pectinifera, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 210.—Malaya.
pothoides, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 478.—N. Granat.
Prazeri, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 582.—Burma.
pygmaea, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 34.—Reg. Himal.
rufina, *Reichb. f. ex Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 19.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *Rolfe, l. c.* 20.—Afr. trop.
transtillata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 225.—Penins. Mal.
tridens, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 162.—Afr. trop.

LIPPIA, Houst. (Verben.).
affinis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 339 (non Schau.).—Urug.
Burtonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 281.—Afr. trop.
caespitosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 106.—Bolivia.
crenata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 251.—Reg. Argent.
floribunda, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 237 (non Phil.).—N. Granat.
geisseana, *Solered. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 624 (= *Buddleia geisseana*).—Chili.
globiflora, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 251 = asperifolia.
hypoleia, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 236.—Mexic.
imbricata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 252.—Bolivia.
juncea, Schau. in DC. Prodr. xi. 573 = Diostea juncea.
Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 239.—Mexic.
lippioides, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 106 = Lantana Chamissonis.
longepedunculata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 253.—Parag.
Morongii, *Kuntze, l. c.*—Parag.
myriocephaloides, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 235.—Mexic.
plicata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 281.—Afr. trop.
Pringlei, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 340.—Mexic.
Radula, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 279.—Afr. trop.
suffruticosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 253.—Reg. Argent.
triphylla, Kuntze, l. c. = citriodora.
Vauthieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 234.—Bras.
venezuelana, *Briq. l. c.* 238.—Venez.
villafloridana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 253.—Parag.

LIQUIDAMBAR, Linn. (Hamamel.).
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 380.—China.

LIRAYEA, Pierre, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. ii. (1896) 341. *ACANTHACEAE.*
floribunda, *Pierre, l. c.* 342.—Afr. trop.

LISIANTHUS, Linn. (Gentian.).
pulcherrimus, *Donn. Sm. in Pittier, Prim. Fl. Costaric.* ii. 166 (non Mart.).—Am. cent.

LISSOCHILUS, R. Br. (Orchid.).
amazonicus, Rodr. Orch. Nov. i. 89 = Eulophia Woodfordii.
Bouliawongo, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 188.—Afr. trop.
candidus, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
Carsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 90.—Afr. trop.
congoensis, *Rolfe, l. c.* 88.—Afr. trop.
elatus, *Rolfe, l. c.* 87.—Afr. trop.
Erythraeae, *Rolfe, l. c.* 91.—Afr. trop.
Holubii, *Rolfe, l. c.* 96.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, l. c.* 97.—Afr. trop.
Kirkii, *Rolfe, l. c.* 92.—Afr. trop.
Kraenzlinii, *Rolfe, l. c.* 97.—Afr. trop.
latus, *Rolfe, l. c.* 79.—Afr. trop.

LISSOCHILUS:—
Leopoldi, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 61.—Afr. trop.
Millsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 79.—Afr. trop.
Monteiroi, *Rolfe, l. c.* 83.—Afr. trop.
Nyasae, *Rolfe, l. c.* 86.—Afr. trop.
Rendlei, *Rolfe, l. c.* 96.—Afr. trop.
Smithii, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
Thomsoni, *Rolfe, l. c.* 97.—Afr. trop.
verrucosus, *Rolfe, l. c.* 76.—Afr. trop.
Volkensii, *Rolfe, l. c.* 94.—Afr. trop.
Wilsoni, *Rolfe, l. c.* 79.—Afr. trop.

LISTERA, R. Br. (Orchid.).
alternifolia, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 126.—Reg. Himal.
auriculata, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 166.—Am. bor.
brevicaulis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 126.—Reg. Himal.
caurina, *Piper, in Erythea*, vi. 32.—Am. bor.
dentata, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 257.—Reg. Himal.
grandiflora, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
lindleyana, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 258 = Neottia listeroides.
longicaulis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 126.—Reg. Himal.
nephrophylla, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 108.—Am. bor.
reniformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 334 (non D. Don).—Am. bor.
retusa, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 155.—Am. bor.
Smallii, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 169.—Am. bor.

LISTROSTACHYS, Reichb. f. (Orchid.).
acuminata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 154.—Afr. trop.
acuta, *Rolfe, l. c.* 159.—Afr. trop.
ashantensis, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
Batesii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 167.—Afr. trop.
bidens, *Rolfe, l. c.* 160.—Afr. trop.
bistorta, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. trop.
capitata, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 190.—Afr. trop.
caudata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 907.—Afr. trop.
chailluana, *Reichb. f. in Flora*, 1885, 381.—Afr. trop.
clandestina, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 161.—Afr. trop.
durandiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 65.—Afr. trop.
Erythraeae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 155.—Afr. trop.
gabonensis, *Rolfe, l. c.* 161.—Afr. trop.
glomerata, *Rolfe, l. c.* 166.—Afr. trop.
henriquesiana, *Rolfe, l. c.* 157.—Afr. trop.
Hookeri, *Rolfe, l. c.* 154.—Afr. trop.
iridifolia, *Rolfe, l. c.* 167.—Afr. trop.
Kirkii, *Rolfe, l. c.* 164.—Afr. trop.
monodon, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
multiflora, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 162.—Afr. trop.
muscicola, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. trop.
mystacidioides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 170.—Afr. trop.
pellucida, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
pertusa, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. 930.—Afr. trop.
pulchella, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 374.—Afr. trop.
rhipsalisocia, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 158.—Afr. trop.
Sedeni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1878, I. 138.—Afr. trop.
subclavata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 160.—Afr. trop.
subulata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 909.—Afr. trop.
thomensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 163.—Afr. trop.
thonneriana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 64.—Afr. trop.
tridens, Reichb. f. in Flora, 1865, 190 = Mystacidium tridens.
vagans, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 162.—Afr. trop.

LISTROSTACHYS:—
vesicata, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 190.—Afr. trop.
Virgula, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 165.—Afr. trop.
Whytei, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. trop.
Wittmackii, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. trop.

LITHOPHILA, Sw. (Amarant.).
vermiculata, Uline, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 39 (= *Gomphrena vermicularis*).—Ind. occ.

LITHOPHRAGMA, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br. (Saxifr.).
campanulata, Howell, Fl. N. W. Amer. 200.—Am. bor.

LITHOSPERMUM, Tourn. (Borag.).
albicans, *Greene, Pittonia*, iv. 91.—Am. bor.
asperum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 244.—Am. bor.
borneensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 488 (= *Havilandia borneensis*).—Borneo.
Chazaliei, *H. Boissieu, in Journ. de Bot.* 1896, 220.—Afr. trop.
ciliolatum, *Greene, Pittonia*, iv. 92.—Am. bor.
guatemalense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 436.—Am. cent.
hancockianum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2457.—China.
lanceolatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 333.—Am. bor.
laxum, *Greene, Pittonia*, iii. 263.—Am. bor.
luteum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 151.—Graecia.
oblongifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 300.—Mexic.
oblongum, *Greene, Pittonia*, iv. 92.—Am. bor.
Zahnii, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. (1899) 190.—Graecia.

LITOSANTHES, Blume (Rubiac.).
leucocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 586.—N. Guin.

LITSEA, Lam. (Laurac.).
accedens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 145 (= *Cylicodaphne accedens*).—Borneo.
areolata, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera areolata*).—N. Guin.
bancana, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera bancana*).—Ins. Banca.
bandongana, Boerl. l. c. = Noronhae.
borneensis, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera borneensis*).—Borneo.
brachystachya, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera brachystachya*).—Java.
Brawas, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera Brawas*).—Sumatra.
calicaris, *Kirk, For. Fl. N. Zeal.* 15, t. 10 (= *Tetranthera calicaris*).—N. Zel.
caloneura, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera caloneura*).—Java.
calophyllantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 331.—N. Guin.
chrysophoena, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera chrysophoena*).—Ins. Molucc.
chrysopleura, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera chrysopleura*).—Java.
costata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne costata*).—Arch. mal.
crassifolia, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera crassifolia*).—Borneo.
cuneata, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera cuneata*).—Celebes.
cuneata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne cuneata*).—Sumatra.
cuspidata, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera cuspidata*).—Java.
flexuosa, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera flexuosa*).—Ins. Molucc.
Fo, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 332.—N. Guin.
Forstenii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 142 (= *Tetranthera Forstenii*).—Celebes.
fusca, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne fusca*).—Sumatra.
gemelliflora, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera gemelliflora*).—Sumatra.
grisea, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne grisea*).—Sumatra.
hirta, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne hirta*).—Java.

LITSEA:—
impressa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera impressa*).—Java.
insignis, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera insignis*).—Sumatra.
intermedia, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera intermedia*).—Java.
lucida, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera lucida*).—Java.
magnifica, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne magnifica*).—Sumatra.
mappacea, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera mappacea*).—Java; Sumatra.
Mogol, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera Mogol*).—Java.
mollis, *Boerl. l. c* 141 (= *Tetranthera mollis*, Blume).—Java.
mollis, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne mollis*).—Java.
neesiana, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne neesiana*).—Penins. Mal.
nigricans, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera nigricans*).—Borneo.
nitens, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera nitens*).—Java.
obscura, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera obscura*).—N. Guin.
obtusata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne obtusata*).—Java.
obtusifolia, Boerl. l. c. 145 = obtusa.
ochracea, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne ochracea*).—Sumatra.
pallida, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera pallida*).—Celebes.
pallida, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne pallida*).—Malaya.
Pantjara, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera Pantjara*).—Java; Sumatra.
polyneura, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne polyneura*).—Java.
propinqua, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera propinqua*).—Sumatra.
punctata, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne punctata*).—Borneo.
riparia, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera riparia*).—Ins. Molucc.
rubiginosa, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne rubiginosa*).—Sumatra.
Rumphii, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera Rumphii*).—Ins. Molucc.
sessilis, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne sessiliflora*).—Borneo.
sumatrana, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne sumatrana*).—Sumatra.
tephrophylla, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne tephrophylla*).—Java.
tuberculata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne tuberculata*).—Sumatra.
unita, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne unita*).—Ins. Molucc.
utilis, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera utilis*).—Borneo.
varians, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera varians*).—Sumatra.
velutina, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne velutina*).—Java.
virens, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera virens*).—Penins. Mal.
waitziana, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera waitziana*).—Java; Sumatra.
xantophylla, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera xanthophylla*).—Sumatra.

LITTLEDALEA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2472 (1896). *GRAMINEAE.*
tibetica, *Hemsl. l. c.*—Tibet.

LITTONIA, Hook. (Liliac.).
Lindeni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 566.—Afr. trop.

LIVISTONA, R. Br. (Palm.).
Woodfordi, *Ridley, in Gard. Chron.* 1898. I. 177.—Polynes.

LLOYDIA, Salisb. (Liliac.).
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 193.—China.
filiformis, *Franch. l. c.* 192.—China.
oxycarpa, *Franch. l. c.*—China.
szechenyiana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. II. 11 = Gagea pauciflora.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 192.—China.

LOASA, Adans. (Loasac.).
acaulis, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 186. —Chili.
acutiloba, *Urb. & Gilg, l. c.* 160.—Chili.
alpina, Urb. & Gilg, l. c. 173 = artemisiifolia.
alpina, *Urb. & Gilg, l. c.* 197 (non l. c. 173).—Ecuador.
amabilis, *Urb. & Gilg, l. c.* 176.—Reg. Argent.
aphanantha, *Urb. & Gilg, l. c.* 137.—Chili.
argentina, *Urb. & Gilg, l. c.* 174.—Reg. Argent.
artemisiifolia, *Poepp. ex Urb. & Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VI A. 117.—Chili.
aurantiaca, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 209.—Ecuador.
bipinnata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 7.—Am. cent.
Bridgesii, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 165.—Chili.
carunculata, *Urb. & Gilg, l. c.* 243.—Peruv.
chillana, *Urb. & Gilg, l. c.* 167.—Chili.
dolichostemon, *Urb. & Gilg, l. c.* 215.—N. Granat.
Dyeri, *Urb. & Gilg, l. c.* 242.—Ecuador.
ferruginea, *Urb. & Gilg, l. c.* 225.—Peruv.
fulva, *Urb. & Gilg, l. c.* 224.—Peruv.
gayana, *Urb. & Gilg, l. c.* 183.—Chili.
grandifolia, *Urb. & Gilg, l. c.* 208.—N. Granat.
humboldtiana, *Urb. & Gilg, l. c.* 240.—Ecuador.
inconspicua, *Urb. & Gilg, l. c.* 221.—Peruv.
karsteniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 244.—N. Granat.
lehmanniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 213.—N. Granat.
leiolepis, *Urb. & Gilg, l. c.* 230.—Peruv.
lindeniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 194.—Venez.
magnifica, *Urb. & Gilg, l. c.* 204 (non Warscz.)—Peruv.
paradoxa, *Urb. & Gilg, l. c.* 156.—Chili.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 521. —Patag.
patagonica, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 163 (non Speg.).—Patag.
peltata, *Spruce, ex Urb. & Gilg, l. c.* 205.—Peruv.
petrophila, *Urb. & Gilg, l. c.* 169.—Reg. Argent.
poeppigiana, *Urb. & Gilg, l. c.* 159.—Chili.
poissoniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 226.—Peruv.
sigmoidea, *Urb. & Gilg, l. c.* 155.—Chili.
speciosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 8.—Am. cent.
stuebeliana, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 228.—Peruv.
Trianae, *Urb. & Gilg, l. c.* 212.—N. Granat.
tripartita, *Urb. & Gilg, l. c.* 171.—Chili.
uleana, *Urb. & Gilg, l. c.* 255.—Bras.
unguiculata, *Urb. & Gilg, l. c.* 162.—Chili.

LOBELIA, Plum. (Campan.).
angolensis, *Engl. & Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 114.—Afr. trop.
benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 626.—Afr. trop.
bicalcarata, *A. Zahlbr. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 186.—Chili.
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 156.—Afr. trop.
capillipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 448.—Afr. austr.
chilawana, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 70.—Afr. austr.
cochlearifolia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 117.—Afr. austr.
decurrentifolia, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 373.—Afr. austr.
djurensis, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
dobrowskioides, *Diels, l. c.* 117.—Afr. austr.
douglasiana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 228.—Austral.
fasciculata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 338. —Am. cent.
Fawcettii, *Urb. Symb. Antill.* i. 452.—Ind. occ.
flaccidifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 338.—Am. bor.
galeopsoides, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 118.—Afr. trop.
glaucoleuca, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 449.—Afr. austr.
Goetzei, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxviii. 501.—Afr. trop.
gracillima, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 625. —Afr. trop.
guadeloupensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 454.—Ind. occ.
hirtella, *Greene, Pittonia*, iii. 349.—Am. bor.
intertexta, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.

LOBELIA:—
kauaensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 911.—Ins. Sandw.
laurentioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 196. —Afr. austr.
lythroides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 113.—Afr. austr.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.
pedicellata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 453.—Ind. occ.
pusilla, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 626 (non aliorum).—Afr. trop.
spathopetala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 115.—Madag.
squarrosa, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.
stolonifera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 338. —Am. cent.
tarsophora, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 489. —Mexic.
thomensis, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 114.—Afr. trop.
tortuosa, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 912. —Ins. Sandw.
vanreenensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 373. —Afr. austr.
Welwitschii, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
wilmsiana, *Diels, l. c.* 115.—Afr. austr.

LOBOGYNE, Schlechter, in Mém. Herb. Boiss. no. 21, 85 (1900). *ORCHIDEAE.*
bracteosa, *Schlechter, l. c.* (= *Appendicula bracteosa*).—Polynes.

LOBOSTEMON, Lehm. (Borag.).
sanguineus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 450.—Afr. austr.

LODICULARIA, Beauv. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 128 = R. compressa.
fasciculata, Beauv. Agrost. 108 = R. compressa.
hamiltoniana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 358 = R. protensa.
laxa, Nees, l. c. = R. compressa.
peruviana, Meyen, Reise, ii. 71 = R. compressa.

LOESELIA, Linn. (Polemon.).
cordifolia, *Hemsl. & Rose, in Hook. Ic. Pl.* t. 2551.—Mexic.
intermedia, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 567.—Am. cent.

LOESENERA, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 197 (1897). *LEGUMINOSAE.*
kalantha, *Harms, l. c., et in Engl. Jahrb.* xxvi. 268.—Afr. trop.

LOEWIA, Urb. in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. (1896) 189. *TURNERACEAE.*
glutinosa, *Urb. l. c.*—Afr. trop.
tanaensis, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 2.—Afr. trop.

LOLIUM, Linn. (Gramin.).
italicum, A. Br. in Flora, 1834, 259 = perenne.
multiflorum, Lam. Fl. Fr. iii. 621 = perenne.

LOMATIUM, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
alatum, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 228.—Am. bor.
ambiguum, Coult. & Rose, l. c. 212 = P. ambiguum.
anomalum, Jones, ex Coult. & Rose, l. c. 237.—Am. bor. occ.
argense, Coult. & Rose, l. c. 234 = P. argense.
Austinae, Coult. & Rose, l. c. 236 = P. Austinae.
bicolor, Coult. & Rose, l. c. 237 = P. bicolor.
brevifolium, Coult. & Rose, l. c. 232.—Am. bor. occ.
Canbyi, Coult. & Rose, l. c. 210 = P. Canbyi.
caruifolium, Coult. & Rose, l. c. 216 = P. caruifolium.
circumdatum, Coult. & Rose, l. c. 213 = P. circumdatum.
Congdoni, Coult. & Rose, l. c. 232.—Calif.
Cous, Coult. & Rose, l. c. 214 = P. Cous.
Cusickii, Coult. & Rose, l. c. 226 = P. Cusickii.
dasycarpum, Coult. & Rose, l. c. 218 = P. dasycarpum, *Torr. & Gray.*
daucifolium, Coult. & Rose, l. c. 221.—Am. bor.
Donnellii, Coult. & Rose, l. c. 231 = P. Donnellii.
ellipticum, Coult. & Rose, l. c. 217.—Calif.
farinosum, Coult. & Rose, l. c. 210 = P. farinosum.
foeniculaceum, Coult. & Rose, l. c. 222 = P. foeniculaceum.
Geyeri, Coult. & Rose, l. c. 209 = P. Geyeri.

LOMATIUM:—
giganteum, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 240.—Calif.
Gormani, Coult. & Rose, l. c. 208 = P. Gormani.
Grayi, Coult. & Rose, l. c. 229 = P. Grayi.
Hallii, Coult. & Rose, l. c. 224 = P. Hallii.
Hendersonii, Coult. & Rose, l. c. 209 = P. Hendersonii.
Jonesii, Coult. & Rose, l. c. 233.—Am. bor. occ.
juniperinum, Coult. & Rose, l. c. 235 = P. juniperinum.
laevigatum, Coult. & Rose, l. c. 225.—Am. bor.
Leibergi, Coult. & Rose, l. c. 224.—Am. bor. occ.
Lemmoni, Coult. & Rose, l. c. 231 = P. Lemmoni.
leptocarpum, Coult. & Rose, l. c. 213.—Am. bor.
Macdougali, Coult. & Rose, l. c. 233.—Am. bor. occ.
macrocarpum, Coult. & Rose, l. c. 217 = P. macrocarpum.
marginatum, Coult. & Rose, l. c. 223.—Am. bor.
Martindalei, Coult. & Rose, l. c. 225 = P. Martindalei.
microcarpum, Coult. & Rose, l. c. 230 = P. microcarpum.
mohavense, Coult. & Rose, l. c. 234 = P. mohavense.
montanum, Coult. & Rose, l. c. 214.—Am. bor. occ.
nevadense, Coult. & Rose, l. c. 220 = P. nevadense.
nudicaule, Coult. & Rose, l. c. 238 = P. nudicaule.
oreganum, Coult. & Rose, l. c. 224 = P. oreganum.
orientale, Coult. & Rose, l. c. 220.—Am. bor.
Parishii, Coult. & Rose, l. c. 235 = P. Parishii.
Piperi, Coult. & Rose, l. c. 211.—Am. bor. occ.
platycarpum, Coult. & Rose, l. c. 226 = P. simplex.
platyphyllum, Coult. & Rose, l. c. 238.—Am. bor. occ.
Plummerae, Coult. & Rose, l. c. 232 = P. Plummerae.
robustius, Coult. & Rose, l. c. 228.—Am. bor. occ.
Sandbergii, Coult. & Rose, l. c. 230 = P. Sandbergii.
Sonnei, Coult. & Rose, l. c. 236.—Am. bor. occ.
Suksdorfii, Coult. & Rose, l. c. 239 = P. Suksdorfii.
tomentosum, Coult. & Rose, l. c. 219 = P. dasycarpum, *Torr. & Gray.*
Torreyi, Coult. & Rose, l. c. 229 = P. Torreyi.
triternatum, Coult. & Rose, l. c. 227 = P. triternatum, *Nutt.*
utriculatum, Coult. & Rose, l. c. 215 = P. utriculatum.
vaginatum, Coult. & Rose, l. c. 223.—Am. bor.
Vaseyi, Coult. & Rose, l. c. 216 = P. Vaseyi.
Watsoni, Coult. & Rose, l. c. 211 = P. Watsoni.

LONCHOCARPUS, H. B. & K. (Legum.).
comosus, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 69.—Afr. trop.
crassifolius, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 299.—Afr. trop.
deguelioides, *Harms, l. c.* 300.—Afr. trop.
Dewevrei, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 68.—Afr. trop.
eetveldeanus, *Micheli, l. c.* 67.—Afr. trop.
glaucifolius, *Urb. Symb. Antill.* i. 326.—Ind. occ.
macrothyrsus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 300.—Afr. trop.
Staudtii, *Harms, l. c.* 301.—Afr. trop.
Zenkeri, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 193.—Afr. trop.

LONCHOSTOMA, Wikstr. (Bruniac.).
quadrifidum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 343. —Afr. austr.

LONICERA, Linn. (Caprifol.).
adenophora, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 311.—China.
calcarata, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2632.—China.
cyanocarpa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 314.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 310.—China.
ebractulata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 372. —Am. bor.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 312.—China.
formanekiana, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 473.—Maced.
glaucescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 90. —Am. bor.
infundibulum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 315.—China.
majoricensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 136.—Eur.
retusa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 313.—China.
setifera, *Franch. l. c.* 314.—China.
stenosiphon, *Franch. l. c.* 318.—China.
stephanocarpa, *Franch. l. c.* 316.—China.
tatsienensis, *Franch. l. c.* 313.—China.
trichopoda, *Franch. l. c.* 317.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 310.—China.

LOPHACME, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 316 (1898). *GRAMINEAE.*
digitata, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2611.—Afr. austr.

LOPHANTHUS, Adans. = **Nepeta**, Linn. (Labiat.).
schtschurowskianus, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 93 = N. schtschurowskiana.

LOPHANTHUS, Benth. (Labiat.).
Cusickii, *Greenm. in Erythea*, vii. 119.—Am. bor.
occidentalis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 387. —Am. bor.

LOPHATHERUM, Brongn. (Gramin.).
dubium, Steud. Syn. Pl. Gram. 300 = gracile.
elatum, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 102 = gracile.
japonicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 300 = gracile.
Lehmanni, Nees, ex Steud. l. c. = gracile.
multiflorum, Steud. l. c. = gracile.
zeylanicum, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 303.—Zeylan.

LOPHOCARPUS, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 110. *CYPERACEAE.*
Bonia, *Boeck. l. c.*—Hab.?
bonianus, Boeck. l. c. p. viii = praec.
tonquinensis, *Boeck. l. c.* 111.—Tonkin.

LOPHOPETALUM, Wight (Celastr.).
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 351.—Penins. Mal.
oblongifolium, *King, l. c.*—Penins. Mal.
oblongum, *King, l. c.* 350.—Penins. Mal.
pachyphyllum, *King, l. c.* 348.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 350.—Penins. Mal.
subobovatum, *King, l. c.* 349.— Penins. Mal.
toxicum, *Loher, in Ic. Bogor.* t. 16.—Malaya.

LOPHOPHORA, Hennings (Cactac.).
Lewinii, *C. H. Thompson, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 133 (= *Anhalonium Lewinii*).—Mexic.

LOPHOPOGON, Hack. (Gramin.).
Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 149.—Ind. or.

LOPHOSTACHYS, Pohl (Acanth.).
conferta, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 103.—Bolivia.
pubiflora, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 655.—Bras.

LOPHOSTIGMA, Radlk. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 228. *SAPINDACEAE.*
plumosum, *Radlk. l. c.*—Bolivia.

LOPHOTOCARPUS, Dur. (Alismac.).
californicus, *J. G. Sm. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 146.—Calif.
depauperatus, *J. G. Sm. l. c.* 148.—Am. sept.
fluitans, *J. G. Sm. l. c.* 145.—N. Mexic.
spatulatus, *J. G. Sm. l. c.* 149.—Am. sept.
spongiosus, *J. G. Sm. l. c.* 148.—Am. sept.

LORANTHUS, Linn. (Loranth.).
acuminatus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Coleobotrys acuminata*).—Java.
acutifolius, *Engl. l. c.* 127 (= *Neophylum acutifolium*). —N. Caled.
acutus, *Engl. l. c.* 128 (= *Stemmatophyllum acutum*). —Ins. Philipp.
adpressus, *Engl. l. c.* (= *Leucobotrys adpressa*).—Tonkin.
alatus, *Engl. l. c.* (= *Coleobotrys alata*).—Sumatra.
Albertisii, *Engl. l. c.* 129 (= *Diplatia Albertisii*).—N. Guin.
Amylo-Zollingerii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 163 (= *Elytranthe Zollingerii*).—Java.
andamanicus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Phoenicanthemum Kingii*).—Ins. Andaman.
arabicus, *Deflers, Voy. Yemen*, 197.—Arab.
aucklandicus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Ileostylus Kirkii*).—N. Zel.
Balansae, *Engl. l. c.* 128 (= *Dithecina Balansae*).—Tonkin.
balansaeanus, *Engl. l. c.* 127 (= *Neophylum Balansae*). —N. Caled.
Bamleri, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.

LORANTHUS :—
Baratra-Beccarii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 162 (= *Baratranthus Beccarii*).—Borneo.
Baratra-Scortechinii, *Boerl. l. c.* (= *Baratranthus Scortechinii*).—Penins. Mal.
Barthei, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 129 (= *Candollina Barthei*).—Ind. or.
Beccarii, *Engl. l. c.* 128 (= *Stemmatophyllum Beccarii*). —Borneo.
berliniicola, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 382.—Afr. trop.
bicolor, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum bicolor*).—N. Caled.
bipindensis, *Engl. l. c.* 132.—Afr. trop.
blumeanus, *Engl. l. c.* 128 (= *Lanthorus blumeanus*). —Java.
borneensis, *Engl. l. c.* (= *Chiridium Beccarii*).—Borneo.
bumbensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 933.—Afr. trop.
capitatus, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 131 = Soyauxii.
celebicus, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 39.—Celebes.
cinnameus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 930.—Afr. trop.
combretoides, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Sycophila combretoides*).—Afr. trop.
Commiphorae, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 380.—Afr. trop.
coronatus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 133 (= *Acrostephanus coronatus*).—Afr. trop.
crassicaulis, *Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 30.—Afr. trop.
cubeboides, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club.* 1900, 135. —Bolivia.
cumingianus, *Engl. ex Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Stemmatophyllum Cumingii*). —Ins. Philipp.
Cumingii, *Engl. l. c.* (= *Lanthorus Cumingii*).—Ins. Philipp.
Deflersii, *Engl. l. c.* 133 (= *Odontella Deflersii*).—Arab.
Demeusii, *Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 29.—Afr. trop.
Descampsii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 132; *et ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 25.—Afr. trop.
discolor, *Engl. l. c.* 131; *et ex Th. Dur. & Wildem. l. c.* 26.—Afr. trop.
discolor, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 52 (non Engl.).—Afr. trop.
Doberae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 151.—Arab.
Durandii, *Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 27.—Afr. trop.
elegantissimus, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 52.—Afr. trop.
Engleri, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 930.—Afr. trop.
Fleckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 53. —Afr. trop.
Ghikae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 200.—Afr. trop.
grandifolius, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum grandifolium*).—N. Caled.
heckmannianus, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 384.—Afr. trop.
hexasepalus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 131 (= *Thelecarpus hexasepalus*).—Afr. trop.
inaequilaterus, *Engl. l. c.* 132; *et in Engl. Jahrb.* xxviii. 384.—Afr. trop.
inflatus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Leucobotrys inflata*).—Tonkin.
irregularis, *Engl. l. c.* (= *Stemmatophyllum irregulare*). —Borneo.
kalachariensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 53.—Afr. austr.
Kingii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 129 = kingianus.
kisantuensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 43.—Afr. trop.
lanceolatifolius, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum lanceolatum*).—N. Caled.
latifolius, *Engl. l. c.* (= *Neophylum latifolium*).—N. Caled.

LORANTHUS :—
Laurentii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 132; *et ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 25.—Afr. trop.
Lauterbachii, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 299.—N. Guin.
Lecomtei, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 132 (= *Stephaniscus Lecomtei*).—Afr. trop.
longissimus, *Engl. l. c.* 128 (= *Chiridium longissimum*).—Sumatra.
Loxa-Beccarii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 165 (= *Loxanthera Beccarii*).—Borneo.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 55.—Afr. trop.
lukwangulensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 383.—Afr. trop.
lunduensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 129 (= *Baratranthus acuminatus*).—Borneo.
luteus, *Engl. l. c.* 127 (= *Neophylum luteum*).—N. Caled.
micrantherus, *Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 28.—Afr. trop.
miniatus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 170.—Austral.
Nestor, *S. Moore, l. c.*—Austral.
nodosus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Stemmatophyllum nodosum*).—Ins. Philipp.
orientalis, *Engl. l. c.* 131 (= *Oliverella Sacleuxii*).—trop.
oxycladus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.
pachypus, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 109.—N. Guin.
Pancheri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum Pancheri*).—N. Caled.
Pentheri, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 376.—Afr. austr.
perakensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Chiridium verticillatum*).—Penins. Mal.
pilosus, *Engl. l. c.* (= *Leucobotrys pilosa*).—Java.
polygonifolius, *Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 29.—Afr. trop.
rhaphidophorus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Coleobotrys raphidophora*).—Java.
rosaceus, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
rotundifolius, *Engl. l. c.* 127 (= *Neophylum rotundifolium*).—Ins. Loyalty.
ruber, *Engl. l. c.* (= *Neophylum rubrum*).—N. Caled.
rubrobrunneus, *Engl. l. c.* 128 (= *Coleobotrys rubra*).—Java.
Ruspolii, *Engl. l. c.* 132.—Afr. trop.
Sacleuxii, *Engl. l. c.* 131 (= *Oncella Sacleuxii*).—Afr. trop.
salakensis, *Engl. l. c.* 129 (= *Baratranthus Beccarii*). —Borneo.
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 628.—Ins. Samoa.
scandens, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum scandens*).—N. Caled.
Scortecchinii, *Engl. l. c.* 129 = L. Baratra-Scortechinii.
sessilifolius, *Engl. l. c.* 128 (= *Stemmatophyllum sessilifolium*).—Ins. Philipp.
Stemmato-Beccarii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 166 (= *Stemmatophyllum Beccarii*).—Borneo.
Sterculiae, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* I. 928.—Afr. trop.
sumbawensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 163 (= *Elytranthe sumbawensis*).—Malaya.
tahitensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 128 (= *Stemmatophyllum grandifolium*).—Ins. Tahiti.
ternatus, *Engl. l. c.* (= *Sycophila ternata*).—Afr. trop.
Thonneri, *Engl. in Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol.* 12.—Afr. trop.
Tieghemii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum tenuiflorum*).—N. Caled.
uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 382.—Afr. trop
ulugurensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 131; *et in Engl. Jahrb.* xxviii. 381.—Afr. trop.
Vieillardii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 127 (= *Neophylum Vieillardi*).—N. Caled.
wentzelianus, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 381.—Afr. trop.
xiphostachyus, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 131 (= *Beccarina xiphostachya*).—Borneo.
Zollingerii, *Engl. l. c.* 128 (= *Coleobotrys Zollingeri*). —Java.
Zygiarum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 929.—Afr. trop.

LORTIA, Rendle, in Journ. Bot. 1898, 29. *EUPHORBIACEAE.*
erubescens, *Rendle, l. c.* 30.—Afr. trop.

LOTONONIS, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
aristata, *Schinz in Bull. Herb. Boiss.* vii. 32.— fr. austr.
buchenroederoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 279.—Afr. austr.
grandifolia, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 19.—Afr. austr.
hirsuta, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 33.—Afr. austr.
leptoloba, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 457.—Afr. austr.
macra, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 373.—Afr. austr.
maira, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 354, sphalm. = praec.
marginata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 31.—Afr. austr.
montana, *Schinz, l. c.* 30.—Afr. austr.
multiflora, *Schinz, l. c.* 31.—Afr. austr.
procumbens, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 18.—Afr. austr.
Schlechterii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 32.—Afr. austr.
stipularis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 147.—Afr. austr.
Woodii, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 19.—Afr. austr.

LOTUS, Tourn. (Legum.).
assakensis, *Coss. ex Brand, in Engl. Jahrb.* xxv. 199.—Afr. bor.
brandianus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 401.—Afr. trop.
Chazaliei, *H. Boissieu, in Journ. de Bot.* 1896, 220.—Afr. trop.
diffusus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 7.—Am. bor.
Fremonti, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.
grandiflorus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxviii. 238.—Eur.
hebranicus, *Hochst. ex Brand, in Engl. Jahrb.* xxv. 176, 221.—Arab.; Afr. trop.
Jolyi, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 251.—Afr. bor.
lalambensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 235.—Afr. trop.
latifolius, *Brand, in Engl. Jahrb.* xxv. 202.—Afr. trop.
namulensis, *Brand, l. c.* 213.—Afr. trop.
nanus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 5 (= *Hosackia nana*).—Am. bor.
Schoelleri, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 231.—Afr. trop.
varius, *Boiss. ex Brand, in Engl. Jahrb.* xxv. 181, 220.—As. Min.
venustus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 7 (= *Hosackia venusta*).—Am. bor.

LOVOA, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 307; et in Engl. Jahrb. xxiii. 164. *MELIACEAE.*
trichilioides, *Harms, l. c.* 308; *l. c.* 165.—Afr. trop.

LOWIA, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (Oct. 25, 1886) 308 = **Orchidantha**, N. E. Br. (Musac.).
borneensis, Baker, in Bot. Mag. sub t. 7351 = O. borneensis.
longiflora, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. 308.—Penins. Mal.
maxillarioides, Baker, in Bot. Mag. sub t. 7351 = O. maxillarioides.

LUCHEA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1899) 483, sphalm. = **Luehea**, Willd. (Tiliac.).
melantha, Auct. l. c., sphalm. = L. meiantha.

LUCILIA, Cass. (Compos.).
pusilla, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 29 (= *Conyza kunthiana*).—Ecuador.
subspicata, *Hieron. l. c.* (= *Belloa subspicata*).—Ecuador.
tunariensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 378 (= *Gnaphalium tunariense*).—Bolivia.

LUCUMA, Molina (Sapot.).
Amorphosperma, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 955 (= *Amorphospermum antilogum*).—Austral.
chartacea, *F. M. Bailey, l. c.*—Austral.

LUCUMA:—
Eichleri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 274.—N. Granat.
Gardneri, *Engl. l. c.* (= *Chrysophyllum Gardneri*).—Bras.
Hartii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2565.—Ind. occ.
macrocarpa, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 57.—Hort.
Melinoni, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 275 (= *Pseudocladia Melinoni*).—Guiana.
nitidula, *Engl. l. c.* 274.—Mexic.
Palmeri, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 87.—Mexic.
sagotiana, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 274 (= *Eremoluma sagotiana*).—Guiana.

LUDOLFIA, Willd. (Gramin.).
glaucescens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. 320 = Bambusa nana.

LUDWIGIANTHA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 178. *ONAGRACEAE.*
arcuata, *Small, l. c.* (= *Ludwigia arcuata*).—Am. bor.

LUEDDEMANNIA, Reichb. f. (Orchid.).
sanderiana, Kraenzl. in Gard. Chron. 1897, II. 138 = Lacaena bicolor.

LUEHEA, Willd. (Tiliac.).
meiantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 394.—Am. cent.
parvifolia, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 507.—Bras.
splendens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 12.—Bolivia.

LUFFA, Tourn. (Cucurb.).
Batesii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 161.—Afr. trop.

LUISIA, Gaudich. (Orchid.).
Hancockii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 199.—China.
inconspicua, *Hook. f. ex King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 203.—Ind. or.
indivisa, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 201.—Ind. or.

LUNASIA, Blanco (Rutac.).
quercifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 376 (= *Androcephalium quercifolium*).—N. Guin.
repanda, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

LUNDIA, DC. (Bignon.).
phaseolifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 99.—Bolivia.
stricta, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 236 (= *Bignonia stricta*).—Guiana.

LUPINUS, Tourn. (Legum.).
aduncus, *Greene, Pittonia*, iv. 132.—Am. bor.
alpestris, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 127.—Am. bor.
alsophilus, *Greene, Pittonia*, iv. 135.—Am. bor.
anemophilus, *Greene, l. c.* 136.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* 132.—Am. bor.
Czermakii, *Micheli, ex Briq. & Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 154.—Bras.
Elmeri, *Greene, Pittonia*, iii. 159.—Am. bor.
erectus, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 343.—Am. bor.
excubitus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 26.—Am. bor.
fulcratus, *Greene, Pittonia*, iii. 159.—Am. bor.
geophilus, *Greene, l. c.* iv. 135.—Am. sept.
gratus, *Greene, l. c.* iii. 160.—Am. bor.
Hellerae, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 265.—Am. bor.
Helleri, *Greene, Pittonia*, iv. 134.—Am. bor.
humicolus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 204.—Am. bor.
ingratus, *Greene, Pittonia*, iv. 133.—Am. bor.
magnificus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 26.—Am. bor.
magnus, *Greene, Pittonia*, iii. 160.—Am. bor.
monticola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 232.—Am. bor.
myrianthus, *Greene, Pittonia*, iv. 134.—Am. bor.
neomexicanus, *Greene, l. c.* 133.—Am. bor.
oreophilus, *Greene, l. c.* 135 (non Phil.).—Am. bor.
pinetorum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 25.—Am. bor.
Princei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 401.—Afr. trop.

LUPINUS:—
pseudoparviflorus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 232.—Am. bor.
psoraleoides, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 129.—Am. bor.
ramosus, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 120.—Am. bor.
retrorsus, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 344.—Am. bor.
rostratus, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 424.—Calif.
sylvestris, E. Drew, in Bull. Torr. Bot. Club, 1889, 150 = Elmeri.
volcanicus, *Greene, Pittonia*, iii. 308.—Am. bor.

LUZIOLA, Juss. (Gramin.).
leiocarpa, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 12.—Bras.

LUZULA, DC. (Juncac.).
crenulata, *Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 209.—N. Zel.
depauperata, *Beyer, in Verh. Bot. Ver. Brand*, xli. p. xxvi.—Eur.
haussknechtiana, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 200.—As. Min.
leptophylla, *Buchen. & Petrie, ex Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 214.—N. Zel.
micrantha, *Buchen. l. c.* 166.—N. Zel.
Novae-Cambriae, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 392.—Austral.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 577.—Patag.
rhadina, *Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 212.—N. Zel.
subsessilis, *Buchen. l. c.* 290.—Am. bor.
triandra, *Buchen. l. c.* 210.—N. Zel.
Ulei, *Buchen. in Engl. Jahrb.* xxvi. 577.—Bras.
Wettsteinii, *Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 213.—N. Zel.

LYCASTE, Lindl. (Orchid.).
dyeriana, *Sander, in Kew Bull.* 1898, 195.—Peruv.
micheliana, *Cogn. in Rev. Hortic.* 1900, 264.—Mexic.

LYCHNIS, Tourn. (Caryophyll.).
antarctica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 14.—Patag.
argentina, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 16.—Reg. Argent.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 596.—Patag.
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 597.—Patag.

LYCIUM, Linn. (Solan.).
acanthocladium, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 552.—Patag.
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 553.—Patag.
chubutense, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 250.—Patag.
decumbens, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 752.—Afr. trop.
durispina, *P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 251.—Patag.
geniculatum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 566.—Mexic.
microphyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. ii. 196 = minutifolium, *Phil.*
minutifolium, *R. Phil. l. c.* xci. 27.—Chili.
paucifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 91.—Bolivia.
repens, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 554.—Patag.
verrucosum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 111.—Am. bor.

LYCOPUS, Tourn. (Labiat.).
angustus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xi. (382).—Japon.
asper, *Greene, Pittonia*, iii. 339.—Am. bor.
lacerus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
maackianus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xi. (382).—Japon.
maritimus, *Greene, Pittonia*, iii. 340.—Am. bor.

LYCOSERIS, Cass. (Compos.).
Eggersii, *Hieron. ex. Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 75.—Ecuador.
Sodiroi, *Hieron. l. c.* 76.—Ecuador.

LYGISTUM, P. Br. = **Manettia**, Linn. (Rubiac.).
micans, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 45 = M. cordifolia.
tenue, Britton, ex Rusby, l. c.—Bolivia.

LYGODESMIA, D. Don (Compos.).
ramosissima, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 315.—Mexic.

LYONIA, Nutt. (Ericac.).
heptamera, *Urb. Symb. Antill.* i. 376.—Ind. occ.

LYONSIA, R. Br. (Apocyn.).
viridiflora, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 156.—N. Guin.

LYPERIA, Benth. (Scrophul.).
breviflora, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 393.—Afr. austr.
punicea, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 163.—Afr. austr.

LYSIAS, Salisb. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
orbiculata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 103 = H. hookeriana.

LYSIELLA, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 104. *ORCHIDEAE.*
obtusata, *Rydb. l. c.* (= *Habenaria obtusata*).—Am. bor.

LYSIMACHIA, Tourn. (Primul.).
insignis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2634.—China.
paradoxa, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. (1896) 326.—Hybr.?
polyantha, *Fernald, in Rhodora*, i. 134.—Am. bor.
producta, *Fernald, l. c.*—Am. bor.
unguiculata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 524.—China.

LYSIMACHIOPSIS, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. (1897) 874. *PRIMULACEAE.*
daphnoides, *A. A. Heller, l. c.* 875 (= *Lysimachia daphnoides*).—Ins. Sandw.
Hillebrandii, *A. A. Heller, l. c.* (= *Lysimachia Hillebrandi*).—Ins. Sandw.
Lydgatei, *A. A. Heller, l. c.* 876 (= *Lysimachia Lydgatei*).—Ins. Sandw.
ovata, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.
Remyi, *A. A. Heller, l. c.* (= *Lysimachia Remyi*).—Ins. Sandw.

LYSIONOTUS, D. Don (Gesner.).
carnosa, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1900, II. 349.—China.
heterophylla, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 249.—China.
involucrata, *Franch. l. c.*—China.

LYTHRUM, Linn. (Lythrac.).
paradoxum, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 19.—Austral.

M

MABA, Forst. (Ebenac.).
coriacea, *Cummins, in Kew Bull.* 1898, 76.—Afr. trop.
polygantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 494.—N. Guin.
ramuensis, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 495.—N. Guin.
Zenkeri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 63.—Afr. trop.

MABEA, Aubl. (Euphorb.).
Trianae, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 506.—N. Granat.

MACADAMIA, F. Muell. (Proteac.).
integrifolia, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. xi. 624.—Austral.

MACAGLIA, Rich. = **Aspidosperma**, Mart. & Zucc. (Apocyn.).
lanata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 197.—Bras.

MACAIREA, DC. (Melast.).
Theresiae, *Cogn. in Bot. Centralbl.* lxvi. 369.—Bras.

MACARANGA, Thou. (Euphorb.).
angustifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 398.—N. Guin.
Bachmanni, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 525.—Afr. austr.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 626.—Celebes.

MACARANGA :—
chrysotricha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 399.—N. Guin.
Reineckei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxv. 646.—Ins. Samoa.
rosea, *Pax, l. c.* xxvi. 328.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax, l. c.* xxiii. 526.—Afr. trop.
subpeltata, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 400.—N. Guin.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 526.—Afr. trop.

MACARISIA, Thou. (Rhizoph.).
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 75.—Afr. trop.

MACDOUGALIA, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 629. *COMPOSITAE.*
Bigelovii, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.

MACFADYENA, A. DC. (Bignon.).
Bangii, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 72.—Bolivia.

MACHAERANTHERA, Nees = **Aster**, Tourn. (Compos.).
aspera, Greene, Pittonia, iii. 62.—Am. bor.
asteroides, Greene, l. c. 63 = A. canescens.
Bigelovii, Greene, l. c. = A. Bigelovii.
commixta, Greene, l. c. iv. 71.—Am. bor.
divaricata, Greene, l. c. 23 = A. canescens.
incana, Greene, l. c. iii. 62 = A. incanus.
inornata, Greene, l. c. = A. inornatus.
laetevirens, Greene, l. c. 61.—Am. bor.
leucanthemifolia, Greene, l. c. = A. leucanthemifolius.
linearis, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 511.—Am. bor.
linearis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 398.—Am. bor.
montana, Greene, Pittonia, iii. 60 = A. canescens.
mucronata, Greene, l. c. iv. 72.—Am. bor.
oxylepis, Greene, l. c. 25.—Am. bor.
Parthenium, Greene, l. c. 99.—Am. bor.
Pattersonii, Greene, l. c. iii. 62 = A. Pattersoni.
pruinosa, Greene, l. c. iv. 157.—Am. bor.
pulverulenta, Greene, l. c. 23 = A. canescens.
rigida, Greene, l. c. 25.—Am. bor.
sessiliflora, Greene, l. c. iii. 60 = A. canescens.
spinulosa, Greene, l. c. iv. 24.—Am. bor.
subalpina, Greene, l. c. 23.—Am. bor.
superba, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 197.—Am. bor.
tagetina, Greene, Pittonia, iv. 71.—Am. bor.
tephrodes, Greene, l. c. 24.—Am. bor.
varians, Greene, l. c. 98.—Am. bor.
viscosa, Greene, l. c. 22 = A. canescens.

MACHAERIUM, Pers. (Legum.).
praecox, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 354 = Tipuana praecox.
stygium, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. *Afd.* III. no. 7, 20.—Am. austr.

MACHAONIA, Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
floribunda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 488.—Mexic.

MACHILUS, Nees (Laurac.).
platyphylla, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 348.—China.

MACLEANIA, Hook. (Vaccin.).
turrialbana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 339.—Am. cent.

MACODES, Lindl. (Orchid.).
celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 132.—Celebes.
sanderiana, *Rolfe, l. c.* 1896, 47.—Ins. Sunda.

MACRACHAENIUM, Hook. f. (Compos.).
foliosum, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 375.—Fuegia.

MACROCARPAEA, Gilg (Gentian.).
bangiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 335.—Bolivia.
bogotana, *Gilg, l. c.* 337.—N. Granat.
calophylla, *Gilg, l. c.* 339.—N. Granat.
Glaziovii, *Gilg, l. c.* 335.—Bras.
micrantha, *Gilg, l. c.* 338.—Peruv.
pachyphylla, *Gilg, l. c.*—Ecuador.
pachystyla, *Gilg, l. c.* 336.—Peruv.
polyantha, *Gilg, l. c.*—N. Granat.
sodiroana, *Gilg, l. c.* xxv. 724.—Ecuador.

MACROCARPAEA :—
stenophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 337.—Peruv.

MACROCNEMUM, P. Br. (Rubiac.).
Sprucei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 44.—Bolivia.

MACROCOCCULUS, Becc. (Menisperm.).
tympanopodus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 314.—N. Guin.

MACROLOBIUM, Schreb. (Legum.).
ferrugineum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 271.—Afr. trop.
Preussii, *Harms, l. c.* 272.—Afr. trop.
trinitense, *Urb. Symb. Antill.* i. 314.—Ind. occ.
trunciflorum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 272.—Afr. trop.
Zenkeri, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

MACROLOTUS, Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 89. *LEGUMINOSAE.*
Rivaei, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

MACROMERIA, D. Don (Borag.).
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 570.—Mexic.

MACRONEMA, Nutt. = **Chrysopsis**, Ell. (Compos.).
grindelifolium, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 384.—Am. bor.
lineare, Rydb. l. c.—Am. bor.
obovatum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 618.—Am. bor.
obtusum, Rydb. l. c. 619.—Am. bor.

MACROPEPLUS, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 557. *MONIMIACEAE.*
ligustrinus, *Perkins, l. c.* 558 (= *Mollinedia ligustrina*).—Bras.

MACROPODANDRA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 114. *EUPHORBIACEAE.*
acuminata, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

MACROPSYCHANTHUS, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 366 (1900). *LEGUMINOSAE.*
Lauterbachii, *Harms, l. c.* 367.—N. Guin.

MACRORUNGIA, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. (1900) 254. *ACANTHACEAE.*
formosissima, *C. B. Clarke, l. c.* 255.—Afr. trop.
macrophylla, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
pubinervia, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

MACROSCEPIS, H. B. & K. (Asclep.).
congestiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 149.—Am. cent.
elliptica, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 225.—Bras.
hirsuta, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 265 = obovata.
magnifica, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 77.—Bras.

MACROSIPHONIA, Muell. Arg. (Apocyn.).
petraea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 198 = verticillata.

MACROSPHYRA, Hook. f. (Rubiac.).
brachystylis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 463.—Afr. trop.

MACROTOMIA, DC. (Borag.).
grandis, *Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 289.—Persia.

MACROTORUS, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 561. *MONIMIACEAE.*
utriculatus, *Perkins, l. c.* (= *Mollinedia utriculata*).—Bras.

MACROZAMIA, Miq. (Cycad.).
Mackenzii, *Hort. in Gard. Chron.* 1877, I. 665.—Austral.
platyrhachis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 356.—Austral.

MADARIA, DC. = **Madia**, Molina (Compos.).
densifolia, Greene, Fl. Francisc. 417 = M. densifolia.
polycarpha, Greene, l. c. 418 = M. polycarpha.

MADIA, Molina (Compos.).
densifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 167.—Am. bor.
polycarpha, *Greene, l. c.*—Am. bor.
tenella, *Greene, l. c.*—Am. bor.

MAERUA, Forsk. (Capparid.).
angustifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. 48 = Guerichii.
angustifolia, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 97 (= *Niebuhria angustifolia*).—Afr. austr.
aprevaliana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 5.—Afr. trop.
candida, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 96.—Afr. trop.
emarginata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. 857.—Afr. austr.
macrantha, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 95.—Afr. trop.
Paxii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 97.—Afr. austr.
Pirottae, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 96.—Afr. trop.
sessiliflora, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
ternata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II. 168 = triphylla, *A. Rich.*
triphylla, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* (= *Capparis triphylla*).—Afr. austr.
undulata, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 169.—Afr. austr.
Woodii, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.

MAESA, Forsk. (Myrsin.).
depauperata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 519.—China.

MAESOBOTRYA, Benth. (Euphorb.).
hirtella, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 21.—Afr. trop.

MAGNOLIA, Linn. (Magnol.).
cubensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 307.—Ind. occ.
splendens, *Urb. l. c.* 306.—Ind. occ.

MAGYDARIS, Koch (Umbell.).
pastinacea, *Fiori & Paol. Fl. Ital.* ii. 205 = tomentosa.

MAHONIA, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).
eurybracteata, Fedde, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 338.—China.
polyodonta, Fedde, l. c. 339.—China.
subtriplinervis, Fedde, l. c. 338 = B. subtriplinervis.

MAIHUENIA, Phil. in Gartenfl. 1883, 260. *CACTEAE.*
brachydelphys, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 756.—Reg. Argent.
Philippii, *Weber, in Bois, Dict. Hortic.* 939.—Chili.
Poeppigii, *Weber, l. c.* (= *Opuntia Poeppigii*).—Chili.

MAIRANIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 6. (1900) = MAIRRANIA, Neck. = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).

MAIRIA, Nees (Compos.).
coriacea, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 2541.—Afr. austr.
decumbens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 199.—Afr. austr.
montana, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

MAJORANA, Tourn. = **Origanum**, Tourn. (Labiat.).
dubia, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III. A. 307 = O. dubium.
majorica, Briq. l. c. 308 = O. majoricum.
Maru, Briq. l. c. 307 = O. Maru.
micrantha, Briq. l. c. = O. micranthum.
Orega, Briq. l. c. = O. Orega.

MALABAILA, Hoffm. (Umbell.).
erbilensis, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 623.—As. Min.
Haussknechtii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia Haussknechtii*).—Persia.
Kirungae, *Engl. in Goetzen, Durch Afr.* (repr.) 7.—Afr. trop.
lignosus, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 484, sphalm. = Pterocephalus lignosus.
nudicaulis, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia nudicaulis*).—Persia.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 24.—Afr. trop.
tempskyana, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 622.—Graecia.
tordylioides, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia tordylioides*).—Persia.

MALACOCARPUS, Salm-Dyck = **Echinocactus**, Link & Otto (Cact.).
heptacanthus, Barb. Rodr. Pl. Mattogross. 29.—Bras.

MALACOTHRIX, DC. (Compos.).
implicata, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 113.—Am. bor.
runcinata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 485.—Am. bor.

MALLOSTOMA, Karst. (Rubiac.).
lavarum, *Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 36.—Am. cent.

MALLOTUS, Lour. (Euphorb.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 626.—Celebes.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 525.—Afr. trop.
tenuifolius, *Pax, l. c.* xxix. 429.—China.

MALPIGHIA, Plum. (Malpigh.).
dasycarpa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 390.—Am. cent.
edulis, *Donn. Sm. l. c.* 391.—Am. cent.
nummulariifolia, *Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsb.* 1899, *aest.* 18.—Ind. occ.

MALUS, Tourn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
ioensis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 235 = P. ioensis.
Malus, Britton, l. c. 236 = P. Malus.
Soulardi, Britton, l. c. 235 = P. Soulardi.

MALVA, Tourn. (Malvac.).
cuneata, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 144.—Galic.
vivianiana, *Rouy, in Journ. de Bot.* 1897, 82.—Reg. Medit.

MALVASTRUM, A. Gray (Malvac.).
aboriginum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 311.—Am. bor.
Alberti, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 231 (= *Tarasa Alberti*).—Chili.
arcuatum, Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. I. 311 = marrubioides.
Davidsonii, *Robinson, l. c.* 312.—Am. bor.
dissectum, Cock. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 87 = coccineum.
erodiifolium, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 236 (= *Malva erodiifolia*).—Chili.
greenmanianum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 180.—Mexic.
involucratum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 310.—Am. bor.
megalorrhizum, *Baker f. in Journ. Bot.* 1891, 363.—Chili.
modioliforme, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 355.—Reg. Argent.
nesioticum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 312.—Am. bor.
saltense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 22, sphalm. = sajamense.
scorpioides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 355.—Bolivia.

MALVAVISCUS, Dill. (Malvac.).
brevibracteatus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 347.—Am. cent.
cinereus, *Baker f. l. c.*—Mexic.
Jordan-Mottii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 73.—Ind. occ.
lanceolata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 175.—Mexic.
Malvaviscus, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 73 = arboreus.
Palmanus, *Pittier & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 238.—Am. cent.
Polakowskyi, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 346.—Am. cent.

MALVEOPIS, Presl (Malvac.).
antofagastana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 20 = Malvastrum antofagastanum.
heterophylla, Kuntze, l. c. 21 = Malvastrum heterophyllum.
modioliformis, Kuntze, l. c. = Malvastrum modioliforme.
Oriastrum, Kuntze, l. c. = Malva Oriastrum.
saltensis, Kuntze, l. c. 22 = Malvastrum sajamense.
scorpiodes, Kuntze, l. c. = Malvastrum scorpioides.

MAMBOGA, Blanco = **Mitragyna**, Korth. (Rubiac.).
stipulosa, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 435 = M. macrophylla.

MAMMEA, Linn. (Guttif.).
Ebboro, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1223.—Afr. trop.

MAMMILLARIA, Haw. (Cact.).
arizonica, Engelm. in S. Wats. Pl. Wheeler, 9 = vivipara.
armillata, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 7.—Calif.
brachydelphis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 343, sphalm. = Maihuenia brachydelphys.
Brandegei, *Engelm. ex K. Brandegee, in Erythea*, v. 116 (= *Cactus Brandegei*).—Calif.
Brownii, *Toumey, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 253.—Am. bor.
Carretii, *Rebut, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 542.—Hab. ?
confinis, Hort. ex K. Schum. l. c. 557 = discolor.
cornuta, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 496.—Mexic.
dioica, *K. Brandegee, in Erythea*, v. 115.—Am. bor.
durangensis, *Rge. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 478.—Mexic
fertilis, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 530.—Mexic.
gigantea, *Hildm. l. c.* 578.—Mexic.
Goodrichi, Engelm. in Erythea, v. 115 = dioica.
guanajuatensis, Rge. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. 578 = gigantea.
heeseana, *McDowell, in Monatsschr. Kakt.* 1896, 125.—Mexic.
hirschtiana, *Haage f. in Monatsschr. Kakt.* 1896, 127.—Hab. ?
kleinschmidtiana, *Zeissold, in Monatsschr. Kakt.* 1898, 21.—Mexic.
krauseana, Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. 595 = mutabilis.
Lassonnerici, *Reb. ex K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1897, 29.—Hort. ?
Lesaunieri, *Reb. ex K. Schum. l. c.*—Mexic.? (sphalmate *Lasaunieri, Lasaunierii, Lasonnerii, Lasonnieri, Lassomeri, Lassonieri, Lassonneri*, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1896 ; 1897).
Macdowellii, Heese, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. 578 = gigantea.
Mainae, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 31.—Am. bor.
Nickelsae, *K. Brandegee, l. c.*—Am. bor.
Oettingenii, *Zeissold, in Monatsschr. Kakt.* 1898, 10.—Mexic.
perbella, *Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 567.—Mexic.
Perringii, Hildm. ex K. Schum. l. c. 566 = celsiana.
Petterssonii, *Hildm. in Deutsch. Gart. Zeit.* 1886, 185.—Mexic.
plumosa, *Web. in Bois, Dict. Hortic.* 804.—Mexic.
senckeana, Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. 575 = seitziana.
senckei, Hort. ex K. Schum. l. c. = seitziana.
Trohartii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 586.—Mexic.
venusta, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 7.—Calif.
Wilcoxii, *Toumey, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 545.—Am. bor.
Wissmannii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 498.—Am. bor.
zeyeriana, *Haage f. ex K. Schum. l. c.* 574.—Mexic.

MANDEVILLA, Lindl. (Apocyn.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 76.—Bolivia.
fluminensis, Donn. Sm. ex Pittier, Prim. Fl. Costaric. ii. (1898) 162 (= *Echites fluminensis*).—Am. trop.
hirsuta, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. xxiv. Afd. III. no. 10, 24 (= *Echites hirsuta*).—Guiana.
lasiocarpa, Malme, l. c. 25 (= *Echites lasiocarpa*).—Bras.
loeseneriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 725.—Ecuador.
Mandoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 496.—Am. bor.

MANETTIA, Mutis (Rubiac.).
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 82.—Parag.
paraguariensis, *Chod. l. c.*—Parag.

MANGIFERA, Linn. (Anacard.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 470.—Ins. Andaman.

MANGIFERA:—
camptosperma, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 363 A.—Cochinch.
duperreana, *Pierre, l. c.* t. 362 A.—Cochinch.
khasiana, *Pierre, l. c.* t. 364 C.—Reg. Himal.
longipetiolata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 470. —Penins. Mal.
Reba, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 363 B.—Cochinch.

MANGLIETIA, Blume (Magnol.).
Minahassae, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 328.—Celebes.

MANIHOT, Tourn. (Euphorb.).
mossamedensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 442.—Bras.

MANILTOA, Scheff. (Legum.).
polyandra, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 194 (=*Cynometra polyandra*).—Ind. or.

MANISURIS, Linn. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).
tessellata, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xx. 20 = R. corrugata.
tuberculosa, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 430. —Am. bor.

MANISURIS, Sw. (Gramin.).
hirta, Russ. ex Wall. Cat. n. 1726 = granularis.

MANOTES, Soland. (Connar.).
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 62.—Afr. trop.
macrophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 190.—Afr. trop.
racemosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 215 (=*Cnestis racemosa*).—Afr. trop.

MANSOA, DC. = **Cuspidaria**, DC. (Bignon.).
acuminatissima, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 200.—Bras.
angustidens, Bureau & K. Schum. l. c. = C. angustidens.
difficilis, Bureau & K. Schum. l. c. 201 = M. laevis.
Glaziovii, Bureau & K. Schum. l. c. 203.—Bras.
Schwackei, Bureau & K. Schum. l. c. 204.—Bras.

MANULEA, Linn. (Scrophul.).
angolensis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. trop.
atropurpurea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 235 = Lyperia atropurpurea.
campanulata, Kuntze, l. c. = Chaenostoma campanulatum.
floribunda, Kuntze, l. c. = Chaenostoma floribundum.
foliolosa, Kuntze, l. c. = Lyperia foliolosa.
fragrans, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 179.—Afr. austr.
halimifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 235 = Chaenostoma halimifolium.
kraussiana, Kuntze, l. c. = Lyperia kraussiana.
laxa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 179.—Afr. austr.
minor, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. austr.
multifida, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 236 = Lyperia multifida.
polyantha, Kuntze, l. c. = Chaenostoma polyanthum.
thodeana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 479.—Afr. austr.

MAOUTIA, Wedd. (Urtic.).
rugosa, Warb. in Engl. Jahrb. xiii. 289 = Warburgii.
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 618.—Ins. Samoa.
Warburgii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 381.—N. Guin.

MAPANIA, Aubl. (Cyperac.).
montana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 189.—N. Guin.

MAPOURIA, Aubl. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).
pallescens, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 49.—Bolivia.

MARAH, Kellogg = **Echinocystis**, Torr. & Gray (Cucurb.).
oregana, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 239 = E. oregana.

MARCELLIA, Baill. (Amarant.).
denudata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 41 (=*Sericocoma denudata*).—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 15.—Afr. trop.
splendens, *Schinz, l. c.* 16.—Afr. trop.
Welwitschii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 40 (=*Sericocoma Welwitschii*).—Afr. trop.

MARCGRAVIA, Plum. (Ternstroem.).
Brownei, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 367.—Ind. occ.
corumbensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 444.—Bras.
crassicostata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 27. —Bras.
dasyantha, *Gilg, l. c.* 25.—Bras.
elegans, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 365.—Ind. occ.
evenia, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 518.—Ind. occ.
Hartii, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 366.—Ind. occ.
lineolata, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 517.—Ind. occ.
macrophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 27. —Bras.
mexicana, *Gilg, l. c.* 26.—Mexic.
neurophylla, *Gilg, l. c.* 29.—Bras.
salicifolia, *Gilg, l. c.* 26.—Bras.
Sprucei, *Gilg, l. c.* 28.—Bras.
stenonectaria, *Gilg, l. c.* 30.—Bras.
subcordata, *Gilg, l. c.* 27.—Bras.
urophylla, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 355, sphalm. = neurophylla.
wittmackiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 29.—Bras.

MAREYA, Baill. (Euphorb.).
brevipes, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 24.—Afr. trop.

MARGARANTHUS, Schlecht. (Solan.).
sulphureus, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 566. —Mexic.

MARGYRICARPUS, Ruiz & Pav. (Rosac.).
acanthocarpus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 513.—Patag.
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 512.—Patag.
patagonicus, *Speg. l. c.*—Patag.
pinnatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 77 = setosus.

MARIACANTHA, Bub. Fl. Pyren. ii. 149 (1900) = **Silybum**, Vaill. (Compos.).
maculosa, Bub. l. c. 150 = S. Marianum.

MARICA, Ker-Gawl. (Irid.).
Sabini, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1826) 75.—Afr. trop.
sabiniana, Herb. in Bot. Mag. sub t. 3809 = Sabini.

MARILA, Sw. (Ternstroem.).
laxiflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 9.—Bolivia.

MARILAUNIDIUM, Kuntze = **Nama**, Linn. (Hydrophyll.).
tenue, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 142.—Am. bor.

MARINELLIA, Bub. Fl. Pyren. i. 261 (1897) = **Melampyrum**, Tourn. (Scrophul.).
arvensis, Bub. l. c. 263 = M. arvense.
cristata, Bub. l. c. = M. cristatum.
nemoralis, Bub. l. c. = M. nemorosum.
vulgaris, Bub. l. c. 262 = M. pratense.

MARISCUS, Gaertn. (Cyper.).
Bolusi, C. B. Clarke, in Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 585 = umbilensis.
brizaeus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 52.—Ind. occ.
bruneus, *C. B. Clarke, in Urb. l. c.* 51.—Ind. occ.
cayennensis, Urb. l. c. 165 = flavus.
concinnus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 224.—Afr. trop.
confertus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 50.—Ind. occ.
congestus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1897, 72.—Afr. austr.
corrugata, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 484, errore = Manisuris corrugata.
cyperoides, Urb. Symb. Antill. ii. 164 = sieberianus.
deciduus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 191.—Afr. austr.
dissitiflorus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 45. —Ind. occ.
elephantinus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 195. —Afr. austr.
filiformis, Roem. & Schult. Syst. ii. 242 = Torulinium filiforme.

MARISCUS:—
globifer, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
globulosus, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = echinatus.
Gregorii, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
havanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 212 = Torulinium filiforme.
hermaphroditus, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = Jacquinii.
incompletus, Urb. l. c. = elatus.
laetus, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 11 (=*Cyperus laetus*).—Bras.
ligularis, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = rufus.
maritimus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 226.—Afr. trop.
planifolius, Urb. Symb. Antill. ii. 165 = purpurascens.
psilostachys, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
tenuis, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 48.—Ind. occ.
tetragonus, *C. B. Clarke, l. c.* 44.—Ind. occ.
umbilensis, *C. B. Clarke, ex W. Watson, in Gard. Chron.* 1891, II. 190.—Afr. austr.
Urbani, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 47.—Ind. occ.

MARKEA, Rich. (Solan.).
verrucosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 92.—Bolivia.

MARLEA, Roxb. (Cornac.).
densiflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 2.—Java.
javanica, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.

MARRUBIUM, Tourn. (Labiat.).
glechomaefolium, *Freyn & Conrath, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 136.—Reg. Caucas.
hyperleucum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 149.—Graecia.

MARSDENIA, R. Br. (Asclep.).
bicoronata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 235.—Afr. trop.
celebica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (=*Chlorochlamys celebica*).—Celebes.
Dussii, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 275.—Ind. occ.
efulensis, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2497.—Afr. trop.
floribunda, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 275 = Stephanotis floribunda.
latifolia, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 372 = racemosa.
leiocarpa, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 170.—Ind. or.
macroglossa, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 276. —Ind. occ.
montana, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 93.—Bras.
rhynchogyna, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 234.—Afr. trop.
Schenckii, *K. Schum. l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 22.—Bras.
suberosa, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 94 (=*Verlotia suberosa*).—Bras.
Taylori, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 100. —Afr. trop.
Teysmanni, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (=*Tetragonocarpus Teysmanni*).—Malaya.
umbellifera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 460.—Afr. trop.
Weddellii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 94 (=*Verlotia Weddellii*).—Bras.

MARSEA, Adans. = **Conyza**, Linn. (Compos.).
aegyptiaca, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 550 = C. aegyptiaca.
artemisiaefolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = C. artemisiaefolia.
chilensis, Kuntze, l. c. = C. chilensis.
cordata, Kuntze, l. c. = C. cordata.
gnaphaliodes, Kuntze, l. c. = C. gnaphalodes.
Gouani, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 552 = C. Gouani.
ivifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = C. ivaefolia, *Less.*
lyrata, Kuntze, l. c. = C. lyrata.
notobellidiastrum, Kuntze, l. c. = C. notobellidiastrum.
obscura, Kuntze, l. c. = C. obscura.
persicifolia, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 550 = C. persicaefolia.
pinnata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = C. pinnatilobata.
podocephala, Kuntze, l. c. = C. podocephala.

MARSEA :—
pyrrhopappa, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 552 = C. pyrrhopappa.
sophiaefolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = C. sophiaefolia.
spartioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 551 = C. spartioides.
stricta, Hiern, l. c. 552 = C. stricta.
ulmifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546 = C. incisa.

MARSHALLIA, Schreb. (Compos.).
lacinarioides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 482.—Am. bor.

MARTINELLA, Baill. (Bignon.).
obovata, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 161 = Martinii.

MARTYNIA, Houst. (Pedal.).
parviflora, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 453. —Am. bor.

MASCARENHASIA, A. DC. (Apocyn.).
caustica, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 268, sphalm. = elastica.
elastica, *K. Schum. l. c.* 270.—Afr. trop.
velutina, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxviii. 1351.—Madag.

MASCHALOCEPHALUS, Gilg & K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 148. *RAPATEACEAE.*
Dinklagei, *Gilg & K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

MASCHALODESME, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 561 (1900). *RUBIACEAE.*
arborea, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

MASDEVALLIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
antioquiensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 456.—N. Granat.
brachyura, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 453.—Ecuador.
chrysochaete, *F. C. Lehm. l. c.* 452.—N. Granat.
chrysoneura, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 453.—N. Granat.
deorsa, *Rolfe, in Orchid Rev.* viii. 255.—N. Granat.
Herradurae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 455.—N. Granat.
inflata, Reichb. f. in Gard. Chron. 1881, II. 716 = corniculata.
Lima, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 454.—N. Granat.
macropus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Hab.?
pantherina, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—N. Granat.
plantaginea, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. 336 = Pleurothallis plantaginea.
sessilis, *Barb. Rodr. in Plant. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 17.—Bras.
stenantha, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 455.—N. Granat.
tricarinata, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 456.—N. Granat.
Woolwardiae, *F. C. Lehm. ex Kraenzl. l. c.* 452.—Ecuador.

MASSONIA, Thunb. (Liliac.).
angustifolia, Linn. f. Suppl. 193 = Polyxena angustifolia.
Burchellii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. 393 = Polyxena Burchellii.
comata, Burch. ex Baker, l. c. 392 = Polyxena comata.
concinna, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 414.—Afr. austr.
Dregei, *Baker, l. c.* 412.—Afr. austr.
Greenii, *Baker, l. c.* 413.—Afr. austr.
longipes, *Baker, l. c.* 411.—Afr. austr.
marginata, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 299 = Polyxena marginata.
namaquensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 416.—Afr. austr.
odorata, Hook. f. Bot. Mag. t. 5891 = Polyxena odorata.
rugulosa, Licht. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 299 = Polyxena rugulosa.
undulata, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 420, in syn. = Polyxena marginata.
uniflora, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 991 = Polyxena uniflora.

MASTIXIA, Blume (Cornac.).
euonymoides, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 295.—Ind. or.

MATAYBA, Aubl. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
adenanthera, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 615.—Bras.
atropurpurea, Radlk. l. c. 617.—Bras.
boliviana, Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 336. —Bolivia.
fallax, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 612.—Bras.
intermedia, Radlk. l. c. 619.—Bras.
leucodictya, Radlk. l. c. 628.—Bras.
macrolepis, Radlk. l. c. 605.—Bras.
pallens, Radlk. l. c. 628.—Bras.
stenodictya, Radlk. l. c. 629.—Bras.
talisioides, Radlk. l. c. 618.—Bras.

MATRICARIA, Tourn. (Compos.).
Schlechteri, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 208.—Afr. austr.

MATTHAEA, Blume (Monim.).
calophylla, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxv. 563.—Borneo.
latifolia, *Perkins, l. c.*—Penins. Mal.

MATTHIOLA, R. Br. (Crucif.).
dimolehensis, *Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 2.—Afr. trop.
integrifolia, *Kom. in Trav. Soc. Nat. St. Pétersb.* xxvi. 85.—Turkestan.
perennis, *Conti, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 58.—Hispan.; Marocc.
pseudoxyceras, *Conti, l. c.* 71.—Afr. bor.; Ins. Canar.
Smithii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 50.—Afr. trop.
songarica, *Conti, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 42.—As. cent.
spathulata, *Conti, l. c.* 49.—As. or.
superba, *Conti, l. c.* 23.—As. cent.

MAURIA, Kunth (Anacard.).
glauca, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 5.—Am. cent.

MAXILLARIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Augustae-Victoriae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 483.—Ecuador.
chapadensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 35.—Bras.
chlorochila, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 482.—N. Granat.
dichroma, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 197.—Am. austr.
elegantula, *Rolfe, l. c.* 196.—Am. austr.
guayanensis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 139. —Guiana.
jucunda, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 484.—Ecuador.
pachyneura, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 480.—Ecuador.
scurrilis, *Hort. in Orchid. Rev.* viii. 234.—Am. cent.?
stenophylla, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 481.—N. Granat.
urbaniana, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 483.—Ecuador.
vulcanica, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 484.—Ecuador.

MAYTENUS, Molina (Celastr.).
flagellata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 20.—Bolivia.
tunarina, *Loes. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 37.—Bolivia.

MAZAEA, Krug & Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1897, 265 = **Neomazaea**, Urb. (Rubiac.).
phialanthoides, Krug & Urb. l. c. 266 = N. phialanthoides.

MAZUS, Lour. (Scrophul.).
macranthus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 566.—China.

MECONOPSIS, Vig. (Papav.).
Delavayi, *Franch. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 311 (= *Cathcartia Delavayi*).—China.
grandis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 320.—Reg. Himal.
lancifolia, *Franch. ex Prain, l. c.* 311 (= *Cathcartia lancifolia*).—China.
oliveriana, *Franch. ex Prain, l. c.* 312.—China.
paniculata, *Prain, l. c.* 316.—Reg. Himal.
primulina, *Prain, l. c.* 319.—Reg. Himal.
sinuata, *Prain, l. c.* 314.—Reg. Himal.
superba, *King, ex Prain, l. c.* 317.—Reg. Himal.

MEDICA, Tourn. = **Medicago**, Tourn. (Legum.).
disciformis, Bub. Fl. Pyren. ii. 477 = M. disciformis.

MEDICA :—
hirsuta, Bub. Fl. Pyren. ii. 477 = M. minima.
littoralis, Bub. l. c. 476 = M. littoralis.
maculata, Bub. l. c. 478 = M. maculata.
maritima, Bub. l. c. 475 = M. marina.
muricata, Bub. l. c. 479 = M. muricata.
orbiculata, Bub. l. c. 474 = M. orbicularis.
pentacycla, Bub. l. c. 475 = M. denticulata.
Pourreti, Bub. l. c. 471 = M. Pourretii.
praecox, Bub. l. c. 477 = M. praecox.
reticulata, Bub. l. c. 480 = M. hispida.
scutellata, Bub. l. c. 574 = M. scutellata.
secundiflora, Bub. l. c. 473 = M. secundiflora.
sphaerocarpa, Bub. l. c. 480 = M. sphaerocarpa.
suffruticosa, Bub. l. c. 472 = M. suffruticosa.
sylvestris, Bub. l. c. 471 = M. falcata.
tribuloides, Bub. l. c. 477 = M. trunculata.
villosa, Bub. l. c. 478 = M. rigidula.

MEDICAGO, Tourn. (Legum.).
heterocarpa, *Duerrnb. ex Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 199 (non Spach).—Hybr.
orbicularioides, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 161.—Graecia.

MEDINILLA, Gaudich. (Melast.).
africana, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 24.—Afr. trop.
Clarkei, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 63.—Penins. Mal.
heteranthera, *King, l. c.* 61.—Penins. Mal.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.
mucronata, *Koord. l. c.* 467, nomen.—Celebes.
Musofo, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 480.—N. Guin.
perakensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 64. —Penins. Mal.
scandens, *King, l. c.* 60.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 62.—Penins. Mal.
venusta, *King, l. c.* 61.—Penins. Mal.

MEDIOCALCAR, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. (1900) 3. *ORCHIDEAE.*
bicolor, *J. J. Sm. l. c.*—Ins. Amboin.

MEEHANIA, Britton (Labiat.).
urticifolia, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899 (159), sphalm. 'urticiforia' (= *Dracocephalum urticaefolium*).—China; Japon.

MEGACARPAEA, DC. (Crucif.).
gracilis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 13.—As. cent.

MEGACLINIUM, Lindl. (Orchid.).
flaccidum, Hook. Cent. Orch. t. 3 = Lindleyi.
imbricatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 37.—Afr. trop.
Lindleyi, *Rolfe, l. c.* 43.—Afr. trop.
maximum, Lindl. Bot. Reg. t. 1959 (non alibi) = Lindleyi.
Millenii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 40.—Afr. trop.
platyrhachis, *Rolfe, l. c.* 43.—Afr. trop.
purpuratum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 128 = maximum.
strobiliferum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 38.—Afr. trop.

MEGALOCHLAMYS, Lindau, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 345. *ACANTHACEAE.*
linifolia, *Lindau, l. c.* 346.—Afr. trop.
Marlothii, *Lindau, l. c.* 345.—Afr. trop.
strobilifera, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 241.—Afr. trop.

MEGALOPUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 491. *RUBIACEAE.*
Goetzei, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

MEGAPTERIUM, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
dissectum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 184 = O. dissecta.
oklahomense, Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 153.—Am. bor.

MEGASKEPASMA, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897), 666. *ACANTHACEAE.*
erythrochlamys, *Lindau, l. c.*—Venez.

MEGASTACHYA, Beauv. = **Eragrostis**, Beauv. (Gramin.).
polymorpha, Beauv. Agrost. 74 = E. amabilis.

MEIBOMIA, Heist. = **Desmodium**, Desv. (Legum.).
arenicola, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 139 = D. lineatum.
huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 243 = D. huillensis.
incana, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. xxiv. no. 7, 9.—Am. austr.
longifolia, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 140.—Am. bor.
megalantha, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 243 = D. megalanthum.
Michauxii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 140 = D. rotundifolium, *DC.*
Scalpe, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 66 = D. Scalpe.

MEIOCARPIDIUM, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 54. *ANONACEAE.*
lepidotum, *Engl. & Diels, l. c.* 55 (= *Uvaria Zenkeri*).—Afr. trop.

MELAMPODIUM, Linn. (Compos.).
paludicola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.

MELAMPYRUM, Tourn. (Scrophul.).
hoermannianum, *Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov.* 1900, 541.—Eur.

MELANCRANIS, Vahl = **Ficinia**, Schrad. (Cyperac.).
Macowanii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 335 = F. Macowani.
trispicata, Kuntze, l. c. = F. sylvatica.

MELANDRIUM, Roehl. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).
caespitosum, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 431.—China.
glandulosum, F. N. Williams, l. c. 430 = L. glandulosa.
kialense, F. N. Williams, l. c. 432.—China.
lacerum, F. N. Williams, l. c. xxxii. 188 (= *Silene lacera*).—Reg. Caucas.
longicarpophorum, Kom. in Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. xxvi. 132.—Turkestan.
platypetalum, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 431.—China.
plutonicum, Reiche & Johow, Fl. Chile, i. 177 (= *Silene plutonica*).—Chili.
Souliei, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 429.—China.
terminale, Reiche & Johow, Fl. Chile, i. 177 = L. terminalis.

MELANOCENCHRIS, Nees = **Gracilea**, Koen. (Gramin.).
Jacquemontii, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 36 = G. royleana.
Perrottetii, Jaub. & Spach, l. c. 38 = G. nutans.
plumosa, Hochst. in Flora, xxxviii. 273 = G. royleana.
rothiana, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. 95 = G. nutans.
royleana, Nees, l. c. = G. royleana.

MELANOCHYLA, Hook. f. (Anacard.).
bracteata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 506.—Penins. Mal.
densiflora, *King, l. c.* 503.—Penins. Mal.
Kunstleri, *King, l. c.* 504.—Penins. Mal.
nitida, *King, l. c.* 507.—Penins. Mal.
rugosa, *King, l. c.* 505.—Penins. Mal.

MELANOPHYLLA, Baker (Cornac.).
crenata, *Baker, in Hook. Ic. Pl.* t. 2499.—Madag.

MELANORRHOEA, Wall. (Anacard.).
aptera, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 487.—Penins. Mal.
inappendiculata, *King, l. c.* 488.—Penins. Mal.
torquata, *King, l. c.* 486.—Penins. Mal.
woodsiana, *Scortech. ex King, l. c.* 485.—Penins. Mal.

MELANOSELINUM, Hoffm. = **Thapsia**, Linn. (Umbell.).
edule, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 247.—Ins. Mader.

MELANTHERA, Rohr (Compos.).
albinervia, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 30.—Afr. trop.

MELANTHERA:—
cuanzensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 583.—Afr. trop.
elliptica, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
monochaeta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 581.—Afr. trop.
scaberrima, *Hiern, l. c.* 582.—Afr. trop.
varians, *Hiern, l. c.* 580.—Afr. trop.

MELANTHIUM, Clayt. (Liliac.).
dispersum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 606.—Am. bor.
tenue, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 223 = Wurmbea tenuis.

MELASMA, Berg (Scrophul.).
atrosanguineum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 769.—Afr. trop.
dentatum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 394 (= *Hymenospermum dentatum*).—Afr. trop.
hippocrepandrum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 768.—Afr. trop.
parviflorum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 394 (= *Orobanche parviflora*).—Afr. trop.
pictum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 770.—Afr. trop.
rigidum, *Hiern, l. c.* 767.—Afr. trop.
sessiliflorum, *Hiern, l. c.* (= *Alectra melampyroides*).—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, l. c.* 769.—Afr. trop.

MELASTOMA, Burm. (Melast.).
Godeffroyi, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 661.—Ins. Samoa.

MELHANIA, Forsk. (Stercul.).
agnosta, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 11.—Afr. austr.
angustifolia, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Dehnhardtii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 302.—Afr. trop.
grandibracteata, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 15.—Afr. trop.
malacochlamys, *K. Schum. l. c.* 13.—Afr. trop.
Phillipsiae, *Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 4.—Afr. trop.
polyneura, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 8.—Afr. trop.
Randii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 425.—Afr. trop.
somalensis, *Baker f. l. c.* 1898, 3.—Afr. trop.
virescens, *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 6.—Afr. trop.

MELIA, Linn. (Meliac.).
bogoriensis, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 18.—Java.

MELIANTHUS, Linn. (Sapind.).
insignis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 43.—Afr. austr.
villosus, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 17.—Afr. austr.

MELICA, Linn. (Gramin.).
Bolusii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 685.—Afr. austr.
caffrorum, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2073 = racemosa.
decumbens, Weber, Spicil. Fl. Gotting. 3 = Danthonia decumbens.
dendroides, Lehm. Pugill. iii. 39 = decumbens.
digitata, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 326 = Chloris incompleta.
longiligula, *Scribn. & Kearney, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 225.—Am. bor.
Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 706.—Japon.
mollis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 161.—Chili.
Neesii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 687.—Afr. austr.
nitida, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 160.—Chili.
Pammelii, *Scribn. ex Pammel, in Contr. Bot. Dep. Iowa*, xv. 240.—Am. sept.
Paulseni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 159.—Chili.
pumila, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 686.—Afr. austr.
rigida, Wibel, Prim. Fl. Werth. 117 = Danthonia decumbens.
rimarum, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 124.—Eur.
scaberrima, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 330.—Ind. or.
tortuosa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 161.—Chili.

MELICOPE, Forst. (Rutac.).
Beccarii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 122 (= *Tetractomia Beccarii*).—Borneo.
fareana, *Engl. l. c.* (= *Evodia fareana*).—Austral.
luzonensis, *Engl. l. c.*—Ins. Philipp.
Mahonyi, *F. M. Bailey, Queensl. Agric. Journ.* vi. 287.—N. Guin.
major, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 122 (= *Tetractomia majus*).—Malaya.
platynema, *Engl. l. c.* (= *Brombya platynema*).—Austral.
Roxburghii, *Engl. l. c.* (= *Tetractomia Roxburghii*).—Malaya.

MELINIA, Decne. (Asclep.).
atropurpurea, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 72.—Bras.
urbaniana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 19.—Bras.

MELINIS, Beauv. (Gramin.).
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 200.—Afr. trop.
gracilis, *Pilger, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 268, nomen.—Afr. trop.
tenuissima, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2660.—Afr. trop.
tomentosa, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 201.—Afr. trop.
Welwitschii, *Rendle, l. c.*—Afr. trop.

MELIOSMA, Blume (Sabiac.).
cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 360A.—Cochinch.
colletiana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 116.—Burma.
ferruginea, *Kurz, ex King, l. c.* (non aliorum).—Reg. Himal.
Glaziovii, *Urb. Symb. Antill.* i. 508.—Bras.
harmandiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 360.—Cochinch.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 452.—China.
impressa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 517.—Ind. occ.
Itatiaiae, *Urb. l. c.* 510.—Bras.
levis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 457.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 458.—Singapore.
seleriana, *Urb. Symb. Antill.* i. 507.—Am. cent.
yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. 465.—China.

MELISSA, Tourn. (Labiat.).
arvensis, Bub. Fl. Pyren. i. 411 = Calamintha Acinos.
inodora, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 617 (non Hassk.).—Palaest.
montana, Bub. Fl. Pyren. i. 412 = Calamintha alpina.

MELLERA, S. Moore (Acanth.).
Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 210.—Afr. trop.
parvifolia, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 314.—Afr. trop.
submutica, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 51.—Afr. trop.

MELLICHAMPIA, Gray (Asclep.).
ligulata, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 425 (= *Enslenia ligulata*).—Mexic.

MELOCACTUS, Tourn. (Cact.).
Bradleyi, *Suring. in Verh. Akad. Wet. Amst.* v. III. 23.—Ind. occ.
croceus, *Suring. l. c.* 40.—Ind. occ.
eustachianus, *Suring. l. c.* 37.—Ind. occ.
Hookeri, *Suring. l. c.* 31.—Ind. occ.
Linkii, *Suring. l. c.* 39.—Ind. occ.

MELOCANNA, Trin. (Gramin.).
gracilis, Kurz, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 133 = Schizostachyum chilianthum.
Kurzii, Munro, l. c. 134 = Bambusa schizostachyoides.
lutescens, Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 414 = Cephalostachyum flavescens.
Rheedii, Steud. Syn. Pl. Gram. 332 = Ochlandra Rheedii.
tenuispiculata, Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 416 = Schizostachyum Blumei.

MELOCHIA, Dill. (Stercul.).
crinita, *R. Br. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 90.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, l. c.* 91.—Afr. trop.

MELODINUS, Forst. (Apocyn.).
australis, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 647.—Austral.
australis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 103 (= *Chilocarpus australis*).—Austral.
Beccarii, *Pierre, l. c.* 98 (= *Ancylocladus Beccarii*).—Malaya.
cambodiensis, *Pierre, l. c.* 103.—Cochinch.
curvinervius, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 10.—Borneo.
hemsleyanus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 539.—China.
landolphioides, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 500.—N. Guin.
ovalis, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 12.—Borneo.
Pancheri, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 103.—N. Caled.
pulchrinervius, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 10.—Borneo.
rhytidiphyllus, *Boerl. l. c.* 11.—Borneo.

MELOLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
Wilmsii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 283.—Afr. austr.

MELOTHRIA, Linn. (Cucurb.).
affinis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 38.—Malaya.
crassifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 483.—Am. bor.
domingensis, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* i. 451.—Ind. occ.
Nashii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 483.—Am. bor.

MEMECYLON, Linn. (Melast.).
andamanicum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 85.—Ins. Andam. et Nicobar.
Buchananii, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 40.—Afr. trop.
calophyllum, *Gilg, l. c.* 42.—Afr. trop.
candidum, *Gilg, l. c.* 43.—Afr. trop.
cinereum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 82.—Penins. Mal.
cinnamomoides, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 39 (non G. Don).—Afr. trop.
Cogniauxii, *Gilg, l. c.* 44.—Afr. trop.
conocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 482.—N. Guin.
dichotomum, *C. B. Clarke, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 75.—Penins. Mal.
epiphyticum, *King, l. c.* 74.—Penins. Mal.
erubescens, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 41.—Afr. trop.
eryanthum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 356, sphalm. = seq.
erythranthum, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 45.—Afr. trop.
flavovirens, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
fruticosum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 74.—Penins. Mal.
Heinsenii, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 42.—Afr. trop.
heterophyllum, *Gilg, l. c.* 39.—Afr. trop.
Hullettii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 76.—Penins. Mal.
hylophilum, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 42.—Afr. trop.
jasminoides, *Gilg, l. c.* 39.—Afr. trop.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 76.—Penins. Mal.
Kurzii, *King, l. c.* 77.—Ins. Nicobar.
leucocarpum, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 40.—Afr. trop.
longicauda, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Machairacme, *Gilg, l. c.* 42.—Afr. trop.
Millenii, *Gilg, l. c.* 39.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.
myrianthum, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 44.—Afr. trop.
Poggei, *Gilg, l. c.* 43.—Afr. trop.
polyneuron, *Gilg, l. c.* 41.—Afr. trop.
pubescens, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 74.—Penins. Mal.
pulcherrimum, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 41.—Afr. trop.
purpureo-coeruleum, *Gilg, l. c.* 38.—Afr. trop.
strychnoides, *Gilg, l. c.* 39 (non Baker).—Afr. trop.
Zenkeri, *Gilg, l. c.* 43.—Afr. trop.

MEMORA, Miers (Bignon.).
consanguinea, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 267 (= *Spathodea consanguinea*).—Am. austr.
flavida, Bureau & K. Schum. l. c. 264 (= *Bignonia flavida*).—Bras.
involucrata, Bureau & K. Schum. l. c. 271 (= *Pharseophora involucrata*).—Bras.
lenta, Bureau & K. Schum. l. c. 265 (= *Temnocydia lenta*).—Bras.
obtusifoliolata, Bureau & K. Schum. l. c. 261.—Bras.

MENDONCIA, Vell. (Acanth.).
crenata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 647.—Guiana.
fulva, *Lindau, l. c.* 646.—Reg. Amazon.
mollis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 44.—Bras.
obovata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 646.—Reg. Amazon.
Sprucei, *Lindau, l. c.* 647.—Reg. Amazon.

MENKEA, Lehm. (Crucif.).
coolgardiensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 161.—Austral.

MENKENIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 556 (1900) = **Lathyrus**, Tourn. (Legum.).
canescens, Bub. l. c. 557 = L. canescens.
ensifolia, Bub. l. c. 558 = L. canescens.
lutea, Bub. l. c. 559 = L. montanus.
nigrescens, Bub. l. c. = L. niger.
saxatilis, Bub. l. c. = L. ciliatus.
tuberosa, Bub. l. c. 557 = L. macrorrhizus.
verna, Bub. l. c. 556 = L. vernus.

MENONVILLEA, R. Br. (Crucif.).
falcata, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 55.—Chili.

MENTHA, Tourn. (Labiat.).
Formae novae nonnullae, vide Braun & Topitz, in Deutsch. Bot. Monatsschr. xiv. 55, 140.
cinerea, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* 114 (non aliorum).—Galic.
cordata, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 534.—Austria.
paradoxa, *Pospich. l. c.* 543.—Austria.
romana, Bub. Fl. Pyren. i. 385 = viridis.
rubella, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 337.—Am. bor.
varians, *Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. Sel.* (1897) fide *Just, Jahresb.* xxv. II. 335.—Eur.

MENTZELIA, Plum. (Loasac.).
andina, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 31.—Chili.
citrina, *Urb. & Gilg, l. c.* 27.—Reg. Argent.
compacta, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 275.—Am. bor.
Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 298.—Mexic.
cordifolia, *Dombey, ex Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 74.—Peruv.
densa, *Greene, Pittonia*, iii. 99.—Am. bor.
Galeottii, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 69.—Mexic.
gracilis, *Urb. & Gilg, l. c.* 61.—Mexic.
Grisebachii, *Urb. & Gilg, l. c.* 48.—Reg. Argent.
imbricata, *Urb. & Gilg, l. c.* 67.—Mexic.
incisa, *Urb. & Gilg, l. c.* 59.—Mexic.
integrifolia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 271 = dispersa.
Karwinskii, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 65.—Mexic.
leucophylla, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 448.—Am. bor.
Lindheimeri, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 54.—Am. bor.; Mexic.
lutea, *Greene, Pittonia*, iii. 99.—Am. bor.
Orizabae, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 60.—Mexic.
palmeriana, *Urb. & Gilg, l. c.* 75.—Mexic.
parviflora, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 199.—Am. bor.
perennis, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 260.—Am. bor.
pinnatifida, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 356 = andina.
polyantha, *Urb. & Gilg, l. c.* 70.—Mexic.
pterosperma, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 290.—Am. bor.

MENTZELIA:—
Rusbyi, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 261.—Am. bor.
sessilifolia, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 57.—Mexic.
soratensis, *Urb. & Gilg, l. c.* 68.—Bolivia.
stenophylla, *Urb. & Gilg, l. c.* 80.—Am. bor.
tenerrima, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 271.—Am. bor.
texana, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 52.—Am. bor.
Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 271.—Am. bor.

MEOSCHIUM, Beauv. = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).
imbricatum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 127 = I. aristatum.
Wightii, Nees, in Wight, Cat. n. 1719 = I. rugosum.

MERCIERA, A. DC. (Campan.).
azurea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 447.—Afr. austr.

MERCURIALIS, Tourn. (Euphorb.).
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. i. 89 = perennis.

MERENDERA, Ram. (Liliac.).
Badghyii, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. no. 4, 99.—Turkestan.
kurdica, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 79.—Oriens.

MERIANDRA, Benth. (Labiat.).
dianthera, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 288 = benghalensis.

MERINGURUS, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxvi. Afd. II. no. 1 (1900) 27. *GRAMINEAE*.
africanus, *Murb. l. c.*—Tunis.

MERINTHOPODIUM, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. (1897) 11. *SOLANACEAE*.
neuranthum, *Donn. Sm. l. c.* 12.—Am. cent.

MEROSTACHYS, Spreng. (Gramin.).
argyronema, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 22.—Bras.

MEROSTELA, Pierre (Meliac.).
grandifolia, Pierre, Fl. Cochinch. t. 342 = grandis.
grandis, *Pierre, l. c.* sub t. 334, et t. 342.—Cochinch.

MERREMIA, Dennst. = **Convolvulus**, Tourn. (Convolv.).
Gregorii, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 39.—Afr. trop.
linearifolia, Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xvi. 36, repr.—Guiana.
Palmeri, Hallier f. l. c. 38 = Ipomoea Palmeri.
pes-draconis, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 537.—Afr. trop.
somalensis, Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 226 = C. somalensis, *Vatke*.

MERTENSIA, Roth (Borag.)
amoena, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 195.—Am. bor.
arizonica, *Greene, Pittonia*, iii. 197.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* iv. 90.—Am. bor.
brachyloba, *Greene, l. c.*—Am. bor.
foliosa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 243.—Am. bor.
franciscana, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 549.—Am. bor.
fusiformis, *Greene, Pittonia*, iv. 89.—Am. bor.
intermedia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 335.—Am. bor.
linearis, *Greene, Pittonia*, iii. 197.—Am. bor.
longiflora, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.
MacDougalii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 550.—Am. bor.
nivalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 336.—Am. bor.
papillosa, *Greene, Pittonia*, iii. 261.—Am. bor.
platyphylla, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 548.—Am. bor.
polyphylla, *Greene, Pittonia*, iv. 87.—Am. bor.
pratensis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 550.—Am. bor.
punctata, *Greene, Pittonia*, iv. 88.—Am. bor.
strigosa, *Greene, l. c.*—Am. bor.
subcordata, *Greene, l. c.* 89.—Am. bor.

MERTENSIA:—
tubiflora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 544.—Am. bor.
Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 336.—Am. bor.
umbratilis, *Greenm. in Erythea*, 1899, 118.—Am. bor.
viridis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 244.—Am. bor.

MERYTA, Forst. (Aral.).
colorata, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 283.—N. Guin.
drakeana, *Nad. in Journ. de Bot.* 1897, 105.—Ins. Societ.
mauraensis, *Nad. l. c.* 106.—Ins. Societ.

MESADENIA, Rafin. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
diversifolia, Greene, Pittonia, iii. 182 = S. floridanus.
floridana, Greene, l. c. 183 = S. floridanus.
tuberosa, Britton, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 474 = S. Nuttallii.

MESANTHUS, Nees = **Cannomois**, Beauv. (Restiac.).
macrocarpus, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 451 = C. Cephalotes.

MESEMBRYANTHEMUM, Dill. (Ficoid.).
arenosum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 79.—Afr. austr.
brevipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 126.—Afr. austr.
calcaratum, *Wolley-Dod, in Journ. Bot.* 1900, 170.—Afr. austr.
chrysoleucum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 126.—Afr. austr.
cradockense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
dasyphyllum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
Fenchelii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 79.—Afr. austr.
grandifolium, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
harazianum, *Deflers, Voy. Yemen*, 140.—Arab.
insigne, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
Kuntzei, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 80.—Afr. trop.
montanum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
nanum, *Schlechter, l. c.* 128.—Afr. austr.
nubigenum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 316.—Afr. austr.
olivaceum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 128.—Afr. austr.
oxysepalum, *Schlechter, l. c.* 129.—Afr. austr.
parvulum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
pulvinatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
ramosissimum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130.—Afr. austr.
Rehmannii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 80.—Afr. trop.
sabulosum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130 (non aliorum).—Afr. austr.
Schenckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 80.—Afr. austr.
schoenlandianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130.—Afr. austr.
subspinosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
Urbanianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 445.—Afr. austr.

MESONA, Blume (Labiat.).
parviflora, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 365 = wallichiana.

MESOSPHAERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiat.).
alopecuroides, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 201 = H. alopecuroides.
amaurocaulon, Briq. l. c. 211 = H. amaurocaulos.
Biolleyi, Briq. l. c. 200 = H. Biolleyi.
brachiatum, Briq. l. c. 215 = H. brachiata.
chacapoyense, Briq. l. c. 204 = H. chacapoyensis.
chapalense, Briq. l. c. 203 = H. chapalensis.
constrictum, Briq. l. c. 217 = H. constricta.
costulatum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 797 = H. costulata.
diaphorum, Briq. l. c. 786 = H. diaphora.
dyscheres, Briq. l. c. 794 = H. dyscheres.
Gardneri, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 230 = H. Gardneri.

MESOSPHAERUM:—
gymnodontum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 795 = H. gymnodonta.
hygrobium, Briq. l. c. 789 = H. hygrobia.
idiocephalum, Briq. l. c. 792 = H. idiocephala.
Jurgenseni, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 219 = H. Jurgenseni.
Karsteni, Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xii. 103.—N. Granat.
kuntzeanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 787 = H. kuntzeana.
leucochlorum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 196 = H. leucochlora.
longifrons, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 793 = H. longifrons.
macrosiphon, Briq. l. c. 785 = H. macrosiphon.
macroterum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 210 = H. macrotera.
macrotrichum, Briq. l. c. 195 = H. macrotricha.
Pittieri, Briq. l. c. 220 = H. Pittieri.
plagiostomum, Briq. l. c. 197 = H. plagiostoma.
rugosum, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 156 = H. radiata.
savannarum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 216 = H. savannarum.
siderotrichum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 791 = H. siderotricha.
spicatum, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 83 = H. spicata.
subnudum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 231 = H. subnuda.
subviolaceum, Briq. l. c. 222 = H. subviolacea.
tenellum, Briq. l. c. 223 = H. tenella.
trachychroum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 790 = H. trachychroa.
Vauthieri, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 199 = H. Vauthieri.
velascanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 798 = H. velascana.

METALASIA, R. Br. (Compos.).
Massoni, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 372.—Afr. austr.

METASTELMA, R. Br. (Asclep.).
aemulans, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 252.—Ind. occ.
atrorubens, *Schlechter, l. c.* 263.—Ind. occ.—
barbadense, *Schlechter, l. c.* 253.—Ind. occ.
bonplandianum, *Schlechter, l. c.* 259.—Ind. occ.
crassiusculum, *Schlechter, l. c.* 261.—Ind. occ.
decaisneanum, *Schlechter, l. c.* 250.—Ind. occ.
decipiens, *Schlechter, l. c.* 249.—Ind. occ.
domingense, *Schlechter, l. c.* 251.—Ind. occ.
Eggersii, *Schlechter, l. c.* 258.—Ind. occ.
ephedroides, *Schlechter, l. c.* 262.—Ind. occ.
fallax, *Schlechter, l. c.* 249.—Ind. occ.
Fawcettii, *Schlechter, l. c.* 260.—Ind. occ.
Harrisii, *Schlechter, l. c.* 256.—Ind. occ.
Hartii, *Schlechter, l. c.*—Ind. occ.
leptocladon, *Schlechter, l. c.* 261 (= *Vincetoxicum leptocladum*).—Am. austr.; Ind. occ.
macropoda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 481.—Mexic.
martinicense, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 251.—Ind. occ.
Mathewsii, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 497.—Bolivia.
palustre, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 258 (= *Amphistelma salinarum*).—Ind. occ.
pauciflorum, *Schlechter, l. c.* 260.—Ind. occ.
Picardae, *Schlechter, l. c.* 248.—Ind. occ.
Readii, *Schlechter, l. c.* 255.—Ind. occ.
salinarum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 120 (= *Amphistelma salinarum*).—Ind. occ.
stenoglossum, *Schlechter, l. c.* 252.—Ind. occ.
tylophoroides, *Schlechter, l. c.* 259.—Ind. occ.
urbanianum, *Schlechter, l. c.* 254.—Ind. occ.

METHONICA, Tourn. = **Gloriosa**, Linn. (Liliac.).
grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 5216 = G. virescens.
Leopoldi, Van Houtte, ex Lem. in Fl. des Serres, tt. 163-4 = G. virescens.
petersiana, Klotzsch, ex Garcke, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 519, t. 54 = G. virescens.
platyphylla, Klotzsch, l. c. 520, t. 55 = G. virescens.
virescens, Kunth, Enum. Pl. iv. 277 = G. virescens.

METRODOREA, A. St. Hil. = **Esenbeckia**, Kunth (Rutac.).
brevifolia, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 29.—Bras.
selloana, Engl. l. c.—Bras.

METROXYLON, Rottb. (Palm.).
oxybracteatum, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 202.—N. Guin.

MEZONEURUM, Desf. (Legum.).
furfuraceum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 471.—Ind. or.
Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 233.—Penins. Mal.

MICHELIA, Linn. (Magnol.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 631.—Celebes.

MICHELIELLA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 325 (1897). *LABIATAE.*
anisata, *Briq. l. c.* (= *Collinsonia anisata*).—Am. bor.
verticillata, *Briq. l. c.* (= *Collinsonia verticillata*).—Am. bor.

MICONIA, Ruiz & Pav. (Melast.).
erioneura, *Cogn. ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 38.—Bolivia.
glomerulifera, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 15.—Bolivia.
Kuntzei, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 93.—Bolivia.
lasiocalyx, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 2:8.—Bolivia.
micrantha, *Cogn. l. c.* 16.—Bolivia.
valida, *Cogn. l. c.* 278.—Bolivia.

MICRANTHUS, Wendl. = **Phaylopsis**, Willd. (Acanth.).
glandulosus, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 115 = P. glandulosa.
Hensii, Lindau, l. c. 114 = P. obliqua.
imbricatus, Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo, i. 217 = P. parviflora.
lankesterioides, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 9 = P. lankesterioides.
longifolius, Lindau, in Engl. Pfl. Ost.-Afr. C. 367 = P. longifolia et P. falcisepala.
Poggei, Lindau, in Engl. Jahrb. xvii. 108 = P. Poggei.

MICROBAMBUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 336. *GRAMINEAE.*
macrostachys, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

MICROCHARIS, Benth. (Legum.).
Galpini, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 258.—Afr. austr.

MICROCHLOA, R. Br. (Gramin.).
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20; et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 404 = setacea.
altera, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 637.—Afr. austr.
elongata, R. Br. in Wall. Cat. n. 3807 = setacea.
ensifolia, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 219.—Afr. trop.

MICROCHONEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 31. *APOCYNACEAE.*
lucida, *Pierre, l. c.* 32.—Cochinch.

MICROCOELIA, Lindl. = **Angraecum**, Bory (Orchid.).
exilis, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 61 = A. Chiloschistae.

MICRODESMIS, Hook. f. (Euphorb.).
paniculata, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 25.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pax, l. c.* xxiii. 531.—Afr. trop.

MICROGLOSSA, DC. (Compos.).
Afzelii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 469.—Afr. trop.

MICROLAENA, R. Br. (Gramin.).
Giulianettii, *Stapf, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

MICROLOMA, R. Br. (Asclep.).
longituba, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 445.—Afr. austr.
Massonii, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 2 = Astephanus Massoni.

MICROLONCHOIDES, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 145. *COMPOSITAE.*
pinnatum, *Candargy, l. c.* 146.—Graecia.

MICROMERIA, Benth. (Labiat.).
balcanica, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 235.—Bulgar.
insularis, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 149. —Graecia.
longiflora, *Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 453.—Afr. trop.
punctata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 378 = biflora.
Purtschelleri, Guerke, in Engl. Hochgebirgsfl. Trop. Afr. 365 = biflora.
Schimperi, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 326 = biflora.
unguentaria, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 124 = longiflora.

MICROSERIS, D. Don (Compos.).
nigrescens, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 348. —Am. bor.

MICROSTEMON, Engl. (Anacard.).
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 498.—Penins. Mal.

MICROSTERIS, Greene, Pittonia, iii. (1898) 300. *POLEMONIACEAE.*
andicola, *Greene, l. c.* 303.—Chili.
californica, *Greene, l. c.* 302.—Am. bor.
diffusa, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 313.—Am. bor.
glabella, *Greene, Pittonia*, iii. 301.—Am. bor.
gracilis, *Greene, l. c.* 300.—Am. bor.
humilis, *Greene, l. c.* 301.—Am. bor.
Mac Dougalii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 621.—Am. bor.
micrantha, *Greene, Pittonia*, iii. 303.—Am. bor.
stricta, *Greene, l. c.* 302.—Am. bor.

MICROSTYLIS, Nutt. (Orchid.).
andamanica, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 582.—Ins. Andaman.
aphylla, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 18.—Ind. or.
cordifolia, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 127.—Celebes.
elegans, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 264.—Borneo.
laciniosa, *Ridley, l. c.*—Borneo.
maculata, *Ridley, l. c.* 263.—Borneo.
madagascariensis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 140.—Madag.
maximowicziana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 329.—Reg. Himal.
mindorensis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 357.—Ins. Philipp.
minutiflora, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 540. —Am. cent.
moluccana, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 2.—Ins. Molucc.
nigrescens, *J. J. Sm. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 324.—Celebes.
perakensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 222.—Penins. Mal.
platyglossa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 35.—Mexic.
prasina, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 223.—Siam.
reineckeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxv. 600.—Ins. Samoa.
repens, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 127.—Celebes.
saprophyta, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 118.—Reg. Himal.
streptopetala, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 36.—Mexic.
trigonopetala, *J. J. Sm. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 324, nomen.—Celebes.

MICROTAENA, Prain (Labiat.).
praineana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 556.—China.

MICROTROPIS, Wall. (Celastr.).
elliptica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 340.—Penins. Mal.
filiformis, *King, l. c.* 342.—Penins. Mal.
occidentalis, *Loes. ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 393.—Am. cent.
schiedeana, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 98.—Mexic.

MICROULA, Benth. (Borag.).
Benthami, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 167 = tibetica.
sikkimensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2562.—Ind. or.
tibetica, *Maxim. Mél. Biol.* x. 682.—Tibet.

MIEDIEGA, Bub. Fl. Pyren. ii. 504 (1900) = **Dorycnium**, Linn. (Legum.).
gracilis, Bub. l. c. 505 = D. herbaceum.
procumbens, Bub. l. c. 506 = Anthyllis Gerardi.
suffruticosa, Bub. l. c. 505 = D. suffruticosum.

MIERSIOPHYTON, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 405. *MENISPERMACEAE.*
nervosum, *Engl. l. c.* 406 (= *Chasmanthera nervosa*). —Afr. trop.

MIKANIA, Willd. (Compos.).
catharinensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 796.—Bras.
chimborazensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 15.—Ecuador.
fragilis, *Urb. Symb. Antill.* i. 464.—Ind. occ.
Gonzalezii, *Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Nat. Hist. Soc.* xxix. 107.—Mexic.
lanceolata, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 17. —Reg. Andin.
lloensis, *Hieron. l. c.* 18.—Ecuador.
Niederleinii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 792.—Reg. Argent.
odoratissima, *Urb. Symb. Antill.* i. 464.—Ind. occ.
orleansensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 790.—Bras.
pachyphylla, *Urb. Symb. Antill.* i. 463.—Ind. occ.
porosa, *Urb. l. c.* 465.—Ind. occ.
saltensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 794.—Reg. Argent.
Schenckii, *Hieron. l. c.* 797.—Bras.
siambonensis, *Hieron. l. c.* 790.—Reg. Argent.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 16.—Ecuador.
tropaeolifolia, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 468.—Afr. trop.
Ulei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 795.—Bras.
variifolia, *Hieron. l. c.* 793.—Reg. Argent.

MILIUM, Linn. (Gramin.).
adscendens, Roxb. Hort. Beng. 8 = effusum.
arundinaceum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 45 = Oryzopsis miliacea.
capillare, Roth, Nov. Pl. Sp. 39 = Panicum subeglume.
Carar, Ham. ex Wall. Cat. n. 8750 F = Eriochloa polystachya.
caucasicum, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 209.—Reg. Caucas.
cimicinoides, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 70 = Arundinella setosa.
cimicinum, Linn. Mant. ii. 184 = Axonopus cimicinus.
dubium, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 235 = effusum.
filiforme, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 314 = Digitaria longiflora.
Laguchinia, Ham. ex Wall. Cat. n. 8750 G = Eriochloa polystachya.
laterale, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. 645 = Oryzopsis lateralis.
minutiflorum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. 121 = Paspalum Perrottetii.
multiflorum, Cav. Desc. 36 = Oryzopsis miliacea.
orixense, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 21 = Eriochloa polystachya.
ovatum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8752 = Digitaria puberula.
radiatum, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18 = Digitaria longiflora.
ramosum, Retz. Obs. vi. 22 = Eriochloa polystachya.
tenerum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3829 B = Eragrostis pilosa.
triracemosum, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18 = Digitaria longiflora.

MILLA, Cav. (Liliac.).
bonariensis, Gilg, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. 382 = Brodiaea uniflora.
brevipes, Baker, l. c. 386 = Brodiaea brevipes.
hirtella, Baker, l. c. 385 = Brodiaea hirtella.
hyacinthina, Baker, l. c. = Brodiaea hyacinthina.
patagonica, Baker, l. c. 382 = Brodiaea patagonica.
poeppigiana, Baker, l. c. 383 = Brodiaea poeppigiana.
sellowiana, Baker, l. c. = Brodiaea sellowiana.
sessiliflora, Baker, l. c. 382 = Brodiaea sessiliflora.
setacea, Baker, l. c. 385 = Brodiaea setacea.
subbiflora, Baker, l. c. = Brodiaea subbiflora.
tweediana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. 319 = Brodiaea uniflora.

MILLA:—
uniflora, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan. 1833) 174 = Brodiaea uniflora.
violacea, Baker, in Journ. Bot. 1874, 5 = Brodiaea violacea.

MILLEGRANA, Adans. = **Radiola**, Dill. (Linac.).
Radiola, Druce, Fl. Berks. 114 = R. linoides.

MILLETTIA, Wight & Arn. (Legum.).
adenopetala, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 184.—Afr. trop.
albiflora, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 92.—Penins. Mal.
Bockii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 412.—China.
cauliflora, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 94.—Penins. Mal.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 15; *et in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. 61.—Afr. trop.
decipiens, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 90.—Penins. Mal.
dielsiana, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 412. —China.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 287.—Afr. trop.
goetzeana, *Harms, l. c.* xxviii. 404.—Afr. trop.
hemsleyana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 90. —Penins. Mal.
impressa, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 288.—Afr. trop.
macroura, *Harms, l. c.* 289.—Afr. trop.
micrantha, *Harms, l. c.* 290.—Afr. trop.
monophylla, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
oocarpa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 92.—Penins. Mal.
paucijuga, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 287.—Afr. trop.
pilipes, *F. M. Bailey, Cat. Pl. Queensl.* 83; *Queensl. Fl.* 397.—Austral.
puerarioides, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 358.—Ind. or.
sanagana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 288.—Afr. trop.
sericantha, *Harms, l. c.* xxviii. 404.—Afr. trop.
Soyauxii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 185.—Afr. trop.
stipularis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 363.—Sumatra.
unifoliata, *Prain, l. c.* 93.—Penins. Mal.
wrightiana, *Prain, l. c.* 359.—Burma.
zenkeriana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 291.—Afr. trop.

MILNEA, Roxb. = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).
pirifera, Pierre, Fl. Cochinch. t. 339 A = A. pirifera.

MILTONIA, Lindl. (Orchid.).
Binoti, *Cogn. in Gard. Chron.* 1897, II. 393.—Bras.

MILULA, Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. (1896) 164. *LILIACEAE.*
spicata, *Prain, l. c.* 165.—Ind. or.

MIMOSA, Linn. (Legum.).
acapulcensis, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 135. —Mexic.
albolanata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 433.—Bras.
Brandegei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 316. —Calif.
caerulea, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
calcicola, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 325. —Mexic.
Campenoni, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1300. —Madag.
coelocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 319.—Mexic.
cyclophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 429.—Bras.
Desmii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 324.—Mexic.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 253.—Afr. trop.
dolichocephala, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 66. —Parag.
eurycarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 322. —Mexic.
formosana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 433.—Bras.
gracilipes, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 67.—Parag.
Goldmanii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 308. —Mexic.

MIMOSA:—
hapaloclada, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 40.—Bras.
Hildebrandti, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1300.—Madag.
Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 67.—Bolivia.
lacerata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
levenensis, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1300.—Madag.
longepedunculata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 432.—Bras.
longepetiolata, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 38.—Bras.
Nelsonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 314.—Mexic.
neptuniodes, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 67.—Bolivia.
paraizensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 430.—Bras.
psilocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 325.—Mexic.
purpurascens, *Robinson, l. c.* xxxiii. 317.—Calif.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 430.—Bras.
Rosei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 317.—Mexic.
setosissima, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 434.—Bras.
sicyocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 313.—Mexic.
speciosissima, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxii. 431.—Bras.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 254.—Afr. trop.
tocantina, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 431.—Bras.
tomentosa, *Taub. l. c.* 434 (non aliorum).—Bras.
Ulei, *Taub. l. c.* 432.—Bras.
velascoensis, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 68.—Bolivia.
Vepres, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 46.—Parag.
Vilersii, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1299.—Madag.

MIMULOPSIS, Schweinf. (Acanth.).
arborescens, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 57.—Afr. trop.
Elliotii, *C. B. Clarke, l. c.* 56.—Afr. trop.
spathulata, *C. B. Clarke, l. c.* 55.—Afr. trop.
Thomsoni, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

MIMULUS, Linn. (Scrophul.).
clivicola, *Greenm. in Erythea*, vii. 119.—Am. bor.
coccineus, *Congdon, in Erythea*, vii. 187.—Calif.
corallinus, *Greene, in Erythea*, iv. 21.—Calif.
jungermannioides, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 154.—Am. bor.
pilosellus, *Greene, in Erythea*, iv. 22.—Calif.
serotinus, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 154.—Am. bor.
thermalis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 269.—Am. bor.
Tolmiei, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 351 = nanus, *Hook. & Arn.*
viscidus, *Congdon, in Erythea*, vii. 187.—Calif.

MIMUSOPS, Linn. (Sapot.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 646.—Afr. trop.
Djave, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 279.—Afr. trop.
frondosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 645.—Afr. trop.
natalensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 279 (= *Mahea natalensis*).—Afr. austr.
natalensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 441 = marginata.
obovata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 279 (non Sond.).—Afr. trop.
penduliflora, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 448.—Afr. trop.
riparia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

MINA, Cerv. (Convolv.).
cordata, Micheli, in Rev. Hort. 1898, 554; 1899, 308 = lobata.
lobata, *Cerv. in La Llav. & Lex. Nov. Veg. Descr.* i. 3.—Mexic.

MINKELERSIA, Mart. & Gal. (Legum.).
multiflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 142.—Mexic.
pauciflora, *Rose, l. c.*—Mexic.

MINUARTIA, Linn. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).
peploides, Hiern, in Journ. Bot. 1899, 322 = A. peploides.
rubella, Hiern, l. c. 320 = A. verna.
sedoides, Hiern, l. c. 321 = A. sedoides.
stricta, Hiern, l. c. 320 = A. stricta.
tenuifolia, Hiern, l. c. 321 = A. tenuifolia.
verna, Hiern, l. c. 320 = A. verna.

MINURIA, DC. (Compos.).
annua, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. 288 (= *Minuriella annua*).—Austral.

MINURIELLA, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xxiii. (1899) 288. *COMPOSITAE.*
annua, *Tate, l. c.*—Austral.

MIQUELIA, Arn. & Nees = **Garnotia**, Brongn. (Gramin.).
courtallensis, Arn. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 177 = G. courtallensis.
elata, Arn. & Nees, ex Miq. Analect. Bot. ii. 20 = G. scoparia.
Emodi, Arn. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 177 = G. polypogonoides.

MIRABILIS, Riv. (Nyctag.).
Cervantesii, Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien. xxiii. repr. 23 (= *Oxybaphus nyctagineus*).—Am. bor.
glutinosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 265.—Bolivia.
prostrata, Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien, xxiii. repr. 21 (= *Oxybaphus micranthus*).—Chili.

MIRBELIA, Sm. (Legum.).
microphylloides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 164.—Austral.

MISCANTHUS, Anderss. (Gramin.).
condensatus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 639.—Japon.
floridulus, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 166 = japonicus.
Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 640.—Japon.
oligostachyus, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 227.—Japon.

MITELLA, Tourn. (Saxifr.).
anomala, *Piper, in Erythea*, vii. 162.—Am. bor.
diversiloba, *Piper, l. c.*—Am. bor.
integripetala, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 689.—Japon.
micrantha, *Piper, in Erythea*, vii. 162.—Am. bor.
stauropetala, *Piper, l. c.* 161.—Am. bor.
stenopetala, *Piper, l. c.*—Am. bor.
stylosa, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 688.—Japon.
violacea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 248.—Am. bor.

MITELLASTRA, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 201 (1898). *SAXIFRAGACEAE.*
caulescens, *Howell, l. c.* (= *Mitella caulescens*).—Am. bor. occ.

MITRACARPUM, Zucc. (Rubiac.).
megapotamicum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 121 = sellowianum.

MITRAGYNA, Korth. (Rubiac.).
diversifolia, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 71.—Ind. or.; Malaya.
hirsuta, *Havil. l. c.* 72.—Cochinch.
rubrostipulacea, *Havil. l. c.* 73 (= *Adina rubrostipulata*).—Afr. trop.

MITREPHORA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
chrysocarpa, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. II. 141 (= *Orophea chrysocarpa*).—Borneo.
ferruginea, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 334.—Celebes.
glandulifera, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 60.—Hab.?
Minahassae, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 335.—Celebes.
mollis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 320.—N. Guin.
ovata, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. II. 141 (= *Orophea ovata*).—N. Guin.
oxycarpa, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 335.—Celebes.

MITREPHORA:—
parallelivenia, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 32; *et in Ic. Bogor.* i. II. 140.—Borneo.
rugosa, *Boerl. ll. cc.* (= *Uvaria rugosa*).—Java.
rupestris, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 61.—Celebes.
sumatrana, *Boerl. l. c.* i. II. 141 (= *Orophea sumatrana*).—Sumatra.

MNESITHEA, Kunth = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).
laevis, Kunth, Rév. Gram. i. 154 = R. perforata.

MNIOPSIS, Mart. (Podostem.).
crulsiana, *Warm. in Overs. Danske Vid. Selsk.* Ser. VI. ix. 138.—Bras.

MODECCA, Lam. (Passifl.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 638.—Celebes.

MOKOFUA, Kuntze (Ternstroem.).
Lorentzii, Kuntze, l. c. (= *Taonabo Lorentzii*).—Bolivia.

MOLINIA, Schrank (Gramin.).
japonica, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 704.—Japon.

MOLLERA, O. Hoffm. (Compos.).
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 569.—Afr. trop.
punctulata, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

MOLLINEDIA, Ruiz & Pav. (Monim.).
acutissima, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxvii. 672.—Bras.
aphanantha, *Perkins, l. c.* 658.—Bras.
argyrogyna, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
blumenaviana, *Perkins, l. c.* 669.—Bras.
calodonta, *Perkins, l. c.* 678.—Bras.
caloneura, *Perkins, l. c.* 663.—Bolivia.
Canfieldiae, *Perkins, l. c.* 676.—Bras.
chrysophylla, *Perkins, l. c.* 651.—Bras.
chrysorrachis, *Perkins, l. c.* 665.—Bras.
corcovadensis, *Perkins, l. c.* 666.—Bras.
cuneata, *Perkins, l. c.* 676.—Bras.
cyathantha, *Perkins, l. c.* 679.—Bras.
engleriana, *Perkins, l. c.* 660.—Bras.
eugeniifolia, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
fasciculata, *Perkins, l. c.* 671.—Bras.
fruticulosa, *Perkins, l. c.* 670.—Bras.
gilgiana, *Perkins, l. c.* 656.—Bras.
glabra, Perkins, l. c. 657 = pellucens.
Glaziovii, *Perkins, l. c.*—Bras.
grosseserrata, *Perkins, l. c.* 673.—Peruv.
guatemalensis, *Perkins, l. c.* 679.—Am. cent.
heteranthera, *Perkins, l. c.* 655.—Bras.
howeana, *Perkins, l. c.* 654.—Bras.
hylophila, *Perkins, l. c.* 680.—Bras.
iomalla, *Perkins, l. c.* 663.—Bras.
lamprophylla, *Perkins, l. c.* 656.—Bras.
leiantha, *Perkins, l. c.* 657.—Bras.
longicuspidata, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
lowtheriana, *Perkins, l. c.* 666.—Bras.
mexicana, *Perkins, l. c.* 674.—Mexic.
micrantha, *Perkins, l. c.* 668.—Bras.
myriantha, *Perkins, l. c.* 655.—Bras.
obovata, *Perkins, l. c.* 679.—Bras.
oligantha, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
oligotricha, *Perkins, l. c.* 658.—Bras.
Orizabae, *Perkins, l. c.* 674.—Mexic.
pachypoda, *Perkins, l. c.* 659.—Bras.
pachysandra, *Perkins, l. c.* 672.—Bras.
Perkinsiae, Rusby, ex Perkins, l. c. 682 = rusbyana.
pfitzeriana, *Perkins, l. c.* 670.—Bras.
polyantha, *Perkins, l. c.* 677.—Bras.
puberula, *Perkins, l. c.* 668.—Bras.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 427.—Bras.
rusbyana, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxvii. 682.—Bolivia.
salicifolia, *Perkins, l. c.* 659.—Bras.
schottiana, Perkins, l. c. 677 = brasiliensis.
sphaerantha, *Perkins, l. c.* 660.—Bras.
stenophylla, *Perkins, l. c.* 669.—Bras.
uleana, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
undulata, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
Warmingii, *Perkins, l. c.* 662.—Bras.

MOLLUGO, Linn. (Ficoid.).
namaquensis, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 121.—Afr. austr.
tenella, *Bolus, l. c.* 122.—Afr. austr.

MOLOPOSPERMUM, Koch (Umbell.).
cicutaefolium, Bub. Fl. Pyren. ii. 414 = cicutarium.

MOMORDICA, Tourn. (Cucurb.).
clarkeana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 35.—Penins. Mal.
fasciculata, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* v. 636.—Afr. trop.
gracilis, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 25.—Afr. trop.
sessilifolia, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 821.—Afr. trop.

MONACHYRON, Parl. (Gramin.).
roseum, Parl. Fl. Ital. i. 131, in obs. = Tricholaena rosea.
tonsum, Parl. l. c. = Tricholaena rosea.

MONACTINOCEPHALUS, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 474. *COMPOSITAE.*
paniculatus, *Klatt, l. c.*—Afr. austr.

MONADENIA, Lindl. = **Disa**, Berg (Orchid.).
conferta, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 810 = D. conferta.
leydenburgensis, Kraenzl. l. c. 811.—Afr. austr.
sabulosa, Kraenzl. l. c. 814.—Afr. austr.
tenuis, Kraenzl. l. c. 819 = D. tenuis.

MONADENIUM, Pax (Euphorb.).
Descampsii, *Pax, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 108.—Afr. trop.
echinulatum, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2666.—Afr. trop.
laeve, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
simplex, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 743.—Afr. trop.

MONANTHEMUM, Scheele, in Flora, 1843, 314 = **Morisia**, J. Gay (Crucif.).
acaule, Scheele, l. c. = M. hypogaea.

MONARDA, Linn. (Labiat.).
stricta, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 263.—Am. sept.

MONECHMA, Hochst. (Acanth.).
affine, Hochst. in Flora, 1843, 76 = bracteatum.
angustifolium, Nees, in DC. Prod. xi. 412 = bracteatum.
arenicola, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 238.—Afr. trop.
bracteatum, *Hochst. in Flora*, 1841, 375.—Afr. trop.
ciliatum, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 411 = Ecbolium Anisacanthus.
cleomoides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 220.—Afr. trop.
debilis, Nees, in DC. Prod. xi. 411 = bracteatum.
depauperatum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 217.—Afr. trop.
desertorum, *C. B. Clarke, l. c.* 218.—Afr. trop.
floridum, *C. B. Clarke, l. c.* 219.—Afr. trop.
genistifolium, *C. B. Clarke, l. c.* 218.—Afr. trop.
hereroense, *C. B. Clarke, l. c.* 220.—Afr. trop.
hispidum, *Hochst. in Flora*, 1841, 375.—Afr. trop.
lolioides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 218.—Afr. trop.
marginatum, *C. B. Clarke, l. c.* 217.—Afr. trop.
Nepeta, *C. B. Clarke, l. c.* 219.—Afr. trop.
Salsola, *C. B. Clarke, l. c.* 220.—Afr. trop.
scabridum, *C. B. Clarke, l. c.* 217.—Afr. trop.
scabrinerve, *C. B. Clarke, l. c.* 215.—Afr. trop.
spissum, *C. B. Clarke, l. c.* 219.—Afr. trop.
subsessile, *C. B. Clarke, l. c.* 216.—Afr. trop.
tettense, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
ukambense, *C. B. Clarke, l. c.* 220.—Afr. trop.
varians, *C. B. Clarke, l. c.* 216.—Afr. trop.
Welwitschii, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

MONNIERA, B. Juss. (Scrophul.).
calycina, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 760.—Afr. trop.
dianthera, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 98.—Ind. occ.
occultans, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 760.—Afr. trop.
Ranaria, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5, 10.—Bras.

MONNINA, Ruiz & Pav. (Polygal.).
alatodrupacea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 10.—Bolivia.
Bangii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 243.—Bolivia.
chimborazeana, *Chod. l. c.* 247.—Ecuador.
clarkeana, *Chod. l. c.* 246.—Peruv.
Francheti, *Chod. l. c.* 248.—Am. trop.
gracilis, *Chod. l. c.* 244.—Bolivia.
guatemalensis, *Chod. l. c.* 249.—Am. cent.
Laureola, *Chod. l. c.* 245.—Bolivia.
macrocarpa, *Chod. l. c.* 252.—Bras.
macroclada, *Chod. l. c.* 246.—Bolivia.
mucronata, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* ix. 75.—Urug.
Pearcii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 243.—Bolivia.
pseudostipulata, *Chod. l. c.* 245.—Bolivia.
rugosa, *Chod. l. c.* 251.—Peruv.
Rusbyi, *Chod. in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 6.—Bolivia.
subserrata, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 250.—Mexic.
weddelliana, *Chod. l. c.* 244.—Bolivia.

MONOCHILUS, Wall. = **Zeuxine**, Lindl. (Orchid.).
lepidus, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 110 = Cheirostylis lepida.
tetrapterus, Reichb. f. l. c. = Z. tetraptera.

MONOCHORIA, Presl (Ponteder.).
vaginalis, Kirk, in Journ. Linn. Soc. viii. 147 = Heteranthera kotschyana.

MONODORA, Dun. (Anonac.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 13.—Afr. trop.
crispata, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 301.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 11.—Afr. trop.
Junodii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 301.—Afr. austr.
Preussii, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 12.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 301.—Afr. trop.

MONOON, Miq. = **Polyalthia**, Blume (Anonac.).
Bemban, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. 45 = P. Bemban.

MONOPETALANTHUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 195; et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 265. *LEGUMINOSAE.*
Pteridophyllum, *Harms, l. c.* 195; *l. c.* 266.—Afr. trop.

MONOPHYLLAEA, R. Br. (Gesner.).
hirticalyx, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 125; *fide K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 535.—Penins. Mal.

MONOPYRENA, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 559. *VERBENACEAE.*
serpyllifolia, *Speg. l. c.*—Patag.

MONOSPORA, Hochst. = **Trimeria**, Harv. (Bixac.).
trinervis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 9 = T. trinervis.

MONOSTICHE, Koern. (Scitamin.).
Danielli, Horan. Prodr. Scit. 13, t. 3 = Thaumatococcus Danielli.

MONOTES, A. DC. (Dipterocarp.).
acuminatus, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 153.—Afr. trop.
caloneurus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 136.—Afr. trop.
glandulosus, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1299.—Afr. trop.
hypoleucus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 134 = africanus.
magnificus, *Gilg, l. c.* 135.—Afr. trop.
rufotomentosus, *Gilg, l. c.* 138.—Afr. trop.

MONOTHECIUM, Hochst. (Acanth.).
abbreviatum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 466.—Afr. trop.

MONOTROPA, Linn. (Monotrop.).
multiflora, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 426 = Hypopitys multiflora.

MONOTROPSIS, Schweinf. = **Schweinitzia**, Ell. (Monotrop.).
Reynoldsiae, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = S. Reynoldsiae.

MONTAÑOA, Cerv. (Compos.).
anomala, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 508.—Mexic.
guatemalensis, *Robinson & Greenm. l. c.* 514.—Am. cent.
hexagona, *Robinson & Greenm. l. c.*—Mexic.
macrolepis, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxii. 44.—Mexic.
myriocephala, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxiv. 511.—Mexic.
Palmeri, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 93.—Mexic.
Pittieri, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 517.—Am. cent.
Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.* 512.—Mexic.
purpurascens, *Robinson & Greenm. l. c.* 515.—Am. cent.
Rosei, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxii. 45.—Mexic.
Schottii, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxiv. 518.—Am. cent.
seleriana, *Robinson & Greenm. l. c.* 510.—Mexic.

MONTIA, Mich. (Portul.).
arenicola, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 96 (= *Claytonia arenicola*).—Am. bor.
depressa, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 221 (= *Claytonia depressa*).—Am. bor.
flagellaris, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. i. 276 (= *Claytonia chamissonis*).—Am. bor.
humifusa, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 96.—Am. bor.
interrupta, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 222.—Am. bor.
latifolia, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
rosulata, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 79.—Am. bor.
sarmentosa, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. i. 272 (= *Claytonia sarmentosa*).—Am. bor.
saxosa, *Brandegee, ex Robinson, l. c.* 274 (= *Claytonia saxosa*).—Am. bor.
washingtoniana, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 220 (= *Claytonia washingtoniana*).—Am. bor.

MONTIOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 14 (1898). *PORTULACACEAE.*
boliviana, *Kuntze, l. c.* 15.—Bolivia.

MONTOLIVAEA, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
elegans, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 107 = H. Montolivaea.
unalaschensis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 107 = Herminium congestum.

MOQUINIA, DC. (Compos.).
mollissima, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 76.—Bras.

MORAEA, Mill. (Irid.).
aurantiaca, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 575 (non aliorum).—Afr. trop.
bella, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 364.—Afr. trop.
glauca, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 352.—Afr. austr.
gracilis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. 272.—Afr. trop.
gracilis, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 478 = tenuis.
kitambensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 575.—Afr. trop.
macra, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 377.—Afr. austr.
macrantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 340.—Afr. trop.
montana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 92.—Afr. austr.
multiflora, Soland. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 18 = polystachya.
Randii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 144.—Afr. trop.
stenocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 93.—Afr. austr.
sulphurea, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7658.—Afr. austr.
xerospatha, *MacOwan, ex Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 529.—Afr. austr.

MORICANDIA, DC. (Crucif.).
tuberosa, *Kom. in Trav. Soc. Nat. St. Pétersb.* xxvi. 112.—Turkestan.

MORINDA, Linn. (Rubiac.).
Buchii, *Urb. Symb. Antill.* i. 480.—Ind. occ.

MORISIA, J. Gay (Crucif.).
acaulis, Gay, in Gaz. de Turin, 1829, 24 = hypogaea.

MORMODES, Lindl. (Orchid.).
oberlanderianum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Gard. Chron.* 1900, II. 317.—N. Granat.

MORONGIA, Britton (Legum.).
aculeata, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = Schrankia aculeata.
floridana, A. A. Heller, l. c. = Schrankia floridana.
horridula, A. A. Heller, l. c. 5 = Schrankia uncinata.

MOSCHOPSIS, Phil. (Calycer.).
monocephala, *Reiche, in Engl. Jahrb.* xxix. 118 (= *Boopis monocephala*).—Am. austr.

MOSCHOSMA, Reichb. (Labiat.).
urticifolium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 353.—Afr. trop.

MOSCHOXYLUM, A. Juss. = **Trichilia**, P. Br. (Meliac.).
pachypodium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 17.—Bolivia.
viride, Rusby, l. c. 18.—Bolivia.

MOSELEYA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2592 (1899) = **Ellisiophyllum**, Max. (Hydrophyll.).
pinnata, Hemsl. l. c. = E. reptans.

MOSENODENDRON, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ser. II. xxxiv. no. 5 (1900) 8. *ANONACEAE.*
insigne, *R. Fries, l. c.* 9.—Bras.

MOSTUEA, Didr. (Logan.).
angolana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 700 (= *Coinochlamys angolana*).—Afr. trop.
camporum, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 117.—Afr. trop.
densiflora, *Gilg, l. c.* xxiii. 198.—Afr. trop.
Dinklagei, *Gilg, l. c.* xxviii. 116.—Afr. trop.
erythrophylla, *Gilg, l. c.* 117.—Afr. trop.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 67.—Afr. trop.
neurocarpa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 116.—Afr. trop.
penduliflora, *Gilg, l. c.* xxiii. 198.—Afr. trop.
ulugurensis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

MOTANDRA, A. DC. (Apocyn.).
rostrata, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 307, nomen.—Afr. trop.

MOURERA, Aubl. (Podostem.).
glazioviana, *Warm. in Overs. Danske Vid. Selsk.* Ser. VI. ix. 114.—Bras.
schwackeana, *Warm. l. c.* 117.—Bras.

MOUROUCOA, Aubl. (Convolv.).
Hieronymi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 217.—Am. austr.
Juramenti, Kuntze, l. c. (= *Ipomoea Lorentzii*).—Am. austr.
megapotamica, Kuntze, l. c. (= *Ipomoea megapotamica*).—Am. austr.
Peteri, Kuntze, l. c. 218 (= *Ipomoea sericophylla*, Peter).—Am. cent.

MOUTABEA, Aubl. (Polygal.).
silvatica, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 441.—Bras.

MSUATA, O. Hoffm. (Compos.).
Buettneri, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 21, descr.—Afr. trop.

MUCUNA, Adans. (Legum.).
Bakeri, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 630.—Celebes.
eriocarpa, *Barb. Rodr. Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 11.—Bras.
ferruginea, *Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 422.—Formosa.
mattogrossensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 15.—Bras.
pluricostata, *Barb. Rodr. Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 9.—Bras.
Poggei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 194.—Afr. trop.
pulcherrima, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 630.—Celebes.
rhynchosioides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 194.—Afr. trop.
Warburgii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 365.—N. Guin.

MUEHLENBERGIA, Schreb. (Gramin.).
cincinnata, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 330, sphalm. = seq.
circinnata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 356.—Reg. Argent.
densiflora, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 18.—Mexic.
duthiaeana, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 259 = sylvatica.
flaviseta, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 11.—Mexic.
ligulata, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 19 = Chaboissaea ligulata.
palustris, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 47.—Am. bor.

MULGEDIUM, Cass. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).
Velenovskyi, Urumoff, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 201.—Bulgar.

MULLAGHERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 507 (1900) = **Lotus**, Tourn. (Legum.).
communis, Bub. l. c. 509 = L. corniculatus.
compressa, Bub. l. c. 510 = L. ornithopodioides.
conjugata, Bub. l. c. 575 = L. conjugatus.
decumbens, Bub. l. c. 520 = L. tenuifolius.
edulis, Bub. l. c. 575 = L. edulis.
uliginosa, Bub. l. c. 509 = L. uliginosus.
variabilis, Bub. l. c. 508 = L. angustissimus.

MUNROA, Torr. (Gramin.).
benthamiana, *Hack. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 357.—Reg. Argent.

MUNRONIA, Wight (Meliac.).
pauciflora, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 282 = Philastrea pauciflora.
sinica, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 425.—China.
yunnanensis, Ind. Kew. Suppl. I. 283, sphalm. = Meliosma yunnanensis.

MURALTIA, Neck. (Polygal.).
alticola, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 391.—Afr. austr.
aspalathoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 434.—Afr. austr.
brachyceras, *Schlechter, l. c.* xxvii. 165.—Afr. austr.
decipiens, *Schlechter, l. c.* xxiv. 435.—Afr. austr.
Dodii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 500.—Afr. austr.
empleuridioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 435.—Afr. austr.
exilis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 218.—Afr. austr.
Flanagani, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 17.—Afr. austr.
nepalathoides, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 486, sphalm. = aspalathoides.
oxysepala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 436.—Afr. austr.
pungens, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

MURUCOA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 217 (1898) = MOUROUCOA, Aubl. = **Maripa**, Aubl. (Convolv.).

MUSA, Linn. (Scitamin.).
Bakeri, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7627.—Cochinch.?
celebica, *Warb. ex K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac.* 22.—Celebes.
elephantorum, *K. Schum. & Warb. ex K. Schum. l. c* 14.—Afr. trop.
lanceolata, *Warb. ex K. Schum. l. c.* 19.—Celebes.
paradisiaca, *Linn. Sp. Pl.* 1043.—Zeylan.
Schweinfurthii, *K. Schum. & Warb. ex K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac.* 14.—Afr. trop.
tomentosa, *Warb. ex K. Schum. l. c.* 22.—Celebes.

MUSCARI, Tourn. (Liliac.).
apertum, *Freyn & Conrath, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 194.—As. Min.
macranthum, *Freyn, l. c.* 192.—As. Min.
Sintenisii, *Freyn, l. c.* 193.—As. Min.

MUSENIOPSIS, Coult. & Rose (Umbell.).
biennis, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 130.—Mexic.
glauca, *Coult. & Rose, l. c.* 131.—Mexic.
madrensis, *Coult. & Rose, l. c.* 130.—Mexic.
ovata, *Coult. & Rose, l. c.* 133.—Mexic.
pubescens, *Coult. & Rose, l. c.* 134.—Mexic.
purpurea, *Coult. & Rose, l. c.* 132.—Mexic.
reticulata, *Coult. & Rose, l. c.* 133.—Mexic.
submontana, *Coult. & Rose, l. c.* 131.—Mexic.
tenuissima, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.

MUSENIUM, Nutt. (Umbell.).
vaginatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 288.—Am. bor.

MUSSAENDA, Burm. (Rubiac.).
procera, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 155.—N. Guin.
rivularis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 452.—Afr. trop.
tristigmatica, *Cummins, in Kew Bull.* 1898, 74.—Afr. trop.

MUTISIA, Linn. f. (Compos.).
Andersoni, *Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 80.—Ecuador.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 612.—Patag.
Moyanoi, *Speg. l. c.* 613.—Patag.
pulchella, *Speg. l. c.* 614.—Patag.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 79.—Ecuador.

MYGINDA, Jacq. (Celastr.).
Gaumeri, *Loes. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 401.—Mexic.
Gommeri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 345, sphalm. = praec.

MYOSOTIS, Tourn. (Borag.).
oreophila, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 539.—N. Zel.
polyantha, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 275.—N. Zel.
tenuifolia, *Colenso, l. c.* 276.—N. Zel.
venosa, *Colenso, l. c.* xxviii. 606.—N. Zel.

MYOSURUS, Linn. (Ranunc.).
lepturus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 12.—Am. bor.
major, *Greene, Pittonia*, iii. 257.—Am. bor.
patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 488.—Patag.
tenellus, *Greene, Pittonia*, iii. 258.—Am. bor.

MYRCEUGENIA, Berg = **Myrtus**, Linn. (Myrtac.).
fernandeziana, Johow, Fl. Juan Fernandez, 94 = M. fernandeziana.
Schulzii, Johow, l. c. 96.—Ins. J. Fernand.

MYRCIA, DC. (Myrtac.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 36.—Bolivia.
seleriana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 332.—Am. cent.

MYRIACHAETA, Zoll. & Mor. = **Thysanolaena**, Nees (Gramin.).
glauca, Mor. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 404 = T. Agrostis.

MYRIANTHEMUM, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 266. *MELASTOMACEAE.*
mirabile, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

MYRIANTHUS, Beauv. (Urtic.).
cuneifolius, *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 40.—Afr. trop.
Holstii, *Engl. l. c.* 41.—Afr. trop.

MYRICA, Linn. (Myricac.).
pumila, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 126.—Am. bor.

MYRICA, Bub. Fl. Pyren. ii. 713 (1900) = **Myricaria**, Desv. (Tamarisc.).
pannonica, Bub. l. c. = M. germanica.

MYRIOSTACHYA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 327 (1897). *GRAMINEAE.*
wightiana, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.

MYRISTICA, Linn. (Myristic.).
affinis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 422.—Celebes.
Albertisii, *Warb. l. c.* 532.—N. Guin.
amplifolia, *Warb. l. c.* 517.—Sumatra.
anceps, *Warb. l. c.* 528.—N. Guin.
apiculata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 88 (= *Gymnacranthera apiculata*).—Borneo.
aruensis, *Boerl. l. c.* 85 (non *aruana*, Bl.).—Malaya.
Avis-paradisiacae, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 528.—Hab.?
Baeuerlenii, *Warb. l. c.* 541.—N. Guin.
batjanica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Malaya.
Beccarii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 518.—Borneo.
borneensis, *Warb. l. c.* 401.—Borneo.
carnosa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Borneo.

MYRISTICA:—
Chalmersii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 539. —N. Guin.
contorta, *Warb. l. c.* 507.—Ind. or.
contracta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 88 (= *Gymnacranthera contracta*).—Borneo.
Cookii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 414.—Cochinch.
coriacea, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 92.—Borneo.
crassinervis, *Boerl. l. c.* 88 (= *Gymnacranthera crassinervis*).—Borneo.
crassipes, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 326.—N. Guin.
crassithyrsa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Celebes.
Cumingii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 442.—Ins. Philipp.
elegans, *Pierre, ex Warb. l. c.* 615.—Cochinch.
euryocarpa, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 327.—N. Guin.
fallax, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 410.—Borneo.
garciniifolia, *Warb. l. c.* 525.—N. Guin.
globosa, *Warb. l. c.* 540.—N. Guin.
Hollrungii, *Warb. l. c.* 490.—N. Guin.
impressa, *Warb. l. c.* 537.—Celebes.
Koordersii, *Warb. l. c.* 619.—Celebes.
Korthalsii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 90.—Borneo.
Labillardieri, *Boerl. l. c.* 85.—Java.
lenta, *Pierre, ex Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 584.—Cochinch.
leptocarpa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Malaya.
longipes, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 535.—N. Guin.
Macgregori, *Warb. l. c.* 479.—N. Guin.
macrocarya, *Warb. l. c.* 533.—N. Guin.
malayana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 91.—Malaya.
maxima, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 385.—Malaya.
Minahassae, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Celebes.
mindanaensis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 497.—Ins. Philipp.
montanoides, *Warb. l. c.* 514.—Ins. Molucc.
Motleyi, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Borneo.
Muelleri, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 502.—Austral.
neglecta, *Warb. l. c.* 542.—N. Guin.
oligocarpa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Borneo.
olivaeformis, *Boerl. l. c.*—N. Guin.
pachythyrsa, *Boerl. l. c.* 86.—Celebes.
papillosa, *Boerl. l. c.* 85.—Java.
paucinervis, *Boerl. l. c.* 87.—Borneo.
pectinata, *Boerl. l. c.* 90.—Borneo.
polyantha, *Boerl. l. c.* 85.—Malaya.
pseudo-argentea, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 453.—N. Guin.
pulverulenta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—N. Guin.
resinosa, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 536.—N. Guin.
reticulata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Borneo.
Riedelii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 417.—Sumatra.
Roxburghii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Malaya.
rufa, *Boerl. l. c.* 90.—Borneo.
salomonensis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 527.—Ins. Solomon.
schumanniana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 328.—N. Guin.
sericea, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 521.—Malaya.
Smithii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Malaya.
stenocarpa, *Boerl. l. c.* 91.—Ins. Philipp.
stenophylla, *Boerl. l. c.* 88 (= *Gymnacranthera stenophylla*).—Malaya.
sulcata, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 538.—N. Guin.
suluensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 88 (= *Gymnacranthera suluensis*).—Ins. Philipp.
sumbavana, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 529.—Malaya.
tomentella, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 91.—Malaya.
tristis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 444.—N. Guin.
umbellata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 92.—Borneo.
villosa, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 419.—Borneo.
Vordermanni, *Warb. l. c.* 525.—Malaya.

MYRISTICA:—
wallaceana, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 530.—Malaya.

MYRMECODIA, Jack (Rubiac.).
Beccarii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6883.—Austral.
Dahlii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 153.—N. Brit.
pentasperma, *K. Schum. l. c.* 154.—N. Brit.

MYROBALANUS, Gaertn. = **Terminalia**, Linn. (Combret.).
Balansaei, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 87 = T. Balansaei.

MYROSMA, Linn. f. (Scitam.).
guapilesense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 251.—Am. cent.

MYROXYLON, Linn. f. (Legum.).
caledonicum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 58.—N. Caled.
Warburgii, *Briq. l. c.* 60.—Urug.

MYRSINE, Linn. (Myrsin.).
congesta, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 6.—Bras.
lanceolata, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 873 (non aliorum).—Ins. Sandw.
papuana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 104.—N. Guin.
tenuifolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands. Plantent.* xxxiii. 232.—Java.
viridis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 74.—Bolivia.

MYRSTIPHYLLUM, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).
cristatum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 493 = P. cristata.
horizontalis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 102 = P. horizontalis.
macrodiscus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 494 = Chasalia macrodiscus.
nigropunctatum, Hiern, l. c. 493 = P. nigropunctata.
reptans, Hiern, l. c. = P. reptans.

MYRTEOLA, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).
leucomyrtillus, Reiche, Fl. Chile, ii. 286 = M. leucomyrtillus.

MYRTILLOCACTUS, Console, in Boll. Ort. Bot. Palermo, 1897, 8. *CACTACEAE.*
geometrizans, *Console, l. c.* 10 (= *Cereus geometrizans*).—Mexic.

MYRTILLUS, Gilib. = **Vaccinium**, Linn. (Vaccin.).
exigua, Bub. Fl. Pyren. ii. 16 = V. Vitis-idaea.
grandis, Bub. l. c. 17 = V. uliginosum.

MYRTOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 137. *RUTACEAE.*
Novae-Caledoniae, *Engl. l. c.*—N. Caled.

MYRTUS, Tourn. (Myrtac.).
arbutifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 92 = Eugenia arbutifolia.
Chekenilla, Kuntze, l. c. 90 = Eugenia apiculata.
coaetanea, Kuntze, l. c. 91 = Eugenia coaetanea.
Conceptionis, *Kuntze, l. c.* 91.—Parag.
Cruckshanksii, Kuntze, l. c. = Eugenia Cruckshanksii.
Guajava, Kuntze, l. c. = Psidium Guajava.
guineensis, Kuntze, l. c. = Psidium Araca.
Hauthalii, *Kuntze, l. c.*—Parag.
Langsdorfii, Kuntze, l. c. = Eugenia Langsdorfii.
major, Kuntze, l. c. 92 = Eugenia capensis.
montevidensis, *Kuntze, l. c.*—Am. trop.
moraviana, Kuntze, l. c. = Eugenia moraviana.
myrciopsis, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
osteomeloides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 36.—Bolivia.
phillyreaefolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 92 = Eugenia phyllireaefolia.
Pitanga, Kuntze, l. c. = Eugenia Pitanga.
rigidifolia, Kuntze, l. c. 89 = Eugenia rigidifolia.
striatula, Kuntze, l. c. 92 = Psidium striatulum.
subglomerata, Kuntze, l. c. = Eugenia glomerata.
thyrsodea, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Veneris, Bub. Fl. Pyren. ii. 639 = communis.
Yapacani, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 89.—Bras.

MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.).
angustum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 570.—Afr. trop.
astroarche, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. trop.
Batesii, *Rolfe, l. c.* 172.—Afr. trop.
cilaosianum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 424.—Bourbon.

MYSTACIDIUM:—
clavatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 172.—Afr. trop.
costatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 425 (= *Angraecum costatum*).—Bourbon.
crassifolium, *Cordem. l. c.* 422.—Bourbon.
curvatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 174.—Afr. trop.
distichum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. 337.—Afr. trop.
Gravenreuthii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 171.—Afr. trop.
hariotianum, *Kraenzl. in Journ. de Bot.* 1897, 153.—Madag.
Hermanni, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 421.—Bourbon.
infundibulare, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 170.—Afr. trop.
Keniae, *Rolfe, l. c.* 171.—Afr. trop.
longicaudatum, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. trop.
longinode, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 424 (= *Angraecum longinode*).—Bourbon.
minutum, *Cordem. l. c.* (= *Angraecum minutum*).—Bourbon.
multiflorum, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum multiflorum*).—Ins. Mascar.
nanum, *Cordem. l. c.* 423 (= *Angraecum nanum*).—Bourbon.
obversifolium, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum obversifolium*).—Bourbon.
pectinatum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. 337.—Ins. Mascar.
pedunculatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 175.—Afr. trop.
pingue, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 421 (= *Angraecum pingue*).—Bourbon.
pseudo-petiolatum, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum pseudo-petiolatum*).—Bourbon.
salazianum, *Cordem. l. c.* 423.—Bourbon.
Schumanni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 173.—Afr. trop.
spicatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 423.—Bourbon.
striatum, *Cordem. l. c.* 422.—Bourbon.
Tridens, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 174.—Afr. trop.
undulatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 425.—Bourbon.
verrucosum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 171.—Afr. trop.
Walleri, *Rolfe, l. c.* 172.—Afr. trop.

MYSTACINUS, Rafin. = **Helinus**, E. Mey. (Rhamn.).
arabicus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 39 = H. arabica.
brevipes, Kuntze, l. c. = H. brevipes.
lanceolatus, Kuntze, l. c. = H. lanceolatus.
Mystacinus, Kuntze, l. c. = H. Mystacinus.
ovatus, Kuntze, l. c. = H. ovatus.

MYSTROXYLON, Eckl. & Zeyh. = **Elaeodendron**, Jacq. (Tiliac.).
aethiopicum, Loes. in Engl. & Prantl, Planzenf. Nachtr. I. 223 = E. aethiopicum.
comorense, Loes. l. c. = Cassine comorensis.
englerianum, Loes. l. c. = Cassine engleriana.
Goetzei, Loes. in Engl. Jahrb. xxviii. 158.—Afr. trop.
Holstii, Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 223.—Afr. trop.
Rehmannii, Loes. in Engl. Jahrb. xxviii. 160 = E. Rehmannii.
Schlechteri, Loes. l. c. 159.—Afr. trop.

MYZODENDRON, Banks (Santal.).
Commersoni, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 557.—Reg. Magell.
gayanum, *Van Tiegh. l. c.*—Chili.
recurvum, *Van Tiegh. l. c.*—Chili.
rioquinoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 284.—Chili.

N

NABALUS, Cass. = **Prenanthes**, Vaill. (Compos.).
sagittata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 463.—Am. bor.

NACREA, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 357. *COMPOSITAE.*
lanata, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.

NAJAS, Linn. (Naiad.).
affinis, *Rendle, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. v. 440.—Afr. trop.?
brevistyla, *Rendle, l. c.* 418.—Ind. or.
browniana, *Rendle, l. c.* 420.—Austral.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 270, 637.—Celebes.
Kingii, *Rendle, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. v. 415.—Ins. Andaman.
kurziana, *Rendle, l. c.* 413.—Ind. or.
lacerata, *Rendle, l. c.* 416.—Ind. or.
madagascariensis, *Rendle, l. c.* 402.—Madag.
polonica, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1897, 110.—Polonia.
punctata, *Rendle, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. v. 407.—Am. austr.
setacea, *Rendle, l. c.* 422.—Bourbon.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 95.—Afr. trop.

NAMA, Linn. (Hydrophyll.).
Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 38.—Mexic.
pueblense, *Robinson & Greenm. l. c.* 39.—Mexic.

NANIA, Miq. = **Metrosideros**, Banks (Myrtac.).
glabrifolia, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 866.—Ins. Sandw.
lutea, A. A. Heller, l. c. 867 = M. villosa.
petiolata, Valet. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 171.—Java.
polymorpha, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 864 = M. villosa.
pumila, A. A. Heller, l. c.—Ins. Sandw.
tremuloides, A. A. Heller, l. c. 866.—Ins. Sandw.

NANOCHILUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 341. *ZINGIBERACEAE.*
palembanicum, *K. Schum. l. c.* (= *Hedychium palembanicum*).—Sumatra.

NAPEANTHUS, Gardn. (Gesner.).
andinus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 98.—Bolivia.
rigidus, *Rusby, l. c.* 99.—Bolivia.

NARCISSUS, Tourn. (Amaryll.).
benacensis, *Porta, in Jahreskat. Wien. Bot. Tausch-anst.* 1897, 69.—Eur.
ledroensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 88.—Eur.
pollinensis, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no. 9, 10.—Eur.
tubulosus, *Baldacci, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. vi. 351.—Eur.

NARDURUS, Reichb. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).
Halleri, Fiori & Paol. Fl. Ital. i. 96 = F. Poa.

NARDUS, Linn. (Gramin.).
Thomaea, Linn. f. Suppl. 105 = Oropetium thomaeum.

NARVALINA, Cass. (Compos.).
corazonensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 49.—Ecuador.
homogama, *Hieron. l. c.* 48.—Ecuador.
Sodiroi, *Hieron. l. c.* 50.—Ecuador.

NASSAUVIA, Comm. (Compos.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 542.—Patag.
bryoides, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 114.—Reg. Magell.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 615.—Patag.
Darwinii, *O. Hoffm. & P. Dusén, ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 112 (= *Panargyrus Darwinii*).—Reg. Magell.
heterophylla, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 373.—Reg. Magell.
modesta, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 114.—Reg. Magell.
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 165.—Patag.
Nordenskjoldii, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 113.—Reg. Magell.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 543.—Patag.
scleranthoides, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 248.—Patag.

NASSELLA, E. Desv. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
floribunda, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 729.—Chili.
fuscescens, R. Phil. l. c.—Chili.
longearistata, R. Phil. l. c. 728.—Chili.
obscura, F. Phil. ex R. Phil. l. c. 727.—Chili.
Pugae, R. Phil. l. c. 728.—Chili.

NASTANTHUS, Miers = **Boopis**, Juss. (Calycer.).
bellidifolius, Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 114 = B. bellidifolia.
caespitosus, Reiche, l. c. = B. caespitosa.

NASTURTIUM, Linn. (Crucif.).
Columbiae, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 211.—Am. bor.
philippianum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 490.—Patag.
riparium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 6.—Afr. austr.

NAUCLEA, Linn. (Rubiac.).
angustifolia, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 55.—Borneo.
celebica, *Havil. l. c.* 54.—Celebes.
elegans, *Teijsm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 498, nomen.—Celebes.
formosana, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 127.—Formosa.
Griffithii, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 51 (= *Adina Griffithii*).—Ind. or.
Hagenii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 557.—N. Guin.
Havilandii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 498.—Celebes.
media, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 56.—Ins. Philipp.
nicobarica, *Havil. l. c.* 59.—Ins. Nicobar.
nitida, *Havil. l. c.* 53.—Ins. Philipp.
philippinensis, *Havil. l. c.* 52 (= *Adina philippinensis*).—Ins. Philipp.
reticulata, *Havil. l. c.* 62.—Ins. Philipp.
tenuis, *Havil. l. c.* 55.—N. Guin.

NAVARRETIA, Ruiz & Pav. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polem.).
klickitatensis, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1900, 133 = G. klickitatensis.

NAVIA, Schult. f. (Bromel.).
angustifolia, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 553 = Cryptanthus angustifolius.

NAZIA, Adans. = **Tragus**, Hall. (Gramin.).
aliena, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 28 = T. racemosus.

NECTANDRA, Roland. (Laurac.).
citrifolia, *Mez & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 115.—Bolivia.
kuntzeana, *Mez, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 277.—Bras.

NEEA, Ruiz & Pav. (Nyctag.).
buxifolia, *Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 633 (= *Eggersia buxifolia*).—Ind. occ.
coccinea, *Heimerl, l. c.* 635 (= *Pisonia coccinea*).—Ind. occ.
constrictoides, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 37.—N. Granat.
fagifolia, *Heimerl, l. c.* 39.—Am. cent.
longipedunculata, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 126.—Bolivia.
macrophylla, *Britton, l. c.* (non Poepp. & Endl.).—Bolivia.
obovata, *Spruce, ex Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 38.—Am. trop.
salicifolia, *Heimerl, l. c.* 39.—Bras.
selloiana, *Heimerl, l. c.* 38 (= *Pisonia pubescens*).—Bras.
subpubescens, *Heimerl, l. c.* 36.—Bras.
virens, *Poepp. ex Heimerl, l. c.* 38.—Peruv.

NEMASTYLIS, Nutt. (Irid.).
caerulescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 296.—Mexic.

NEMATOLEPIS, Turcz. (Rutac.).
Paxteri, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 145 = N. Euphemiae.

NEMATOPOGON, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. (1897) 395. *BIGNONIACEAE.*
densicoma, *Bureau & K. Schum. l. c.* 396 (= *Jacaranda densicoma*).—Bras.
laurifolius, *Bureau & K. Schum. l. c.* (= *Digomphia laurifolia*).—Guiana.

NEMESIA, Vent. (Scrophul.).
Bodkinii, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 2502.—Afr. austr.
brevicalcarata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 174.—Afr. austr.
capensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 237 = linearis.
euryceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 175.—Afr. austr.
grandiflora, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 473.—Afr. austr.
macroceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 175.—Afr. austr.
picta, *Schlechter, l. c.* 176.—Afr. austr.
platysepala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 473.—Afr. austr.
psammophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 176.—Afr. austr.

NEMIA, Berg = **Manulea**, Linn. (Scrophul.).
angolensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 757 = M. angolensis.

NEMOPHILA, Nutt. (Hydrophyll.).
inconspicua, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 349.—Am. bor.
Kirtleyi, *Hend. l. c.* 350.—Am. bor.
sepulta, *Parish, in Erythea*, vii. 93.—Am. bor.

NENAX, Gaertn. (Rubiac.).
glabra, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 121 = acerosa.

NENGA, H. Wendl. & Drude (Palm.).
calophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 208.—N. Guin.

NEOBECKIA, Greene, Pittonia, iii. (1896) 95. *CRUCIFERAE.*
aquatica, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium lacustre*).—Am. bor.

NEOCOUMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 33. *APOCYNACEAE.*
ternstroemiacea, *Pierre, l. c.* 34 (= *Tabernaemontana ternstroemiacea*).—Bras.

NEOCRACCA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 68 (1898). *LEGUMINOSAE.*
Kuntzei, *Kuntze, l. c.* (= *Cracca Kuntzei*).—Bolivia.

NEOGOETZEA, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 419. *EUPHORBIACEAE.*
brideliifolia, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

NEOJOBERTIA, Baill. (Bignon.).
candolleana, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 297 = brasiliensis.

NEOLAUCHEA, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 110. *ORCHIDEAE.*
pulchella, *Kraenzl. l. c.*—Hab. ?

NEOLEHMANNIA, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 478. *ORCHIDEAE.*
epidendroides, *Kraenzl. l. c.* 479.—Ecuador.

NEOLINDLEYA, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 651 (1899). *ORCHIDEAE.*
decipiens, *Kraenzl. l. c.* (= *Platanthera decipiens*).—As. or. bor.

NEOMAZAEA, Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1897, 542. *RUBIACEAE.*
phialanthoides, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* (= *Rondeletia phialanthoides*).—Ind. occ.

NEORAUTANENIA, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) 35. *LEGUMINOSAE.*
amboensis, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.

NEOSCHUMANNIA, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 310 (1900). *ASCLEPIADACEAE.*
kamerunensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

NEOSPARTON, Griseb. (Verben.).
aphyllum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 254 = Verbena aphylla.

NEOSTAPFIA, Davy, in Erythea, vii. (1899) 43. *GRAMINEAE.*
colusana, *Davy, l. c.*—Am. bor.

NEOWASHINGTONIA, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. (1898) 38. *PALMAE.*
filamentosa, *Sudw. l. c.* (= *Washingtonia filifera*).—Am. bor.
robusta, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 3 (= *Washingtonia filifera*).—Am. bor.
Sonorae, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 255 (= *Washingtonia Sonorae*).—Mexic.

NEPENTHES, Linn. (Nepenth.).
albolineata, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 355.—Austral.
Alicae, *F. M. Bailey, l. c.* 356.—Austral.
Cholmondeleyi, *F. M. Bailey, l. c.* vii. 441.—Austral.
Jardinei, *F. M. Bailey, l. c.* i. 230.—Austral.
Moorei, *F. M. Bailey, l. c.* iii. 355.—Austral.
Rowanae, *F. M. Bailey, l. c.* i. 231.—Austral.

NEPETA, Riv. (Labiat.).
adenoclada, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 243.—Persia.
Amani, *Post, Fl. Syria*, 637.—Syria.
assurgens, *Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 235.—Persia.
autraniana, *Bornm. l. c.* 248.—Oriens.
Bornmuelleri, *Hausskn. ex Bornm. l. c.* 237.—Persia.
carmanica, *Bornm. l. c.* 239.—Persia.
caucasica, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 208.—Reg. Caucas.
decolorans, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2470.—Tibet.
dschuparensis, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 244.—Persia.
Ehlersi, Schweinf. in Engl. Hochgebirgsfl. Trop. Afr. 368 = Calamintha simensis.
eremophila, *Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 238.—Persia.
exicola, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 488, sphalm. = oxicola.
galatica, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 241.—Oriens.
Haussknechti, *Bornm. l. c.* 249.—Oriens.
janthinostegia, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 135.—As. Min.
kurdica, *Hausskn. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 251.—Oriens.
mardinensis, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 159.—Oriens.
Michauxii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 105.—Persia.
oxicola, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 346.—As. cent.
pamirensis, *Franch. l. c.* 345.—As. cent.
petitiana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 460.—Afr. trop.
rivularis, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 233.—Persia.
scordiifolia, *Bornm. l. c.* 246 (non aliorum).—Oriens.
suavis, *Stapf, in Kew Bull.* 1896, 19.—Afghan.
teucrioides, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 236 = lasiocephala.
yanthina, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 324.—Tibet.

NEPHELAPHYLLUM, Blume (Orchid.).
chinense, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 194.—China.
cristatum, *Rolfe, l. c.*—China.

NEPHELIUM, Linn. (Sapind.).
lautererianum, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 9.—Austral.
winterianum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 283.—N. Guin.

NEPHELOCHLOA, Boiss. (Gramin.).
altaica, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 367 = Poa persica.
soongorica, Griseb. l. c. = Poa persica.

NEPHRADENIA, Decne. (Asclep.).
filipes, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 88.—Bras.

NEPHROCARYA, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 150. *BORAGINACEAE.*
horizontalis, *Candargy, l. c.*—Graecia.

NEPHROPETALUM, Robinson & Greenm. in Coult. Bot. Gaz. xxii. (1896) 168. *STERCULIACEAE.*
Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.*—Am. bor.

NEPTUNIA, Lour. (Legum.).
floridana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 138.—Am. bor.
Lindheimeri, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 333.—Am. bor.

NERINE, Herb. (Amaryll.).
angustifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 211.—Afr. austr.
brachystemon, *Baker, l. c.* 212.—Afr. austr.
duparquetiana, *Baker, l. c.* 214.—Afr. austr.

NERISYRENIA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 225. *CRUCIFERAE.*
camporum, *Greene, l. c.* (= *Greggia camporum*).—Am. bor. occ.
linearifolia, *Greene, l. c.* (= *Greggia linearifolia*).—Am. bor. occ.

NERTERA, Banks & Soland. (Rubiac.).
ciliata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 247.—N. Zel.
montana, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 595.—N. Zel.
papillosa, *Colenso, l. c.*—N. Zel.

NERVILIA, Comm. = **Pogonia**, Juss. (Orchid.).
crispata, Schlechter, ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 240 = P. crispata.

NESAEA, Comm. (Lythrac.).
Dinteri, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 166.—Afr. trop.
Kuntzei, *Koehne, l. c.* 167.—Afr. austr.
ondongana, *Koehne, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 78.—Afr. trop.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 198.—Mexic.
Rautanenii, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 750.—Afr. trop.
straminea, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 167.—Afr. trop.

NESLIA, Desv. (Crucif.).
hispanica, *Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto*, 1896, 212.—Hispan.

NESODRABA, Greene, Pittonia, iii. (1897) 252. *CRUCIFERAE.*
grandis, *Greene, l. c.* 253 (= *Draba grandis*).—Am. bor. occ.
megalocarpa, *Greene, l. c.*—Am. bor. occ.
siliquosa, *Greene, l. c.* (= *Cochlearia siliquosa*).—Am. bor. occ.

NESTLERA, Spreng. (Compos.).
relhanioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 205.—Afr. austr.

NEUMANNIA, A. Rich. = **Aphloia**, Benn. (Bixac.).
myrtiflora, Th. Dur. in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II. 218 = A. myrtiflora.

NEURACANTHUS, Nees (Acanth.).
Lindaui, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 139.—Afr. trop.
polyacanthus, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
Robecchii, *C. B. Clarke, l. c.* 140.—Afr. trop.
spinosus, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 222.—Arab.
strobilinus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 138.—Afr. trop.
ukambensis, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

NEUROCARPAEA, R. Br. = **Pentas**, Benth. (Rubiac.).
arvensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 439 = P. arvensis.
herbacea, Hiern, l. c.—Afr. trop.
purpurea, Hiern, l. c. 438 = P. purpurea.

NEUROPELTIS, Wall. (Convolv.).
velutina, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 374.—Afr. trop.

NEUROTHECA, Salisb. (Gentian.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 98.—Afr. trop.
exacoides, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 304, nomen.—Afr. trop.

NEVES-ARMONDIA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 302 (1897). *BIGNONIACEAE.*
cordifolia, *K. Schum. l. c.* (= *Pithecoctenium cordifolium*).—Bras.

NEWBERRYA, Torr. (Monotrop.).
subterranea, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 80.—Am. bor.

NEYRAUDIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 305 (1896). *GRAMINEAE.*
madagascariensis, *Hook. f. l. c.*—As. et Afr. trop.

NHANDIROBA, Plum. = **Fevillea**, Linn. (Cucurb.).
Harmsii, Kuntze, Rev. Gen. ii. II. 103.—Bolivia.
pergamentacea, Kuntze, l. c. 104 = F. pergamentacea.

NICOLASIA, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 458. *COMPOSITAE.*
heterophylla, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.
pedunculata, *S. Moore, l. c.* 459.—Afr. trop.

NICOTEBA, Lindau (Acanth.).
lanceolata, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 38 = Peristrophe luteoviridis.
marginata, Lindau, l. c. xxii. 119 = Monechma marginatum.
versicolor, Lindau, l. c. 118 = Justicia versicolor.

NICOTIANA, Linn. (Solan.).
integrifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 223 = Petunia violacea.
pampasana, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 23.—Am. austr.
silvestris, *Speg. & Comes, in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. I. 34.—Reg. Argent.
staticifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 223 = Bouchetia erecta.
Stocktoni, *Brandegee, in Erythea*, vii. 6.—Mexic.
uspallatensis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. 770.—Chili.

NIDORELLA, Cass. (Compos.).
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 149.—Afr. trop.

NIDULARIUM, Lem. = **Karatas**, Adans. (Bromel.).
angustifolium, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xvi. 351.—Bras.
Burchelli, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 101 (= *Aechmea Burchellii*).—Bras.
corcovadense, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xviii. 321.—Bras.
farinosum, Ule, l. c. 319.—Bras.
macahense, Ule, l. c. 318.—Bras.
microcephalum, Ule, l. c. xvii. 4.—Bras.
pauciflorum, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xvi. 353 (non Lindm.).—Bras.
regelioides, Ule, l. c. 351.—Bras.
rosulatum, Ule, l. c. xviii. 320.—Bras.
terminale, Ule, l. c. xvi. 348.—Bras.
utriculosum, Ule, l. c. 347.—Bras.

NIEREMBERGIA, Ruiz & Pav. (Solan.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 557.—Patag.

NIGELLA, Tourn. (Ranunc.).
bithynica, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 165.—Turcia.

NIGERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 404 (1900) = **Caucalis**, Linn. (Umbell.)
daucoides, Bub. l. c. = C. daucoides.
parviflora, Bub. l. c. 405 = C. leptophylla.

NIGRINA, Linn. (Scrophul.).
melampyrodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 237 = Alectra melampyroides.
orobanchodes, Kuntze, l. c. = Alectra orobanchoides.

NISSOLIA, Jacq. (Legum.).
diversifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 160.—Mexic.
Dodgei, *Rose, l. c.* 161.—Mexic.
guatemalensis, *Rose, l. c.* 162.—Am. cent.
laxior, *Rose, l. c.*—Mexic.
multiflora, *Rose, l. c.* 161.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 162.—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.* 159.—Mexic.

NIVENIA, R. Br. (Proteac.).
laxa, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 282.—Afr. austr.
micrantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 107.—Afr. austr.

NOMAPHILA, Blume (Acanth.).
glandulosa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 198=Dyschoriste verticillaris.
quadrangularis, Klotzsch, l. c. 197 = Disperma quadrangulare.

NOMOCHARIS, Franch. (Liliac.).
meleagrina, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 196.—China.

NONNEA, Medic. (Borag.).
heterostemon, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II. no. 7, 7.—Afr. bor.

NOPALEA, Salm-Dyck (Cact.).
karwinskiana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 752 (= *Opuntia karwinskiana*).—Mexic.
moniliformis, *K. Schum. l. c.* 750 (= *Cereus moniliformis*).—Ind. occ.

NORANTEA, Aubl. (Ternstroem.).
costaricensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 31.—Am. cent.
macroscypha, *Gilg, l. c.*—Peruv.
macrostoma, *Gilg, l. c.* 30.—Bolivia.
microscypha, *Gilg, l. c.* 32.—Ecuador.
spiciflora, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 520 = Jussiaei.
subsessilis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 390.—Am. cent.

NOTHOPANAX, Miq. = **Panax**, Linn. (Aral.).
Bockii, Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 488.—China.
Davidii, Harms, l. c. = P. Davidi.
Rosthornii, Harms, l. c. 487.—China.

NOTHOSCORDUM, Kunth (Liliac.).
bivalve, Britton, in Britton and A. Brown, Fl. N. U. S. i. 415 = striatum.
brevispathum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 268.—Chili.
nidulans, *R. Phil. l. c.*—Chili.
uniflorum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 227.—Urug.
vernum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 267.—Chili.

NOTODON, Urb. Symb. Antill. i. (1899) 324. *LEGUMINOSAE.*
gracilis, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

NOTONIA, DC. (Compos.).
Grantii, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 407 = Kleinia Grantii.
obesa, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 108.—Arab.
sempervіva, Aschers, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 152 = Kleinia Grantii.
trachycarpa, Klotzsch, in Sitzb. Acad. Wien. Math.-Nat. li. Abth. II. 370 = Kleinia pendula.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 596 (= *Senecio Welwitschii*).—Afr. trop.

NOTOSCEPTRUM, Benth. (Liliac.).
brachystachyum, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 15.—Afr. austr.
natalense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 285.—Afr. austr.

NOTOSPARTIUM, Hook. f. (Legum.).
torulosum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 117; *et in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 507.—N. Zel.

NOUETTEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 29 (Nouetta). *APOCYNACEAE.*
cochinchinensis, *Pierre, l. c.* 30.—Cochinch.

NYCTERINIA, D. Don = **Zaluzianskya**, F. W. Schmidt (Scrophul.).
microsiphon, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 238.—Afr. austr.

NYMPHAEA, Tourn. (Nymphaeac.).
Brownii, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 39.—Austral.
fennica, *Mela, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xiv. III. 1.—Eur.
macrophylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 465.—Am. bor.
orbiculata, *Small, l. c.* 1896, 128.—Am. bor.

O

OBERONIA, Lindl. (Orchid.).
aurantiaca, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 210.—Malaya.
auriculata, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 13.—Reg. Himal.
Bertoldi, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 581.—Penins. Mal.
brunescens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 220.—Penins. Mal.
caudata, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 581.—Penins. Mal.
croftiana, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 7.—Reg. Himal.
dissitiflora, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 218.—Penins. Mal.
emarginata, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 6.—Reg. Himal.
falcata, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 329.—Reg. Himal.
Gammiei, *King & Pantl. l. c.* lxvi. 578.—Ind. or.
gardneriana, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 296 = recurva.
intermedia, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 579.—Penins. Mal.
kaernbachiana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 242.—N. Guin.
lobulata, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 331.—Reg. Himal.
longilabris, *King & Pantl. l. c.* 330.—Reg. Himal.
macrostachys, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 263.—Borneo.
micrantha, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 330 (non A. Rich.).—Reg. Himal.
multiflora, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 262.—Borneo.
pachyphylla, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 5.—Reg. Himal.
papuana, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 14.—N. Guin.
parvula, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 330.—Reg. Himal.
porphyrochila, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 220.—Penins. Mal.
prainiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 331.—Reg. Himal.
Proudlockii, *King & Pantl. l. c.* lxvi. 580.—Ind. or.
Ritaii, *King & Pantl. l. c.* 579.—Ind. or.
rolfeana, *King & Pantl. l. c.* 581.—Penins. Mal.
sinuosa, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 263.—Borneo.
stenophylla, *Ridley, l. c.* xxxii. 218.—Penins. Mal.
subnavicularis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 579.—Penins. Mal.
subulata, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 337, sphalm. = lobulata.
Treubii, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 219.—Java.

OCHLANDRA, Thw. (Gramin.).
Beddomei, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 124.—Ind. or.
Brandisii, *Gamble, l. c.* 126.—Ind. or.
Rheedii, *Benth. & Hook. f. ex Gamble, l. c.* 121.—Ind. or.
Ridleyi, *Gamble, l. c.* 127.—Ind. or.
setigera, *Gamble, l. c.* 128.—Ind. or.

OCHNA, Linn. (Ochnac.).
acutifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 433.—Afr. trop.
arenaria, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 7.—Afr. trop.
densicoma, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
gracilipes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 121.—Afr. trop.
longipes, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.
pygmaea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 122.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 21.—Afr. trop.
shirensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.
splendida, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 434.—Afr. trop.

OCHOCOA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1257. *MYRISTICACEAE.*
Gabonii, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

OCHRADENUS, Delile (Resed.).
somalensis, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 52.—Afr. or.

OCHROCARPOS, Thou. (Guttif.).
Humbloti, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1220.—Ins. Comor.

OCHROSIA, Juss. (Apocyn.).
citrodora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 504.—N. Guin.
Cowleyi, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.
Poweri, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 11.—Austral.

OCHTHOCHARIS, Blume (Melast.).
decumbens, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 15.—Penins. Mal.

OCHTHOCOSMUS, Benth. (Linac.).
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 27.—Afr. trop.

OCIMUM, Linn. (Labiat.).
andongense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 850.—Afr. trop.
Balansae, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 37.—Parag.
Buchananii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 348.—Afr. trop.
capitatum, *Baker, l. c.* 345 (non Roth).—Afr. trop.
Descampsii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 83.—Afr. trop.
filiforme, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 556 = angustifolium.
Galpinii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 78.—Afr. austr.
Hanningtonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
heckmannianum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 472.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 372 (= *Orthosiphon Hildebrandtii*).—Madag.
huillense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 851.—Afr. trop.
Johnstonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 345.—Afr. trop.
laxiflorum, *Baker, l. c.* 348.—Afr. trop.
Menyhartii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 556.—Afr. trop.
punctatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 345 (non aliorum).—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 463.—Afr. trop.
roseo-violaceum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 471.—Afr. trop.
Rothii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
rotundifolium, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 472.—Afr. trop.
spicatum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 226.—Arab.
Stirbeyi, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 213.—Afr. trop.
thymoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
tortuosum, *Baker, l. c.* 339.—Afr. trop.
tuberosum, *Baker, l. c.* 522 (non Roxb.).—Afr. trop.
usaramense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 79.—Afr. trop.
Wilmsii, *Guerke, l. c.*—Afr. austr.

OCOTEA, Aubl. (Laurac.).
albida, *Mez & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 114.—Bolivia.
Bangii, *Mez & Rusby, ex Rusby, l. c.* 115.—Bolivia.
falcata, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. 388.—Ind. occ.
hartiana, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 251.—Ind. occ.
Zenkeri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 385.—Afr. trop.

OCTOKNEMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1290. *OLACACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* 1293.—Afr. trop.

OCTOLEPIS, Oliver (Thymel.).
decalepis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 142.—Afr. trop.
Dinklagei, *Gilg, l. c.* 143.—Afr. trop.
macrophylla, *Gilg, l. c.* 144.—Afr. trop.
nodosericea, *Gilg, l. c.* 143.—Afr. trop.

OCTOLOBUS, Welw. (Stercul.).
heteromerus, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 306.—Afr. trop.

OCTOMERIA, R. Br. (Orchid.).
brevifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 643.—Bras.
decumbens, *Cogn. l. c.* 642.—Bras.
gracilis, Barb. Rodr. Orch. Nov. ii. 108 = Rodriguesii.
minuta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 633.—Bras.
pusilla, Barb. Rodr. Orch. Nov. ii. 109 = minuta.
Rodriguesii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 629.—Bras.

ODONTADENIA, Benth. (Apocyn.).
boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 76.—Bolivia.

ODONTARRHENA, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
lesbiaca, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 153.—Graecia.

ODONTELYTRUM, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 86. *GRAMINEAE.*
abyssinicum, *Hack, l. c.*—Afr. trop.

ODONTITES, Riv. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).
pratensis, Borbas, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 276.—Eur.
rigida, Borb. in Termész. Füzetek. Budapest, xxi. 467.—Eur.

ODONTOCHILUS, Blume (Orchid.).
tortus, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 125.—Reg. Himal.

ODONTOGLOSSUM, H. B. & K. (Orchid.).
Candelabrum, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7687 = brevifolium.
loxense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 492.—Ecuador.
miniatum, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7687 = brevifolium.
popayanense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 490.—N. Granat.

ODONTOSTYLIS, Breda = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
multiflora, Breda, Kuhl & Hasselt, Gen. et Sp. Orch. t. 4 = B. multiflorum.

ODONTOTECOMA, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. (1897) 305. *BIGNONIACEAE.*
fulgens, *Bureau & K. Schum. l. c.* 306 (= *Tecoma fulgens*).—Bras.

ODYENDEA, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. (1896) 215. *SIMARUBACEAE.*
gabunensis, *Engl. l. c.* (= *Quassia gabonensis*).—Afr. trop.
klaineana, *Engl. l. c.* (= *Quassia klaineana*).—Afr. trop.

OENANTHE, Tourn. (Umbell.).
bulgarica, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 127.—Bulg.
japonica, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 204 = stolonifera.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 498.—China.
subbipinnata, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 204 = stolonifera.

OENOCARPUS, Mart. (Palm.).
discolor, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 8.—Bras.

OENONEA, Bub. Fl. Pyren. i. 430 (1897) = **Melittis**, Linn. (Labiat.).
melissaefolia, Bub. l. c. 431 = M. melissophyllum.

OENOTHERA, Linn. (Onagr.).
bufonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 28.—Am. bor.
formosa, *Leichtl. in Garden*, lvi. (1899) 212.—Hab. ?
gaurodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 99.—Chili.
gigas, *Vries, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxi. 124.—Hort.
heiniana, *Teyber, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 469.—Hybr.
nyctaginiifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 278.—Am. bor.
Punae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 99.—Bolivia.

OENOTHERIDIUM, Reiche, Fl. Chile, ii. 256 (1898). *ONAGRACEAE.*
sulphureum, *Reiche, l. c.* (= *Godetia sulfurea*).—Chili.

OEONIA, Lindl. = **Aeonia**, Lindl. (Orchid.).
brauniana, Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid. iii. 172. t. 300.—Madag.
forsythiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 171.—Madag.

OLAX, Linn. (Olac.).
autraniana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1295.—Afr. trop.
denticulata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 146; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 286.—Afr. trop.
Durandii, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 286.—Afr. trop.
latifolia, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 284.—Afr. trop.
longiflora, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 284.—Afr. trop.
longifolia *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 285 (non Wall.).—Afr. trop.
macrocalyx, *Engl. l. c.* 285.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 285.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. l. c.* 146.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 283.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 146; *et l. c.* 284.—Afr. trop.

OLDENHAMIA, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1898) 379, sphalm. = seq.

OLDENLANDIA, Linn. (Rubiac.)
acutidentata, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1898, 145.—Afr. trop.
angolensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 412.—Afr. trop.
asperuliflora, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 318, nomen.—Afr. trop.
benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 448.—Afr. trop.
crepiniana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 55.—Afr. trop.
cuspidata, *K. Schum. l. c.* xxiii. 413.—Afr. trop.
debeerstii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 27.—Afr. trop.
delagoensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 64.—Afr. austr.
fasciculata, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 59.—Afr. trop.
geminiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 485 (non Kuntze).—Afr. trop.
golungensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 451.—Afr. trop.
gregaria, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 414.—Afr. trop.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 441.—Afr. trop.
juncoides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 414.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 65.—Afr. austr.
littoralis, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 27.—Am. bor.
luzuloides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 55.—Afr. trop.
megistosiphon, *K. Schum. l. c.* 56.—Afr. trop.
microcalyx, *K. Schum. l. c.* xxiii. 415.—Afr. trop.
microphylla, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 28.—Afr. trop.
nervosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 450.—Afr. trop.
nesaeoides, *Hiern, l. c.* 448.—Afr. trop.
papillosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 416.—Afr. trop.
pellucida, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 448.—Afr. trop.
rosulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 416.—Afr. trop.
sipaneoides, *K. Schum. l. c.* 417.—Afr. trop.
spermacocina, *K. Schum. l. c.* 418.—Afr. trop.
sphaerocephala, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 65.—Afr. austr.
staelioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 418.—Afr. trop.
stellarioides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 447.—Afr. trop.
subverticillata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 419.—Afr. trop.
tardavelina, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 445.—Afr. trop.
thamnoidea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 56.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 442.—Afr. trop.

OLDENLANDIA :—
Wiedenmannii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 57.—Afr. trop.
xestosperma, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 41.—Mexic.

OLEARIA, Moench (Compos.).
aggregata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 597.—N. Zel.
Buchanani, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 267.—N. Zel.
consimilis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 596.—N. Zel.
coriacea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 276.—N. Zel.
laxiflora, *T. Kirk, l. c.* 275.—N. Zel.
parvifolia, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 598.—N. Zel.
quinquefida, *Colenso, l. c.* 596.—N. Zel.

OLIGOTHRIX, DC. (Compos.).
Newtonii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 33.—Afr. trop.
xyridopsis, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

OLYRA, Linn. (Gramin.).
brevifolia, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 402 = latifolia.
concinna, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7469.—Am. cent.
guineensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 37 = latifolia.
heliconia, *Lindm. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 11.—Bras.

OMPHALANDRIA, P. Br. = **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).
linearibracteata, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 59.—Ind. occ.

OMPHALEA, Linn. (Euphorb.).
megacarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2537.—Ind. occ.

OMPHALOGRAMMA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898) 178. *PRIMULACEAE.*
Delavayi, *Franch. l. c.* 179 (= *Primula Delavayi*).—China.
Elwesiana, *Franch. l. c.* (= *Primula elwesiana*).—Reg. Himal.
Souliei, *Franch. l. c.* 180.—China.
vincaeflora, *Franch. l. c.* (= *Primula vinciflora*).—China.

ONAGRA, Tourn. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
arguta, Small, in Bull. Torr. Bot. Club. 1896, 171 = O. arguta.
cruciata, Small, l. c. 169 = O. biennis.
depressa, Small, l. c. 170 = O. depressa.
Hookeri, Small, l. c. 171 = O. biennis.
Jamesii, Small, l. c. = O. Jamesii.
macrosceles, Small, l. c. = O. macrosceles.
strigosa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 278.—Am. bor.

ONCIDIUM, Sw. (Orchid.).
depauperatum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 496.—Ecuador.
fractiflexum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Ecuador.
funis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 497.—Ecuador.
godseffianum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, I. 754.—Hab. ?
gracillimum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 197.—Peruv.
polystachyoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 495.—Ecuador.
sessile, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* i. 101, t. 21.—Peruv.

ONCINOTIS, Benth. (Apocyn.).
axillaris, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 226.—Afr. trop.
Batesii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 272.—Afr. trop.
campanulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 227.—Afr. trop.
chlorogena, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 307, nomen.—Afr. trop.
glabrata, *Stapf, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 674 (= *Motandra glabrata*).—Afr. trop.
inandensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 254.—Afr. austr.
subsessilis, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 307, nomen.—Afr. trop.
tenuiloba, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
zygodioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 227.—Afr. trop.

ONCOBA, Forsk. (Bixac.).
crepiniana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér II. i. I. 7.—Afr. trop.
Demeusei, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 54.—Afr. trop.
eximia, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 438.—Afr. trop.
Klainii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 118.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. & Th. Dur. in. Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 8.—Afr. trop.
spinidens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 39.—Afr. trop.
spireana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 117.—Afr. trop.

ONCOSPERMA, Blume (Palm.).
tigillaria, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 173.—Penins. Mal.

ONGOKEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1313; et in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 147. *OLACACEAE.*
Gore, Pierre, l. c. 1314; l. c. 147 = klaineana.
klaineana, *Pierre, ll. cc.* (= *Aptandra Gore*).—Afr. trop.

ONOBRYCHIS, Linn. (Legum.).
Bellevii, *Prain, in Bull. Herb. Boiss.* v. 75.—Afghan.
Degeni, *Doerfler, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien*, lxiv. 718.—Eur.
Formaneki, Heldr. ex Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 321 = Heldreichi.
grandis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 53.—As. cent.
halacsyana, *Heldr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 711.—Graecia.
Halacsyi, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 199 = Heldreichi.
Heldreichi, *Form. l. c.* 321 (non Bunge).—Thessalia.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 218.—Eur.
Onobrychis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 256 = viciaefolia.

ONOCHILIS, Mart. = **Nonnea**, Medic. (Borag.).
lutea, Bub. Fl. Pyren, i. 493 = Alkanna lutea.
tinctoria, Bub. l. c. 491 = Alkanna tinctoria.
ventricosa, Bub. l. c. 492 = N. alba.

ONONIS, Linn. (Legum.).
purpurascens, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 362.—Eur.

ONOPORDON, Linn. (Compos.).
eriocephalum, *Rouy, in Bull. Soc. Bot Fr.* xliii. 591.—Eur.
ferox, *Rouy, l. c.* 592.—Eur.
Gautieri, *Rouy, l. c.* 587.—Eur.
laconicum, *Heldr. & Sart. ex Rouy, l. c.* 585.—Eur.
minus, *Rouy, l. c.* 597.—Afr. bor.
nervosum, Gaud. ex Rouy, l. c. 587 = Gautieri.
spectabile, *Rouy, l. c.* 594.—Eur.

ONOPYXUS, Bub. = **Carduus**, Tourn. (Compos.).
acanthifolius, Bub. Fl. Pyren. ii. 140 = C. acanthoides.
carlinaefolius, Bub. l. c. 142 = C. carlinaefolius.
medius, Bub. l. c. 143 = C. medius.
nutans, Bub. l. c. 145 = C. nutans.
pycnocephalus, Bub. l. c. 139 = C. pycnocephalus.
pyrenaeus, Bub. l. c. 141 = C. carlinoides.

ONOSMA, Linn. (Borag.).
asperum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 199.—Bulg.
elegans, *Bub. Fl. Pyren.* i. 478 (non Koch).—Pyren.
exsertum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2639.—China.
macedonicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 177.—Eur.
proponticum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 145.—Eur.
sinicum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 547.—China.
thracicum, *Vel. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxxvii. 8.—Eur.

OONOPSIS, Greene, Pittonia, iii. (1896) 45. *COMPOSITAE.*
argillacea, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 481.—Am. bor.

OONOPSIS:—
Engelmanni, *Greene, Pittonia*, iii. 45 (= *Bigelowia Engelmanni*).—Am. bor. occ.
foliosa, *Greene, l. c.* 46 (= *Aplopappus Fremonti*).—Am. bor.
multicaulis, *Greene, l. c.* 45 (= *Aplopappus multicaulis*).—Am. bor.
Wardi, *Greene, l. c.* 46.—Am. bor.

OPHIOCAULON, Hook. f. (Passifl.).
apiculatum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 85.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.*—Afr. trop.
reticulatum, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 86.—Afr. trop.

OPHIOPOGON, Ker-Gawl. (Haemodor.).
bockianus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 254.—China.
cordylinoides, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 300.—Ind. or.

OPHIORRHIZA, Linn. (Rubiac.).
fibrillosa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 22.—Borneo.
lawrenceana, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 295.—Ind. or.
pileoides, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
uniflora, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 150.—N. Brit.

OPHIORRHIZIPHYLLON, Kurz (Acanth.).
laxum, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 645.—Cochinch.

OPHIURUS, Gaertn. f. (Gramin.).
laevis, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 69 = Rottboellia perforata.
perforatus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. Math. 246 = Rottboellia perforata.

OPHRYOSPORUS, Meyen (Compos.).
axilliflorus, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 706 (= *Eupatorium axilliflorum*).—Reg. Argent.
Charua, *Hieron. l. c.* 705 (= *Mikania Charua*).—Reg. Argent.
Kuntzei, *Hieron. l. c.* 707.—Bolivia.
Lorentzii, *Hieron. l. c.* 706.—Reg. Argent.
origanoides, *Hieron. l. c.* 707 (= *Eupatorium origanoides*).—Peruv.
saltensis, *Hieron. l. c.* 705.—Reg. Argent.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 3.—Ecuador.
solidaginoides, *Hieron. l. c.* 4 (= *Eupatorium solidaginoides*).—Ecuador.

OPHRYS, Linn. (Orchid.).
litigiosa, *Camus, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 49.—Eur.
Nicotiae, *Zodda, in Malpighia*, xiv. 183.—Eur.

OPILIA, Roxb. (Olac.).
Afzelii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 282.—Afr. trop.
Sadebeckii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

OPIZIA, J. & C. Presl (Gramin.).
Pringlei, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 44 (= *Pringleochloa stolonifera*).—Mexic.

OPLISMENUS, Beauv. (Gramin.).
africanus, *Beauv. Fl. Owar.* ii. 15.—Afr. et Am. trop.
brasiliensis, Raddi, Agrost. Bras. 40 = africanus.
bromoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. 452 = compositus.
cuspidatus, Kunth, Rév. Gram. i. 45 = Panicum colonum.
dubius, Kunth, l. c. 44 = Panicum Crus-galli.
hirtellus, Roem. & Schult. Syst. ii. 481 = africanus.
loliaceus, Beauv. Agrost. 168 = africanus.
muticus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 714.—Chili.
oahuaensis, Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 220 = africanus.
scaber, Kunth, Rév. Gram. i. 44 = Panicum stagninum.
semialatus, Desv. Opusc. 81 = Axonopus semialatus.
simplex, K. Schum. in Engl. Veg. Usamb. 48 = africanus.
stagninus, Kunth, Rév. Gram. i. 44 = Panicum stagninus.
Thwaitesii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 169.—Zeylan.
velutinus, Schult. f. Mant. ii. 271 = africanus.

OPULASTER, Medic. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).
pauciflorus, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 581 = N. malvacea.
pubescens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 205.—Am. bor.

OPUNTIA, Tourn. (Cact.).
aquosa, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 165.—Mexic.
assumptionis, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 153.—Parag.
australis, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 896.—Patag.
beckeriana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 722.—Hab. ?
brachydelphis, K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 107 = Maihuenia brachydelphis.
bradtiana, K. Brandegee, in Erythea, v. 121 = Cereus bradtianus.
Brandegeei, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 653.—Calif.
calmalliana, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 453.—Mexic.
cardiosperma, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 150.—Parag.
cereiformis, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 897 = Cereus bradtianus.
Ciribe, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 445—Mexic.
clavellina, *Engelm. l. c.* 444.—Mexic.
digitalis, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 898 = Verschaffelti.
Digueti, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 166.—Mexic.
Ficus-indica, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. no. 2.—Mexic.
golziana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 654 (= *Pereskia opuntiaeflora*).—Mexic.
gymnocarpa, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 893 = O. Ficus-indica.
hempeliana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 690.—Bolivia.
hyptiacantha, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 894.—Mexic.
laevis, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 419.—Am. bor.
Larreyi, *A. Web. ex Coult. l. c.* 423.—Mexic.
microcarpa, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 714 (non Engelm.).—Ind. occ.
microdisca, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 896.—Reg. Argent.
Morenoi, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 107, nomen.—Patag.
myriacantha, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 894 (non Link & Otto).—Ins. Galap.
nigrispina, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 695.—Bolivia.
Opuntia, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 432 = vulgaris.
Palmeri, *Engelm. ex Coult. l. c.* 423.—Am. bor.
pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 30.—Reg. Argent.
papyracantha, Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 694 = andicola.
paraguayensis, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 149.—Parag.
Philippii, Haage & Sch. ex Bois, Dict. Hortic. 939 = Maihuenia Philippii.
pilifera, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 894.—Mexic.
Pititache, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 166 (= *Pereskia Pititache*).—Mexic.
Porteri, *Brandegee ex A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 899.—Mexic.
pycnacantha, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 380, sphalm. = seq.
pycnantha, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 423.—Mexic.
pyrrhacantha, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 694.—Peruv.
Quimilo, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 107, nomen.—Reg. Argent.
Quipa, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 894.—Bras.
quitensis, *A. Web. l. c.*—Ecuador.
rauppiana, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 118.—Am. austr.
rhodantha, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 735.—Am. bor.
rosea, Phil. ex K. Schum. l. c. 686 = rosiflora.
rosiflora, *K. Schum. l. c.*—Chili.
rotundifolia, *K. Schum. l. c.* 652 (= *Pereskia rotundifolia*).—Mexic.
rubrifolia, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 424.—Am. bor.
Scheeri, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 895.—Mexic. ?

OPUNTIA:—
Schickendantzii, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 898.—Reg. Argent.
schweriniana, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 148.—Am. bor.
spathulata, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 165 (=*Pereskia spathulata*).—Mexic.
Spegazzinii, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 898.—Reg. Argent.
stenarthra, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 149.—Parag.
Tapona, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 423.—Mexic.
Tenajo, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 380, sphalm. = Tesajo.
teres, *Cels. ex A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 898.—Bolivia.
teres, Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 683 = Verschaffelti.
Tesajo, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 448.—Mexic.
Treleasii, *Coult. l. c.* 434.—Mexic.
ursina, *A. Web. in Bois, Dict. Hortic.* 896.—Am. bor.
Verschaffelti, *Cels. ex A. Web. l. c.* 898.—Bolivia.
vulpina, *A. Web. l. c.* 895.—Reg. Argent.
xanthostemma, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 735.—Am. sept.

ORANIA, Zipp. (Palm.).
macropetala, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*. 205.—N. Guin.

ORBIGNYA, Mart. (Palm.).
campestris, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 78.—Bras.
longibracteata, *Barb. Rodr. l. c.* 79.—Bras.
macrocarpa, *Barb. Rodr. l. c.* 74.—Bras.
martiana, *Barb. Rodr. l. c.* 68.—Bras.

ORCHIDANTHA, N. E. Br. in Gard. Chron. Oct. 23, 1886, 519. *MUSACEAE.*
borneensis, *N. E. Br. l. c.*—Borneo.
maxillarioides, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac.* 42.—Penins. Mal.

ORCHIS, Tourn. (Orchid.).
Fauriei, *Finet, in Journ. de Bot.* 1898, 340.—Japon.
habenarioides, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 302.—Reg. Himal.
ichneumonea, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 207 = Habenaria ichneumonea.
mediterranea, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 163 (non aliorum).—Reg. Medit.
monticola, *Klinge, l. c.* 178.—Eur.; Oriens.
orientalis, *Klinge, l. c.* 182.—Eur.; As.; Afr. bor.
puberula, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 304.—Ind. or.
Ruthei, *Schulze, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 237.—Hab. ?
subrotunda, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 600.—Burma.
szechenyiana, *Reichb. f. ex Kan. in Szech. Keletazsiai Utj.* ii. 843.—China.

OREASTRUM, Greene, Pittonia, iii. (1896) 146 = **Oreostemma**, Greene (Compos.).
alpigenum, Greene, l. c. 147 = O. alpigenum.
Andersonii, Greene, l. c. = O. Andersonii.
elatum, Greene, l. c. = O. elatum.
Haydeni, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 398 = O. Haydeni.

ORELLANA, Ludw. = **Bixa**, Linn. (Bixac.).
Orellana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 9 = B. Orellana.

OREOBAMBOS, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1896) 178. *GRAMINEAE.*
Buchwaldii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

OREOBROMA, Howell = **Calandrinia**, H. B. & K. et **Lewisia**, Pursh (Portul.).
Grayi, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 137 = Calandrinia Grayi.
minima, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 260.—Am. bor.

OREOCARYA, Greene (Borag.).
abortiva, *Greene, Pittonia*, iii. 114.—Am. bor.
affinis, *Greene, l. c.* 110.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* iv. 92.—Am. bor.
caespitosa, *A. Nelson, in Erythea*, vii. 65.—Am. bor.
cinerea, *Greene, Pittonia*, iii. 113.—Am. bor.

OREOCARYA:—
confertiflora, *Greene, Pittonia*, iii. 112.—Am. bor.
flava, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 202.—Am. bor.
flavoculata, *A. Nelson, in Erythea*, vii. 66.—Am. bor.
humilis, *Greene, Pittonia*, iii. 112.—Am. bor.
interrupta, *Greene, l. c.* 111.—Am. bor.
longiflora, *A. Nelson, in Erythea*, vii. 67.—Am. bor.
lutescens, *Greene, Pittonia*, iv. 93.—Am. bor.
multicaulis, *Greene, l. c.* iii. 114 (=*Eritrichium multicaule*, Torr.).—Am. bor.
nubigena, *Greene, l. c.* 112.—Am. bor.
thyrsiflora, *Greene, l. c.* 111.—Am. bor.

OREOCHARIS, Benth. (Gesner.).
fokienensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 212.—China.
tubicella, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 249.—China.

OREOMYRRHIS, Endl. (Umbell.).
linearis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2590.—N. Guin.

OREOPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).
Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 116.—Bolivia.
loesenerianum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 127.—Am. cent.

OREOPOLUS, Schlecht. (Rubiac.).
patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 525.—Patag.

OREORCHIS, Lindl. (Orchid.).
Fargesii, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 697.—China.
unguiculata, Finet, l. c. 698 = Cremastra unguiculata.

OREOSOLEN, Hook. f. (Scrophul.).
unguiculatus, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2467.—Tibet.

OREOSTEMMA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 224. *COMPOSITAE.*
alpigenum, *Greene, l. c.* (=*Aster alpigenus*).—Am. bor.
Andersonii, *Greene, l. c.* (=*Aster Andersoni*).—Am. bor.
elatum, *Greene, l. c.* (=*Oreastrum elatum*).—Am. bor.
Haydeni, *Greene, l. c.* (=*Aster Haydeni*).—Am. bor.

OREOSYCE, Hook. f. (Cucurb.).
Kellerii, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 822.—Afr. trop.

OREOXIS, Rafin. = **Cymopterus**, Rafin. (Umbell.).
alpina, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 144.—Am. bor.
Bakeri, Coult. & Rose, l. c.—Am. bor.

ORICIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1287. *RUTACEAE.*
gabonensis, *Pierre, l. c.* 1289.—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, l. c.* n. s. i. 68.—Afr. trop.
lecomteana, *Pierre, l. c.* ii. 1289; et n. s. i. 68.—Afr. trop.

ORIGANUM, Tourn. (Labiat.).
lirium, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 192.—Graecia.

ORMOCARPUM, Beauv. (Legum.).
megalophyllum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 292.—Afr. trop.

ORMOSIA, Jacks. (Legum.).
bancana, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. 184 = parvifolia.
dubia, Prain, l. c. 182 = inopinata.
gracilis, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 148.—Penins. Mal.
Henryi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 180.—China.
inopinata, *Prain, l. c.* 181.—Ind. or.
Krugii, *Urb. Symb. Antill.* i. 320.—Ind. occ.
laxa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 182.—Ind. or.
monchyana, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 441.—Celebes.
nitida, Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 149 = polita.
polita, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 184.—Penins. Mal.
Ridleyi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 151 = microsperma.
scandens, *Prain, ex King, l. c.* 147.—Penins. Mal.
sumatrana, *Prain, ex King, l. c.* 150.—Malaya.
yunnanensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 183.—China.

ORNITHIDIUM, Salisb. (Orchid.).
Lehmannii, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 486.—N. Granat.
luteo-rubrum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.*—Ecuador.
pfitzerianum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.*—N. Granat.

ORNITHOCHILUS, Wall. (Orchid.).
Delavayi, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 496.—China.
Moretoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* v. 41.—N. Guin.

ORNITHOGALUM, Tourn. (Liliac.).
ambiguum, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no. 9, 7.—Eur.
Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 504.—Afr. austr.
bulbinelloides, Baker, l. c. 509 = Anthericum ornithogaloides.
byzantinum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 149 (non aliorum).—Eur.
capillaris, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 490.—Afr. austr.
cernuum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 547.—Afr. trop.
elatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 508 (non Andr.).—Afr. austr.
euryphyllum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 1897, 149.—Graecia.
Flanagani, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 535.—Afr. austr.
Galpini, *Baker, l. c.* 516.—Afr. austr.
Galpini, Baker, l. c. 536 = subspicatum.
gambosanum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 547.—Afr. trop.
gracilentum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
inandense, *Baker, l. c.* 503.—Afr. austr.
inconspicuum, *Baker, l. c.* 498.—Afr. austr.
Kirkii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. 279 = Albuca caudata.
leptophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
lineare, *Baker, l. c.* 503.—Afr. austr.
Melleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. 280 = Albuca Melleri.
monophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
Monteiroi, *Baker, l. c.* 508.—Afr. austr.
oliganthum, *Baker, l. c.* 510.—Afr. austr.
oostachyum, *Baker, l. c.* 502.—Afr. austr.
pauciflorum, *Baker, l. c.* 498 (non aliorum).—Afr. austr.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 23.—Afr. austr.
polyphlebium, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 507.—Afr. austr.
praeumbellatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 140.—Graecia.
Rogersii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 501.—Afr. austr.
Saltmarshei, *Baker, l. c.* 513.—Afr. austr.
sigmoideum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 189.—As. Min.
spirale, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 42 (non Wimm.).—Afr. trop.
Stapffii, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
subspicatum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 164.—Afr. trop.
tempskyanum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 188.—As. Min.
tortuosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 510.—Afr. austr.
tulbaghense, *Baker, l. c.* 504.—Afr. austr.
xanthochlorum, *Baker, l. c.* 508.—Afr. austr.

ORNITHOPODIUM, Tourn. = **Ornithopus**, Linn. (Legum.).
bracteolatum, Bub. Fl. Pyren. ii. 565 = O. ebracteatus.
egoceraton, Bub. l. c. = O. compressus.
missus, Bub. l. c. 566 = O. perpusillus.
roseum, Bub. l. c. 565 = O. perpusillus.

OROBANCHE, Tourn. (Orobanch.).
Cathae, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 219.—Arab.
chassia, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 178; *et in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 197.—Eur.
Cooperi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (=*Aphyllon Cooperi*).—Am. bor.
Paralias, *Corbière, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. i. 184.—Gallia.
tuberosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 (=*Aphyllon tuberosum*).—Calif.

OROBUS, Tourn. = **Lathyrus**, Tourn. (Legum.).
sessilifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 64 = L. digitatus.
tempskyanus, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 608.—Graecia.
venetus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = L. venetus.

OROPETIUM, Trin. (Gramin.).
capense, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 742.—Afr. austr.

OROPHACA, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 306. *LEGUMINOSAE.*
caespitosa, *Britton, l. c.* (= *Astragalus triphyllus*).—Am. bor.
sericea, *Britton, l. c.* (= *Astragalus sericoleucus*).—Am. bor.

OROPHEA, Blume (Anonac.).
filipes, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 319.—N. Guin.
Minahassae, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 336.—Celebes.

OROPHOCHILUS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 657. *ACANTHACEAE.*
stipulaceus, *Lindau, l. c.* 658.—Peruv.

ORTHANTHERA, Wight (Asclep.).
stricta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 694.—Afr. trop.

ORTHOCARPUS, Nutt. (Scrophul.).
columbinus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 37.—Am. bor.
cuspidatus, *Greene, Pittonia*, iv. 101.—Am. bor.
mariposanus, *Congdon, in Erythea*, vii. 188.—Calif.

ORTHOCHILUS, Hochst. = **Eulophia**, R.Br. (Orchid.).
Mechowii, Reichb. f. in Flora, 1882, 532 = E. Mechowii.
renschianus, Reichb. f. l. c. = E. renschiana.
Welwitschii, Reichb. f. l. c. 1865, 186 = E. Welwitschii.

ORTHOGONEURON, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 267 (1897). *MELASTOMACEAE.*
dasyanthum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

ORTHOPHYTUM, Beer = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).
glabrum, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 117.—Bras.
leprosum, Mez, l. c.—Bras.

ORTHOPOGON, R. Br. = **Oplismenus**, Beauv. (Gramin.).
africanus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 448 = Oplism. africanus.
agrostoides, Trev. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 234 = Arundinella brasiliensis.
albus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 44 = Oplism. Burmannii.
gonyrrhizus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 443 = Oplism. undulatifolius.
hirtellus, R. Br. Prod. 194 = Oplism. undulatifolius.
Junghuhnii, Nees, ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 444 = Oplism. compositus.
loliaceus, Spreng. Syst. i. 306 = Oplism. africanus.
squarrosus, Spreng. l. c. 307 = Chamaeraphis spinescens.
stagninus, Spreng. l. c. = Panicum stagninum.
undulatus, Link, Hort. Reg. Berol. i. 203 = Oplism. undulatifolius.
velutinus, Spreng. Syst. i. 306 = Oplism. africanus.

ORTHORAPHIUM, Nees = **Stipa**, Linn. (Gramin.).
Roylei, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. 94 = S. Orthoraphium.

ORTHOSIPHON, Benth. (Labiat.).
bartsioides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 367.—Afr. trop.
brachystemon, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 228.—Arab.
bracteosus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 375.—Afr. trop.
canescens, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 557.—Afr. austr.
dissitifolius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 371.—Afr. trop.
Elliottii, *Baker, l. c.* 376.—Afr. trop.
heterophyllus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 82.—Afr. austr.

ORTHOSIPHON:—
Hildebrandtii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 372 (non Vatke).—Afr. trop.
Johnstonii, *Baker, l. c.* 373.—Afr. trop.
Kirkii, *Baker, l. c.* 376.—Afr. trop.
liebrechtsianum, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 84.—Afr. trop.
longipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 373.—Afr. trop.
macranthus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 84.—Afr. austr.
malosanus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 371.—Afr. trop.
Marquesii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 242.—Afr. trop.
mombasicus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 369.—Afr. trop.
natalensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 82.—Afr. austr.
nyasicus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 373.—Afr. trop.
petrensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 859.—Afr. trop.
Pretoriae, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 81.—Afr. austr.
Rehmannii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 557.—Afr. austr.
salagensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 368.—Afr. trop.
serratum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 431.—Afr. austr.
shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 368.—Afr. trop.
stenophyllus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 84.—Afr. austr.
subvelutinus, *Guerke, l. c.* 80.—Afr. austr.
transvaalensis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 281.—Afr. austr.
Wakefieldii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 371.—Afr. trop.
Wattii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 520.—Reg. Himal.
Wilmsii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 81.—Afr. austr.
Woodii, *Guerke, l. c.* 83.—Afr. austr.

ORTHROSANTHUS, Sweet (Irid.).
nigrorhynchus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 126.—Bolivia.
tunarensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 309.—Bolivia.

ORYCTANTHUS, Eichl. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Andrieuxii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 135 (= *Cladocolea Andrieuxii*).—Mexic.
cordifolius, Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 30 (= *Viscum cordifolium*).—Am. cent.
florulentus, Urb. l. c. 31 = L. florulentus.
ligustrinus, Urb. l. c. 30 (= *Viscum ligustrinum*).—Mexic.

ORYPETALUM, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1900) 372, sphalm. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.)

ORYZA, Linn. (Gramin.).
ciliata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8637 B = Leersia hexandra.
granulata, *Nees, in Wall. Cat.* n. 8634.—Ind. or.; Malaya.
montana, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8633 = latifolia.
officinalis, Wall. Cat. n. 8635 = latifolia.
Ridleyi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 93.—Ind. or.
triandra, Heyne, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 3 = granulata.

ORYZOPSIS, Michx. (Gramin.).
aequiglumis, *Duthie, Grasses N. W. Ind.* 27.—Reg. Himal.
divulsa, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 234 = Munroi.
Duthiei, Hack. ex Hook. f. l. c. = aequiglumis.
effusa, Hack. ex Hook. f. l. c. = lateralis.
florulenta, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxvii. 26.—N. Granat.
kashmirensis, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 234 = Munroi.
lateralis, *Stapf, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
Munroi, *Stapf, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
tiraquensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 330 (= *Stipa tiraquensis*).—Bolivia.

OSBECKIA, Linn. (Melast.).
abyssinica, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 8.—Afr. trop.
albiflora, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 21.—Afr. trop.
auricola, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 356, sphalm. = saxicola.
calotricha, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 8.—Afr. trop.
densiflora, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
drepanosepala, *Gilg, l. c.* 7.—Afr. trop.
postpluvialis, *Gilg, l. c.* 6.—Afr. trop.
saxicola, *Gilg, l. c.* 7.—Afr. trop.

OSCHATZIA, Walp. = **Azorella**, Lam. (Umbell.).
cuneifolia, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 128 = A. cuneifolia.

OSMANTHUS, Lour. (Oleac.).
armatus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 532.—China.
bracteatus, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 14.—Japon.
Cooperi, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 18.—China.

OSMELIA, Thw. (Samyd.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
Maingayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 19.—Malaya.

OSMITOPSIS, Cass. (Compos.).
nana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 207.—Afr. austr.

OSSAEA, DC. (Melast.).
macrandra, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 432 (= *Sagraea macrandra*).—Ind. occ.

OSTEOPHLOEUM, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 127. *MYRISTICACEAE.*
platyspermum, *Warb. l. c.* 162 (= *Myristica platysperma*).—Bras.

OSTEOSPERMUM, Linn. (Compos.).
glaberrimum, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 165.—Afr. austr.
pterigoideum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 471.—Afr. austr.
riparium, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 475.—Afr. austr.

OSTRYOCARPUS, Hook. f. (Legum.).
parviflorus, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 66.—Afr. trop.

OSYRIDICARPOS, A. DC. (Santal.).
linearifolius, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 385.—Afr. trop.

OSYRIS, Linn. (Santal.).
mediterranea, Bub. Fl. Pyren. i. 124 = alba.

OTANTHERA, Blume (Melast.).
oligantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 478.—N. Guin.

OTHONNA, Linn. (Compos.).
ambifaria, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 403.—Afr. trop.
brachyanthera, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 606.—Afr. trop.
bracteata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 471.—Afr. austr.
floribunda, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 214.—Afr. austr.
gracilis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 605.—Afr. trop.
huillensis, *Welw. ex Hiern, l. c.* 603.—Afr. trop.
humilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 214.—Afr. austr.
lepidocaulis, *Schlechter, l. c.* 215.—Afr. austr.
lobata, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
patula, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 26.—Afr. austr.
plantaginea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 604.—Afr. trop.

OTOCHLAMYS, DC. (Compos.).
pedunculata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 208.—Afr. austr.

OTOMERIA, Benth. (Rubiac.).
calycina, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 58.—Afr. trop.
micrantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 423.—Afr. trop.

OTOMERIA:—
rupestris, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 59.—Afr. trop.
speciosa, *Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 437 (=*Pentas speciosa*).—Afr. trop.

OTOPETALUM, F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 457. *ORCHIDEAE.*
Tunguraguae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Ecuador.

OTOPHORA, Blume (Sapind.).
sessilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 430.—Penins. Mal.

OTOSTEGIA, Benth. (Labiat.).
fruticosa, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 258 = scariosa.
Michauxii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 111.—Persia.
modesta, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 65.—Afr. trop.
Olgae, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. no. 4, 96 (=*Chartocalyx Olgae*).—Turkestan.

OTTELIA, Pers. (Hydrocharid.).
crassifolia, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 2.—Afr. trop.
halogena, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 56.—Afr. trop.
scabra, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. 151 = Boottia scabra.

OURATEA, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).
arnoldiana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 30.—Afr. trop.
cubensis, Urb. Symb. Antill. i. 362.—Ind. occ.
Guildingi, Urb. l. c. 364 = G. pyrifolia.
jamaicensis, Urb. l. c. 362 = G. guyannensis.
laevis, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 34.—Afr. trop.
laxiflora, Wildem. & Th. Dur. l. c. 33.—Afr. trop.
litoralis, Urb. Symb. Antill. i. 363.—Ind. occ.
pellucida, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 35.—Afr. trop.
refracta, Wildem. & Th. Dur. l. c. 31.—Afr. trop.
Scheffleri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
spinulosa, Urb. Symb. Antill. i. 362.—Ind. occ.

OURET, Adans. = **Aerua**, Forsk. (Amarant.).
lanata, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 893 = A. lanata.
scandens, Hiern, l. c. = A. scandens.

OURISIA, Comm. (Scrophul.).
cockayniana, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 426.—N. Zel.
ruelleodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 238 = magellanica.

OVILLA, Adans. = **Jasione**, Linn. (Campan.).
amethystina, Bub. Fl. Pyren. ii. 22 = J. amethystina.
globulariifolia, Bub. l. c. 20 = J. montana.
humilis, Bub. l. c. 22 = J. humilis.
perennis, Bub. l. c. 21 = J. perennis.

OWATARIA, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1900, 1. *GUTTIFERAE.*
formosana, *Matsum. l. c.*—Formosa.

OXALIS, Linn. (Geran.).
amblyosepala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 153.—Afr. austr.
aurea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
biloba, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 10, 5.—Parag.
brachycarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 153.—Afr. austr.
brevipes, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 10, 8.—Bras.
Bushii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 611.—Am. bor.
Canterai, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 226.-Urug.
cymosa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 267.-Am. bor.
dammeriana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 437.-Afr. austr.
decipiens, *Schlechter, l. c.* xxvii. 154 (non Prog.).-Afr. austr.
denticulata, *Wolley-Dod, in Journ. Bot.* 1900, 170.-Afr. austr.
dumicola, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 23—Urug.

OXALIS:—
duriuscula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 437.—Afr. austr.
engleriana, *Schlechter, l. c.* 438.—Afr. austr.
erythropoda, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 16.—Bolivia.
filipes, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 346.—Am. bor.
fontinalis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 215.—Urug.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 391.—Afr. austr.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 413.—Afr. trop.
gracilipes, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 23.—Afr. austr.
gracilissima, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 224.—Urug.
grandiflora, *Arechav. l. c.* 239 (non Jacq.).—Urug.
guttata, *Arechav. l. c.* 228.—Urug.
halophila, *Arechav. l. c.* 227.—Urug.
hirsuticaulis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 611.—Am. bor.
kurziana, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 213.—Urug.
Leipoldtii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 24.—Afr. austr.
lindaviana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 154.—Afr. austr.
longissima, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 360.—Bolivia.
Macachin, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 219.—Urug.
macra, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 155.—Afr. austr.
macrantha, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 268.—Am. bor.
mattogrossensis, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 10, 9.—Bras.
monticola, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 231.—Urug.
Osteri, *Arechav. l. c.* 228.—Urug.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 501.—Patag.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 46.—Afr. austr.
phloxidiflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 155.—Afr. austr.
polyadenia, *Schlechter, l. c.* 156.—Afr. austr.
Priceae, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 612.—Am. bor.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 439.—Bras.
Reineckii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 155.—Bras.
rivalis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 230.—Urug.
salmonicolor, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 156.—Afr. austr.
sericea, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 223 (non Linn. f.).—Urug.
stenocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 156.—Afr. austr.
subcorymbosa, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 238.—Urug.
trichocalyx, Phil. Fl. Atacam. 13 = atacamensis.
uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 412.—Afr. trop.
uliginosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 157.—Afr. austr.
urbaniana, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
uruguayensis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 220.—Urug.
venustula, *Arechav. l. c.* 216.—Urug.
viscidula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 158.—Afr. austr.
vulcanicola, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 241.

OXYANTHUS, DC. (Rubiac.).
Goetzei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 491.—Afr. trop.
pallidus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 465.—Afr. trop.
pulcher, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 65.—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

OXYCHLOË, Phil. = **Distichia**, Nees & Meyen (Juncac.).
bisexualis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 321.—Reg. Argent.

OXYDECTES, Linn. Syst. ed. I. (1735) = **Croton**, Linn. (Euphorb.).
argentina, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 288 = C. argentinus.
fluminensis, Kuntze, l. c. = C. fluminensis.
Hauthalii, Kuntze, l. c. 289 = C. Hauthallii.
Hieronymi, Kuntze, l. c. 289 = C. Hieronymi.
saltensis, Kuntze, l. c. = C. saltensis.
sarcopetala, Kuntze, l. c. = C. sarcopetalus.
sarcopetalodes, Kuntze, l. c. = C. sarcopetaloides.
sparsiflora, Kuntze, l. c. = C. sparsiflorus.
subdioeca, Kuntze, l. c. = C. subdioecus.
subglabra, Kuntze, l. c. 290 = C. subglaber.
subpannosa, Kuntze, l. c. = C. subpannosus.

OXYGONUM, Burch. (Polygon.).
delagoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 268.—Afr. austr.

OXYLOBIUM, Andr. (Legum.).
graniticum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 185.—Austral.

OXYMITRA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
gabonensis, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 297.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 10.—Afr. trop.

OXYOTIS, Welw. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 395 (1900) = **Aeolanthus**, Mart. (Labiat.).
nodosa, Welw. l. c. = A. nodosus.
sedoides, Welw. l. c. = A. sedoides.

OXYPETALUM, R. Br. (Asclep.).
aureum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 80.—Parag.
Balansae, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 51.—Bras.
cordifolium, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 269 = riparium.
Ekblomii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 52.—Bras.
hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 79.—Parag.
Henschenii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 45.—Bras.
oliganthum, *Malme, l. c.* 46.—Bras.
paraguayense, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 80 (non Schlechter).—Parag.
Schenckii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 20.—Bras.
stipatum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 44.—Bras.
suaveolens, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 43 (non Fourn.).—Reg. Argent.

OXYPOLIS, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
Fendleri, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 478 (=*Archemora Fendleri*).—Am. bor.
occidentalis, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 196.—Am. bor.
ternata, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = P. ternatum.

OXYPTERYX, Greene, Pittonia, iii. (1897) 234. *ASCLEPIADACEAE.*
arenicola, *Greene, l. c.* 235 (=*Asclepias arenicola*).—Am. bor.

OXYTENANTHERA, Munro (Gramin.).
Bourdilloni, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 76. —Ind. or.
parvifolia, *Brandis, ex Gamble, l. c.* 72.—Burma.
sinuata, *Gamble, l. c.* 71.—Penins. Mal.

OXYTRIA, Rafin. = **Schoenolirion**, Torr. (Liliac.).
albiflora, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 406 = S. Elliottii.
texana, Pollard, l. c. 407 = S. texanum.

OXYTROPIS, DC. (Legum.).
aculeata, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. no. 4, 93.—Turkestan.
Cusickii, *Greenm. in Erythea*, vii. 116.—Am. bor.
Dutreuilii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 322.—Tibet.
Grenardi, *Franch. l. c.*—Tibet.
kermanica, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 606.—Persia.
lutchensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 322.—Tibet.
megalantha, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 666.—Japon.
nivalis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 323. —Tibet.
parviflora, *Franch. l. c.*—Tibet.
Poncinsii, *Franch. l. c.* ii. 343.—As. cent.

P

PACHYGONE, Miers (Menisperm.).
longifolia, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 34.—Austral.

PACHYLOBUS, G. Don (Burser.).
Afzelii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 366.—Afr. trop.
Barteri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
edulis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 89.—Afr. trop.
klaineana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 366 (= *Santiriopsis klaineana*).—Afr. trop.
Saphu, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 243 = edulis.

PACHYLOPHUS, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
montanus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 128 = O. caespitosa.

PACHYPODANTHIUM, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 55. *ANONACEAE.*
confine, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Unona confinis*).—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Uvaria Staudtii*).—Afr. trop.

PACHYPODIUM, Lindl. (Apocyn.).
Lamerei, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* v. 308. —Madag.

PACHYSTELA, Pierre = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).
cuneata, Radlk. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. I. 32.—Afr. trop.

PACHYSTOMA, Blume (Orchid.).
thomsonianum, Reichb. f. in Gard. Chron. 1879, II. 582 = Ancistrochilus thomsonianus.

PACOURIA, Aubl. = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).
crassifolia, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 663 = L. scandens.
florida, Hiern, l. c. 662 = L. florida.
owariensis, Hiern, l. c. 661 = L. owariensis.
parvifolia, Hiern, l. c. 663 = L. parvifolia.

PADIA, Zoll. & Mor. = **Oryza**, Linn. (Gramin.).
meyeriana, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 103 = O. granulata.

PAEDERIA, Linn. (Rubiac.).
cruddasiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 295.—Ind. or.
Grandidieri, *Drake, in Bull. Soc Linn. Par.* ii. 1305.—Madag.
Grevei, *Drake, l. c.*—Madag.
Pospischilii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 469.—Afr. trop.

PAEDEROTA, Linn. (Scrophul.).
axillaris, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 20 = Botryopleuron axillare.

PAEONIA, Tourn. (Ranunc.).
macrophylla, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 282.—Reg. Caucas.
Mlokosewitschi, *Lomak. l. c.*—Reg. Caucas.

PAEPALANTHUS, Mart. (Eriocaul.).
bulbifer, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 499.—Bras.
domingensis, *Ruhl. in Urb. Symb. Antill.* i. 485.—Ind. occ.
maracanus, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 500.—Bras.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 102.—Afr. trop.

PAGETIA, F. Muell. (Rutac.).
monostylis, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 7.—Austral.

PAHUDIA, Miq. (Legum.).
cochinchinensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 386 A.—Cochinch.
martabanica, *Prain, in Ind. Forest.* xxvi. 312.—Burma.

PALAQUIUM, Blanco = **Dichopsis**, Thw. (Sapot.).
leiocarpum, Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v. 24.—Borneo.

PALAUA, Cav. (Malvac.).
modesta, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 215 (= *Sida modesta*).—Chili.

PALIAVANA, Vell. (Gesner.).
racemosa, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 18. —Bras.

PALISOTA, Reichb. (Commelin.).
hirsuta, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 347.—Afr. trop.
Maclaudi, *Cornu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 30.—Afr. trop.
myriantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 345.—Afr. trop.
pedicellata, *K. Schum. l. c.* 346.—Afr. trop.
Staudtii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

PANAX, Linn. (Aral.).
Ayresii, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 63 (= *Polyscias Ayresii*).—Maurit.
bakeriana, *Drake, l. c.* 60.—Madag.
Balfouri, *Hort. ex Sand. Cat.* 1899, 24.—N. Caled.
Bernieri, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 60.—Maurit.
Chapelieri, *Drake, l. c.* 64.—Madag.
Commersoni, *Drake, l. c.* 63.—Maurit.
Cuphocarpus, *Drake, l. c.* 66 (= *Cuphocarpus inermis*). —Madag.
cupularis, *Drake, l. c.* 63 (= *Polyscias cupularis*).—Maurit.
cussonioides, *Drake, l. c.* 62.—Madag.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 305.—China.
dichroostachya, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 62 (= *Polyscias dichroostachya*).—Maurit.
flexuosa, Auct. in Just. Jahresb. xxv. II. 489, sphalm. = seq.
floccosa, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 62.—Madag.
fraxinifolia, *Drake, l. c.* 59 (= *Cussonia fraxinifolia*). —Madag.
Grevei, *Drake, l. c.* 66.—Madag.
Hildebrandti, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
lancifolia, *Drake, l. c.* 65.—Madag.
Lantzii, *Drake, l. c.*—Madag.
lokobensis, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
mastersiana, *Sander, ex Masters, in Gard. Chron.* 1898, I. 242.—Ins. Solomon.
neraudiana, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 62.—Maurit.
nossebiensis, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
Oligoscias, *Drake, l. c.* 64.—Madag.
paniculata, *Drake, l. c.* 62 (= *Polyscias paniculata*). —Maurit.
racemosa, *Drake, l. c.* 63.—Maurit.
tafondroensis, *Drake, l. c.* 64.—Madag.

PANCOVIA, Willd. = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).
harmsiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 302.—Afr. trop.
Hildebrandtii, Gilg, l. c. 304.—Afr. trop.
macrophylla, Gilg, l. c. 303.—Afr. trop.
pedicellaris, Radlk. & Gilg, ex Gilg, l. c. 302.—Afr. trop.

PANDA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1255. *PANDANACEAE.*
oleosa, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

PANDANUS, Rumph. (Pandan.).
amboinensis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 83.—Amboin.
Bakeri, *Warb. l. c.* 65.—Madag.
boninensis, *Warb. l. c.* 45.—Ins. Bonin.
borneensis, *Warb. l. c.* 78.—Borneo.
Bullii, *Warb. l. c.* 89.—N. Caled.
canaranus, *Warb. l. c.* 75.—Ind. or.
celebicus, *Warb. l. c.* 80.—Celebes.
Cominsii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2654.—Ins. Solomon.
Dammannii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 49.—Hab. ?
Delessertii, *Warb. l. c.* 55 (= *Eydouxia Delesserti*).—Bourbon.
ellipsoideus, *Warb. l. c.* 81.—Celebes.
flagellifer, *Warb. l. c.* 80.—Penins. Mal.
Forbesii, *Warb. l. c.* 78.—Sumatra.
Goetzei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxviii. 350.—Afr. trop.
Hahnii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 56. —Afr. trop. ?
Heddei, *Warb. l. c.* 46.—Afr. trop.
Hollrungii, *Warb. l. c.* 71.—N. Guin.
indicus, *Warb. l. c.* 56 (= *Roussinia indica*).—Hab. ?
Kaernbachii, *Warb. l. c.* 49.—N. Guin.
kamerunensis, *Warb. l. c.* 66.—Afr. trop.
Lauterbachii, *K. Schum. & Warb. ex Warb. l. c.* 81. —N. Guin.
Lindenii, *Warb. l. c.* 88.—Ins. Mascar.
mauritianus, *Warb. l. c.* 58 (= *Dorystigma mauritianum*).—Maurit.
micracanthus, *Warb. l. c.* 83.—Borneo.
parvus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 171. —Ind. or.
Petersii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 66.—Afr. trop.
platycarpus, *Warb. l. c.* 50.—Afr. trop.
pseudolais, *Warb. l. c.* 76.—Java.
Pynaertii, *Warb. l. c.* 88.—Hab. ?
radula, *Warb. l. c.* 76.—Sumatra.
Reineckei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 581.—Ins. Samoa.
Rumphii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 84 (non Gaudich.).—Amboin.
samoensis, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 580.—Ins. Samoa.
Sanderi, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1898, I. 243.—Hab. ?
Sarasinorum, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 78.—Celebes.
scopula, *Warb. l. c.* 76.—Ind. or.
setistyla, *Warb. l. c.* 81.—N. Guin.
spinifer, *Warb. l. c.* 57.—Madag.
Stuhlmannii, *Warb. l. c.*—Afr. trop.
terrestris, *Warb. l. c.* 84.—Amboin.
Teuszii, *Warb. l. c.* 67.—Afr. trop.
zeylanicus, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv. 339 = ceylanicus.

PANDIAKA, Benth. & Hook. f. (Amarant.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 895.—Afr. trop.
debilis, *Hiern, l. c.* 894 (= *Psilotrichum debile*).—Afr. trop.
ramulosa, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, l. c.* (= *Achyranthes Welwitschii*). —Afr. trop.

PANDOREA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
amboinensis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 600 = T. amboinensis.
dendrophila, Boerl. l. c. = T. dendrophila.
leptophylla, Boerl. l. c. = T. leptophylla.

PANICULARIA, Fabr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).
borealis, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 348.—Am. bor.
brachyphylla, Nash, l. c. 349.—Am. bor.
elata, Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 54.—Am. bor.
plicata, Druce, Fl. Berks. 582 = G. fluitans.

PANICUM, Linn. (Gramin.).
acutiglumum, Steud. Syn. Pl. Gram. 66 = P. Myurus.
Addisonii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 83.—Am. bor.
adpressum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. 193 = Digitaria sanguinalis.
aegyptiacum, Retz. Obs. iii. 8 = Digitaria sanguinalis.
aequatum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 98 = Isachne miliacea.
aequiglume, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 44 (non Hack. & Arechav.).—Ind. or.

PANICUM:—
affine, Poir. Encyc. Suppl. iv. 273 = setigerum.
africanum, Poir. l. c. 275 = Oplismenus africanus.
albomaculatum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 2.—Mexic.
albomarginatum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 40.—Am. bor.
ambiguum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 31 = Digitaria glabra.
Amlisa, Ham. ex Wall. Cat. n. 8882 C = Thysanolaena Agrostis.
ammophilum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = Tricholaena arenaria.
amphibium, Steud. l. c. 61 = muticum.
andongense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 167.—Afr. trop.
Andrewsi, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 192.—Ins. Christm.
angustatum, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 157.—Ind. or.
annulum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 58.—Am. bor.
Anthaenantia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Anthaenantia villosa.
appendiculatum, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 13 = Setaria appendiculata.
aquaticum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 373 = repens.
araneosum, Ind. Kew. ii. 410, errore. = Pennisetum araneosum.
arborescens, Linn. Sp. Pl. ed. I. 59, partim = ovalifolium.
arenarium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 52 = Digitaria glabra.
arenicolum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 56.—Am. bor.
argyrograptum, Nees, Fl. Afr. Austr. 27 = Digitaria argyrograpta.
argyrotrichum, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 548 = Digitaria tenuiflora.
Ashei, *G. Pearson, ex Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 35.—Am. bor.
asperum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 75 = Pennisetum compressum.
assamicum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 40.—Ind. or.
atlanticum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 346.—Am. bor.
Aulaxanthus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 361 (= *Anthaenantia rufa*).—Am. bor.
aurantiacum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8714 B = proliferum.
auritum, Hassk. Pl. Jav. Rar. 22 = P. Myurus.
badium, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 12.—Mexic.
balbisianum, Schult. Mant. ii. 254 = zizanioides.
Baldwinii, *Nutt. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 43.—Am. bor.
barbatum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria barbata.
barbipulvinatum, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 21.—Am. bor.
Baumannii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 331.—Afr. trop.
Beccabunga, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 179.—Afr. trop.
bengalense, Spreng. Syst. i. 311 = Arundinella Wallichii.
Benjamini, Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = Isachne miliacea.
Bicknellii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 193.—Am. bor.
bicorne, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
bifarium, *Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 76.—Bras.
biforme, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
biglandulare, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 13.—Mexic.
blephariphyllum, Trim. in Journ. Bot. 1885, 272 = Arundinella blephariphylla.
bongaense, *Pilger, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 268, nomen.—Afr. trop.
Braunii, Steud. Syn. Pl. Gram. 93 = Tricholaena rosea.
brevispicatum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 168.—Afr. trop.
Brittoni, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 194.—Am. bor.
brunonianum, Griff. Notul. iii. 29 = Chamaeraphis spinescens.
Burgu, *Cheval. in Compt. Rend. Assoc. Fr.* xxx. I. 176; II. 649.—Afr. trop.
Bushii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 568.—Am. bor.
calliphyllum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 31.—Am. bor.

PANICUM:—
capense, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 457 = Tricholaena capensis.
catumbense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 175.—Afr. trop.
caudatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 19 = Sporobolus indicus.
caudiculatum, *Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 76.—Bras.
Ceresia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 360 = Paspalum membranaceum.
Chintaman, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8712 D = psilopodium.
Chlorochloe, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 333.—Afr. trop.
chrysanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 50 = Setaria aurea.
ciliare, Retz. Obs. iv. 16 = Digitaria sanguinalis.
ciliiferum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 195.—Am. bor.
ciliosum, *Nash, l. c.* 1899, 568.—Am. bor.
cimicinum, Retz. Obs. iii. 9 = Axonopus cimicinus.
cirrhosum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxi. 40 (= *Setaria cirrosa*).—Mexic.
Clutei, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 569.—Am. bor.
Codaea, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8641 A = Setaria glauca.
columbianum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 78.—Am. bor.
columbiense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 360.—N. Granat.
Combsii, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 42.—Am. bor.
commelinaefolium, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 29 (non aliorum).—Am. bor.
commonsianum, *Ashe, l. c.* 55.—Am. bor.
commutatum, Nees, in Linnaea, vii. 274 = Digitaria sanguinalis.
corymbiferum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 76 = deustum.
Crus-pavonis, *Nees, Agrost. Bras.* 259.—Afr.; Am. trop.
curtifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 569.—Am. bor.
cuspidatum, Roxb. Fl. Ind. i. 298 = colonum.
Cuthbertii, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 48.—Am. bor.
debile, Desf. Fl. Atlant. i. 59 = Digitaria debilis.
decoloratum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 570.—Am. bor.
deflexum, Guss. in Ten. Fl. Nap. v. 320 = Ehrharta erecta.
densepilosum, Steud. Syn. Pl. Gram. 72 = miliaceum.
diagonale, Nees, Fl. Afr. Austr. 23 = Digitaria diagonalis.
didactylum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
difforme, Roth, Nov. Pl. Sp. 52 = trigonum.
dispar, Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = Isachne dispar.
diversinerve, Nees, Fl. Afr. Austr. 23 = Digitaria diversinervis.
Earlei, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 571.—Am. bor.
Eatoni, *Nash, l. c.* 1898, 84.—Am. bor.
elegans, Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 256 = Sphaerocaryum elegans.
elegantissimum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 52.—Ind. or.
elephantipes, Nees, Agrost. Bras. 165 = proliferum.
Elytroblepharum, Steud. in Zoll. Syst. Verz. Pfl. Ind. Archip. ii. 54 = Digitaria barbata.
elytrochaetum, *Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 77.—Bras.
epilifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 571.—Am. bor.
equilaterale, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 42.—Am. bor.
equinum, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 67 = muticum.
erectifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 148.—Am. bor.
eriogonum, Schrad. Pl. Hort. Gotting. fasc. I; ex Schult. Mant. ii. 253 = Digitaria sanguinalis.
excurrens, Nees, Fl. Afr. Austr. 48 = Setaria sulcata.
fenestratum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 361 = Digitaria horizontalis.
festuciforme, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 332 = Centotheca lappacea.
filiculme, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 59 (non Hack.).—Am. bor.

PANICUM:—
filiforme, Jacq. Obs. iii. 18 = Digitaria sanguinalis.
fistulosum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 71 = proliferum.
flaccidum, Koen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 29 = flavidum.
flavovirens, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 572.—Am. bor.
floribundum, Willd. ex Spreng. Syst. i. 306 = Setaria verticillata.
floridum, Royle, Ill. Bot. Himal. 420 = flavidum.
forbesianum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 98 = Setaria forbesiana.
Frederici, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 180.—Afr. trop.
frumentaceum, Roxb. Fl. Ind. i. 304 = P. Crus-galli.
Galli, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = stagninum.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 359 = Isachne Gardneri.
georgianum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 36.—Am. bor.
giganteum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 360.—Bolivia.
glabrifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 196.—Am. bor.
glabrissimum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 62.—Am. bor.
globulare, Steud. Nom. ed. II. ii. 257 = Setaria italica.
gonyrrhizum, Steud. Syn. Pl. Gram. 44 = Oplismenus undulatifolius.
gracilicaule, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 179.—Afr. trop.
graciliflorum, *Rendle, l. c.* 181.—Afr. trop.
gracillimum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 331 (non Scribn.).—Afr. trop.
gracillimum, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 146.—Am. bor.
granulare, Boj. Hort. Maurit. 364 = punctatum.
Griffithii, Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 15 = Digitaria sanguinalis.
grossarium, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 205 = ramosum.
grossarium, Roxb. Fl. Ind. i. 297 = villosum.
gyrans, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 113.—Am. bor.
haemacarpon, *Ashe, l. c.* 55.—Am. bor.
hagenbeckianum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 361.—Am. austr.
Hamiltonii, Kunth, Enum. Pl. i. 84 = Digitaria horizontalis.
Hasskarlii, Steud. ex Zoll. Syst. Verz. Pfl. Ind. Archip. ii. 54 = P. Myurus.
Helleri, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 572.—Am. bor.
Helopus, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 84.—Geront. trop.
Hensii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 332.—Afr. trop.
hermaphroditum, Steud. Syn. Pl. Gram. 67 = pilipes.
heteranthum, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 174 = Digitaria barbata.
hirsutulum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 176.—Afr. trop.
hirtellum, Linn. Amoen. Acad. v. 391 = Oplismenus africanus.
hochstetterianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 369 = P. Helopus.
holcoides, Roxb. Fl. Ind. i. 285 = Pennisetum setosum.
holosericeum, Nees, Fl. Afr. Austr. 30 = serratum.
Holubii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 394.—Afr. trop. et austr.
homogynum, Duthie, Grass. N. W. Ind. 4, sphalm. = homonymum.
hordeoides, Lam. Illustr. i. 170 = Pennisetum parviflorum.
horizontale, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 54 = Digitaria horizontalis.
Huachucae, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 51.—Am. bor.
huillense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 174.—Afr. trop.
humboldtianum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Paspalum humboldtianum.
humidicolum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 169.—Afr. trop.
imberbe, Poir. Encyc. Suppl. iv. 272 = Setaria imberbis.
implicatum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 43.—Am. bor.
inaequivalve, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Paspalum inaequivalve.
inflatum, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xvi. fide *Scribn. l. c.* xix. 1.—Mexic.

PANICUM:—
insigne, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = Tricholaena rosea.
insulicola, Steud. l. c. 78 = auritum.
Ischaemum, Schreb. ex Schweigg. Spec. Fl. Erlang. 16 = Digitaria glabra.
javanum, Nees, ex Buese, in Miq. Pl. Jungh. 376 = auritum.
Jurgensenii, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxi. 40 (= *Setaria Jurgensenii*).—Mexic.
kafuroense, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 334.—Afr. trop.
khasianum, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 54.—Ind. or.
kunthianum, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = Isachne kunthiana.
Kurzii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 38.—Ind. or.
Lagascae, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = Paspalum quadrifarium.
Leibergii, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 6.—Am. bor.
leiogonum, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 51 = repens.
leiogonum, Sieber, ex Link, Hort. Berol. i. 206 = muticum.
leptochloa, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 62 = Arundinella leptochloa.
leucothrix, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 41.—Am. bor.
lindenbergianum, Nees, Fl. Afr. Austr. 47 = Setaria lindenbergiana.
Lindheimeri, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 196.—Am. bor.
lineare, Burm. f. Fl. Ind. 25, t. 10, f. 2 = Cynodon Dactylon.
lineare, Krock. Fl. Siles. i. 95 = Digitaria glabra.
linearifolium, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 42.—Am. bor.
linkianum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
litorale, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = Paspalum distichum.
loliaceum, Lam. Encyc. iv. 733, errore 743 = Oplismenus africanus.
longiflorum, J. F. Gmel. Syst. 158 = Digitaria tenuiflora.
longiligulatum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 574.—Am. bor.
longipes, Wight & Arn. in Wight Cat. n. 1638 = maximum.
lucidum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 47.—Am. bor.
lutetense, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 332.—Afr. trop.
macroblepharum, *Hack. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 7.—Afr. trop.
maculatum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 44 (non aliorum).—Am. bor.
malaccense, Trin. Gram. Panic. 204 = Sphaerocaryum elegans.
malacon, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 197.—Am. bor.
malacophyllum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = Paspalum malacophyllum.
malacophyllum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 198.—Am. bor.
manatense, *Nash, l. c.* 42.—Am. bor.
mangaloricum, Steud. Syn. Pl. Gram. 78 = P. Myurus.
Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 644.—Japon.
mattamusketense, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 45.—Am. bor.
mattogrossense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 362.—Bras.
mauritianum, Willd. ex Spreng. Syst. i. 305 = flavescens.
megalanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 93 = Tricholaena Wightii.
megaphyllum, Steud. l. c. 53 = Setaria sulcata.
melanotylum, Hack. in Engl. Jahrb. xi. 398 = nigropedatum.
meneritana, Spreng. Syst. i. 321 = Isachne miliacea.
meridionale, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 59.—Am. bor.
mexicanum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxi. 40 (= *Setaria effusa*).—Mexic.
meyerianum, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 32 = muticum.
microphyllum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 61.—Am. bor.
minimum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = Paspalum minimum.
minimum, Wall. Cat. n. 8641 B = Setaria glauca.

PANICUM:—
minus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 410 (non Nash).—Afr. austr.
monodactylum, Nees, Fl. Afr. Austr. 21 = Digitaria monodactyla.
mucronatum, Roth, Nov. Pl. Sp. 45 = punctatum.
multibrachiatum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 74 = Paspalum Perrottetii.
multinode, Lam. Encyc. iv. 747 = repens.
multirameum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 2.—Mexic.
Myurus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 98.—As. trop.; Austral.; Amer.
nashianum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 79.—Am. bor. et austr.
natans, Koen. ex Trin. Gram. Panic. 237 = proliferum.
nemopanthum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 42—Am. bor.
nepalense, Steud. Syn. Pl. Gram. 49 = Setaria sulcata.
nigrirostre, Nees, Fl. Afr. Austr. 55 = Setaria nigrirostris.
notabile, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 32.—Ind. or.
numidianum, Hook. Niger Fl. 560 = zizanioides.
numidianum, Lam. Encyc. iv. 739, errore 749 = muticum.
nyanzense, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 333.—Afr. trop.
obliquum, Roth, Nov. Pl. Sp. 51 = patens.
obumbratum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 401.—Afr. austr.
octonodum, *J. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 73.—Am. bor.
orangensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 113.—Am. bor.
oryzoides, Sw. Prodr. 23 = zizanioides.
pabulare, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xix. 190 = Digitaria sanguinalis.
paludosum, Roxb. Fl. Ind. i. 307 = proliferum.
paniculatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = Paspalum paniculatum.
pansum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 177.—Afr. trop.
paractaenoides, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. II. 219 = flavescens.
paraguayense, Steud. ex Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. II. 189 = muticum.
parvispiculum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 347.—Am. bor.
parvulum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. II. 205 = Digitaria tenuiflora.
patentifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 574.—Am. bor.
paucipilum, *Nash, l. c.* 573.—Am. bor.
pencanum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 713.—Chili.
perlaxum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 400.—Afr. austr.
perlongum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 575.—Am. bor.
pernervosum, *Nash, l. c.* 576.—Am. bor.
Perrottetii, Kunth, Rév. Gram. ii. 395 = Paspalum Perrottetii.
pictigluma, Steud. Syn. Pl. Gram. 73 = muticum.
pictum, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 204 = colonum.
pictum, Nees, Fl. Afr. Austr. 59 = stagninum.
piluliferum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 94 = Isachne rigida.
platense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = Paspalum dilatatum.
platycaulon, Kuntze, l. c. = Paspalum platycaulon.
plicatile, Hochst. in Flora, 1855, 198 = Setaria sulcata.
plicatulum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = Paspalum undulatum.
plumosum, Presl, Fl. Sic. p. xliii = Tricholaena Teneriffae.
poaeforme, Boj. Hort. Maurit. 365 = Stenotaphrum glabrum.
polycaulon, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 200.—Am. bor.
polystachyum, Schult. Mant. ii. 146 = Pennisetum setosum.
porranthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 42 = Digitaria horizontalis.
propinquum, R. Br. Prod. 193 = Digitaria tenuiflora.
pruriens, Trin. Gram. Panic. 77 = Digitaria sanguinalis.
psammophilum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 576 (non Welw.).—Am. bor.
psammophilum, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 171.—Afr. trop.

PANICUM:—
pseudanceps, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 85.—Am. bor.
pseudopubescens, *Nash, l. c.* 1899, 577.—Am. bor.
pseudoryzoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 75 = zizanioides.
puberulum, Kunth, Rév. Gram. i. 32 = Digitaria puberula.
pubifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 577.—Am. bor.
pubivaginatum, K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 102 = deustum.
pulchellum, Spreng. Syst. i. 322 = Sphaerocaryum elegans.
punctulatum, Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 62 = muticum.
purpurascens, Opiz, in Flora, v. (1822) 266 = muticum.
pyriforme, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 579.—Am. bor.
racemiferum, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 171 = Setaria sulcata.
radicans, Retz. Obs. iv. 18 = patens.
radicosum, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 297 = Digitaria sanguinalis.
reimarioides, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 547 = Digitaria debilis.
repens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 360 = proliferum.
respiciens, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 52 = Setaria verticillata.
Ridleyi, Hack. ex Ridley, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. 400 = zizanioides.
Rivae, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 62.—Afr. trop.
roanokense, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 44.—Am. bor.
roseum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = Tricholaena rosea.
Rottleri, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
roxburghianum, Schult. Mant. ii. 245 = repens.
Ruspolii, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 64.—Afr. trop.
saccharoides, Trin. Gram. Panic. 245 = Tricholaena Teneriffae.
Sama, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8692 F = flavidum.
sanguinale, Burm. f. Fl. Ind. t. 10, f. 1 (non descr.) = ambiguum.
sanguinale, Linn. Sp. Pl. 57 = Digitaria sanguinalis.
sanguinale, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 57 = Digitaria glabra.
scabrum, Lam. Illustr. i. 171 = stagninum.
Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 358 = Paspalum Schaffneri.
Schlechteri, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 24.—Afr. austr.
scoparioide, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 53.—Am. bor.
segetale, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 32 = P. Crus-galli.
semialatum, R. Br. Prod. 192 = Axonopus semialatus.
sempervirens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 364.—Bolivia.
serratulum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8699 = P. Myurus.
seslerioides, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 174.—Afr. trop.
Sorghi, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 51 = maximum.
sphacelatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = Tricholaena rosea.
stagninum, *Koen. in Naturf.* xxiii. 201.—Ind. or.; Afr. trop. et austr.
stenothyrsum, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 710.—Ecuador.
strictifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 579.—Am. bor.
strictum, Roxb. Fl. Ind. i. 303 = Arundinella Wallichii.
subrepandum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 178.—Afr. trop.
suffultum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 364 = Paspalum scoparium.
sumatrense, Roth, Nov. Pl. Sp. 50 = miliare.
tennesseense, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xv. 52.—Am. bor.
tenuiflorum, R. Br. Prod. 193 = Digitaria tenuiflora.
ternatum, Hochst. in Flora, 1841, I. Intell. 19 = Digitaria ternata.
tjicoyaense, Steud. Syn. Pl. Gram. 70 = sarmentosum.
tonsum, Steud. l. c. 92 = Tricholaena rosea.
trichoglume, K. Schum. in Engl. Glied. Veg. Usamb. 38 = maximum.
trichopus, *Hochst. in Flora*, 1844, 254.—Afr. trop. et austr.

PANICUM :—
tridactylum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 712.—Chili.
trifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 580.—Am. bor.
tsugetorum, *Nash, l. c.* 1898, 86.—Am. bor.
tulcumbense, *Turner, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 56.—Austral.
typhurum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 414.—Afr. trop. et austr.
umbrosum, Retz. Obs. iv. 16 = ramosum.
unguiculatum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. II. 275 = deustum.
uniglume, Hochst. in Flora, 1841, I. Intell. 19 = Digitaria diagonalis.
unispicatum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 14.—Mexic.
utowanaeum, *Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 25.—Ind. occ.
velutinum, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 51 = Oplismenus africanus.
viaticum, Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 145, f. 2 = Axonopus semialatus.
villosissimum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 149.—Am. bor.
viscidellum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 2.—Mexic.
wallichianum, Wight & Arn. in Wight Cat. n. 1607 = Paspalum Perrottetii.
webberianum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 149.—Am. bor.
wrightianum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 44.—Ind. occ.
Zenkeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 330.—Afr. trop.
Zeyheri, Nees, Fl. Afr. Austr. 25 = Digitaria horizontalis.
zeylanicum, Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 76 = Arundinella leptochloa.
zizanioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 100.—Afr. austr.

PANOPSIS, Salisb. (Proteac.).
Sprucei, *Meissn. ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 116.—Bolivia.

PANTLINGIA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxv. (1896) 107. *ORCHIDEAE.*
paradoxa, *Prain, l. c.*—Reg. Himal.

PAPAVER, Tourn. (Papaverac.).
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 247.—Am. bor.

PAPAYA, Tourn. = **Carica**, Linn. (Passifl.).
tunariensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 102.—Bolivia.

PAPHIOPEDILUM, Pfitzer (Orchid.).
glaucophyll m, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 1.—Java.
longifolium, Pfitzer, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 98 = Selenipedium longifolium.

PAPPEA, Eckl. & Zeyh. (Sapind.).
Radlkoferi, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 338.—Afr. trop.

PAPPOPHORUM, Schreb. (Gramin.).
abyssinicum, Hochst. in Flora, 1855, 202 = Enneapogon mollis.
Aucheri, *Jaub. & Spach, Illustr.* iv. 32.—As. austr.
brachystachium, Jaub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. 365; Illustr. iv. 34 = Enneapogon brachystachyus.
bulbosum, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 254 = Enneapogon brachystachyus.
cenchroides, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 616 = Enneapogon mollis.
figarianum, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 254 = Enneapogon brachystachyus.
Foxii, *Post, Fl. Syria*, 873.—Syria.
nanum, Steud. Syn. Pl. Gram. 200 = Enneapogon brachystachyus.
pappiferum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 365 = alopecuroideum.
persicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 200 = Aucheri.
phleoides, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 73 = Enneapogon brachystachyus.
robustum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 302 = Enneapogon mollis.

PAPPOPHORUM :—
scabrum, Kunth, Enum. Pl. i. 255 = Enneapogon scaber.
senegalense, Steud. Syn. Pl. Gram. 199 = Enneapogon brachystachyus.
turcomanicum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. 27 = Aucheri.
vincentianum, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 144 = Enneapogon brachystachyus.

PAPPOSTYLES, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1268. *STYRACACEAE.*
neuropetalum, *Pierre, l. c.* 1269.—Afr. trop.

PAPPOSTYLUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1268 = praec.

PARAGONIA, Bur. = **Bignonia**, Linn. (Bignoniac.).
schumanniana, Loesen. in Engl. Jahrb. xxiii. 130.—Am. cent.

PARAGOPHYTON, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 454. *RUBIACEAE.*
spermacocinum, *K. Schum. l. c.* 455.—Afr. trop.

PARAMERIA, Benth. (Apocyn.).
angustior, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 399.—Malaya.
Pierrei, *Seeligm. Caoutch. et Gutta*, 22, nomen.—Cochinch.

PARANEPHELIUM, Miq. (Sapind.).
macrophyllum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 450.—Penins. Mal.
nitidum, *King, l. c.*—Penins. Mal.

PARARTOCARPUS, Baill. (Urtic.).
involucrata, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 267 (= *Artocarpus involucrata*).—N. Guin.

PARASIA, Rafin. = **Belmontia**, E. Mey. (Gentian.).
debilis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 708 = B. debilis.
gracilis, Hiern, l. c. = B. gracilis.
grandis, Hiern, l. c. 707 = B. grandis.
platyptera, Hiern, l. c. 706 = B. platyptera.
primuliflora, Hiern, l. c. 707 = B. primulaeflora.

PARASYSTASIA, Baill. (Acanth.).
Kelleri, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 321.—Afr. trop.

PARAVALLARIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 30. *APOCYNACEAE.*

PARINARIUM, Aubl. (Rosac.).
congoense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 377 (non Didr.).—Afr. trop.
elatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 280.—Penins. Mal.
Elliottii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 377.—Afr. trop.
floribundum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
heteropetalum, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 283.—Penins. Mal.
Kunstleri, *King, l. c.* 282.—Penins. Mal.
Maingayi, *King, l. c.* 280.—Penins. Mal.
Poggei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 378.—Afr. trop.
spicatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 279.—Penins. Mal.
Whytei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 378.—Afr. trop.

PARIS, Rupp. (Liliac.).
bockiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 253.—China.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 190.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 252.—China.

PARKIA, R. Br. (Legum.).
dongnaiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 393A.—Cochinch.
Hildebrandtii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 261.—Afr. trop.

PARNASSIA, Tourn. (Saxifr.).
amoena, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 370.—China.
chinensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 252.—China.
cirrata, *Piper, in Erythea*, vii. 128.—Am. bor.
crassifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 253.—China.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 267.—China.
lutea, *Batal. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 320.—China.
monochorifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 260.—China.
perciliata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 369.—China.

PARNASSIA :—
setchuenensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 254.—China.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 266.—China.

PARONYCHIA, Tourn. (Illecebr.).
chlorothyrsa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 48.—Afr. bor.
chorizanthoides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 336.—Am. bor.
diffusa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 237.—Am. bor.
scoparia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 335.—Am. bor.

PAROPSIA, Noronha (Passifl.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 191.—Afr. trop.

PAROSELA, Cav. = **Dalea**, Linn. (Legum.).
amoena, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 17 = D. amoena.
arborescens, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = D. arborescens.
argyraea, A. A. Heller, l. c. = D. argyraea.
arizonica, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 14 = D. Lumholtzii.
calycosa, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = D. calycosa.
elatior, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 15 = D. rubescens.
Emoryi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 6 = D. Emoryi.
filiformis, A. A. Heller, l. c. = D. filiformis.
Fremontii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 16 = D. Fremontii.
Grayi, Vail, l. c. 14 = D. laevigata, *A. Gr.*
Greggii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 6 = D. Greggii.
Jamesii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 16 = D. Jamesii.
Johnsoni, Vail, l. c. 17 = D. Johnsoni.
Kingii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 6 = D. Kingii.
lachnostachys, A. A. Heller, l. c. = D. lachnostachys.
lasiathera, A. A. Heller. l. c. = D. lasiathera.
Lemmoni, A. A. Heller, l. c. = D. Lemmoni.
Lumholtzii, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 117 = D. Lumholtzii.
mollis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 6 = D. mollis.
neomexicana, A. A. Heller, l. c.—Am. bor.
Ordiae, A. A. Heller, l. c. = D. Ordiae.
Parryi, A. A. Heller, l. c. = D. Parryi.
polydenia, A. A. Heller, l. c. = D. polydenia.
polygonoides, A. A. Heller, l. c. = D. polygonoides.
Pringlei, A. A. Heller, l. c. = D. Pringlei.
pulchella, A. A. Heller, l. c. = D. pulchella, *Moric.*
ramosissima, A. A. Heller, l. c. = D. ramosissima.
scariosa, A. A. Heller, l. c. = D. scariosa.
Schottii, A. A. Heller, l. c. = D. Schottii.
scoparia, A. A. Heller, l. c. 7 = D. scoparia.
spinosa, A. A. Heller, l. c. = Asagraea spinosa.
Thompsonae, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 18.—Am. bor.
thyrsiflora, Vail, l. c. 14 = D. thyrsiflora.
Wheeleri, Vail, l. c. 17.—Am. bor.
Wrightii, Vail, l. c. 16 = D. Wrightii.

PARRYA, R. Br. (Crucif.).
ramosissima, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 343.—As. cent.

PARRYELLA, Torr. & Gray (Legum.).
rotundata, *Woot. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 457.—Am. bor.

PARSONSIA, P. Br. = **Cuphea**, P. Br. (Lythrac.).
Chapmani, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = C. aspera.
glutinosa, A. A. Heller, l. c. = C. glutinosa.
pinto, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 862 = C. Balsamona.
procumbens, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = C. procumbens, *Cav.*

PARSONSIA, R. Br. (Apocyn.).
burnensis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 397 (= *Heligme buruensis*).—Java.

PARSONSIA:—
korthalsiana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 397 (= *Heligme korthalsiana*).—Malaya.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 531 (= *Heligme Minahassae*).—Celebes.
nesophila, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.
Paddisoni, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 385.—Austral.

PARTHENIUM, Linn. (Compos.).
auriculatum, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 521.—Am. bor.

PARTHENOCISSUS, Planch. = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).
Engelmannii, Koehne & Graebn. ex Graebn. in Gartenfl. 1900, 285.—Am. bor.
Graebneri, Graebn. l. c. 275.—Hab.?
henryana, Graebn. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 464 = V. henryana.
hirsuta, Graebn. in Gartenfl. 1900, 274 = V. hederacea.
radicantissima, Koehne & Graebn. ex Graebn. l. c. 286 = V. hederacea?
Saint-Paulii, Koehne & Graebn. ex Graebn. l. c. 283.—Hort.
sinensis, Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 463.—China.
Spaethii, Koehne & Graebn. ex Graebn. in Gartenfl. 1900, 274.—Hort.

PASCHANTHUS, Burch. = **Modecca**, Lam. (Passifl.).
Jaeggii, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20, 23 = M. Paschanthus.

PASINA, Adans. = **Horminum**, Tourn. (Labiat.).
pyrenaea, Bub. Fl. Pyren. i. 396 = H. pyrenaicum.

PASPALUM, Linn. (Gramin.).
aegyptiacum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 314 = Digitaria sanguinalis.
ambiguum, DC. Fl. Fr. iii. 16 = Digitaria glabra.
annulatum, Fluegge, Gram. Monog. 133 = Eriochloa polystachya.
bicorne, Lam. Illustr. i. 176 = Digitaria sanguinalis.
bifarium, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 178 = Digitaria tenuiflora.
bifidum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 192 (= *Panicum floridanum*).—Am. bor.
blepharophorum, Roem. & Schult. Syst. ii. 292 = Digitaria sanguinalis.
brevifolium, Fluegge, Gram. Monog. 150 = Digitaria tenuiflora.
Chapmani, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 290.—Am. bor.
chinense, Nees, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 231 = Digitaria tenuiflora.
consanguineum, Kunth, Enum. Pl. i. 46 = Digitaria sanguinalis.
contractum, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 709.—N. Granat.
corymbosum, Kunth, Rév. Gram. i. 25; Enum. Pl. i. 48 = Digitaria sanguinalis.
debile, Poir. Encyc. v. 34 = Digitaria debilis.
Digitaria, Poir. Encyc. Suppl. iv. 316 = distichum.
distans, Nees, ex Trin. Gram. Panic. 83 = Digitaria sanguinalis.
Eggertii, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 434.—Am. bor.
erianthoides, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 6.—Parag.
filiculme, Nees, ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 358 = Digitaria tenuiflora.
filiforme, Steud. Nom. ed. I. 592 = Digitaria sanguinalis.
geminum, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 434.—Am. bor.
glabratum, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 21.—Am. bor.
granulare, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 47, partim = Digitaria tenuiflora.
heteranthum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 16 = Digitaria barbata.
inaequale, Link, Enum. Hort. Berol. i. 103 = Digitaria sanguinalis.
lehmannianum, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 709.—N. Granat.
longicilium, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 435.—Am. bor.

PASPALUM:—
longiflorum, Retz. Obs. iv. 15 = Digitaria tenuiflora.
longipilum, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 435.—Am. bor.
minutiflorum, Steud. Syn. Pl. Gram. 17 = Digitaria tenuiflora.
mollicomum, Kunth, Enum. Pl. i. 47 = Panicum muticum.
nematodes, Schult. Mant. ii. 171 = Digitaria tenuiflora.
oxyanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 27 = Digitaria sanguinalis.
pennatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 16.—Ind. or.
Perrottetii, *Hook. f. l. c.* 20.—Ind. or.
Polo, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 234.—Austral.
porrigens, Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 12 = compactum.
praecox, Walt. Fl. Carol. 75 = Cynodon Dactylon.
propinquum, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 291.—Am. bor.
prostratum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 9.—Mexic.
Pseudo-Durva, Nees, Fl. Afr. Austr. 21 = Digitaria tenuiflora.
reimarioides, Brongn. Bot. Voy. Coquille, 140, t. 20 = Digitaria sanguinalis.
rigidifolium, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 292.—Am. bor.
Rosei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 9.—Mexic.
royleanum, Nees, ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 358 = Digitaria puberula.
sanguinale, Lam. Illustr. i. 176 = Digitaria sanguinalis.
scabrum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 36.—Am. cent.
Schaffneri, *Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 24 (non Griseb.).—Am. cent.
Simpsoni, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 39.—Am. bor.
ternatum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 17 = Digitaria ternata.
trachyanthum, Nees, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 19 = Digitaria puberula.
Trianae, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxvii. 18.—N. Granat.
umbellatum, Lam. Illustr. i. 177 = Cynodon Dactylon.
vaseyanum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 32.—Am. bor.
villosissimum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 40.—Am. bor.

PASSERINA, Linn. (Thymel.).
Sanamunda, Bub. Fl. Pyren. i. 135 = Thymelaea Sanamunda.

PASSIFLORA, Linn. (Passifl.).
australis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 75.—Parag.
Bigelovii, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 283.—Am. bor.
campestris, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 25.—Bras.
chrysophylla, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 75.—Parag.
colimensis, *Mast. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 181.—Mexic.
curumbaensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 27.—Bras.
europhylla, *Mast. in Gard. Chron.* 1900, II. 350.—Guiana.
franchetiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2623.—China.
fuchsiiflora, *Hemsl. l. c.* t. 2553.—Guiana.
galbana, *Mast. in Gard. Chron.* 1896, II. 555.—Bras.
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 74.—Parag.
Henryi, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2623.—China.
Imthurnii, *Mast. in Gard. Chron.* 1898, I. 305.—Guiana.
montana, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 256 = ovalis.
Nelsoni, *Mast. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 142.—Mexic.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 74.—Parag.
parahybensis, *Barb. Rodr. Pl. Nov. Rio*, v. 1.—Bras.
pediculata, *Mast. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 247.—Am. cent.
Pittieri, *Mast. l. c.* 246.—Am. cent.
pruinosa, *Mast. in Gard. Chron.* 1897, II. 393.—Guiana.
Tulae, *Urb. Symb. Antill.* i. 374.—Ind. occ.
urnaefolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 42.—Bolivia.
venosa, *Rusby, l. c.*—Bolivia.

PASTINACA, Linn. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 393 = Peuced. sativum.

PATAGONIUM, Schrank = **Adesmia**, DC. (Legum.).
adenophorum, Reiche, Fl. Chile, ii. 176 = A. adenophora.
bijugum, Reiche, l. c. 168 = A. bijuga.
calopogon, Reiche, l. c. 123 = A. calopogon.
calycosum, Reiche, l. c. 162 = A. calycosa.
cespitosum, Reiche, l. c. 117 = A. caespitosa.
colinense, Reiche, l. c. 139 = A. colinensis.
compactum, Reiche, l. c. 170 = A. compacta.
concinnum, Reiche, l. c. 159 = A. concinna.
confertum, Reiche, l. c. 165 = A. conferta.
crassicaule, Reiche, l. c. 118 = A. crassicaulis.
darapskyanum, Reiche, l. c. 142 = A. darapskyana.
Dessaueri, Reiche, l. c. 130 = A. Dessaueri.
dispermum, Reiche, l. c. 165 = A. disperma.
divaricatum, Reiche, l. c. 129 = A. divaricata.
dumosum, Reiche, l. c. 121 = A. dumosa.
Godoyae, Reiche, l. c. 161 = A. Godoyae.
grandidentatum, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 24.—Bolivia.
intricatum, Reiche, Fl. Chile, ii. 124 = A. intricatum.
Izquierdi, Reiche, l. c. 164 = A. Izquierdi.
latistipula, Reiche, l. c. 157 = A. latistipula.
leucopogon, Reiche, l. c. 121 = A. leucopogon.
maulinum, Reiche, l. c. 145 = A. maulina.
Medinae, Reiche, l. c. 144 = A. Medinae.
melanocaulon, Reiche, l. c. 130 = A. melanocaulos.
melanthes, Reiche, l. c. 120 = A. melanthes.
microcalyx, Reiche, l. c. 148 = A. microcalyx.
Morenonis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 70 = A. Morenonis.
Palenae, Reiche, Fl. Chile, ii. 148 = A. Palenae.
parviflorum, Reiche, l. c. 173 = A. parviflora.
pentaphyllum, Reiche, l. c. 129 = A. pentaphylla.
Peraltae, Reiche, l. c. 132 = A. Peraltae.
polyphyllum, Reiche, l. c. 118 = A. polyphylla.
pusillum, Reiche, l. c. 173 = A. pusilla.
Rahmeri, Reiche, l. c. 174 = A. Rahmeri.
renjifoanum, Reiche, l. c. 124 = A. renjifoana.
resinosum, Reiche, l. c. 166 = A. resinosa.
senticula, Reiche, l. c. 126 = A. senticula.
sentis, Reiche, l. c. 125 = A. sentis.
subumbellatum, Reiche, l. c. 118 = A. subumbellata.
tenuicaule, Reiche, l. c. 164 = A. tenuicaulis.
torcaeum, Reiche, l. c. 176 = A. torcaea.
Vallis-pulchrae, Reiche, l. c. 174 = A. Vallis-pulchrae.
venosum, Reiche, l. c. 166 = A. venosa.
Villanuevae, Reiche, l. c. 127 = A. Villanuevae.
villosum, Reiche, l. c. 146 = A. villosa.
virens, Reiche, l. c. 127 = A. virens.

PATASCOYA, Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiv. (1896) 282. *TERNSTROEMIACEAE.*
Stuebelii, Urb. l. c. 283 (= *Taonabo Stuebelii*).—N. Granat.

PATTARA, Adans. = **Embelia**, Burm. f. (Myrsin.).
pellucida, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 639.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 638.—Afr. trop.

PAULLINIA, Linn. (Sapind.).
dasystachya, *Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 337.—Am. austr.

PAULOWILHELMIA, Hochst. (Acanth.).
nobilis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 53.—Afr. trop.

PAULOWNIA, Sieb. & Zucc. (Scrophul.).
Fargesii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1896, 280.—China.

PAURIDIANTHA, Hook. f. (Rubiac.).
multiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 60.—Afr. trop.

PAVETTA, Linn. (Rubiac.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 488.—Afr. trop.
angolensis, *Hiern, l. c.* 485.—Afr. trop.
brachycoryne, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 81.—Afr. trop.
Buchneri, *K. Schum. l. c.* 82.—Afr. trop.
catophylla, *K. Schum. l. c.* 80.—Afr. trop.
comorensis, Vatke, ex K. Schum. l. c. xxiii. 453 = Cremaspora comorensis.
flammea, *K. Schum. l. c.* xxviii. 83.—Afr. trop.
macrostemon, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
melanophylla, *K. Schum. l. c.* 85.—Afr. trop.

PAVETTA:—
microlancea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 80.—Afr. austr.
microthamnus, *K. Schum. l. c.* 84.—Afr. trop.
nitidula, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 486.—Afr. trop.
Phillipsiae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 369.—Afr. trop.
platyclada, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 570.—N. Guin.
radicans, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 487.—Afr. trop.
rotundifolia, Boivin, ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1307 = Ixora rotundifolia.
sansibarica, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 79.—Afr. trop.
silvae, *K. Schum. l. c.* 81.—Afr. trop.
sphaerobotrys, *K. Schum. l. c.* 494.—Afr. trop.
suffruticosa, *K. Schum. l. c.* 84.—Afr. trop.
zombana, *K. Schum. l. c.* 85.—Afr. trop.

PAVONIA, Cav. (Malvac.).
galpiniana, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 434 = P. Columella.
oxyphyllaria, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 237.—Am. cent.
urticifolia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (Fl. Urug.) 144 (non Presl).—Urug.

PAXIA, Gilg (Connarac.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 33.—Afr. trop.
myriantha, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1233 = Rourea myriantha.

PAXIODENDRON, Engl. (Laurac.).
ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 389.—Afr. trop.

PAYENA, A. DC. (Sapot.).
dongnaiensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 272 (= *Aesandra dongnaiensis*).—As. trop.

PECKIA, Vell. = **Cybianthus**, Mart. (Myrsin.).
psychotriaefolia, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 75.—Bolivia.

PECTINARIA, Cordem. in Rev. Gén. de Bot. xi. (1899) 412. *ORCHIDEAE.*
Thouarsii, *Cordem. l. c.* 413 (= *Mystacidium pectinatum*).—Ins. Mascar.

PECTIS, Linn. (Compos.).
ambigua, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 84.—Calif.
depressa, *Fernald, l. c.* 71.—Mexic.
grandiflora, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 290.—Am. cent.
Lessingii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 67.—Am. bor.; Ind. occ.
Pringlei, *Fernald, l. c.* 76.—Mexic.
Rosei, *Fernald, l. c.* 77.—Mexic.
sinaloensis, *Fernald, l. c.* 69.—Mexic.
stella, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 70.—Bras.
tenuicaulis, *Urb. Symb. Antill.* i. 468.—Ind. occ.

PEDICELLARIA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1900) 491, errore = POLANISIA, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
kalachariensis, Auct. l. c. errore = *Polanisia kalachariensis*.
luederitziana, Auct. l. c. errore = *Polanisia luederitziana*.

PEDICULARIS, Tourn. (Scrophul.).
albomarginata, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 38.—Am. bor.
bicolor, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 570.—China.
Bietii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 34.—China.
biondiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 571.—China.
brevilabris, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 33.—China.
cinerascens, *Franch. l. c.* 30.—China.
ctenophora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 293.—Am. bor.
cyathophylla, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 25.—China.
cystopteridifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 365.—Am. bor.
decora, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 28.—China.
elegans, *Franch. l. c.* 32 (non aliorum).—China.

PEDICULARIS:—
Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 26.—China.
fastigiata, *Franch. l. c.* 25.—China.
floribunda, *Franch. l. c.* 31.—China.
fluviatilis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, ii. 33.—Am. bor.
Hallii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 364.—Am. bor.
hoermanniana, *Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov.* fide *Bot. Centralbl.* lxxxvi. 168.—Eur.
imperialis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 34.—China.
Karoi, *Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 26.—Dahuria.
kialensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 22.—China.
laxiflora, *Franch. l. c.* 27.—China.
montanensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 292.—Am. bor.
Mussoti, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 24.—China.
nasturtiifolia, *Franch. l. c.* 28.—China.
phaceliaefolia, *Franch. l. c.* 27.—China.
praeclara, *Franch. l. c.* 35.—China.
Souliei, *Franch. l. c.* 23.—China.
stenantha, *Franch. l. c.* 36 (non Franch. 1891).—China.
stenocorys, *Franch. l. c.* 32.—China.
tibetica, *Franch. l. c.* 24.—China.
tongolensis, *Franch. l. c.* 29.—China.
veronicifolia, *Franch. l. c.* 30.—China.

PEDILANTHUS, Neck. (Euphorb.).
gritensis, *Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xii. 104.—Venez.
itzaeus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 305.—Mexic.
nodiflorus, *Millsp. l. c.*—Mexic.

PEIXOTOA, A. Juss. (Malpigh.).
cordobensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 28.—Reg. Argent.

PELARGONIUM, L'Hérit. (Geran.).
caucalidifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 150.—Afr. austr.
Maximiliani, *Schlechter, l. c.* 151.—Afr. austr.
oppositifolium, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 315.—Afr. austr.
oreophilum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 151.—Afr. austr.
rhodanthum, *Schlechter, l. c.* 152.—Afr. austr.
Whytei, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 246.—Afr. trop.

PELATANTHERIA, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. (1896) 371. *ORCHIDEAE.*
cristata, *Ridley, l. c.* 373 (= *Cleisostoma cristatum*).—Penins. Mal.
ctenoglossum, *Ridley, l. c.* 372.—Cochinch.
insectifera, *Ridley, l. c.* 373 (= *Sarcanthus insectifer*).—Ind. or.

PELEA, A. Gray = **Melicope**, Forst. (Rutac.).
cruciata, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 839.—Ins. Sandw.
microcarpa, A. A. Heller, l. c.—Ins. Sandw.

PELECYPHORA, Ehrenb. (Cact.).
pectinata, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 603.—Mexic.

PELEXIA, Poit. (Orchid.).
lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 500.—N. Granat.
longicornu, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 425.—Bras.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 562.—Mexic.

PELIOSANTHES, Andr. (Haemodor.).
Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 43.—China.
grandifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxi. 97.—Penins. Mal.
lurida, *Ridley, l. c.* 96.—Penins. Mal.
stellaris, *Ridley, l. c.* 97.—Penins. Mal.

PELLA, Gaertn. = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
ribesioides, Gaertn. Fruct. i. 143 = F. Tsjakela.

PELLACALYX, Korth. (Rhizophor.).
symphiodiscus, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 224.—Borneo.

PELLETIERA, St. Hil. = **Asterolinon**, Hoffmgg. & Link (Primul.).
serpyllifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 193 = A. trinum.

PELLIONIA, Gaudich. (Urtic.).
falcata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 375 (= *Elatostema falcatum*).—Borneo.
insignis, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema insigne*).—Borneo.
latifolia, *Boerl. l. c.* (= *Procris latifolia*).—Java.
mesargyrea, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema mesargyreum*).—Borneo.
picta, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema pictum*).—Borneo.
robusta, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema robustum*).—Borneo.
sinuata, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema sinuatum*).—Arch. Mal.
viridis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 481.—China.
vittata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 375 (= *Elatostema vittatum*).—Borneo.

PELTARIA, Jacq. (Crucif.).
turkmena, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 8.—As. cent.

PELTODON, Pohl (Labiat.).
repens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 260 = radicans.

PELTOPHORUM, Walp. (Legum.).
berteroanum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 286.—Ind. occ.
brasiliense, Urb. l. c. 285 = Linnaei.
grande, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 225, 471.—Sumatra.

PEMPHIS, Forst. (Lythrac.).
punctata, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1222.—Madag.

PENIANTHUS, Miers (Menisperm.).
klaineanus, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 76.—Afr. trop.

PENICILLARIA, Willd. = **Pennisetum**, Rich. (Gramin.).
chinensis, Nees, ex A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 26 = Pennis. typhoideum.
ciliaris, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8646 = Pennis. setosum.
fallax, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 371 = Pennis. typhoideum.
nigritarum, Schlecht. in Linnaea, xxv. 561 = Pennis. typhoideum.
sieberiana, Schlecht. l. c. 565 = Pennis. typhoideum.

PENNISETUM, Rich. (Gramin.).
alopecuroides, Spreng. Syst. i. 303 = typhoideum, compressum.
amoenum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 386 = pedicellatum.
angolense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 189.—Afr. trop.
araneosum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 180 = orientale.
asperifolium, Kunth, Rév. Gram. i. 49 = orientale.
barbatum, Schult. Mant. ii. 147 = setosum.
borbonicum, *Kunth, Rév. Gram.* i. 259.—Ind. or.; Ins. Bourbon.
breve, Nees, Agrost. Bras. 281 = setosum.
chinense, Steud. Syn. Pl. Gram. 108 = compressum.
ciliares, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 87 = setosum.
ciliatum, Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 184 = setosum.
Cornucopiae, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8904 A = Pommereulla Cornucopiae.
cylindricum, Sw. ex Trin. Diss. ii. 70 = typhoideum.
cynosuroides, Wall. Cat. n. 8653 = compressum.
dasistachyum, Desv. Opusc. 76 = setosum.
elatum, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 297 = orientale.
elegans, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 105 = setosum.
flaccidum, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 86.—As. cent. et austr.
flavescens, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 316 = setosum.
gracile, Benth. in Hook. Niger Fl. 564 = setosum.
Griffithii, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 86 = orientale.
helvolum, R. Br. Prodr. 195 = Setaria glauca.
hirsutum, Nees, Agrost. Bras. 284 = setosum.
holcoides, Schult. Mant. ii. 148 = setosum.
implicatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 107 = pedicellatum.
incomptum, Nees, ex Steud. l. c. 105 = cenchroides.
intertextum, Schlecht. in Bot. Zeit. ix. 878 = pedicellatum.
Kirkii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
lanuginosum, Hochst. in Flora, xxv. Beibl. i. 133 = pedicellatum.
macrostachyum, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. 135 = orientale.

PENNISETUM:—
megastachyum, Steud. Syn. Pl. Gram. 108 = typhoideum.
mutilatum, *Hack. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 (= *Cenchrus mutilatus*).—Reg. Argent.
myurus, Parl. in Atti 8va Riun. Sc. Ital. (1846) 586; et in Hook. Niger Fl. 183 = setosum.
natalense, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 435.—Afr. austr.
nigricans, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 781 = typhoideum.
nigricans, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 297 = compressum.
Nigritarum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 781 = typhoideum.
pallidum, Nees, Agrost. Bras. 285 = setosum.
phalariforme, Steud. Syn. Pl. Gram. 106 = orientale.
Plukenetii, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 782 = typhoideum.
plumosum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 201 = Gracilea royleana.
polycladum, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 167.—Afr. trop.
polystachyum, Schult. Mant. ii. 146 = setosum.
Ruppellii, Steud. Nom. ed. II. ii. 298 = orientale.
sericeum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 84 = lanatum.
Sieberi, Kunth, Rév. Gram. i. 50 = setosum.
tenuispiculatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 107 = setosum.
Tiberiadis, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 43 = orientale.
typhoides, Trin. Gram. Pan. 71; et in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. 184, sphalm. = typhoideum.
yemense, *Deflers, Voy. Yemen*, 217.—Arab.

PENTACARPAEA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 439 (1898). *RUBIACEAE.*
arenaria, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

PENTACHONDRA, R. Br. (Epacrid.).
rubra, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 601.—N. Zel.

PENTACLETHRA, Benth. (Legum.).
eetveldeana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 20.—Afr. trop.

PENTADESMA, Sabine (Guttif.).
leptonema, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 21.—Afr. trop.
maritima, *Pierre, l. c.* ii. 1226.—Afr. trop.

PENTAGONIA, Heist. ex Fabric. Enum. Pl. Hort. Helmstad. ed. I. (1759) 184 = **Nicandra**, Adans. (Solan.).
physalodes, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 752 = N. physaloides.

PENTAMERIS, Beauv. (Gramin.).
airoides, Nees, Sem. Hort. Bot. Vratisl. 1834; et in Linnaea, x. Lit. 118 = Pentaschistis airoides.
dregeana, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 515.—Afr. austr.
longiglumis, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 299.—Afr. austr.
pallescens, Nees, in Linnaea, vii. 312 = Pentaschistis pallescens.
papillosa, Nees, l. c. 311, partim = Pentaschistis aspera.
speciosa, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 299.—Afr. austr.
squarrosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 515.—Afr. austr.
Thuarii, *Beauv. Agrost.* 93, t. 18.—Afr. austr.
tortuosa, Nees, in Linnaea, vii. 311 = Pentaschistis colorata.

PENTANISIA, Harv. (Rubiac.).
caerulea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 471.—Afr. trop.

PENTANOPSIS, Rendle, in Journ. Bot. 1898, 28. *RUBIACEAE.*
fragrans, *Rendle, l. c.* 29.—Afr. trop.

PENTAPANAX, Seem. (Aral.).
Henryi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 21.—China.
stellatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 293.—Ind. or.
warmingianus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 56 (= *Coemansia warmingiana*).—Am. austr.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 305.—China.

PENTAS, Benth. (Rubiac.).
Ainsworthii, *Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 433.—Afr. trop.
cleistostoma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 419.—Afr. trop.

PENTAS:—
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 198.—Afr. trop.
herbacea, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 392 (= *Neurocarpaea herbacea*).—Afr. trop.
ionolaena, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 487.—Afr. trop.
mechowiana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 420.—Afr. trop.
quadrangularis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 127.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 432.—Arab.
Thomsonii, *Scott Elliot, l. c.* 435.—Afr. trop.
verticillata, *K. Schum. ex Scott Elliot, l. c.* 431, nomen.—Afr. trop.
volubilis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 421.—Afr. trop.
Woodii, *Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 434.—Afr. austr.

PENTASCHISTIS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 480 (1899). *GRAMINEAE.*
acinosa, *Stapf, l. c.* 495.—Afr. austr.
airoides, *Stapf, l. c.* 511.—Afr. austr.
angustifolia, *Stapf, l. c.* 502.—Afr. austr.
argentea, *Stapf, l. c.* 487.—Afr. austr.
aristidioides, *Stapf, l. c.* 485.—Afr. austr.
aspera, *Stapf, l. c.* 500.—Afr. austr.
brachyathera, *Stapf, l. c.* 507.—Afr. austr.
Burchellii, *Stapf, l. c.* 501.—Afr. austr.
capensis, *Stapf, l. c.* 494.—Afr. austr.
colorata, *Stapf, l. c.* 491.—Afr. austr.
curvifolia, *Stapf, l. c.*—Afr. austr.
densifolia, *Stapf, l. c.* 506.—Afr. austr.
elegans, *Stapf, l. c.* 496.—Afr. austr.
eriostoma, *Stapf, l. c.* 489.—Afr. austr.
euadenia, *Stapf, l. c.* 510.—Afr. austr.
fibrosa, *Stapf, l. c.* 492.—Afr. austr.
filiformis, *Stapf, l. c.* 505.—Afr. austr.
heptamera, *Stapf, l. c.* 504.—Afr. austr.
heterochaeta, *Stapf, l. c.* 503.—Afr. austr.
hirsuta, *Stapf, l. c.* 497.—Afr. austr.
imperfecta, *Stapf, l. c.* 506.—Afr. austr.
Jugorum, *Stapf, l. c.* 504.—Afr. austr.
juncifolia, *Stapf, l. c.* 490.—Afr. austr.
leucopogon, *Stapf, l. c.* 500.—Afr. austr.
Linia, *Stapf, l. c.* 496.—Afr. austr.
longipes, *Stapf, l. c.* 509.—Afr. austr.
natalensis, *Stapf, l. c.* 493.—Afr. austr.
nutans, *Stapf, l. c.* 488.—Afr. austr.
pallescens, *Stapf, l. c.* 486.—Afr. austr.
patula, *Stapf, l. c.* 510.—Afr. austr.
patuliflora, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 381.—Afr. austr.
rupestris, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 498.—Afr. austr.
subulifolia, *Stapf, l. c.* 499.—Afr. austr.
Thunbergii, *Stapf, l. c.* 507.—Afr. austr.
tomentella, *Stapf, l. c.* 502.—Afr. austr.
tortuosa, *Stapf, l. c.* 488.—Afr. austr.
triseta, *Stapf, l. c.* 495.—Afr. austr.
Tysonii, *Stapf, l. c.* 493.—Afr. austr.
viscidula, *Stapf, l. c.* 486.—Afr. austr.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 213.—Afr. trop.
Zeyheri, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 497.—Afr. austr.

PENTASPADON, Hook. f. (Anacard.).
officinalis, *Holmes, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 499.—Penins. Mal.

PENTATROPIS, R. Br. (Asclep.).
hoyoides, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 40.—Afr. trop.

PENTSTEMON, Mitch. (Scrophul.).
arenicola, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 280.—Am. bor.
aridus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 348.—Am. bor.
arizonicus, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 591.—Am. bor.
Brandegei, *Porter, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 343.—Am. bor.
calycosus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 470.—Am. bor.
caudatus, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, ii. 34.—Am. bor.
collinus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 279.—Am. bor.
coloradoensis, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 355.—Am. bor.

PENTSTEMON:—
Crandallii, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 354.—Am. bor.
diphyllus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 349.—Am. bor.
floridus, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 454.—Am. bor.
geniculatus, *Greene, Pittonia*, iii. 310.—Am. bor.
Helleri, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 471.—Am. bor.
incertus, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 454.—Calif.
petiolatus, *Brandegee, l. c.* 455.—Am. bor.
pseudohumilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 347.—Am. bor.
pseudoprocerus, *Rydb. l. c.* 346.—Am. bor.
pulchellus, *Greene, Pittonia*, iii. 310 (non Lindl.).—Am. bor.
Purpusi, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 455.—Am. bor.
radicosus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 280.—Am. bor.
riparius, *A. Nelson, l. c.* 379.—Am. bor.
Rydbergii, *A. Nelson, l. c.* 281.—Am. bor.
saliens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 344.—Am. bor.
similis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 548.—Am. bor.
sudosus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 37.—Am. bor.
utahensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 242.—Am. bor.
Whitedii, *Piper, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 490.—Am. bor.

PENTZIA, Thunb. (Compos.).
cotuloides, DC. Prod. vi. 138 = virgata.
dentata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 166 = crenata.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 401.—Afr. trop.
hereroensis, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 751.—Afr. trop.
incana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 166 = virgata.

PEPEROMIA, Ruiz & Pav. (Piperac.).
aceroana, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 572.—Bolivia.
adenocarpa, *C. DC. l. c.* 569.—Bolivia.
albovittata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 510.—Reg. Andin.
amnicola, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 361, sphalm. = omnicola.
andicola, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 182.—Peruv.
aphanoneura, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 507.—Ecuador.
Balbisii, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 164.—Ind. occ.
Baumannii, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxvi. 360.—Afr. trop.
bavina, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 287.—Tonkin.
brevispica, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 670.—Bolivia.
carpinterana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 281, repr.—Am. cent.
catharinensis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 116.—Bras.
chimboana, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 508.—Ecuador.
Claudii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 285.—Peruv.
Cogniauxii, *Urb. Symb. Antill.* i. 292.—Ind. occ.
corazonicola, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 520.—Ecuador.
cordigera, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 158.—Bras.
costulata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 506.—Ecuador.
crassilimbus, *C. DC. l. c.* 516.—Ecuador.
crassiuscula, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 33.—Ind. occ.
crinicaulis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 286.—Bras.
cuspidata, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 74.—Ind. occ.
decora, *Dahlst. l. c.* 173.—Bras.
diaphanoides, *Dahlst. l. c.* 112.—Bras.
dissitiflora, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 279.—Ind. occ.

PEPEROMIA:—
distans, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 146.—Bras.
Donnell-Smithii, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 291, repr.—Am. cent.
dumeticola, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 569.—Bolivia.
ecuadorensis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 507.—Ecuador.
Eggersii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 282.—Ind. occ.
emiliana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, iii. 292, repr.—Am. cent.
enantiostachya, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 514.—Ecuador.
filicaulis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 282, repr.—Am. cent.
filispica, *C. DC. l. c.* 285, repr.—Am. cent.
floribunda, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 19 = lancifolia.
fruticetorum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 519.—Ecuador.
Gayi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 283.—Peruv.
glaberrima, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 289, repr.—Am. cent.
glabricaulis, *C. DC. l. c.* 290, repr.—Am. cent.
glutinosa, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 293.—Mexic.
goetzeana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 375.—Afr. trop.
gracilis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 159.—Bras.
Grisari, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 516.—Ecuador.
Harmandi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 280.—Cochinch.
Helleri, *C. DC. l. c.* 283.—Ins. Sandw.
heterophylla, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 192 (non aliorum).—Bras.
Hieronymi, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 362, errore = Piper Hieronymi.
hispidosa, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 158.—Bras.
Hombroni, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 281.—Ind. occ.
Humbloti, *C. DC. l. c.* 284.—Ins. Comor.
hylophila, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 284, repr.—Am. cent.
inconspicua, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 515.—Ecuador.
induta, *C. DC. l. c.* 511.—Ecuador.
irazuana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 293, repr.—Am. cent.
Johnsonii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 286 (*Johsonii*).—Austral.
Kuntzei, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 272.—Bolivia.
laeteviridis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 361.—Afr. trop.
lagartana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 285, repr.—Am. cent.
lenticularis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 154 (non Parodi).—Am. trop.
lindmaniana, *Dahlst. l. c.* 44.—Bras.
lonchophylla, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 255.—Ins. Samoa.
longespicata, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 284.—Am. cent.
longicaulis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 517.—Ecuador.
Lorentzii, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 273.—Reg. Argent.
macrandra, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 276.—Mexic.
malmeana, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 169.—Parag.
megapotamica, *Dahlst. l. c.* 194.—Bras.
Mocquerysi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 280.—Madag.
Mosemi, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 115.—Bras.
multispica, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 571.—Bolivia.
nemoralis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 292, repr.—Am. cent.
nemorosa, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 49 = acuminata.
Niederleinii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 278.—Urug.

PEPEROMIA:—
nitida, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 92.—Bras.
nudifolia, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 284.—Bras.
oajacensis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 128.—Mexic.
omnicola, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 507.—Ecuador.
oxystachya, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 294, repr.—Ind. occ.
pachydermis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277.—Bras.
pachystachya, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 510.—Ecuador.
papillosa, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 170.—Ind. occ.
pedicellata, *Dahlst. l. c.* 35.—Am. cent.
peltata, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277 (non A. Dietr.).—Am. cent.
peltifolia, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 570.—Bolivia.
peltigera, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 505.—Ecuador.
pendula, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 288, repr. (non Willd.).—Am. cent.
peruviana, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 32 = umbilicata.
petraea, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 519.—Ecuador.
pilinervia, *C. DC. l. c.* 509.—Ecuador.
podocarpa, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 280, repr.—Am. cent.
polystachyoides, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 136.—Bras.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 292.—Ind. occ.
Pringlei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 287.—Mexic.
pseudocasaretti, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 291, repr.—Am. cent.
pseudoestrellensis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277.—Bras.
pseudomajor, *C. DC. l. c.* 281.—Ind. occ.
psiloclada, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 283, repr.—Am. cent.
pteroneura, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 515.—Ecuador.
punicea, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 135.—Bras.
Reineckei, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 254.—Ins. Samoa.
Remyi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 286.—Ins. Sandw.
renifolia, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 40.—Bras.
rhomboides, *Dahlst. l. c.* 190 (non Hook. & Arn.).—Ind. occ.
Rossi, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 186.—Ins. Christm.
Rothschuhii, *C. DC. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 87.—Am. cent.
rotundifolia, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 99 = nummularifolia.
rubropunctulata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 517.—Ecuador.
rupicola, *C. DC. l. c.* 511.—Ecuador.
salicifolia, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 281.—Peruv.
samoensis, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 611.—Ins. Samoa.
saxatilis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 512 (non A. Dietr.).—Ecuador.
saxicola, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 571.—Bolivia.
schenkiana, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 91.—Bras.
sciaphila, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 279, repr.—Am. cent.
silvivaga, *C. DC. l. c.* 287, repr.—Am. cent.
Sodiroi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 506.—Ecuador.
soratana, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 569.—Bolivia.
spathophylla, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 105.—Ind. occ.
Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 361.—Afr. trop.
stenostachya, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 510.—Ecuador.

PEPEROMIA:—
Stroemfeltii, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 108.—Bras.
subalata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 508.—Ecuador.
Sumichrasti, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 278.—Mexic.
syringifolia, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 514.—Ecuador.
tablahuasiana, *C. DC. l. c.*—Ecuador.
tecticola, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 280, repr.—Am. cent.
tenuicaulis, *C. DC. l. c.* 286, repr.—Am. cent.
ternata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 509.—Ecuador.
tominana, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 572.—Bolivia.
trineuroides, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 198.—Bras.
trunciseda, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 513.—Ecuador.
truncivaga, *C. DC. l. c.* 512.—Ecuador.
tsakiana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 288, repr.—Am. cent.
Tuerckheimii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 279.—Am. cent.
tuisana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 282, repr.—Am. cent.
turbinata, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 88.—Bras.
Ulei, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 26.—Bras.
ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 374.—Afr. trop.
velutina, *Urb. Symb. Antill.* i. 293 (non Linden & André).—Ind. occ.
vestita, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 568.—Bolivia.
Wilmsii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 282.—Afr. austr.

PEPLIS, Linn. (Lythrac.).
tubulosa, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 160.—Graecia.

PEPONIUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 318 (1897) = **Peponia**, Naud. (Cucurb.).

PERAMIUM, Salisb. = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).
tesselatum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = G. pubescens.

PERDICIUM, Linn. = **Gerbera**, Gronov., et **Trixis**, P. Br. (Compos.).
abyssinicum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 615 = G. abyssinica.
piloselloides, Hiern, l. c. = G. piloselloides.

PERESKIA, Plum. (Cact.).
Amapola, *Weber, in Bois, Dict. Hortic.* 938.—Parag.
argentina, *Weber, l. c.*—Reg. Argent.
Guamacho, *Weber, l. c.*—Venez.
panamensis, *Weber, l. c.* 939.—Am. cent.
Peireskia, Karst. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 107 = aculeata.
tampicana, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 167.—Mexic.
weberiana, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 107; *Gesamtb. Kakt.* i. 762.—Bolivia.

PEREZIA, Lag. (Compos.).
cuernavacana, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.
elongata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 166.—Bolivia.
foliosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 71.—Bolivia.
laurifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 166.—Bolivia.
megalantha, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 540.—Patag.
Nelsonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 342.—Mexic.
oleracea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 167.—Patag.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 540.—Patag.
sessiliflora, *Speg. l. c.* 542.—Patag.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 372.—Peruv.
umbratilis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.

PERGAMENA, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 263. *ORCHIDEAE.*
uniflora, *Finet, l. c.*—Japon.

PERIBALLIA, Trin. (Gramin.).
minuta, Aschers. & Graebn. Mittel-Eur. Fl. ii. 298 = Aira minuta.

PERILOMIA, H. B. & K. (Labiat.).
cumanensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 233 (= *Scutellaria cumanensis*).—Venez.
malvaefolia, *Briq. l. c.* (= *Scutellaria malvaefolia*).—N. Granat.
volubilis, *Briq. l. c.* (= *Scutellaria volubilis*).—N. Granat.

PERINERION, Baill. = **Baissea**, A. DC. (Apocyn.).
Welwitschii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. 758 = B. Welwitschii.

PERIPEPLUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 66. *RUBIACEAE.*
klaineanus, *Pierre, l. c.*—Hab. ?

PERIPLOCA, Tourn. (Asclep.).
ephedriformis, Schweinf. ex Deflers, in Mém. Inst. Égypte, iii. 256 = Leptadenia ephedriformis.

PERIPTERA, DC. (Malvac.).
macrostelis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 174.—Mexic.
Periptera, Rose, l. c. 173 = Anoda incarnata.

PERISTROPHE, Nees (Acanth.).
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 103 = bicalyculata.
longifolia, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 171.—Ind. or.
luteoviridis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 243.—Afr. trop.
usta, *C. B. Clarke, l. c.* 244.—Afr. trop.

PERISTYLUS, Blume (Orchid.).
arachnoideus, A. Rich. in Ann. Sci. Nat. Sér. II. xiv. 267 = Holothrix Richardii.
bilobus, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 132.—Celebes.
Brandisii, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 506 = Habenaria Brandisii.
clavellatus, Kraenzl. l. c. 521 = Habenaria tridentata.
cubitalis, Kraenzl. l. c. 502 = Habenaria cubitalis.
Gardneri, Kraenzl. l. c. 506 = Habenaria Gardneri.
gigas, Kraenzl. l. c. 504 = Habenaria gigas.
gracillimus, Kraenzl. l. c. 513 = Habenaria gracillima.
lefebvreanus, *A. Rich. in Ann. Sci. Nat.* Sér. II. xiv. 266.—Afr. trop.
monophyllus, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 516 = Habenaria monophylla.
niveus, Kraenzl. l. c. 520 = Habenaria nivea.
Orchidis, Kraenzl. l. c. 515 = Habenaria Orchidis.
Prainii, Kraenzl. l. c. 514 = Habenaria Prainii.
Preussii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 199.—Afr. trop.
secundiflorus, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 518 = Habenaria secundiflora.
squammatus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 289 = Deroemeria squamata.
stenostachyus, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 502 = Habenaria stenostachya.
Steudneri, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 200.—Afr. trop.
Stocksii, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 513 = Habenaria Stocksii.
tridentatus, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 221 = Holothrix tridentata.
unifolius, Hochst. ex Reichb. f. in Bonplandia, iii. 213 = Deroemeria unifolia.
volkensianus, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 199.—Afr. trop.
warburgianus, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 519.—Ins. Philipp.

PERITHRIX, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 65. *ASCLEPIADACEAE.*
glabra, *Pierre, l. c.* 66.—Afr. trop.

PERITOMA, DC. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
inornata, Greene, Pittonia, iv. 210 = C. inornata.

PERNETTYA, Gaudich. (Ericac.).
buxifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. 1873, 508 = philippiana.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 618.—Patag.
patagonica, *Speg. l. c.* 547.—Patag.
philippiana, *Speg. l. c.* 548.—Patag.
polyphylla, *Colenso, in Trans. N. Zeal. Inst.* xxxi. 274.—N. Zel.

PEROSTIS, Beauv. Agrost. 5 (1812) = **Perotis**, Ait. (Gramin.).
laxifolia, Beauv. l. c. 6 = Perotis latifolia.

PEROTIS, Ait. (Gramin.).
cubana, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 202 = latifolia.
hordeiformis, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 306 = latifolia.
longiflora, Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 247 = latifolia.
rara, R. Br. Prod. 172 = latifolia.
scabra, Willd. ex Trin. Gram. Unifl. 172 = latifolia.

PERROTTETIA, H. B. & K. (Celastr.).
glabrata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 110.—Mexic.
longistylis, *Rose, l. c.*—Mexic.
racemosa, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 224 (= *Celastrus racemosus*).—Japon.

PERSEA, Plum. (Laurac.).
boliviensis, *Mez & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 113.—Bolivia.
Harrisii, *Mez, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 325.—Ind. occ.

PERSOONIA, Sm. (Proteac.).
leucopogon, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 220.—Austral.

PERTYA, Sch. Bip. (Compos.).
Fauriei, *Franch. in Mém. Herb. Boiss.* no. 14, 2.—Japon.
hybrida, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 144.—Japon.
Macroclinidium, *Makino, l. c.* (= *Macroclinidium robustum*).—Japon.
rigidula, *Makino, l. c.* (= *Eupatorium rigidulum*).—Japon.
triloba, *Makino, l. c.* (= *Ainsliaea triloba*).—Japon.

PERYMENIUM, Schrad. (Compos.).
chalarolepis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 525.—Am. cent.
croceum, *Robinson & Greenm. l. c.* 527.—Am. cent.
Ghiesbreghtii, *Robinson & Greenm. l. c.* 525.—Am. cent.
Klattii, *Robinson & Greenm. l. c.* 528.—Am. cent.
microphyllum, *Robinson & Greenm. l. c.* 527.—Am. cent.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. l. c.* 529.—Am. cent.
Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.* 526.—Am. cent.
Rosei, *Robinson & Greenm. l. c.* 523.—Am. cent.
rude, *Robinson & Greenm. l. c.* 526.—Am. cent.
subsquarrosum, *Robinson & Greenm. l. c.* 524.—Am. cent.

PESCATORIA, Reichb. f. (Orchid.).
schroederiana, *Rolfe, in Orchid Rev.* 1900, 68.—Hort.

PETALIDIUM, Nees (Acanth.).
canescens, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 92.—Afr. trop.
Currori, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 226.—Afr. trop.
englerianum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 89.—Afr. trop.
glutinosum, *C. B. Clarke, l. c.* 92.—Afr. trop.
hamatum, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 299 = Ecbolium hamatum.
huillense, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 91.—Afr. trop.
lanatum, *C. B. Clarke, l. c.* 90.—Afr. trop.
latifolium, *C. B. Clarke, l. c.* 88.—Afr. trop.
ovatum, *C. B. Clarke, l. c.* 90.—Afr. trop.
Rautanenii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 33.—Afr. trop.
spiniferum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 91.—Afr. trop.
variabile, *C. B. Clarke, l. c.* 92.—Afr. trop.

PETALONEMA, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 264 (1897). *MELASTOMACEAE.*
pulchra, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

PETALOSTEMON, Michx. (Legum.).
Gattingeri, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 593.—Am. bor.
microphyllus, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.
mollis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 238.—Am. bor.
oligophyllus, *Rydb. l. c.* 237.—Am. bor.

PETALOSTEMON:—
pulcherrimus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 593.—Am. bor.
purpureus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 238 = violaceus.
tenuis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 593.—Am. bor.

PETASTOMA, Miers = **Bignonia**, Tourn. (Bignon.).
cuneifolium, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 77 = B. cuneifolia.
discocalyx, Bureau & K. Schum. l. c. 80.—Bras.
reticulatum, Bureau & K. Schum. l. c. 82 = B. reticulata, *Poepp.*
trachyphyllum, Bureau & K. Schum. l. c. 77.—Bras.

PETROCOSMEA, Oliver (Gesner.).
iodioides, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2599.—China.
minor, *Hemsl. l. c.* t. 2600.—China.

PETROPHYTON, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. (1900) 206. *ROSACEAE.*
caespitosum, *Rydb. l. c.* (= *Spiraea caespitosa*).—Am. bor.
elatior, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 5.—Am. bor.

PETROSELINUM, Hoffm. = **Carum**, Linn. (Umbell.).
macedonicum, Bub. Fl. Pyren. ii. 344 = C. Petroselinum.

PEUCEDANUM, Tourn. (Umbell.).
argense, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 30.—Am. bor.
brachystylum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea brachystyla*).—Afr. trop.
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
confusum, *Piper, in Erythea*, vi. 29.—Am. bor.
crassifolium, *Halacsy & Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvii. 646.—Austria.
erosum, *Jepson, in Erythea*, v. 1.—Am. bor.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 503.—China.
Gormani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 252.—Am. bor.
heracleoides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
insulare, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 106.—Am. bor.
juniperinum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 29.—Am. bor.
Lefeburia, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea abyssinica*).—Afr. trop.
longipedicillatum, *Drude, l. c.* (= *Lefebvrea longipedicellata*).—Afr. trop.
megarrhiza, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 130.—Am. bor.
multiradiatum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 237 (= *Bubon capensis*).—Afr. austr.
muriculatum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 429.—Afr. trop.
narbonense, Bub. Fl. Pyren. ii. 389 = officinale.
occidentale, Bub. l. c. = Seseli cantabricum.
reptans, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 502.—China.
Ruspolii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 23.—Afr. trop.
scopulorum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 31.—Am. bor.
Stuhlmannii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea Stuhlmannii*).—Afr. trop.
trachystylum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 368, sphalm. = brachystylum.
Upingtoniae, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea Upingtoniae*).—Afr. austr.
valerianaefolium, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 269.—Afr. trop.

PFEIFFERA, Salm-Dyck = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).
ianthothele, Web. in Bois, Dict. Hortic. 944 = R. cereiformis.

PHACA, Linn. = **Astragalus**, Linn. (Legum.).
inepta, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 246 = A. lentiginosus.
microcystis, Rydb. l. c. 245 = A. microcystis, *A. Gray.*
platytropis, Rydb. l. c. 246 = A. platytropis.

PHACELIA, Juss. (Hydrophyll.).
alpina, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 324.—Am. bor.
Bicknellii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 141.—Am. bor.
biennis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 132.—Am. bor.
Boykinii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 136.—Am. bor.

PHACELIA :—
campestris, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 242.—Am. bor.
deserta, *A. Nelson, l. c.* 1898, 277.—Am. bor.
frigida, *Greene, Pittonia*, iv. 39.—Calif.
intermedia, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 457.—Am. bor.
laxa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 141.—Am. bor.
Lyallii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 325.—Am. bor.
minutissima, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 351.—Am. bor.
mutabilis, *Greene, in Erythea*, iv. 55.—Calif.
Purpusi, *T. S. Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Calif.
virgata, *Greene, in Erythea*, iv. 54.—Calif.

PHAEANTHUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
Schefferi, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 337.—Celebes.

PHAEOCEPHALUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 158. *COMPOSITAE.*
gnidioides, *S. Moore, l. c.*—Afr. austr.

PHAEONEURON, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 267 (1897). *MELASTOMACEAE.*
dicellandroides, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Moloneyi, *Stapf, in Bot. Mag.* t. 7729.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Stapf, l. c.* sub t. 7729.—Afr. trop.
setosum, *Stapf, l. c.* (= *Dicellandra setosa*).—Afr. trop.

PHAGNALON, Cass. (Compos.).
harazianum, *Deflers, Voy. Yemen*, 150.—Arab.

PHAIUS, Lour. (Orchid.).
Mannii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 118.—Afr. trop.
pallidus, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 313.—Penins. Mal.

PHALAENOPSIS, Blume (Orchid.).
denisiana, *Cogn. in Gard. Chron.* 1899, II. 82.—Ins. Philipp.
Mastersii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 591.—Burma.

PHALANGIUM, Moehr. = **Bulbine**, Linn. (Liliac.).
altissimum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 317 = B. longiscapa.
tenuifolium, Kuntze, l. c.—Afr. austr.

PHALARIS, Linn. (Gramin.).
caesia, Nees, Fl. Afr. Austr. 6 = arundinacea.
dentata, Linn. f. Suppl. 106 = Prionanthium rigidum.
intermedia, Bosc. ex Poir. Encyc. Suppl. i. 300 = arundinacea.
velutina, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 17 = Digitaria sanguinalis.

PHALERIA, Jack (Thymel.).
ambigua, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Drimyspermum ambiguum*).—Java.
longifolia, *Boerl. l. c.* (= *Drimyspermum longifolium*).—Java.
macrocarpa, *Boerl. l. c.* (= *Drimyspermum macrocarpum*).—N. Guin.
papuana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 460.—N. Guin.
revoluta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Drimyspermum revolutum*).—N. Guin.
urens, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 577.—Celebes.

PHANERA, Lour. = **Bauhinia**, Linn. (Legum.).
albolutea, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1079 = B. albolutea.

PHARNACEUM, Linn. (Ficoid.).
pusillum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 123.—Afr. austr.

PHARUS, P. Br. (Gramin.).
ciliatus, Retz. Obs. v. 23 = Leersia hexandra.
urceolatus, Roxb. Hort. Beng. [104]; Fl. Ind. iii. 611 = Leptaspis urceolata.

PHASEOLUS, Tourn. (Legum.).
amboensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 36.—Afr. trop.
macrorhynchus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 409.—Afr. trop.
psammodes, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 17.—Bras.
smilacifolius, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 233.—Am. bor.

PHAULOPSIS, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 305 (1897) = seq.

PHAYLOPSIS, Willd. (Acanth.).
falcisepala, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 84.—Afr. trop.
glandulosa, *C. B. Clarke, l. c.* 87.—Afr. trop.
Johnstoni, *C. B. Clarke, l. c.* 86.—Afr. trop.
lankesterioides, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 305.—Afr. trop.
longifolia, Sims, Bot. Mag. t. 2433 = parviflora.
micrantha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 85.—Afr. trop.
microphylla, *T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
oppositifolius, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 305 = parviflora.
Poggei, *Lindau, l. c.*—Afr. trop.
silvestris, *Lindau, l. c.* (= *Micranthus silvestris*).—Afr. trop.

PHEBALIUM, Vent. (Rutac.).
Beckleri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 141 (= *Eriostemon Beckleri*).—Austral.
squameum, Engl. l. c. = Billardierii.

PHELLANDRIUM, Tourn. = **Oenanthe**, Tourn. (Umbell.).
Dodonaei, Bub. Fl. Pyren. ii. 368 = O. fistulosa.
Lobelii, Bub. l. c. 370 = O. silaifolia.
Mathioli, Bub. l. c. = O. pimpinelloides.
Plinii, Bub. l. c. = O. crocata.
Tabernaemontani, Bub. l. c. 368 = O. Lachenalii.

PHELLOPTERUS, Benth. (Umbell.).
bulbosus, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 168 (= *Cymopterus bulbosus*).—Am. bor.
macrorhizus, *Coult. & Rose, l. c.* 167 (= *Cymopterus macrorhizus*).—Am. bor.
multinervatus, *Coult. & Rose, l. c.* 169.—Am. bor.
purpurascens, *Coult. & Rose, l. c.* 168 (= *Cymopterus utahensis*).—Am. bor.

PHENAX, Wedd. (Urtic.).
edentatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 294 (= *Ramium edentatum*).—Bolivia.
globulifera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 120.—Bolivia.

PHIALODISCUS, Radlk. (Sapind.).
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 171.—Afr. trop.

PHILADELPHUS, Riv. (Saxifr.).
argyrocalyx, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 452.—Am. bor.
Billiardi, *Koehne, in Gartenfl.* 1896, 508.—Am. bor.?
caucasicus, *Koehne, l. c.* 619.—Reg. Caucas.
columbianus, *Koehne, l. c.* 542 (= Hort.?).—Am. bor.
incanus, *Koehne, l. c.* 562.—China.
karwinskyanus, *Koehne, l. c.* 486.—Mexic.
lancifolius, *Koehne, l. c.* 561.—Reg. Himal.
matsumuranus, *Koehne, l. c.* 619.—Japon.
occidentalis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 374.—Am. bor.
sericanthus, *Koehne, in Gartenfl.* 1896, 561.—China.

PHILIBERTELLA, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 305. *ASCLEPIADACEAE.*
clausa, *Vail, l. c.* 306 (= *Philibertia viminalis*).—Am. trop.
crassifolia, *Vail, l. c.* (= *Philibertia crassifolia*).—Mexic.
crispa, *Vail, l. c.* (= *Philibertia crispa*).—Texas; Mexic.
cumanensis, *Vail, l. c.* (= *Philibertia cumanensis*).—Mexic.
cynanchoides, *Vail, l. c.* 307 (= *Philibertia cynanchoides*).—Texas; Mexic.
elegans, *Vail, l. c.* 310 (= *Philibertia elegans*).—Mexic.
Hartwegii, *Vail, l. c.* 308 (= *Philibertia linearis*).—Calif.; Mexic.
hirtella, *Vail, l. c.* 309.—Am. bor.
Torreyi, *Vail, l. c.* (= *Philibertia Torreyi*).—Texas.

PHILIBERTIA, H. B. & K. (Asclep.).
bonariensis, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 23 (= *Sarcostemma bonariense*).—Reg. Argent.
cuspidata, *Malme, l. c.* 24 (= *Sarcostemma cuspidatum*).—Bras.

PHILIPPIELLA, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 566. *ILLECEBRACEAE.*
patagonica, *Speg. l. c.*—Patag.

PHILODENDRON, Schott (Arac.).
acuminatissimum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 543.—Ecuador.
angustisectum, *Engl. l. c.* 549.—N. Granat.
bahiense, *Engl. l. c.* 518.—Bras.
bulaoanum, *Engl. l. c.* 542.—Ecuador.
cannifolium, Engl. l. c. 512 = rudgeanum.
chimboanum, *Engl. l. c.* 519.—Ecuador.
coerulescens, *Engl. l. c.* 523.—N. Granat.
Cooperi, *Engl. ex Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 88, nomen.—Am. cent.
cymbispathum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 555.—Bras.
Dussii, *Engl. l. c.* 530.—Ind. occ.
ecuadorense, *Engl. l. c.* 531.—Ecuador.
Eichleri, *Engl. l. c.* 556.—Bras.
graveolens, *Engl. l. c.* 519.—N. Granat.
gualeanum, *Engl. l. c.* 532.—Ecuador.
guatemalense, *Engl. l. c.* 514.—Am. cent.
houlletianum, *Engl. l. c.* 550.—Guiana.
Krugii, *Engl. l. c.* 538.—Ind. occ.
longipes, *Engl. l. c.* 519.—N. Granat.
martianum, Engl. l. c. 518 = cannaefolium.
multispadiceum, *Engl. l. c.* 542.—N. Granat.
Pittieri, *Engl. l. c.* 541.—Am. cent.
purpureoviride, *Engl. l. c.* 526.—Ecuador.
quercifolium, *Engl. l. c.* 546 (non Hort.).—Bras.?
rubrocinctum, *Engl. l. c.* 532.—N. Granat.
silvaticum, *Engl. l. c.* 513.—Ecuador.
Smithii, *Engl. l. c.* 540.—Am. cent.
sodiroanum, *Engl. l. c.* 531.—Ecuador.
Talamancae, *Engl. l. c.* 511.—Am. cent.
tobagense, *Engl. l. c.* 524.—Ind. occ.
viride, *Engl. l. c.* 540.—N. Granat.
Wallisii, *Regel, ex Engl. l. c.* 543.—N. Granat.

PHIPPSIA, R. Br. (Gramin.).
himalaica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 240.—Ind. or.

PHLEUM, Linn. (Gramin.).
dentatum, Pers. Syn. i. 79 = Prionanthium rigidum.
ovatum, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 237 = alpinum.
subulatum, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 12 = Lasiochloa longifolia.

PHLOGACANTHUS, Nees (Acanth.).
publiflorus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 659.—Cochinch.
turgidus, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 211 (= *Cystacanthus turgida*).—Cochinch.

PHLOMIS, Linn. (Labiat.).
Bertrami, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no 18, 98.—Syria.
Chimerae, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 290.—Lycia.
Clusii, Bub. Fl. Pyren. i. 461 = P. Lychnitis.
Cypria, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 99.—Cyprus.
flavescens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 716 (= *Anthocoma flavescens*).—Malaya.
medicinalis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 554.—China.
stenocalyx, *Diels, l. c.* 555.—China.

PHLOX, Linn. (Polemon.).
alyssifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 27.—Am. bor.
andicola, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 11.—Am. bor.
aspera, *E. Nelson, l. c.* 34.—Am. bor.
Brittonii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 279.—Am. bor.
cernua, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 22.—Am. bor.
collina, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 316.—Am. bor.
condensata, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 13.—Am. bor.
costata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 315.—Am. bor.
Covillei, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 15.—Am. bor.
diapensioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 317.—Am. bor.
gladiformis, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 21.—Am. bor.
hirsuta, *E. Nelson, l. c.* 28.—Am. bor.
lanceolata, *E. Nelson, l. c.* 29.—Am. bor.

PHLOX:—
multiflora, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 278.—Am. bor.
Piperi, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 18.—Am. bor.
scleranthifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 313.—Am. bor.
Stansburyi, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 478.—Am. bor.
tenuifolia, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 27.—Am. bor.
tenuis, *E. Nelson, l. c.* 35.—Am. bor.
virida, *E. Nelson, l. c.* 24.—Am. bor.
viscida, *E. Nelson, l. c.*—Am. bor.
Whitedii, *E. Nelson, in Erythea*, vii. 167.—Am. bor.
Woodhousei, *E. Nelson, Revis. W. N. Am. Phloxes*, 31.—Am. bor.

PHOEBE, Nees (Laurac.).
falcata, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 251 (= *Ocotea falcata*).—Ind. occ.
taubertiana, *Mez & Schwacke, in Engl. Jahrb.* xxi. 427.—Bras.

PHOENIX, Linn. (Palm.).
farinifera, Roxb. Pl. Corom. i. 53, t. 74 = pusilla.
melanocarpa, *Naud. in E. Sauvaigo, Phoenix Cult. Jard. Nice*, 1.—Hab. ?

PHOLIDIA, R. Br. (Myopor.).
caerulea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 208.—Austral.
homoplastica, *S. Moore, l. c.* 207.—Austral.
interstans, *S. Moore, l. c.* 210.—Austral.
saligna, *S. Moore, l. c.* 207.—Austral.
Veronica, *S. Moore, l. c.* 209.—Austral.

PHOLIDOTA, Lindl. (Orchid.).
caduca, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 288.—Borneo.
cantonensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 196.—China.
decurva, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 328.—Penins. Mal.
Wattii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 590.—Ind. or.

PHORADENDRON, Nutt. (Loranth.).
Aequatoris, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 10.—Ecuador.
anceps, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 40 = hexastichon.
argentinum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 14.—Reg. Argent.
bilineatum, *Urb. l. c.* 5.—Venez.
Campbellii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 44.—Ind. occ.
caracasanum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 4.—Venez.
carneum, *Urb. l. c.* 1.—Mexic.
chrysocarpum, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 39.—Ind. occ.
Crulsii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 11.—Bras.
cuneifolium, *Urb. l. c.* 5.—Venez.
cymosum, *Urb. l. c.* 7.—Venez.
dichotomum, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 48 = berterianum.
Eggersii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 10.—Ecuador.
Forestierae, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 36.—Mexic.
fragile, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 13.—Bras.
gardnerianum, *Urb. l. c.* 11.—Bras.
Glaziovii, *Urb. l. c.* 12.—Bras.
Gundlachii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 44.—Ind. occ.
Hartii, *Krug & Urb. l. c.* 40.—Ind. occ.
inaequidentatum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 137.—Bolivia.
Kuntzei, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 11.—Bolivia.
longipetiolatum, *Urb. l. c.* 6.—Venez.
minutifolium, *Urb. l. c.* 2.—Mexic.
mucronatum, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 35 = emarginatum.
ovalifolium, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 6.—Venez.
paradoxum, *Urb. l. c.* 8.—Venez.
Pearcei, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 136.—Bolivia.
pruinosum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 14.—Reg. Argent.

PHORADENDRON:—
quadrangulare, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 35 = rubrum.
racemosum, Krug & Urb. l. c. 46 = glandulosum.
reticulatum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 12.—Bras.
rigidum, *Urb. l. c.* 7.—Venez.
Robinsonii, *Urb. l. c.* 4.—Mexic.
rugulosum, *Urb. l. c.* 13.—Bras.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 136.—Bolivia.
spathulifolium, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 41.—Ind. occ.
subtrinerve, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 117.—Bolivia.
tetrapterum, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 35.—Ind. occ.
tovarense, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 8.—Venez.
tubulosum, *Urb. l. c.* 5.—Venez.
tucumanense, *Urb. l. c.* 16.—Reg. Argent.
Wattii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxiv. 43.—Ind. occ.

PHRAGMITES, Trin. (Gramin.).
barbata, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 541 = communis.
bifaria, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 304 = Karka.
Karka, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 324.—As.; Afr.; Austral.
longivalvis, Steud. Syn. Pl. Gram. 196 = communis.
nepalensis, Nees, ex Steud. l. c. = Karka.

PHREATIA, Lindl. (Orchid.).
celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 129.—Celebes.
congesta, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxv. 358.—Ins. Christm.
Koordersii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 129.—Celebes.
listrophora, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 307.—Penins. Mal.

PHRYGILANTHUS, Eichl. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
bolivianus, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 133.—Bolivia.
Diguetii, Engl. l. c. 134 = Dipodophyllum Digueti.
eucalyptifolius, Engl. l. c. = L. celastroides.
mapirensis, Engl. l. c. = Struthanthus mapirensis.
Palmeri, Engl. l. c. = L. Palmeri.
Raoulii, Engl. l. c. = L. Raoulii.
tenuiflorus, Engl. l. c. = L. tenuiflorus.

PHRYNIUM, Loefl. (Scitamin.).
adenocarpum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 324.—Afr. trop.
basiflorum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 182.—Penins. Mal.
Benthami, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 323.—Afr. trop.
bisubulatum, *Baker, l. c.* 325.—Afr. trop.
coriscense, *Baker, l. c.* 322.—Afr. trop.
cylindricum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 178 (non Rosc.).—Penins. Mal.
Guppyi, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 239 = Cominsia Guppyi.
heliconioides, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 238.—N. Guin.
Hensii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 323.—Afr. trop.
hirtum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 181.—Penins. Mal.
holostachyum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 322.—Afr. trop.
inaequilaterum, *Baker, l. c.* 325.—Afr. trop.
leiogonium, *Baker, l. c.* 324.—Afr. trop.
limosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 318 = Heteranthera limosa.
macrophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 323.—Afr. trop.
malaccense, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 180.—Penins. Mal.
monophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 324 (non C. Koch).—Afr. trop.
oxycarpum, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
pedunculatum, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 238.—N. Guin.
prionogonium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 325.—Afr. trop.
reniforme, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 318 = Heteranthera reniformis.
sulphureum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 326.—Afr. trop.

PHRYNIUM:—
velutinum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 323 (non Poepp. & Endl.).—Afr. trop.
villosum, *Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 653 (non Sweet).—Afr. trop.

PHTHEIROSPERMUM, Bunge (Scrophul.).
japonicum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, (111) (= *Gerardia japonica*).—Japon.

PHTHIRUSA, Mart. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
alata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 135 (= *Dendropemon alatus*).—Ind. occ.
bicolor, Engl. l. c. (= *Dendropemon bicolor*).—Ind. occ.
caribaea, Engl. l. c. (= *Dendropemon caribaeus*).—Ind. occ.
Constantiae, Engl. l. c. (= *Dendropemon Constantiae*).—Ind. occ.
jamaicensis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 15 = L. Theobromae.
montana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 135 = L. parvifolius.
Picardae, Engl. l. c. (= *Dendropemon Picardae*).—Ind. occ.
purpurea, Engl. l. c. = L. uniflorus.
Seitzii, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 16.—Ind. occ.
Sintenisii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 135 (= *Dendropemon Sintenisii*).—Ind. occ.

PHYLA, Lour. = **Lippia**, Linn. (Verben.).
betulaefolia, Greene, Pittonia, iv. 48 = L. betulaefolia.
canescens, Greene, l. c. = L. canescens.
cuneifolia, Greene, l. c. 47 = L. cuneifolia, *Steud.*
lanceolata, Greene, l. c. = L. lanceolata.
nodiflora, Greene, l. c. 46 = L. nodiflora.
reptans, Greene, l. c. 47 = L. reptans.

PHYLICA, Linn. (Rhamn.).
aemula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 166.—Afr. austr.
altigena, *Schlechter, l. c.* 167.—Afr. austr.
chionocephala, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
chionophila, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 428.—Afr. austr.
fruticosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
glabriflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 39.—Afr. austr.
Maximiliani, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
minutiflora, *Schlechter, l. c.* xxiv. 440.—Afr. austr.
mucronata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 84 = Stilbe mucronata.
odorata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
pulchella, *Schlechter, l. c.* 169.—Afr. austr.
stenopetala, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
tropica, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.
tubulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 170.—Afr. austr.

PHYLLACTIS, Pers. (Valerian.).
carnosa, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 526 (= *Valeriana carnosa*).—Reg. Magell.
clarioneifolia, *Speg. l. c.* (= *Valeriana clarionaefolia*).—Chili.

PHYLLAGATHIS, Blume (Melast.).
Griffithii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 45 (= *Allomorphia Griffithii*).—Penins. Mal.
hispida, *King, l. c.* 46.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 45.—Penins. Mal.
tuberculata, *King, l. c.* 44.—Penins. Mal.

PHYLLANTHODENDRON, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. tt. 2563-4 (1898). *EUPHORBIACEAE.*
mirabilis, *Hemsl. l. c.*—Siam.

PHYLLANTHUS, Linn. (Euphorb.).
Antunesii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 519.—Afr. trop.
Avicularia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 278.—Am. bor.
Bachmanni, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 588, 627.—Celebes.
cordobensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 350 (= *Diasperus cordobensis*).—Reg. Argent.
guineensis, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 732.—Afr. trop.
hodjelensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 304.—Arab.
inaequalis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 118.—Bolivia.

PHYLLANTHUS:—
lalambensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 302, descr.—Arab.; Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 588, 627.—Celebes.
mirabilis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 355 = Phyllanthodendron mirabilis.
peninsularis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 8.—Mexic.
Pittieri, *Pax, ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 327.—Am. cent.
polyanthus, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 19.—Afr. trop.
polycladus, *Urb. Symb. Antill.* i. 333.—Ind. occ.
popayanensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 503.—N. Granat.
Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 182.—Afr. trop.
subcuneatus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 478.—Mexic.
submollis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 390.—N. Guin.

PHYLLOBAEA, Benth. (Gesner.).
speciosa, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 522.—Malaya.

PHYLLOCACTUS, Link (Cact.).
acuminatus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 213 (= *Epiphyllum acuminatum*).—Bras.
Pfersdorfii, *Hort. ex K. Schum. l. c.* 138.—Hab.?
Pittieri, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 957.—Am. cent.

PHYLLOCOMOS, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxvi. 19 (1900). *RESTIACEAE.*
insignis, *Mast. l. c.* 20.—Afr. austr.

PHYLLODES, Lour. = **Phrynium**, Loefl. (Scitam.).
adenocarpum, K. Schum. in Engl. Jahrb. xv. 442 = Phr. adenocarpum.
bisubulatum, K. Schum. in Bol. Soc. Broter. xi. 83 = Phr. bisubulatum.
leiogonium, K. Schum. in Engl. Jahrb. xv. 442 = Phr. leiogonium.
macrophyllum, K. Schum. l. c. 444 = Phr. macrophyllum.
macrostachyum, K. Schum. l. c. 445 = Phr. Benthami.
monophyllum, K. Schum. l. c. 440 = Phr. monophyllum, *Baker.*
oxycarpum, K. Schum. l. c. 443 = Phr. oxycarpum.
prionogonium, K. Schum. l. c. 441 = Phr. prionogonium.
villosum, K. Schum. l. c. 445 = Phr. villosum, *Benth.*

PHYLLODESMIS, Van Tiegh. (Loranth.).
Kaempferi, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 188 = Viscum Kaempferi.

PHYLLODOCE, Salisb. = **Bryanthus**, S. G. Gmel. (Ericac.).
glanduliflora, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 299 = B. glanduliflorus.
hybrida, Rydb. l. c. 298.—Am. bor.
intermedia, Rydb. l. c. = B. empetriformis.

PHYLLOPODIUM, Benth. (Scrophul.).
glutinosum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 220.—Afr. austr.

PHYLLOSMA, Bolus, in Engl. Jahrb. xxiv. 547 (1897). *RUTACEAE.*
capensis, *Bolus, l. c.*—Afr. austr.

PHYLLOSTACHYS, Sieb. & Zucc. (Gramin.).
Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 718.—Japon.
Mannii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 28.—Ind. or.
Monaii, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 383, sphalm. = praec.

PHYLLOSTEGIA, Benth. (Labiat.).
variabilis, *Bitter, in Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xvi. 435.—Ins. Sandw.

PHYLLOTA, Benth. (Legum.).
humilis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 186.—Austral.
lycopodioides, *S. Moore, l. c.* 185.—Austral.

PHYMASPERUM, Less. (Compos.).
pubescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 167.—Patag.

PHYSACANTHUS, Benth. (Acanth.).
cylindricus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 58.—Afr. trop.
inflatus, *C. B. Clarke, l. c.* 57.—Afr. trop.

PHYSALIDIUM, Fenzl (Crucif.).
graelsiaefolium, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 12.—As. cent.

PHYSALIS, Linn. (Solan.).
acuminata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 311.—Mexic.
margaranthoides, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 197.—Bolivia.
monticola, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 119.—Am. bor.
philippensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 568.—Mexic.
polyphylla, *Greene, Pittonia*, iv. 150.—Am. bor.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 311.—Mexic.
rigida, *Pollard & Ball, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 134.—Am. bor.
Rydbergii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
saltillensis, *Fernald, l. c.* 568.—Mexic.
sordida, *Fernald, l. c.*—Mexic.
subintegra, *Fernald, l. c.* 567.—Mexic.

PHYSOPTYCHIS, Boiss. = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).
Haussknechtii, Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xiii–xiv. 1, descr.—As. Min.

PHYSOSIPHON, Lindl. (Orchid.).
deregularis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 341 (= *Stelis deregularis*).—Bras.
echinanthus, *Cogn. l. c.* 338 (= *Pleurothallis echinantha*).—Bras.
minor, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 275.—Am. cent.
parahybunensis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 340 (= *Lepanthes parahybunensis*).—Bras.

PHYSOSTEGIA, Benth. (Labiat.).
digitalis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 613.—Am. bor.
leptophylla, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 286.—Am. bor.

PHYSOSTEMON, Mart. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
guyanense, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. xxiv. no. 6, 26 = C. guianensis.

PHYSURUS, L. C. Rich. (Orchid.).
boliviensis, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 300.—Bolivia.
chinensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
herpysmoides, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 124.—Reg. Himal.

PHYTOCRENE, Wall. (Olac.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 629.—Celebes.
ovalifolia, *Koord. l. c.*—Celebes.
tinosporifolia, *Koord. l. c.*—Celebes.

PHYTOLACCA, Tourn. (Phytolacc.).
Goudotii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 213.—Madag.
nova-hispania, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 41 = mexicana.

PICEA, Link (Conif.).
columbiana, *Lemmon, in Gard. & For.* 1897, 183.—Am. bor.
rubens, Sargent, Silva N. Am. xii. 33 = nigra.

PICRADENIA, Hook. = **Actinella**, Nutt. (Compos.).
acaulis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 449 = A. acaulis.
biennis, Greene, Pittonia, iii. 272 = A. biennis.
canescens, Greene, l. c. 271.—Am. bor.
Cooperi, Greene, l. c. 272 = A. Cooperi.
floribunda, Greene, l. c.—Am. bor.
Lemmoni, Greene, l. c.—Am. bor.
ligulaeflora, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 378 = pumila.
linearifolia, Britton, in Britton & A. Brown. Fl. N. U. S. iii. 448 = A. linearifolia.
macrantha, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxviii. 130.—Am. bor.
multiflora, Greene, Pittonia, iii. 273.—Am. bor.
nudiflora, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 379, sphalm. = praec.
odorata, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 449 = A. odorata.
pumila, Greene, Pittonia, iii. 271.—Am. bor.
Rusbyi, Greene, l. c. = A. Rusbyi.
scaposa, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 449 = A. scaposa.
texana, Greene, Pittonia, iii. 273 = A. texana.
Vaseyi, Greene, l. c. 271 = A. Vaseyi.

PICRALIMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1278. *APOCYNACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.* 1279.—Afr. trop.

PICRASMA, Blume (Simarub.).
crenata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 222 (= *Picraena Vellozii*).—Bras.

PICRIDIUM, Desf. (Compos.).
lesbiacum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 147.—Graecia.

PICTETIA, DC. (Legum.).
aculeata, Urb. Symb. Antill. ii. 294 = Ormocarpum sennoides.
sessilifolia, *Wright, ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 411.—Ind. occ.
spinifolia, Urb. Symb. Antill. ii. 295 = Desvauxii, &c.

PILEA, Lindl. (Urtic.).
floribunda, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 280.—Madag.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 379.—Afr. trop.
Hamaoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, x. (364).—Japon.
Harrisii, *Urb. Symb. Antill.* i. 299.—Ind. occ.
involucrata, Urb. l. c. 298 = pubescens.
Krugii, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
leptophylla, *Urb. l. c.* 297.—Ind. occ.
multicaulis, *Urb. l. c.* 295.—Ind. occ.
nigrescens, *Urb. l. c.* 299.—Ind. occ.
notata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 476.—China.
plataniflora, *C. H. Wright, l. c.* 477.—China.
rubriflora, *C. H. Wright, l. c.* 478.—China.

PILOCARPUS, Vahl (Rutac.).
insularis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 80.—Mexic.
longipes, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 112.—Mexic.

PILOCEREUS, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).
albisetosus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 196 = C. albisetosus.
chrysacanthus, Weber, ex K. Schum. l. c. 178.—Mexic.
erythrocephalus, K. Schum. l. c. 195.—Reg. Argent.
flavispinus, Ruempl. in Foerst. Handb. Cact. ed. II. 659 = C. strictus.
fulviceps, Weber, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 176.—Mexic.
fulvispinosus, K. Schum. l. c. 196 = C. Royeni.
Gounellei, Weber, ex K. Schum. l. c. 188.—Bras.
lanatus, Weber, in Bois, Dict. Hort. 965 = C. lanatus.
lateralis, Weber, l. c. 966.—Mexic.
macrocephalus, Weber, l. c.—Mexic.
marschalleckianus, Zeissold, in Monatsschr. Kakt. 1898, 34.—Mexic.?
nobilis, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 189 = C. strictus.
Pringlei, Weber, in Bois, Dict. Hort. 966 = C. Pringlei.
Schlumbergeri, Weber, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 186.—Hab.?
Sterkmanii, Hort. ex K. Schum. l. c. 179 = *scoparius.*
Swartzii, K. Schum. l. c. 184 = C. lanuginosus.
Tetezo, Weber, ex K. Schum. l. c. 176 = C. Tetazo.
urbanianus, K. Schum. l. c. 193.—Ind. occ.

PIMELANDRA, A. DC. (Myrsin.).
macrophylla, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 242 (= *Ardisia macrophylla*).—Java.
myristicaefolia, *Koord. & Valet. l. c.* 241 (= *Ardisia myristicaefolia*).—Malaya.

PIMELEA, Banks & Soland. (Thymel.).
dasyantha, *Colenso, in Trans. N. Zeal. Inst.* xxviii. 609.—N. Zel.
montana, *Colenso, l. c.* xxxi. 279.—N. Zel.
subsimilis, *Colenso, l. c.* xxviii. 609.—N. Zel.
thesioides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 224.—Austral.

PIMPINELLA, Riv. (Umbell.).
arguta, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 496.—China.
Bicknellii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 85.—Ins. Balear.
cantabrica, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 355.—Pyren.
filicina, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 494 (= *Carum filicinum*).—China.
Henryi, *Diels, l. c.* 495.—China.
platyphylla, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 426.—Afr. trop.
rhomboidea, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 495.—China.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 22.—Afr. trop.

PIMPINELLA :—
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 495.—China.
Tanakae, *Diels, l. c.* 494 (= *Carum Tanakae*).—China.
trichomanifolia, *Diels, l. c.* 495 (= *Carum trichomanifolium*).—China.
triternata, *Diels, l. c.* 496.—China.

PINDAREA, Barb. Rodr. Pl. Nov. Rio, v. (1896) 17. *PALMAE.*
concinna, *Barb. Rodr. l. c.*—Bras.
fastuosa, *Barb. Rodr. l. c.* 23.—Bras.

PINELIA, Lindl. (Orchid.).
lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 479.—N. Granat.

PINGUICULA, Tourn. (Lentibul.).
Hellwegeri, *Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 80.—Austria.

PINUS, Tourn. (Conif.).
celakovskiorum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 230.—Hybr.
heterophylla, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 19 = cubensis.
mayriana, *Sudw. l. c.* 16.—Am. bor.
scipioniformis, *Mast. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 270.—China.
scopulorum, *Lemmon, in Gard. & For.* 1897, 183.—Am. bor.
tenuis, *Lemmon, in Erythea*, vi. 77.—Am. bor.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 253.—China.

PIPER, Linn. (Piperac.).
acutiusculum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 259.—Mexic.
antioquiense, *C. DC. l. c.* 260.—N. Granat.
argyroneurum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 297.—Borneo.
arieianum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 254, repr.—Am. cent.
articulatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 267 (= A. Rich.?).—Ind. occ.
asymmetricum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 271, repr.—Am. cent.
atrorameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 487.—Ecuador.
Baclei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 267.—Urug.
bavinum, *C. DC. l. c.* 270.—Tonkin.
biauritum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 240, repr.—Am. cent.
brevicaule, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 272 (non Poir.).—Tonkin.
brevipedunculatum, *C. DC. l. c.* 266.—Am. cent.
brevispica, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 481.—Ecuador.
brevistylum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 232, repr.—Am. cent.
cabagranum, *C. DC. l. c.* 273, repr.—Am. cent.
Candelarium, C. DC. l. c. 258, repr., sphalm. = candelarianum.
carpinteranum, *C. DC. l. c.* 251, repr.—Am. cent.
ceibense, *C. DC. l. c.* 245, repr.—Am. cent.
cenocladum, *C. DC. l. c.* 259, repr.—Am. cent.
chandocanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 274.—Cochinch.
Claudii, *C. DC. l. c.* 264.—Peruv.
curtispicum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 266, repr.—Am. cent.
cyphophyllum, *C. DC. l. c.* 257, repr.—Am. cent.
domingense, *C. DC. l. c.* 238, repr.—Am. cent.
dumeticola, *C. DC. l. c.* 247, repr.—Am. cent.
dumetorum, *C. DC. l. c.* 272, repr.—Am. cent.
durirameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 484.—Ecuador.
Elatostema, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 295.—Borneo.
Ferriei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 268.—Ins. Luchu.
filistilum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 491.—Ecuador.
flabellinerve, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 26.—Bras.
frustratum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 73 (= *Chavica frustrata*).—Java.
glabrifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 246, repr.—Am. cent.

PIPER :—
glabrirameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 493.—Ecuador.
Glaziovii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 265.—Bras.
gracilirameum, *C. DC. l. c.*—Venez.
Graeffei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 610.—Ins. Samoa.
guadaloupense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 264.—Ind. occ.
guayasanum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 486.—Ecuador.
hainana, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 363 (= *Chavica hainana*).—China.
Harmandi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 268.—Cochinch.
Henryci, *C. DC. l. c.* 271.—China.
Hieronymi, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 273.—Reg. Argent.
Hollrungii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 256.—N. Guin.
humile, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 25 (non aliorum).—Bras.
Hydrolapathum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 487.—Ecuador.
hylebates, *C. DC. l. c.* 479.—Ecuador.
hylophilum, *C. DC. l. c.* 484.—Ecuador.
juayasanum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 363, sphalm. = guayasanum.
Kerberi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 258.—Mexic.
Koordersii, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 568, nomen.—Celebes.
Kuntzei, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 274.—Bolivia.
laevifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 263, repr. (non Blume).—Am. cent.
Langlassei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 273.—Mexic.
lanuginosum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 233, repr.—Am. cent.
laosanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 269.—Cochinch.
Lauterbachii, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 255.—N. Guin.
leptocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 249, repr.—Am. cent.
littorale, *C. DC. l. c.* 252, repr.—Am. cent.
Lolot, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 272.—Tonkin.
longepilosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 489.—Ecuador.
longipedunculatum, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 261 (non D. Dietr.).—Ins. Samoa.
lunulibracteatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 483.—Ecuador.
machadoanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 253, repr.—Am. cent.
malacophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 259.—N. Guin.
martinicense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 259.—Ind. occ.
matinanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 266, repr.—Am. cent.
metallicum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 297.—Borneo.
Minahassae, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 569, nomen.—Celebes.
minus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 258.—N. Guin.
Moreleti, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 256.—Am. cent.
multinodum, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 25.—Bras.
nudicaule, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 243, repr.—Am. cent.
nudifolium, *C. DC. l. c.* 269, descr. emend.—Am. cent.
orenocanum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 564.—Am. trop.
orizabanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 258.—Mexic.
oxystachyum, *C. DC. l. c.* 255.—N. Granat.
pachyphloium, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 274.—Bolivia.
pallidirameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 493.—Ecuador.
pastoense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 261.—N. Granat.

PIPER :—
paulownifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 275, repr.—Am. cent.
pilinervium, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 262.—N. Granat.
plagiophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 260.—N. Guin.
praecox, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 254.—Bras.
pseudoaduncum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 255, repr.—Am. cent.
pseudobumbratum, *C. DC. l. c.* 270, repr.—Am. cent.
pseudodilatatum, *C. DC. l. c.* 250, repr.—Am. cent.
pseudolanceolatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 256.—Bras.
pseudomarginatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 492.—Ecuador.
pseudonigrum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 275.—Tonkin.
pseudonobile, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 485.—Ecuador.
pseudopsis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 248, repr.—Am. cent.
psilorhachis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 253.—Am. cent.
regale, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 490.—Ecuador.
riparense, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 274, repr.—Am. cent.
ripense, *C. DC. l. c.* 263, repr.—Am. cent.
ripicola, *C. DC. l. c.* 267, repr.—Am. cent.
Rodatzii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 262.—N. Guin.
Rothschuhii, *C. DC. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 86.—Am. cent.
rubrum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 273 (non Reinw.).—Tonkin.
sagittifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 268, repr.—Am. cent.
Sanctae-Crucis, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 274.—Bolivia.
san-marcosanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 231, repr.—Am. cent.
sarapiquinum, *C. DC. l. c.* 254, repr.—Am. cent.
Savagii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 252.—Am. cent.
saxicola, *C. DC. l. c.* 269 (non Vahl).—Tonkin.
Schumannii, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 256.—N. Britt.
scleromyelum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 256, repr.—Am. cent.
sepium, *C. DC. l. c.* 260, repr.—Am. cent.
silvarum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 486.—Ecuador.
silvicola, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 234, repr.—Am. cent.
silvivagum, *C. DC. l. c.* 242, repr.—Am. cent.
Singkojan, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 569.—Celebes.
Sodiroi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 482.—Ecuador.
sphaeroides, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 263.—N. Granat.
squamulosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 488.—Ecuador.
stenocarpum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 270.—N. Guin.
stenocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 244, repr.—Am. cent.
stenophyllum, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 261.—Sumatra.
stenostachys, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 254.—Peruv.
subaspericaule, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 241, repr.—Am. cent.
subbullatum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 262.—N. Guin.
subciliatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 263.—Guiana.
suberythrocarpum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 237, repr.—Am. cent.
subflavirameum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 255.—Bras.
subglabribracteatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 485.—Ecuador.
substenocarpum, *C. DC. l. c.* 492.—Ecuador.
subtropicum, *C. DC. l. c.* 489.—Ecuador.
Tonduzii, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 264, repr.—Am. cent.
trachyphyllum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 482.—Ecuador.

PIPER:—
trichocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 256, repr.—Am. cent.
trichophyllum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 261.—Mexic.
trichorhachis, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 566.—Bolivia.
trigoniastrifolium, *C. DC. l. c.* 567.—Bolivia.
trimetrale, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 235, repr.—Am. cent.
tsakianum, *C. DC. l. c.* 276, repr.—Am. cent.
tucumanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 253.—Reg. Argent.
tuisanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 244, repr.—Ind. occ.
Ulei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 262.—Bras.
ulvifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 259.—N. Guin.
umbraculum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 488.—Ecuador.
urophyllum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 265, repr.—Am. cent.
verbenanum, *C. DC. l. c.* 250, repr.—Am. cent.
virillanum, *C. DC. l. c.* 230, repr.—Am. cent.
Werneri, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 257.—Bras.
xanthostachyum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 261, repr.—Am. cent.
xiroresanum, *C. DC. l. c.* 262, repr.—Am. cent.
zacatense, *C. DC. l. c.* 239, repr.—Am. cent.
zhorquinense, *C. DC. l. c.* 232, repr.—Am. cent.

PIPTADENIA, Benth. (Legum.).
Elliotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 260.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, l. c.* xxviii. 397.—Afr. trop.
paraguayensis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 36 (= *Pithecolobium paraguense*).—Parag.
Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 260.—Afr. trop.

PIPTATHERUM, Beauv. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
aequiglume, Munro, ex Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Prov. 626 = O. aequiglumis.
arisitense, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 511.—Eur.
laterale, Munro, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. 106 = O. lateralis.
miliaceum, Coss. Notes Crit. 129 = O. miliacea.
molinoides, Boiss. Fl. Orient. v. 509, partim = O. lateralis.
multiflorum, Beauv. Agrost. 18 = O. miliacea.
soongaricum, Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Prov. 626 = O. Munroi.
strictum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 234 = O. lateralis.

PIPTOCARPHA, R. Br. (Compos.).
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 2.—Ecuador.
tetrantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 457.—Ind. occ.

PIPTOCHAETIUM, J. & C. Presl = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
angolense, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 734.—Chili.
brevifolium, R. Phil. l. c. 733.—Chili.
collinum, R. Phil. l. c.—Chili.
cuspidatum, R. Phil. l. c. 732.—Chili.
gibbum, R. Phil. l. c. 731.—Chili.
granulatum, R. Phil. l. c. 732.—Chili.
humile, R. Phil. l. c. 730.—Chili.
macrocarpum, R. Phil. l. c. 735.—Chili.
Moelleri, R. Phil. l. c. 734.—Chili.
subnudum, R. Phil. l. c. 731.—Chili.

PIPTOSTIGMA, Oliver (Anonac.).
longepilosum, *Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 297.—Afr. trop.

PIPTOTHRIX, A. Gray (Compos.).
Goldmanii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 328.—Mexic.

PIPTURUS, Wedd. (Urtic.).
kauaiensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 815.—Ins. Sandw.
ruber, *A. A. Heller. l. c.*—Ins. Sandw.

PIQUERIA, Cav. (Compos.).
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 3.—Ecuador.

PISONIA, Plum. (Nyctag.).
arborescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 265 = hirtella.
boliviana, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 125.—Bolivia.
calophylla, *Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 625.—Ind. occ.
Cephalotomandra, *Heimerl, in Jahresb. Staats.-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 34.—N. Granat.
cuspidata, *Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 628.—Ind. occ.
eggersiana, *Hiemerl, l. c.* 627.—Ind. occ.; Guiana.
ferruginosa, *Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Guian.* 1131, nomen.—Guiana.
fragrans, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. 429 = P. Cephalotomandra.
Lauterbachii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 307.—N. Guin.
praecox, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 265.—Parag.
riedeliana, *Fischer, ex Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 35.—Bras.
rufescens, Griseb. ex Heimerl, in Engl. Jahrb. xxi. 626 = calophylla.
schomburgkiana, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 34.—Guiana.
spathiphylla, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 308.—N. Guin.

PITCAIRNIA, L'Hérit. (Bromel.).
Bakeri, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 460 (= *Quesnelia Bakeri*).—N. Granat.
Bangii, *Baker, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 124.—Bolivia.
brittoniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 451.—Bolivia.
caulescens, *C. Koch, ex Mez, l. c.* 425.—Venez.?
Fendleri, *Mez, l. c.* 387.—Venez.
gracilis, *Mez, l. c.* 407.—Ind. occ.
hemsleyana, *Mez, l. c.* 455.—Am. cent.
klabochiana, *Morr. ex Mez, l. c.* 414.—Ecuador.
longebracteata, *Bouché, ex Mez, l. c.* 428.—Am. cent.
lorentziana, *Mez, l. c.* 373.—Reg. Argent.
multiramosa, *Mez, l. c.* 419.—Bolivia.
oerstediana, *Mez, l. c.* 448.—Am. cent.
Pavonii, *Mez, l. c.* 386.—Ecuador.
penduliflora, *Mez, l. c.* 463 (= *Tillandsia penduliflora*).—Ind. occ.
platystemon, *Mez, l. c.* 421.—Bolivia.
pruinosa, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. 454 = weddelliana.
pulchella, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 459.—Ecuador.
pusilla, *Mez, l. c.* 429.—Guiana.
ruiziana, *Mez, l. c.* 420.—Peruv.
spectabilis, *Mez, l. c.* 421.—N. Granat.
spicata, *Mez, l. c.* 392 (= *Bromelia spicata*).—Ind. occ.
straminea, *Poepp. ex Mez, l. c.* 427.—Peruv.
sulfurea, Mez, l. c. 456 = Wendlandi.
taenipetala, *Mez, l. c.* 382.—Mexic.
tenuis, *Mez, l. c.* 421.—Venez.
Theae, *Mez, l. c.* 376.—Am. cent.
weddelliana, *Mez, l. c.* 434 (non Baker).—Bras.

PITCHIA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 493, sphalm. = **Fitchia**, Hook. f. (Compos.).

PITHECOLOBIUM, Mart. (Legum.).
arboreum, Urb. Symb. Antill. ii. 259 = filicifolium.
attopeuense, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 396 A.—Cochinch.
caribaeum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 260.—Ind. occ.
harmandianum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 394 A.—Cochinch.
Jupunba, Urb. Symb. Antill. ii. 257 = trapezifolium.
Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 271.—Penins. Mal.; Borneo.
malayanum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 394 B.—Siam.
mekongense, *Pierre, l. c.* t. 396 B.—Cochinch.
Minahassae, *Teijsm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 630, descr.—Celebes.
nervosum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 257.—Ind. occ.
nicobaricum, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 267.—Ins. Nicobar.
oppositifolium, *Urb. Symb. Antill.* ii. 258.—Ind. occ.
pendulum, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 54.—Am. austr.
quocense, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 396.—Cochinch.
reductum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 42.—Parag.
venosum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 29.—Bolivia.

PITTIERA, Cogn. (Cucurb.).
grandiflora, *Cogn. ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 123 (= *Cayaponia grandiflora*).—Am. cent.
parvifolia, *Cogn. & Rose, ex Rose, l. c.*—Am. cent.

PITTOSPORUM, Banks (Pittospor.).
berberidoides, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 96.—N. Guin.
comptum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 338.—N. Guin.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 392.—Afr. trop.
illicoides, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1900 (31).—Japon.
Kruegeri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 26.—Afr. austr.
macrophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 338.—N. Guin.
malosanum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 244.—Afr. trop.
microcalyx, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvii. 62.—Java.
nativitatis, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 171.—Ins. Christm.
oblongifolium, C. H. Wright, in Kew Bull. 1897, 243 = Alsodeiae sp.
pullifolium, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 96.—N. Guin.
setigerum, *F. M. Bailey, in Agric. Journ. Queensl.* i. 451.—Austral.
spathaceum, *Burkill, in Hook. Ic. Pl.* t. 2561.—Ins. Tonga.
truncatum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 378.—China.
zollingerianum, *Binn. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvii. 58.—Java.

PITURANTHOS, Viv. (Umbell.).
aphylla, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 115.—Afr. austr.

PLACEA, Miers (Amaryll.).
amoena, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 145.—Chili.

PLAGIANTHUS, Forst. (Malvac.).
cymosus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 70.—N. Zel.
repens, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 179.—Austral.

PLAGIOBOTHRYS, Fisch. & Mey. (Borag.).
asper, *Greene, Pittonia*, iii. 262.—Am. bor.
colorans, *Greene, l. c.*—Am. bor.
echinatus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
parvulus, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.

PLAGIOLYTRUM, Nees = **Tripogon**, Roth (Gramin.).
filiforme, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. 95 = T. filiformis.
unidentatum, Nees, l. c. = T. filiformis.

PLAGIOSIPHON, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 194 (1897); et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 263. *LEGUMINOSAE.*
discifer, *Harms, ll. cc.*—Afr. trop.

PLAGIOSTACHYS, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1899) 151. *SCITAMINEAE.*
lateralis, *Ridley, l. c.* 152 (= *Amomum laterale*).—Penins. Mal.
strobilifera, *Ridley, l. c.* 151 (= *Alpinia strobilifera*).—Borneo.

PLAGIOSTYLES, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1327. *EUPHORBIACEAE.*
klaineana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

PLANALTOA, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. (1896) 454. *COMPOSITAE.*
salviifolia, *Taub. l. c.*—Bras.

PLANCHONELLA, Pierre (Sapot.).
Koordersii, *Pierre, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 519, nomen.—Celebes.

PLANOTIA, Munro (Gramin.).
ingens, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 721.—N. Granat.
Stuebelii, *Pilg. l. c.* 720.—N. Granat.
tesselata, *Pilg. l. c.*—N. Granat.

PLANTAGO, Tourn. (Plantag.).
abyssinica, Hochst. ex A. Br. in Flora, 1841, i. 279 = lanceolata.
angustifolia, Bub. Fl. Pyren. i. 209 = maritima.
argentina, *Pilg. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 263.—Reg. Argent.

PLANTAGO:—
argyrea, *Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 111.—Am. bor.
brunnea, *Morris, l. c.* 115.—Calif.
dura, *Morris, l. c.* 113.—Calif.
erecta, *Morris, l. c.* 118.—Calif.
fastigiata, *Morris, l. c.* 116.—Am. bor.
glabriuscula, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 268.—Chili.
Helleri, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 288.—Am. bor.
inflexa, *Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 113.—Am. bor.
insularis, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 112.—Am. bor.
Kuntzei, *Pilg. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 263.—Urug.
lanatifolia, *Small, ex Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 114.—Am. bor.
limarensis, *F. Phil. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 266.—Chili.
lubenensis, *Form. in Verh. Nat. Ver. Brünn*, xxxviii. 214.—Eur.
myosuroides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 369.—Am. bor.
oligantha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 270 (non Roem. & Schult.).—Chili.
oxyphylla, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 565.—Patag.
scariosa, *Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 117.—Am. bor.
sodiroana, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 733.—Ecuador.
subverticillata, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 152.—Graecia.
tanalensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 276.—Madag.
tehuelcha, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 565.—Patag.
tetrantha, *Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 119.—Am. bor.
tunetana, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3 (1899) 2.—Afr. bor.

PLATANTHERA, Rich. (Orchid.).
acuta, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 611 (=*Gymnadenia acuta*).—Cambodia.
bakeriana, *Kraenzl. l. c.* 632 (=*Habenaria bakeriana*).—Reg. Himal.
biermanniana, *Kraenzl. l. c.* 636 (=*Habenaria biermanniana*).—Reg. Himal.
Buchananii, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 420=Brachycorythis Buchananii.
citrina, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 633 (=*Habenaria citrina*).—Ins. Maurit.
densa, *Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 96 (non Lindl.).—Dahuria.
dyeriana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 636 (=*Habenaria dyeriana*).—Reg. Himal.
engleriana, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 204.—Afr. trop.
fuscescens, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 637 (=*Orchis fuscescens*).—As. et Am. bor.
glaberrima, *Kraenzl. l. c.* 609 (=*Holothrix glaberrima*).—Madag.
hawkesiana, *Kraenzl. l. c.* 634 (=*Habenaria hawkesiana*).—Burma.
Helferi, *Kraenzl. l. c.* 611 (=*Gymnadenia Helferi*).—Reg. Himal.
helleborina, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 204.—Afr. trop.
Henryi, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 632 (=*Habenaria Henryi*).—China.
holochila, *Kraenzl. l. c.* 645 (=*Habenaria holochila*).—Ins. Sandw.
inhambanensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 330.—Afr. trop.
madagascariensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 609 (=*Holothrix madagascariensis*).—Madag.
manubriata, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 265.—China.
setchuenica, *Kraenzl. l. c.*—China.
sikkimensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 621 (=*Habenaria sikkimensis*).—Reg. Himal.
sparsiflora, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 538 (=*Habenaria sparsiflora*).—Am. bor. et cent.
tenuior, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 205.—Afr. trop.
unalaschkensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 631 (=*Spiranthes unalascensis*).—Ins. Aleutian.

PLATANTHERA:—
uncata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 205.—Afr. trop.
virginea, *Bolus, Orch. S. Afr.* t. 60.—Afr. austr.
viridimaculata, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 618.—Anglia.

PLATEA, Blume (Olac.).
parviflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* ii. 3; *et in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 155.—Java.

PLATYCLINIS, Benth. (Orchid.).
bistorta, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* 169, t. 299.—Malaya.
globigera, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 266.—Borneo.
linearifolium, *Ridley, l. c.* xxxii. 231 (=*Dendrochilum linearifolium*).—Penins. Mal.
linearis, *Ridley, l. c.* 230.—Penins. Mal.
rufa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 192.—As. trop.
sarawakensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 267.—Borneo.

PLATYCORYNE, Reichb. f. (Orchid.).
aurea, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 256.—Afr. trop.
buchananiana, *Rolfe, l. c.* 257.—Afr. trop.
crocea, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
Guingangae, *Rolfe, l. c.* 258.—Afr. trop.
paludosa, *Rolfe, l. c.* 256.—Afr. trop.
poggeana, *Rolfe, l. c.* 258.—Afr. trop.
Protearum, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
tenuicaulis, *Rolfe, l. c.* 257.—Afr. trop.
Wilfordii, *Rolfe, l. c.* 256.—Afr. trop.

PLATYMISCIUM, Vog. (Legum.).
cochabambense, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 26.—Bolivia.

PLATYMITIUM, Warb.=**Dobera**, Juss. (Salvad.).
loranthifolium, Warb. in Engl. Pfl. Ost.-Afr. C. 279=D. loranthifolia.

PLATYMITRA, Boerl. Cat. Hort. Bogor. (1899) 33. *ANONACEAE.*
macrocarpa, *Boerl. l. c.*; *et in Ic. Bogor.* t. 62.—Java.

PLATYOSPRION, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxii. (1877) 263; Mél. Biol. ix. 659. *LEGUMINOSAE.*
platycarpum, *Maxim. ll. cc.* (=*Sophora platycarpa*).—Japon.

PLATYSEPALUM, Welw. (Legum.).
cuspidatum, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 187.—Afr. trop.
ferrugineum, *Taub. l. c.* 186.—Afr. trop.
hypoleucum, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
Poggei, *Taub. l. c.* 185.—Afr. trop.

PLAZIA, Ruiz & Pav. (Compos.).
argentea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 167=Hyalis argentea.
spartiodes, Kuntze, l. c.=Aphyllocladus spartioides.

PLECTRANTHUS, L'Hérit. (Labiat.).
andongensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 525.—Afr. trop.
biflorus, *Baker, l. c.* 402.—Afr. trop.
bongensis, *Baker, l. c.* 410.—Afr. trop.
brevipes, *Baker, l. c.* 406.—Afr. trop.
Buchananii, *Baker, l. c.* 402.—Afr. trop.
calcaratus, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2671.—China.
chiradzulensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 412.—Afr. trop.
deccanicus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 234.—Ind. or.
dichromophyllus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 562.—China.
fragilis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 407.—Afr. trop.
fruticosus, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 623=deccanicus.
fulvescens, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 521.—Burma.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 393.—Afr. austr.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 469.—Afr. trop.
grandidentatus, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 554.—Afr. austr.

PLECTRANTHUS:—
horridus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 416.—Afr. trop.
hoslundioides, *Baker, l. c.* 418 (non Scott Elliot).—Afr. trop.
insolitus, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 275.—Afr. trop.
Johnstonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 411.—Afr. trop.
kondowensis, *Baker, l. c.* 417.—Afr. trop.
Kunstleri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 521.—Penins. Mal.
Kuntzei, *Guerke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 260.—Afr. austr.
Lastii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 403.—Afr. trop.
leptobotrys, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 561.—China.
longipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 406.—Afr. trop.
luteus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 468.—Afr. trop.
Malinvaldi, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. 125=Coleus Malinvaldi.
mandalensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
manganjensis, *Baker, l. c.* 406.—Afr. trop.
Mannii, *Baker, l. c.* 408.—Afr. trop.
Marquesii, *Guerke, in Bol. Soc. Brot.* xvi. 70.—Afr. trop.
masukensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
matabelensis, *Baker, l. c.* 417.—Afr. trop.
microphyllus, Baker, l. c. 410=porpeodon.
microphyllus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 467.—Afr. trop.
Mocquerysii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 233.—Madag.
monticola, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 468, descr.—Afr. trop.
moschosmoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 414.—Afr. trop.
natalensis, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 552.—Afr. austr.
neochilus, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
nyikensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 416.—Afr. trop.
paniculatus, *Baker. l. c.* 419 (non Jacq.).—Afr. trop.
parviflorus, *Guerke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 261 (non aliorum).—Afr. austr.
pauciflorus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
phryxotrichus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 66.—Afr. trop.
porpeodon, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 525.—Afr. trop.
pubescens, *Baker, l. c.* 416 (non Willd.).—Afr. trop.
pyramidatus, Guerke, in Bull. Herb. Boiss. vi. 552=calycinus.
Rehmannii, *Guerke, l. c.* 553.—Afr. austr.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 562.—China.
rupestris, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 409.—Afr. trop.
schizophyllus, *Baker, l. c.* 414.—Afr. trop.
Schlechteri, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 311, nomen.—Afr. trop.
sphaerophyllus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 410.—Afr. trop.
stenophyllus, *Baker, l. c.* 402.—Afr. trop.
stenosiphon, *Baker, l. c.* 415.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 469.—Afr. trop.
triflorus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 417.—Afr. trop.
Tysoni, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 77.—Afr. austr.
urticoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 412.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, l. c.* 419.—Afr. trop.
Woodii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 76 (Wodii).—Afr. austr.
Zollingeri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 234.—Java.
zombensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 402.—Afr. trop.

PLECTRITIS, DC.=**Valerianella**, Tourn. (Valerian.).
anomala, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 144=V. anomala.
aphanoptera, Suksd. l. c.=V. aphanoptera.
involuta, Suksd. l. c.—Am. bor.

PLECTRITIS:—
magna, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 145 = V. magna.
microptera, Suksd. l. c. 119.—Am. bor.

PLECTRONIA, Linn. (Rubiac.).
abbreviata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 73.—Afr. trop.
anomocarpa, *K. Schum. l. c.* xxiii. 459 (= *Canthium anomocarpum*).—Afr. trop.
arnoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 29.—Afr. trop.
Barteri, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 33 (= *Canthium Barteri*).—Afr. trop.
brevifolium, *Engl. ex Wildem. & Th. Dur. l. c.* (= *Canthium brevifolium*).—Afr. trop.
calycophila, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 73.—Afr. trop.
Chamaedendrum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 122.—Afr. austr.
chlorantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 458.—Afr. trop.
connata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 201.—Afr. trop.
cuspidata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 74.—Afr. trop.
decidua, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
discolor, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 68.—Afr. trop.
fragrantissima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 75.—Afr. trop.
golungensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium golungense*).—Afr. trop.
huillensis, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium huillense*).—Afr. trop.
klotzschiana, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 460 = spinosa, *Klotzsch*.
kranussioides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium kraussioides*).—Afr. trop.
lactescens, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium lactescens*).—Afr. trop.
Lualabae, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 76.—Afr. trop.
laxiflora, *K. Schum. l. c.* xxiii. 459.—Afr. trop.
locuples, *K. Schum. l. c.* xxviii. 75.—Afr. trop.
lucida, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 33.—Afr. trop.
macrophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 76.—Afr. trop.
medusula, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium medusula*).—Afr. trop.
Minahassae, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium Minahassae*).—Celebes.
pallida, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 77.—Afr. trop.
Palma, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
platyphylla, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium platyphyllum*).—Afr. trop.
rhamnoides, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium rhamnoides*).—Afr. trop.
silvatica, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium sylvaticum*).—Afr. trop.
spinosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 459 (= *Canthium Thonningii*).—Afr. trop.
strychnoides, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 320, nomen.—Afr. trop.
subevenia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 78.—Madag.
telidosma, *K. Schum. l. c.* xxiii. 460.—Afr. trop.
tenuiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium tenuiflorum*).—Afr. trop.
umbrosa, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium umbrosum*).—Afr. trop.
vanguieroides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 460 (= *Canthium vanguerioides*).—Afr. trop.
virgata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium virgatum*).—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium Welwitschii*).—Afr. trop.

PLEIOCARPA, Benth. (Apocyn.).
tubicina, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 304.—Afr. trop.
Welwitschii, *Stapf, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 665.—Afr. trop.

PLEIOCARPIDIA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 314 (1897). *RUBIACEAE.*
enneandra, *K. Schum. l. c.* (= *Aulacodiscus premnoides*).—Malaya.

PLEIOSPORA, Harv. (Legum.).
holosericea, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 29.—Afr. austr.
obovata, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.

PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.).
Dewevrei, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 34.—Afr. trop.
fulva, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 611.—Afr. trop.

PLEODENDRON, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1899, 272. *CANELLACEAE.*
macranthum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Cinnamodendron macranthum*).—Ind. occ.

PLEONOTOMA, Miers = **Bignonia**, Linn. (Bignon.).
Brittoni, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 72.—Bras.
diversifolia, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 274.—Am. trop.
Imperatoris-Maximiliani, Bureau & K. Schum. l. c. 279 = B. Imperatoris-Maximiliani.

PLEURANTHODES, Weberbauer, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. (1896) 424. *RHAMNACEAE.*
Hillebrandti, *Weberbauer, l. c.* (= *Gouania Hillebrandi*).—Ins. Sandw.
orbiculare, *Weberbauer, l. c.* (= *Gouania orbiculare*).—Ins. Sandw.

PLEURISANTHES, Baill. (Olac.).
emarginata, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 117.—Guiana.

PLEUROPHORA, D. Don (Lythrac.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 518.—Patag.

PLEUROPLITIS, Trin. = **Arthraxon** Beauv. (Gramin.).
major, Regel, in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 370 = A. ciliaris.

PLEUROSPERMUM, Hoffm. (Umbell.).
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 492.—China.
lacicum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 172 (= *Eleutherospermum lazicum*).—As. Min.
meoides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 493.—China.

PLEUROSTACHYS, Brongn. (Cyper.).
gracilis, *Boeckl. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 111.—Bras.
longa, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 29.—Bras.
spicata, *Boeckl. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 112.—Bras.

PLEUROSTELMA, Schlechter, in Journ. Bot. 1895, 303 = **Tacazzea**, Decne. (Asclep.).

PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.).
acutangula, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 298.—Bras.?
armeniaca, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 470 (= *Lepanthes armeniaca*).—Bras.
atropurpurea, Cogn. l. c. 588 = teretifolia.
atroviolacea, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—Ecuador.
bicolor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 408 (= *Lepanthes bicolor*).—Bras.
bicornuta, *Cogn. l. c.* 470 (= *Lepanthes bicornuta*).—Bras.
bicristata, *Cogn. l. c.* 459 (= *Lepanthes bicarinata*).—Bras.
Blumenavii, *Cogn. l. c.* 514 (= *Lepanthes Blumenawii*).—Bras.
carinifera, *Cogn. l. c.* 584.—Bras.
catharinensis, *Cogn. l. c.* 579 (= *Specklinia violacea*).—Bras.
chaetocephala, *Cogn. l. c.* 590.—Bras.
chiquindensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—Ecuador.
collina, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 582 (= *Lepanthes montana*).—Bras.
complicata, *Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 121.—Bolivia.
congestiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 591 (= *Lepanthes densiflora*).—Bras.
convergens, *R. Gerard, in Ann. Soc. Bot. Lyon*, xxiv. 33.—Bras.
corazonica, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 443.—Ecuador.
crassicaulis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 450 (= *Lepanthes crassicaulis*).—Bras.

PLEUROTHALLIS:—
crebrifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 482 (= *Lepanthes crebifolia*).—Bras.
crepiniana, *Cogn. l. c.* 542.—Bras.
cristata, *Cogn. l. c.* 530 (= *Lepanthes cristata*).—Bras.
cryptantha, *Cogn. l. c.* 587 (= *Lepanthes cryptantha*).—Bras.
cuneifolia, *Cogn. l. c.* 441 (= *Lepanthes wawraeana*).—Bras.
daguensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 444.—N. Granat.
densiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 559.—Bras.
depauperata, *Cogn. l. c.* 574.—Bras.
endotrachys, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 439 (non Reichb. f.).—N. Granat.
exigua, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 575.—Bras.
fasciculata, *Cogn. l. c.* 559.—Bras.
ferdinandiana, *Cogn. l. c.* 488 (= *Lepanthes ferdinandiana*).—Bras.
filiformis, *Cogn. l. c.* 453 (= *Lepanthes viridula*).—Bras.
flaccida, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 140.—Hort.
flammea, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 509 (= *Lepanthes flammea*).—Bras.
funerea, *Cogn. l. c.* 567 (= *Lepanthes funerea*).—Bras.
furfuracea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 441.—Ecuador.
Glaziovii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 546.—Bras.
granulosa, *Cogn. l. c.* 550 (= *Lepanthes granulosa*).—Bras.
guttulata, *Cogn. l. c.* 467 (= *Lepanthes punctata*).—Bras.
hartwegiaefolia, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 296.—Mexic.
hebesepala, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 568.—Bras.
heterophylla, *Cogn. l. c.* 556.—Bras.
kraenzliniana, *Cogn. l. c.* 473.—Bras.
lentiginosa, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 446.—Am. cent.
limbata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 485 (= *Lepanthes marginata*).—Bras.
lindleyana, *Cogn. l. c.* 489.—Am. cent.; Bras.
linearifolia, *Cogn. l. c.* 573.—Bras.
lineolata, *Cogn. l. c.* 456 (= *Lepanthes lineolata*).—Bras.
lobiserrata, *Cogn. l. c.* 438 (= *Lepanthes lobisserrata*).—Bras.
lonchophylla, Cogn. l. c. 589 = Warmingii.
marginata, Cogn. l. c. 478 = striata, *Focke*.
marmorata, *Cogn. l. c.* 490 (= *Lepanthes marmorata*).—Bras.
melanopus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 443.—Am. cent.?
mentosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 400 (= *Lepanthes yauaperyensis*).—Bras.
microphyta, *Cogn. l. c.* 484 (= *Lepanthes microphyta*).—Bras.
minutiflora, *Cogn. l. c.* 564 (non S. Wats.).—Bras.
modesta, *Cogn. l. c.* 449 (= *Lepanthes modesta*).—Bras.
Mouraei, *Cogn. l. c.* 580.—Bras.
myriantha, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 445.—Am. cent.
nectarifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 560.—Bras.
ophiantha, Cogn. l. c. 522 = ophicephala.
osmosperma, *Cogn. l. c.* 563.—Bras.
pellifeloidis, *Cogn. l. c.* 515 (= *Lepanthes pellifeloides*).—Bras.
pluriflora, *Cogn. l. c.* 492 (= *Lepanthes plurifolia*).—Bras.
popayanensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—N. Granat.
Pristis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 443.—N. Granat.
pterophora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 583.—Bras.
pulvinata, *Cogn. l. c.* 563.—Bras.
purpureo-violacea, *Cogn. l. c.* 405.—Bras.
quadridentata, *Cogn. l. c.* 454 (= *Lepanthes quadridentata*).—Bras.
quartzicola, *Cogn. l. c.* 581 (= *Lepanthes quartzicola*).—Bras.
racemosa, *Cogn. l. c.* 554.—Bras.
ramphastorhyncha, *Cogn. l. c.* 458 (= *Lepanthes ramphastorhyncha*).—Bras.
recurvipetala, *Cogn. l. c.* 439 (= *Lepanthes recurvipetala*).—Bras.
renipetala, *Cogn. l. c.* 504 (= *Lepanthes renipetala*).—Bras.
rigidula, *Cogn. l. c.* 572.—Bras.
Rodriguesii, *Cogn. l. c.* 538.—Bras.
rufa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 192.—Mexic.
sarcopetala, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 516 (= *Lepanthes sarcopetala*).—Bras.

PLEUROTHALLIS:—

sibatensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 445.—N. Granat.

simmleriana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 274.—Am. cent.

stenophylla, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 442.—N. Granat.

striata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 457 (=*Lepanthes striata*).—Bras.

strobilifera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 440.—N. Granat.

sylvatica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 455 (=*Lepanthes nemorosa*).—Bras.

tabacina, *Cogn. l. c.* 517 (=*Lepanthes tabacina*).—Bras.

tenera, *Cogn. l. c.* 407 (=*Lepanthes tenera*).—Bras.

tetrapetala, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 446.—N. Granat.

trachytheca, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 444.—N. Granat.

trialata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 500 (=*Lepanthes tricarinata*).—Bras.

tricolor, *Cogn. l. c.* 493 (=*Lepanthes tricolor*).—Bras.

Tunguraguae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 439.—Ecuador.

umbrosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 468 (=*Lepanthes umbrosa*).—Bras.

unilateralis, *Cogn. l. c.* 592 (=*Lepanthes secunda*).—Bras.

urosepala, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 442.—N. Granat.

PLOCOGLOTTIS, Blume (Orchid.).

foetida, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 319.—Penins. Mal.

PLUCHEA, Cass. (Compos.).

imbricata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 108.—Am. sept.

longifolia, *Nash, l. c.*—Am. sept.

suaveolens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 168 = P. Quitoc.

PLUMERIA, Tourn. (Apocyn.).

bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 387.—Ind. occ.

Krugii, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

portoricensis, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

POA, Linn. (Gramin.).

acutiglumis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 4.—Am. bor.

alpicola, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 47.—Am. bor.

amabilis, Linn. Sp. Pl. 68 = Eragrostis tenella.

araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 171.—Chili.

argentina, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 584.—Patag.

asthenes, Roem. & Schult. Syst. ii. 574 = Leptochloa chinensis.

Atherstonei, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 713.—Afr. austr.

atropidiformis, *Hack. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 224.—Reg. Magell.

atropurpurea, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 53.—Calif.

atroviridis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3843 A = Eragrostis elegantula, *Steud.*

attenuata, *Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt.* 9.—Asia.

bidentata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 713.—Afr. austr.

Blytti, *Lindeb. in Bot. Notiser*, 1898, 154.—Scand.

Borchersi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 172.—Chili.

Borreri, Hook. & Arn. Brit. Fl. ed. VIII. 549 = Atropis Borreri.

brevifolia, Kunth, Rév. Gram. i. 111 = Eleusine brevifolia.

brevipaniculata, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 2.—Am. bor.

Brownei, Kunth, Rév. Gram. i. 112 = Eragrostis elongata, *Jacq.*

callosa, *Stapf, in Kew Bull.* 1899, 116.—N. Guin.

capensis, Steud. in Flora, 1829, 488 = Eragrostis curvula.

capillarifolia, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Calif.

capillaris, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 51 (non aliorum).—Calif.

chariis, Schult. Mant. ii. 314 = Eragrostis elegantula, *Steud.*

chinensis, Burm. f. Fl. Ind. 27 = Leptochloa uniflora.

chinensis, Linn. Sp. Pl. 69 = Leptochloa chinensis.

POA:—

cilianensis, All. Fl. Pedem. ii. 246 = Eragrostis major.

Collinsii, *T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 589.—N. Zel.

contracta, Retz. Obs. iii. 11 = Leptochloa filiformis.

corana, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3850 F = Eragrostis interrupta.

curvata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3849 = Eragrostis tremula.

decumbens, Schrad. Fl. Germ. 305 = Danthonia decumbens.

despiciens, Link, Enum. Hort. Berol. i. 88 = Eragrostis tenella.

dialytostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 167.—Chili.

diandra, Roxb. Fl. Ind. i. 337 = Eragrostis interrupta.

diaphora, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. 69 = persica.

diarrhena, Schult. Mant. ii. 616 = Eragrostis interrupta.

dimorphantha, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, 20.—Marocc.

duplociliaris, Roxb. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 313 = Eragrostis ciliata.

elegantula, Kunth, Rév. Gram. i. 114 = Eragrostis gangetica.

epilis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 5.—Am. bor.

Falconeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 342.—Ind. or.

Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 711.—Japon.

filiformis, Thunb. Prod. 21 = Eragrostis curvula.

flexuosa, *Wahlb. Fl. Carp.* 22 (non aliorum).—Reg. temp. et arct. bor.

fuegiana, *Hack. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 225 (=*Festuca fuegiana*).—Reg. Magell.

gammieana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 345.—Ind. or.

gangetica, Roxb. Fl. Ind. i. 341 = Eragrostis gangetica.

glomerata, Thunb. Prodr. 22 = Tetrachne Dregei.

Grimburgii, *Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 12.—Corcyra.

Hackeli, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 760.—As. Min.

hakusanensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 709.—Japon.

Hanseni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 53.—Calif.

hirtiglumis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 343.—Ind. or.

hyemalis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3850 C = Eragrostis interrupta.

Ibari, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 170.—Patag.

imeretica, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 210.—Reg. Cauc.

incurva, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 6.—Am. bor.

incurvata, Rottl. ex Wall. Cat. n. 5014 = Eragrostis ciliata.

indica, Koen. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Neue Schr. iv. (1803) 194 = Eragrostis pilosa.

invaginata, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 6.—Am. bor.

japonica, Thunb. Fl. Jap. 51 = Eragrostis interrupta.

juncifolia, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 52.—Am. bor.

khasiana, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 343.—Ind. or.

lagopodioides, Kunth, Rév. Gram. i. 111 = Aeluropus villosus.

Laha, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3850 B = Eragrostis interrupta.

Laka, Stapf, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 317 = Eragrostis interrupta.

Leckenbyi, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 2.—Am. bor.

Leibergii, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 6.—Am. bor.

limosa, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 5.—Calif.

longepedunculata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 54.—Am. bor.

longiligula, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 3.—Am. bor.

longipila, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 46.—Am. bor.

malabarica, Klein, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 30, 360 = Leptochloa filiformis.

malabarica, Retz. Obs. v. 19 = Leptochloa chinensis.

massauensis, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. 143 = Aeluropus villosus.

Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 709.—Japon.

POA:—

maullinica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 164.—Chili.

maysorensis, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 299 = Leptochloa obtusiflora.

minimiflora, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2608.—N. Guin.

multiflora, Roxb. Fl. Ind. i. 338 = Eragrostis amabilis.

nudata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Am. bor.

nutans, Retz. Obs. iv. 19 = Eragrostis stenophylla.

occidentalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 50 (non Vasey).—Am. bor.

Olneyae, *Piper, in Erythea*, vii. 101.—Am. bor.

orthophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715.—N. Granat.

ovina, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 428 = Eragrostis stenophylla.

panicea, Retz. Obs. iii. 11 = Leptochloa filiformis.

papillosa, Schrad. in Goett. Gel. Anz. 1821, III. 2074 = Brizopyrum capense.

papuana, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2607.—N. Guin.

paradoxa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 864 = persica.

patagonica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 168.—Patag.

Phullica, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3829 C = Eragrostis pilosa.

planifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 366.—Am. austr.

planifolia, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 3 (non Kuntze).—Am. bor.

plumosa, Retz. Obs. iv. 20 = Eragrostis tenella.

polycolea, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 342.—Ind. or.

polymorpha, R. Br. Prod. 180 = Eragrostis elongata.

pratericola, Rydb. & Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 51 = arida.

procera, Roxb. Fl. Ind. i. 334 = Diplachne fusca.

pseudamabilis, Roxb. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 317 = Eragrostis amabilis.

pseudopratensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 340 (non aliorum).—Ind. or.

pseudopratensis, *Scribn. & Rydb. ex Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 531 (non aliorum).—Am. bor.

pycnantha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 165.—Chili.

racemosa, Thunb. Prod. 21 = Eragrostis chalcantha.

remotiflora, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, 22 (non Rupr.).—Graecia; Alger.

roxburghiana, Schult. Mant. ii. 314 = Eragrostis major.

royleana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 256 = annua.

rupicola, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 49.—Am. bor.

saxatilis, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Am. bor.

scabrifolia, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 310.—Am. bor.

scabriuscula, *T. A. Williams, in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* x. 4.—Am. bor.

schoenoides, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 166.—Chili.

secundaria, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 299 = Leptochloa chinensis.

soongarica, Boiss. Fl. Or. v. 611 = persica.

Spillmani, *Piper, in Erythea*, vii. 102.—Am. bor.

stachyodes, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 168.—Chili.

sterilis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 62 = attenuata, *Trin.*

subaristata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 171 (non Scribn.).—Chili.

subtilis, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1842, 532 = persica.

Telphulia, Ham. ex Wall. Cat. n. 5008 B = Eragrostis tenella.

tenella, R. Br. Prod. 181 = Eragrostis interrupta.

tenellula, Kunth, Enum. Pl. i. 338 = Eragrostis interrupta.

tenerrima, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 4.—Calif.

tenuifolia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 425 = Eragrostis tenuifolia.

tortuosa, Spreng. Syst. Veg. i. 345 = Eragrostis major.

trachyphylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715 (non Hack.).—N. Granat.

tremula, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 344 (non aliorum).—Ind. or.

Turneri, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 5.—Ins. Kurile.

POA:—
Uniolae, Schrad. in Goett. Gel. Anz. 1821, III. 2074 = Brizopyrum capense.
vaseyochloa, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Am. bor.
Villaroeli, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 169.—Chili.
viscosa, Retz. Obs. iv. 20 = Eragrostis tenella.
yaganica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 90.—Fuegia.

POAGROSTIS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 760 (1900). *GRAMINEAE.*
pusilla, *Stapf, l. c.*—Afr. austr.

PODAGRARIA, Hall. = **Aegopodium**, Knaut (Umbell.).
erratica, Bub. Fl. Pyren. ii. 351 = A. Podagraria.

PODANDRIA, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 205 (1898). *ORCHIDEAE.*
macrandra, *Rolfe, l. c.* 206.—Afr. trop.

PODANTHUM, Boiss. = **Phyteuma**, Linn. (Campan.).
serbicum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 288.—Eur.

PODOCARPUS, L'Hérit. (Conif.).
celebica, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 39.—Celebes.
celebica, *Warb. in Monsunia*, i. 192 (non Hemsl.).—Celebes.
sutchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 265.—China.

PODOCHILUS, Blume (Orchid.).
albus, *Schlechter, in Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 36 (= *Appendicula alba*).—Java.
anceps, *Schlechter, l. c.* 33 (= *Appendicula anceps*).—Malaya.
angustifolius, *Schlechter, l. c.* 28 (= *Appendicula angustifolia*).—Java.
appendiculatus, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 2.—Ins. Amboin.
brachiatus, *Schlechter, in Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 38.—Java.
buxifolius, *Schlechter, l. c.* 52 (= *Appendicula buxifolia*).—Malaya.
calcaratus, *Schlechter, l.c.* 41 (= *Appendicula calcarata*).—Borneo.
callosus, *Schlechter, l. c.* 62 (= *Appendicula callosa*).—Malaya.
carnosus, *Schlechter, l. c.* 29 (= *Appendicula carnosa*).—Java.
congener, *Schlechter, l. c.* 40 (= *Appendicula congenera*).—Java.
congestus, *Schlechter, l. c.* 59 (= *Appendicula congesta*).—Borneo.
cornutus, *Schlechter, l. c.* 34 (= *Appendicula bifaria*).—As. or. austr.
cristatus, *Schlechter, l. c.* 43 (= *Appendicula cristata*).—Malaya.
distichus, *Schlechter, l. c.* 57 (= *Appendicula disticha*).—N. Guin.
elegans, *Schlechter, l. c.* 45 (= *Appendicula elegans*).—Malaya.
floribundus, *Schlechter, l. c.* 58.—Borneo.
Hasseltii, *Schlechter, l. c.* 61 (= *Appendicula Hasseltii*).—Malaya.
Hellwigii, *Schlechter, l. c.* 22.—N. Guin.
hexandrus, *Schlechter, l. c.* 27 (= *Appendicula Koenigii*).—Ind. or.
lancifolius, *Schlechter, l. c.* 51 (= *Appendicula lancifolia*).—Penins. Mal.
lucidus, *Schlechter, l. c.* 37 (= *Appendicula lucida*).—Penins. Mal.
micranthus, *Schlechter, l. c.* 39 (= *Appendicula micrantha*).—Ins. Philipp.
muricatus, *Schlechter, l. c.* 64 (= *Appendicula muricata*).—Java.
ovalis, *Schlechter, l. c.* 54.—Sumatra; Java.
pauciflorus, *Schlechter, l. c.* 30 (= *Appendicula pauciflora*).—Java.
pendulus, *Schlechter, l. c.* 48 (= *Appendicula pendula*).—Malaya.
penicillatus, *Schlechter, l. c.* 50 (= *Appendicula penicillata*).—N. Guin.
philippinensis, *Schlechter, l. c.* 49.—Ins. Philipp.
purpurascens, *Schlechter, l. c.* 46 (= *Appendicula purpurascens*).—Java.

PODOCHILUS:—
ramosus, *Schlechter, in Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 53 (= *Appendicula ramosa*).—Java.
reflexus, *Schlechter, l. c.* 31 (= *Appendicula reflexa*).—Malaya.
rupestris, *Schlechter, l. c.* 56 (= *Appendicula rupestris*).—Penins. Mal.
tortus, *Schlechter, l. c.* 60 (= *Appendicula torta*).—Malaya.
undulatus, Schlechter, l. c. 42 = unciferus.
Vieillardii, *Schlechter, l. c.* 32 (= *Appendicula Vieillardi*).—N. Caled.
xytriophorus, *Schlechter, l. c.* 47 (= *Appendicula xytriophora*).—Malaya.

PODOCOMA, Cass. (Compos.).
Reineckii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 171.—Bras.

PODOGYNIUM, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 173, descr. *LEGUMINOSAE.*
capparidaceum, *Taub. l. c.*, descr.—Afr. trop.

PODONOSMA, Boiss. = **Onosma**, Linn. (Borag.).
Sintenisii, Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlviii. 609.—Syria.

PODOSEMUM, Desv. (Gramin.).
angustum, Nees, Fl. Afr. Austr. 147 = Agrostis lachnantha.

PODOSTEMMA, Greene, Pittonia, iii. (1897) 235. *ASCLEPIADACEAE.*
australe, *Greene, l. c.* 238.—Am. cent.
Emoryi, *Greene, l. c.* 237.—Am. bor.
Helleri, *Greene, l. c.* 236.—Am. bor.
leoninum, *Greene, l. c.* 237.—Mexic.
Lindheimeri, *Greene, l. c.* 236 (= *Asclepias Lindheimeri*).—Am. bor.
longicornu, *Greene, l. c.* (= *Asclepias longicornu*).—Calif.
nyctaginifolium, *Greene, l. c.* 237 (= *Asclepias nyctaginifolia*).—Calif.

PODOSTEMON, Michx. (Podostem.).
glaziovianus, *Warming, in Overs. Danske Vid. Selsk.* Ser. VI. ix. 130.—Bras.
osteniana, *Warming, l. c.* 127.—Urug.
rutifolius, *Warming, l. c.* 129.—Bras.
uruguayensis, *Warming, l. c.* 133 (non Web.).—Urug.

POECILOCHROMA, Miers (Solan.).
albescens, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 91.—Bolivia.

POGA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1254. ~~PHYTOLACCACEAE.~~
oleosa, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

POGOCYBE, Pierre, Fl. Cochinch. t. 392 B (1899). *LEGUMINOSAE.*
entadoides, *Pierre, l. c.*—Cochinch.

POGONARTHRIA, Stapf, ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 232 (1899); et in Hook. Ic. Pl. t. 2610 (1899). *GRAMINEAE.*
falcata, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 232.—Afr. trop. et austr.

POGONATHERUM, Beauv. (Gramin.).
crinitum, *Kunth, Enum. Pl.* i. 478.—As. or. austr.
refractum, Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 239 = crinitum.

POGONIA, Juss. (Orchid.).
Buchanani, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 187.—Afr. trop.
falcata, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 129.—Reg. Himal.
foliosa, *King & Pantl. l. c.* lxvi. 598.—Burma.
hookeriana, *King & Pantl. l. c.* lxv. 129.—Reg. Himal.
khasiana, *King & Pantl. l. c.* lxvi. 597.—Burma.
lanceolata, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 267.—China.
parishiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 597.—Burma.
pleionoides, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 267.—China.
prainiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 129.—Reg. Himal.

POGONIA:—
shirensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 187.—Afr. trop.
yunnanensis, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 419.—China.

POGONOPSIS, J. & C. Presl = **Pogonatherum**, Beauv. (Gramin.).
tenera, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 333 = Pogonath. crinitum.

POGONOSPERMUM, Hochst. = **Monechma**, Hochst. (Acanth.).
ciliare, Hochst. in Flora, 1844, Beil. 6 = M. hispidum.
hispidum, Hochst. l. c. = M. hispidum.

POGOSTEMON, Desf. (Labiat.).
formosanus, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2440.—Formosa.

POIKILACANTHUS, Lindau (Acanth.).
oncodes, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 48.—Bras.
phyllocalyx, *Lindau, l. c.*—Bras.

POITEA, Vent. (Legum.).
glycyphylla, Urb. Symb. Antill. i. 321 = P. Campanilla.
longiflora, *Urb. l. c.* ii. 290.—Ind. occ.
multiflora, *Urb. l. c.* 291 (= *Vilmorinia multiflora*).—Ind. occ.

POLANISIA, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
chrysantha, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II. 161 = C. chrysantha.
diandra, Th. Dur. & Schinz, l. c. 162 = C. diandra.
didynama, Th. Dur. & Schinz, l. c. = C. didynama.
foliosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. = C. foliosa.
kalachariensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App. III. 92.—Afr. austr.
luederitziana, Schinz, l. c. 93.—Afr. austr.
Paxii, Schinz, l. c.—Afr. austr.
ramosissima, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II. 163 = C. ramosissima.
semitetrandra, Th. Dur. & Schinz, l. c. = C. semitetrandra.

POLEMONIUM, Tourn. (Polemon.).
amoenum, *Piper, in Erythea*, vii. 174.—Am. bor.
bicolor, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 262.—Am. bor.
biflorum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 202 = Phlox biflora.
crassifolium, Kuntze, l. c. 203 = Gilia crassifolia.
Drummondii, Kuntze, l. c. = Phlox Drummondii.
elegans, *Greene, Pittonia*, iii. 305.—Am. bor.
eximium, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Haydeni, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 353.—Am. bor.
incisum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = Gilia incisa.
laciniatum, Kuntze, l. c. = Gilia laciniata.
luteum, *Greene, Pittonia*, iv. 100.—Am. bor.
mellitum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 354.—Am. bor.
Morenonis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = Collomia gracilis.

POLIOTHYRSIS, Oliv. (Bixac.).
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 476.—Celebes.
Stapfii, *Koord. l. c.* 474.—Celebes.

POLLINIA, Trin. (Gramin.).
birmanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 113.—Ind. or.
calochloa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 167.—N. Guin.
delicatula, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 117.—Ind. or.
eriopoda, Hance, in Journ. Bot. 1866, 173 = Ischaemum angustifolium.
Gryllus, Spreng. Pugill. ii. 10 = Andropogon Gryllus.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 136.—Afr. trop.
pallida, Roem. & Schult. Syst. ii. 829 = Andropogon Gryllus.
pleiostachya, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 168.—N. Guin.
sericea, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 59.—Afr. trop.
Stapfii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 115.—Ind. or.
tristachya, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 368 = ciliata.
villosa, Munro, ex Benth. Fl. Hongk. 420 = quadrinervis.

POLYALTHIA, Blume (Anonac.).
Bembau, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; *et in Ic. Bogor.* i. 103 (= *Monoon Bemban*).—Sumatra.

POLYALTHIA:—
brevipedunculata, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; *et in Ic. Bogor.* i. 104, t. 64.—Hort.
canangioides, *Boerl. l. c.* 19; *et l. c.* 105 (= *Monoon canangioides*).—Malaya.
ceramensis, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106, t. 65.—Arch. Mal.
chlorantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 316.—N. Guin.
costigera, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106 (= *Monoon costigerum*).—Sumatra.
elegans, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 316.—N. Guin.
gamopetala, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 338.—Celebes.
Gerrardi, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 37 (= *Unona Gerrardi*).—Madag.
glauca, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; *et in Ic. Bogor.* i. 104 (= *Monoon glaucum*).—Java.
greveana, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 37 (= *Unona greveana*).—Madag.
Havilandi, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 107, t. 66.—Borneo.
littoralis, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 1899, 34; *et in Ic. Bogor.* 145 (= *Guatteria littoralis*).—Java.
micrantha, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106, t. 67 (= *Uvaria micrantha*).—Burma; Malaya.
nervosa, *Boerl. l. c.* 108, t. 68.—Borneo.
Pondok, *Boerl. l. c.* 107 (= *Guatteria Pondok*).—Sumatra.
pulchrinervia, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 20; *et in Ic. Bogor.* i. 106.—Borneo.
siamensis, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. t. 69.—Siam.
spathulata, *Boerl. l. c.* 108 (= *Guatteria spatulata*).—Sumatra.
Teysmannii, *Boerl. l. c.* 107 (= *Guatteria Teysmanni*).—Sumatra.

POLYASTER, Hook. f. (Rutac.).
Ehrenbergii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 26.—Mexic.
paucijugus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 331.—Am. cent.

POLYCARENA, Benth. (Scrophul.).
filiformis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. trop.
parvula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 181.—Afr. austr.

POLYCEPHALIUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 227; et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 484. *OLACACEAE.*
lobatum, *Pierre, in Engl. l. c.* 485 (= *Chlamydocarya lobata*).—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.* 227; *l. c.* 484.—Afr. trop.

POLYCERATOCARPUS, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 56. *ANONACEAE.*
Scheffleri, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.

POLYCODIUM, Rafin. = **Vaccinium**, Linn. (Vaccin.).
caesium, Greene, Pittonia, iii. 325 = V. caesium.
elevatum, Greene, l. c. 324 = V. stamineum.
floridanum, Greene, l. c. 325 = V. stamineum.
oblongum, Greene, l. c. = V. oblongum, *Greene*.
revolutum, Greene, l. c. = V. revolutum.
stamineum, Greene, l. c. 324 = V. stamineum.

POLYECHMA, Hochst. (Acanth.).
abyssinicum, Nees, in DC. Prod. xi. 83 = Hemigraphis abyssinica.

POLYGALA, Tourn. (Polygal.).
acutiappendiculata, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 236.—Reg. Argent.
africana, *Chod. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 335.—Afr. trop.
alata, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 200.—Afr. trop.
albicoma, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* ix. (*Fl. Urug.*) 69.—Urug.
bakeriana, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
bangiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Bolivia.
bicarunculata, *Chod. l. c.* 236.—Reg. Argent.
bicornis, *Chod. l. c.*—Afr. austr.
britteniana, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 198.—Afr. trop.
Cabrae, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 838.—Afr. trop.
chodatiana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 45 (non A. W. Bennett).—Afr. trop.
clarkeana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 235.—Afr. trop.
congoënsis, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 295, nomen.—Afr. trop.
Dodii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 24.—Afr. austr.

POLYGALA:—
Edmundi, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 911.—Afr. trop.
Elliotii, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
fallax, *Hayek, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 43 (non aliorum).—Afr. austr.
Forbesii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Hong Kong.
Gerrardi, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 417.—Afr. trop.
hecatantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 331.—Ind. occ.
Latouchei, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 206.—China.
Lewtonii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 140.—Am. bor.
lindmaniana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 238.—Am. austr.
lonchophylla, *Greene, Pittonia*, iii. 307.—Am. bor.
macroneura, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 418.—Reg. Himal.
macrostachya, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234 (non Hassk.).—Peruv.
natalensis, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
paradoxa, *Chod. l. c.* 235.—Am. austr.
pauciflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 164 (non Thunb.).—Afr. austr.
polygoniflora, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 200.—Afr. trop.
pseudolaurifolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 235.—Reg. Argent.
pubescens, *Chod. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 331 (non aliorum).—Am. cent.
ruwenzoriensis, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
sinuata, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Bras.
socotrana, *Chod. l. c.* 236.—Socotra.
sumatrana, *Chod. l. c.* 234.—Sumatra.
texensis, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 451.—Am. bor.
tristis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 903.—Afr. trop.
Ulei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 441.—Bras.
uncinata, *Wright, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 429 (non aliorum).—Ind. occ.
wittrockiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 239.—Am. austr.
Woodei, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
Zahlbruckneri, *Hayek, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 45.—Afr. austr.

POLYGONATUM, Tourn. (Liliac.).
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 247.—China.
Periballanthus, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898 (228) = involucratum.

POLYGONELLA, Michx. (Polygon.).
macrophylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 407.—Am. bor.

POLYGONUM, Tourn. (Polygon.).
constans, *Cummins, in Kew Bull.* 1896, 20.—Reg. Himal.
fallax, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 46.—Bolivia.
Macounii, *J. K. Small, ex Macoun, Fur Seals N. Pacif.* iii. 570.—Am. bor.
nyikense, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 280.—Afr. trop.
pamiricum, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VIII. iv. no. 4, 98.—Turkestan.
paronychioides, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 130 (non C. A. Mey.).—Am. bor.
Spaethii, *Damm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 378.—China.
tibeticum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2471.—Tibet.
tibeticum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 428 (non Hemsl.).—Tibet.
unifolium, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 129.—Am. bor.

POLYMNIA, Linn. (Compos.).
arborea, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 33.—Ecuador.
laevigata, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 278.—Am. bor.
microcephala, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 33.—Ecuador.

POLYOSMA, Blume (Saxifr.).
coriacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 300.—Penins. Mal.

POLYOSMA:—
laetevirens, *Griff. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 409; *et ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 303.—Penins. Mal.
longepedicellata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 305.—Sumatra.
longipes, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 391.—Java.
mutabilis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 409 = laetevirens.
parviflora, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 300.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 304.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 301.—Penins. Mal.

POLYOTHYRIS, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 474, sphalm. = **Poliothyrsis**, Oliv. (Bixac.).

POLYOTHYRSIS, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 476, sphalm. = **Poliothyrsis**, Oliv. (Bixac.).

POLYPOGON, Desf. (Gramin.).
Adscensionis, Trin. Agrost. ii. 11 = tenuis.
brachyatherus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 8.—Chili.
breviaristatus, *R. Phil. l. c.*—Chili.
demissus, Steud. Syn. Pl. Gram. 422 = littoralis.
fugax, Nees, ex Steud. l. c. 184 = monspeliensis.
nepalensis, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 378 = monspeliensis.
purpurascens, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 9.—Chili.
strictus, Nees, in Linnaea, vii. 297 = tenuis.
tenuis, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot.* 22.—Afr. austr.; Ins. Ascens.
zeylanicus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 183 = monspeliensis.

POLYSCIAS, Forst. (Aral.).
Elliotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 246.—Afr. trop.
Hildebrandti, *Harms, l. c.* (= *Panax Hildebrandti*).—Madag.
javanica, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 13.—Java.
malosana, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 20.—Afr. trop.
nossibiensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 247 (= *Panax nossibiensis*).—Madag.
polybotrya, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 20.—Afr. trop.
Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 245.—Afr. trop.
Reineckei, *Harms, l. c.* xxv. 663.—Ins. Samoa.
Stuhlmannii, *Harms, l. c.* xxvi. 244.—Afr. trop.

POLYSTACHYA, Hook. (Orchid.).
bituberculata, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 165.—Afr. trop.
bracteosa, Lindl. Bot. Reg. 1840, Misc. 48 = affinis.
calluniflora, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 166.—Afr. trop.
carnea, Brongn. in Fl. des Serres, xv. 45 = rhodoptera.
confusa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 123.—Afr. trop.
crassifolia, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 277, nomen.—Afr. trop.
dolichophylla, *Schlechter, l. c.*, nomen.—Afr. trop.
galericulata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 111 = laxiflora.
heckmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 371.—Afr. trop.
Holstii, *Kraenzl. in Xenia Orch.* iii. 150, t. 287.—Afr. trop.
hypocrita, Reichb. f. in Gard. Chron. 1881, II. 685 = tessellata.
ionocharis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 371.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 124.—Afr. trop.
Kraenzlinii, *Rolfe, l. c.* 112.—Afr. trop.
lehmbachiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 166.—Afr. trop.
Mannii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 117.—Afr. trop.
melanantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 341.—Afr. trop.
micropetala, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 131.—Afr. trop.
paniculata, *Rolfe, l. c.* 113.—Afr. trop.
penangensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 344.—Penins. Mal.
plehniana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 277, nomen.—Afr. trop.

POLYSTACHYA:—
pleistantha, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, I. 118.—Borneo ?
quinqueloba, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 141.—Hort.
Rendlei, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 112.—Afr. trop.
Ridleyi, *Rolfe, l. c.* 119.—Afr. trop.
rolfeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
siamensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 343.—Penins. Mal.
singapurensis, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
sulfurea, Brongn. in Fl. des Serres, xv. 45 = pyramidalis.
supfiana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 278, nomen.—Afr. trop.
tessellata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 130.—Afr. trop.
trigonochila, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
usambarensis, *Schlechter, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 250.—Afr. trop.
Victoriae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 165.—Afr. trop.
villosa, *Cogn. in Journ. des Orch.* vii. 139 (non Rolfe).—Madag.
zanguebarica, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 115.—Afr. trop.

POLYSTEMONANTHUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 197 (1897); et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 273. *LEGUMINOSAE.*
Dinklagei, *Harms, l. c.*; *l. c.* 274.—Afr. trop.

POLYTOCA, R. Br. (Gramin.).
barbata, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 102.—Ind. or.
punctata, *Stapf, l. c.*—Ind. or.

POLYXENA, Kunth (Liliac.).
angustifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 419.—Afr. austr.
Burchellii, *Baker, l. c.* 420.—Afr. austr.
comata, *Baker, l. c.* 419.—Afr. austr.
marginata, *Baker, l. c.* 420.—Afr. austr.
rugulosa, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
uniflora, *Baker, l. c.* 421.—Afr. austr.

POMETIA, Forst. (Sapind.).
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 443.—Penins. Mal.
gracilis, *King, l. c.* 441.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 443.—Penins. Mal.

PONAEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 195 (1900) = **Carpesium**, Linn. (Compos.).
cernua, Bub. l. c. 196 = C. cernuum.

PONERA, Lindl. (Orchid.).
australis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 9.—Bras.

PONTIA, Bub. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).
alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 219 = C. alpinum.
Barrelieri, Bub. l. c. = C. coronopifolium.
corymbosa, Bub. l. c. 220 = C. corymbosum.
grandis, Bub. l. c. 222 = C. maximum.
heterophylla, Bub. l. c. 224 = C. heterophyllum.
Matricaria, Bub. l. c. 220 = C. Parthenium.
montana, Bub. l. c. 224 = C. montanum.
pallens, Bub. l. c. 223 = C. pallens.
vulgaris, Bub. l. c. 221 = C. Leucanthemum.

POPOWIA, Endl. (Anonac.).
cyanocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 317.—N. Guin.

POPULUS, Linn. (Salicac.).
Fargesii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1896, 280.—China.

POROPHYLLUM, Vaill. (Compos.).
brachypodum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 341.—Mexic.
macrolepideum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 69.—Bras.
Millspaughii, *Robinson, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 109.—Am. cent.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 32.—Mexic.
nutans, *Robinson & Greenm. l. c.* 31.—Mexic.
oblanceolatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 64.—Bolivia.

POROPHYLLUM:—
oppositifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 168 (non DC.).—Bras.
pausodynum, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 32.—Mexic.
Porophyllum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 168 = ruderale.

PORPAX, Lindl. = **Eria**, Lindl. (Orchid.).
fibuliformis, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 114 = E. fibuliformis.
Meirax, King & Pantl. l. c. = E. Meirax.

PORPHYRANTHUS, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 367. *BURSERACEAE.*
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

PORPHYROGLOTTIS, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1896) 290. *ORCHIDEAE.*
Maxwelliae, *Ridley, l. c.*—Borneo.

PORTERELLA, Torr. = **Laurentia**, Neck. (Campan.).
eximia, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 270.—Am. bor.

PORTULACA, Linn. (Portul.).
coronata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 126.—Am. bor.
elongata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 7.—Bolivia.
Erythraeae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 171.—Afr. trop.
hereroensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no 20, 18.—Afr. trop.
plano-operculata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 16.—Reg. Argent.

POSOQUERIA, Aubl. (Rubiac.).
calantha, *Barb. Rodr. Pl. Nov. Rio*, v. 5.—Bras.
multiflora, Lemaire, Illustr. Hortic. xvi. t. 597 = macropus.

POTAMOGETON, Tourn. (Naiad.).
alpinus, *Balb. Misc.* 13.—Afr. austr.
americanus, *Cham. in Linnaea*, ii. 226.—Afr. austr.
cognatus, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 317.—Hybr.
cymatodes, *Aschers. & Graebn. l. c.* 337.—Hybr.
fallax, *Aschers. & Graebn. l. c.* 330.—Hybr.
Heidenreichii, *Aschers. & Graebn. l. c.* 327.—Hybr.
huillensis, Welw. ex Schinz, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. i. 61 = javanicus.
natans, Thunb. Prod. 32 = americanus.
Richardi, *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 194, 292.—Afr. trop. et austr.
Seemenii, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 335.—Hybr.
Thunbergii, Cham. in Linnaea, ii. 221 = americanus.

POTENTILLA, Linn. (Rosac.).
ashlandica, *Greene, Pittonia*, iii. 248.—Am. bor.
atrorubens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 11.—Am. bor.
atrovirens, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 95.—Am. bor.
bicrenata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 431.—Am. bor.
bruginoensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
candida, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 6.—Am. bor.
cascadensis, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 109.—Am. bor.
ciliata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 175 (non Greene).—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 115.—Am. bor.
concinnaeformis, *Rydb. l. c.* 54.—Am. bor.
Convallaria, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 249.—Am. bor.
ctenophora, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 75.—Am. bor.
daonensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 56.—Tyrol.
decurrens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 396.—Am. bor.
etomentosa, *Rydb. l. c.* 1897, 8.—Am. bor.
filicaulis, *Rydb. l. c.* 2.—Am. bor.
Gardae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 56.—Austria.
glabrella, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 94.—Am. bor.

POTENTILLA:—
glomerata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 480.—Am. bor.
gracilipes, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 392.—Am. bor.
Hanseni, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Calif.
Hellwegeri, *J. Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 62.—Austria.
isosepala, *Blocki, in Allg. Bot. Zeitschr.* ii. 115.—Galicia.
jucunda, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 32.—Am. bor.
lactea, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Calif.
lancifolia, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
lateriflora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 261.—Am. bor.
litoralis, *Rydb. l. c.* 264.—Am. bor.
longipedunculata, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 39.—Am. bor.
loppiensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 59.—Austria.
luteosericea, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 101.—Calif.
Macounii, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Mandoni, *Foucaud, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 90.—Corsica.
Mezzocoronae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
michoacana, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 44.—Mexic.
micrandra, *Koehne, in Dendr. Ges.* 1896, 48.—Japon. ?
millefolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 433.—Am. bor.
minutifolia, *Rydb. l. c.* 399.—Am. bor.
monidensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 266.—Am. bor.
multisecta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 397.—Am. bor.
Noarnae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58.—Austria.
oaxacana, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 206.—Mexic.
oblanceolata, *Rydb. l. c.* 53.—Mexic.
ovina, *Macoun, in Canad. Rec. Sci.* vi. 464.—Am. bor.
pacifica, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 179.—Am. bor.
Pari, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
pectinisecta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 7.—Am. bor.
permixta, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 8 (non Schur).—Eur.
pinnatisecta, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyom.* 104.—Am. bor.
Ponale, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 59.—Austria.
pseudorupestris, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 250.—Am. bor.
pseudosericea, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 98.—Am. bor.
quinquefolia, *Rydb. l. c.* 76.—Am. bor.
ramulosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 430.—Am. bor.
reflexa, *Greene, Pittonia*, iii. 19.—Calif.
rhomboidea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 248.—Am. bor.
Rivae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58.—Tyrol.
rosulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 542.—Am. bor.
rupincola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 256.—Am. bor.
saximontana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 399.—Am. bor.
semipinnata, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 103.—Bulgar.
Sierrae-Blancae, *Wooton & Rydb. ex Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 57.—Am. bor.
staminea, *Rydb. l. c.* 67.—Mexic.
subcoriacea, *Rydb. l. c.* 63.—Mexic.
subjuga, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 397.—Am. bor.
tenerrima, *Rydb. l. c.* 398.—Am. bor.
valida, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Am. bor.
vasonis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
virgulata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 265.—Am. bor.
viridescens, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 69.—Am. bor.

POTENTILLA:—
viscida, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58. —Tyrol.
wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 32.—Am. bor.

POTHOS, Linn. (Arac.).
Balansae, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 3.—Cochinch.
Hellwigii, *Engl. l. c.* 2.—N. Guin.
sumatranus, *Engl. l. c.* 5 (non Miq.).—Sumatra.
Warburgii, *Engl. l. c.* 2.—Formosa.

POTTINGERIA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. (1898) 291. *SAXIFRAGACEAE.*
acuminata, *Prain, l. c.*—Ind. or.

POULSENIA, Eggers, in Bot. Centralbl. lxxiii. (1898) 65. *URTICACEAE.*
aculeata, *Eggers, l. c.* 66.—Ecuador.

POUPARTIA, Comm. (Anacard.).
Fordii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2557.—China.

POURTHIAEA, Decne. (Rosac.).
parvifolia, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 389.—China.
variabilis, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 76 (= *Photinia variabilis*).—China ; Japon.

POUTERIA, Aubl. (Sapot.).
Lucuma, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 195 = Lucuma obovata.
splendens, Kuntze, l. c. = Lucuma valparadisaea.

POUZOLZIA, Gaudich. (Urtic.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 992.—Afr. trop.
denudata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 54.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 53.—Afr. trop.
Erythraeae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 146.—Afr. trop.
golungensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 993.—Afr. trop.
huillensis, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 612, nomen.—Celebes.
papuana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 294.—N. Guin.
parasitica, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 145 = procridioides.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 476.—Mexic.

POZOA, Lag. = **Azorella**, Lam. (Umbell.).
exigua, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 87 = A. exigua.
Haastii, Hook. f. l. c. 88 = A. Haastii.
ranunculacea, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 129 = A. dichopetala.

PRANGOS, Lindl. (Umbell.).
bucharica, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 179.—Turkestan.
heptaptera, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 174 = colladonioides.
tschimganica, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 180.—Turkestan.

PRASOPHYLLUM, R. Br. (Orchid.).
fuscoviride, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiv. 163.—Austral.

PREMNA, Linn. (Verben.).
colorata, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 833 = Vitex sulphurea.
ferruginea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 172 = Moschosma multiflorum.
longipes, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 288 = Hoslundia opposita.
macrodonta, *Baker, l. c.* 291.—Afr. trop.
Milnei, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
nervosa, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 186.—Java.
oligotricha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 292.—Afr. trop.
polita, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 832.—Afr. trop.
rotundifolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 182.—Java.
somaliensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 289.—Afr. trop.

PRESCOTTIA, Lindl. (Orchid.).
crassicaulis, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 501.—Ecuador.

PRESTONIA, R. Br. (Apocyn.).
speciosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 435.—Am. cent.

PREUSSIELLA, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 267 (1897). *MELASTOMACEAE.*
kamerunensis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

PREVOSTEA, Choisy = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
Cabrae, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 70.—Afr. trop.
capitata, Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 36. —Bras.
micrantha, Damm. l. c. 57.—Afr. trop.
Poggei, Damm. ex Hallier f. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 88.—Afr. trop.
sphaerocephala, Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 37.—Bras.

PRIMULA, Linn. (Primul.).
barbicalyx, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 24.—China.
eximia, *Greene, Pittonia*, iii. 251.—Am. bor.
Hookeri, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 142 (non Watt).—As. Min.
leucophylla, *Pax, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 194.—Austria.
longipes, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 141. —As. Min.
maccalliana, *Wieg. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 339. —Am. bor.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 251.—Am. bor.
mucronata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 520.—China.
Ruprechti, *Kusnez. ex Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, iv. 386.—Reg. Caucas.
serra, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 319.—Am. bor.
tenuis, *Small, l. c.* 320.—Am. bor.

PRINGLEOCHLOA, Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xxi. (1896) 137. *GRAMINEAE.*
stolonifera, *Scribn. l. c.* 138.—Mexic.

PRINTZIA, Cass. (Compos.).
densifolia, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 488.—Afr. austr.

PRIONANTHIUM, Desv. (Gramin.).
Ecklonii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 455.—Afr. austr.
pholiuroides, *Stapf, l. c.* 456.—Afr. austr.

PRIONITIS, Adans. (Umbell.).
pastinacifolia, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 410 = Carum latifolium.

PRIONOPHYLLUM, C. Koch = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.).
maritimum, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 542 = D. maritima.

PRIONOSCIADIUM, S. Wats. (Umbell.).
acuminatum, *Robinson, ex Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 149.—Am. cent.
cuneatum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
dissectum, *Coult. & Rose, l. c.* 151.—Am. cent.
durangense, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
filifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 152.—Am. cent.
macrophyllum, *Coult. & Rose, l. c.* 151.—Am. cent.
Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.* 149.—Am. cent.
serratum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
tenuifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 152.—Am. cent.

PRISMATOCARPUS, L'Hérit. (Campan.).
junceus, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 35.—Afr. trop.

PRIVA, Adans. (Verben.).
cuneato-ovata, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 80 = laevis.

PROBLETOSTEMON, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 450. *RUBIACEAE.*
Elliottii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

PROCRIS, Comm. (Urtic.).
lepidotula, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 376 (= *Elatostema lepidotulum*).—Sumatra.

PROSOPANCHE, De Bary (Cytin.).
americana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 271 = Burmeisteri.
Bonacinai, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. I. 19. —Am. austr.

PROSOPIS, Linn. (Legum.).
Barba-tigridis, *Stuck. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. 66.—Reg. Argent.
casadensis, *Penzig, in Malpighia*, xii. 408.—Reg. Argent.
Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 71.—Bolivia.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 510. —Patag.
velutina, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 456. —Mexic.
Vinalillo, *Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 73. —Reg. Argent.

PROSTANTHERA, Labill. (Labiat.).
discolor, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxi. 378.—Austral.
stricta, *R. T. Baker, l. c.* 380.—Austral.

PROSTHECIDISCUS, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 149 (1898). *ASCLEPIADACEAE.*
guatemalensis, *Donn. Sm. l. c.* 150.—Am. cent.

PROTAMOMUM, Ridley = **Orchidantha**, N. E. Br. (Musac.).
maxillarioides, Ridley, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. 383 = O. maxillarioides.

PROTEA, Linn. (Proteac.).
cedromontana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 109. —Afr. austr.
conchiformis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 278.—Afr. austr.
lanuginosa, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 364. —Afr. austr.
triandra, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 110.—Afr. austr.
uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 380.—Afr. trop.
xanthoconus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 278.—Afr. austr.

PROTOSCHWENKIA, Solered. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1898, 243. *SOLANACEAE.*
Mandoni, *Solered. l. c.* 244.—Bolivia.

PROUSTIA, Lag. (Compos.).
crassinervis, *Urb. Symb. Antill.* i. 470.—Ind. occ.
krugiana, *Urb. l. c.* 471.—Ind. occ.

PRUNELLA, Linn. (Labiat.).
angustifolia, Bub. Fl. Pyren. i. 422 = hyssopifolia.

PRUNUS, Tourn. (Rosac.).
adenophora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 10.—Java.
adenopoda, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 347.—Java.
alabamensis, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 118. —Am. bor.
corymbulosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 226.—Am. bor.
Gravesii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 45.—Am. bor.
guanaiensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 31.—Bolivia.
injucunda, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 149. —Am. bor.
oregana, *Greene, Pittonia*, iii. 21.—Am. bor.
Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 30.—Bolivia.
sativa, Rouy & Camus, Fl. Fr. vi. 4 = domestica, etc.
tatsienensis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 322.—China.

PSAMMISIA, Klotzsch (Vaccin.).
turbinata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 384 (= *Chupalon turbinatum*).—Bolivia.

PSAMMOTROPHA, Eckl. & Zeyh. (Ficoid.).
frigida, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 500.—Afr. austr.

PSEDNOTRICHIA, Hiern, in Journ. Bot. 1898, 289. *COMPOSITAE.*
tenella, *Hiern, l. c.* 290.—Afr. trop.

PSEUDANTHISTIRIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 219 (1896). *GRAMINEAE.*
burmanica, *Hook. f. l. c.* 220.—Ind. or.
heteroclita, *Hook. f. l. c.* 219.—Ind. or.
hispida, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
umbellata, *Hook. f. l. c.* 220.—Ind. or.

PSEUDARTHRIA, Wight & Arn. (Legum.).
crenata, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 245. —Afr. trop.

PSEUDERANTHEMUM, Radlk. = **Eranthemum**, Linn. (Acanth.).
affine, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 546 = E. hypocrateriforme.
biceps, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vii. 576.—Am. cent.
bolivianum, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 77.—Bolivia.
Hildebrandtii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 39 = E. Hildebrandtii.
Huegelii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 546 = E. Huegelii.
leptorhachis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 664.—Bras.
lindavianum, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 104.—Afr. trop.
metallicum, Hallier, in Ann. Jard. Buitenz. xv. 26.—Sumatra.

PSEUDIBATIA, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7 (1900) 78. *ASCLEPIADACEAE.*
ganglinosa, *Malme, l. c.* 81 (= *Cynanchum ganglinosum*).—Parag.
lanosa, *Malme, l. c.* 78 (= *Ibatia lanosa*).—Bras.
suberosa, *Malme, l. c.* 79.—Bras.
surgens, *Malme, l. c.* 80.—Bras.

PSEUDOBARLERIA, T. Anders. = **Petalidium**, Nees (Acanth.).
canescens, Engl. in Engl. Jahrb. x. 258 = Pet. canescens.
engleriana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 197 = Pet. englerianum.
glutinosa, Engl. in Engl. Jahrb. x. 259 = Pet. glutinosum.
lanata, Engl. l. c. 258 = Pet. lanatum.
latifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 197 = Pet. latifolium.
Lindaui, Dewèvre, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 104 = Mellera submutica.
ovata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 198 = Pet. ovatum.
variabilis, Engl. in Engl. Jahrb. x. 259 = Pet. variabile.

PSEUDOBLEPHARIS, Baill. (Acanth.).
Boivini, Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 837 = Sclerochiton Boivini.
Dusenii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 34 = Acanthus Dusenii.
Heinsenii, Lindau, l. c. xxiv. 320 = Sclerochiton Boivini.
Holstii, Lindau, l. c. xx. 35 = Sclerochiton Vogelii.
nitida, Lindau, in Engl. & Prantl, Planzenf. iv. III B. 319 = Sclerochiton nitidus.
Preussii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 34 = Sclerochiton Preussii.

PSEUDOBRAVOA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1899) 155. *AMARYLLIDACEAE.*
densiflora, *Rose, l. c.* (= *Bravoa densiflora*).—Mexic.

PSEUDOBRAYA, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. no. 4 (1896) 88. *CRUCIFERAE.*
Kizylarti, *Korsh. l. c.*—Turkestan.

PSEUDOBROMUS, K. Schum. (Gramin.).
africanus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 763.—Afr. austr.

PSEUDOCYMOPTERUS, Coult. & Rose (Umbell.).
Hendersoni, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 190.—Am. bor.

PSEUDODRACONTIUM, N. E. Br. (Arac.).
Harmandi, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 15.—Cochinch.

PSEUDOGARDNERIA, Racib. in Anzeiger Akad. Krakau, April 1896, fide Solered. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 282. *LOGANIACEAE.*
angustifolia, *Racib. l. c.* (= *Gardneria angustifolia*). —Ind. or.
nutans, *Racib. l. c.* (= *Gardneria nutans*).—Japon.

PSEUDOLACHNOSTYLIS, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 19. *EUPHORBIACEAE.*
Dekindtii, *Pax, l. c.* 20.—Afr. trop.
maprouneaefolia, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

PSEUDOPANAX, C. Koch (Aral.).
chathamicum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 223.—N. Zel.
Gilliesii, *T. Kirk, l. c.* 221.—N. Zel.

PSEUDORAPHIS, Griff. = **Chamaeraphis**, R. Br. (Gramin.).
brunoniana, Griff. Notul. iii. 29 = C. spinescens.

PSEUDORLAYA, Murb. in Act Univ. Lund. xxxiii. no. 12 (1897) 86. *UMBELLIFERAE.*
maritima, *Murb. l. c.* (= *Daucus maritimus*).—Eur. occ.

PSEUDOSMODINGIUM, Engl. (Anacard.).
multifolium, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.

PSEUDOSOPUBIA, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 28; et in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 511. *SCROPHULARIACEAE.*
Hildebrandtii, *Engl. ll. cc.* (= *Sopubia Hildebrandtii*). —Afr. trop.
kituiensis, *Engl. ll. cc.* (= *Sopubia kituiensis*).—Afr. trop.
obtusifolia, *Engl. ll. cc.*—Afr. trop.

PSEUDOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
Helferi, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. 253 = Teinostachyum Helferi.

PSIADIA, Jacq. (Compos.).
gnaphaliopsis, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis*, 218.—Afr. trop.
lyciodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 553.—Afr. trop.
vernicosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 559 (non Steetz).—Afr. trop.

PSIDIUM, Linn. (Myrtac.).
savannarum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 244. —Am. cent.
thyrsoideum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 359 (= *Myrtus thyrsodea*).—Bras.

PSILANTHELE, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 663. *ACANTHACEAE.*
Eggersii, *Lindau, l. c.* 664.—Ecuador.

PSILOSTACHYS, Hochst. (Amarant.).
filiformis, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 305 = Dimeria ornithopoda.
Kirkii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 279.—Afr. trop.

PSILOTRICHUM, Blume (Amarant.).
angustifolium, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 328.—Afr. trop.
concinnum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 279.—Afr. trop.
debile, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Robecchii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 60; *et in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 19.—Afr. trop.
rubellum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 279.—Afr. trop.
Ruspolii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 59; *et in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 19.—Afr. trop.
trichophyllum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 279.—Afr. trop.
villosiflorum, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 59; *et in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 20.—Afr. trop.

PSITTACANTHUS, Mart. (Loranth.).
amplexifolius, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 136 = Arthraxon amplexifolium.
Kerberi, Engl. l. c. = Loranthus Kerberi.
Melinonii, Engl. l. c. 137 = Alveolina Melinonii.

PSORALEA, Linn. (Legum.).
juncea, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 286. —Am. bor.
oreophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 442.—Afr. austr.
Wilmsii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 286.—Afr. austr.

PSOROSPERMUM, Spach (Hyperic.).
Humbloti, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1218.—Madag.
membranaceum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1898, 301.—Afr. trop.

PSYCHOTRIA, Linn. (Rubiac.).
adafoana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 90.—Afr. trop.
aemulans, *K. Schum. l. c.* 95.—Afr. trop.
albomarginata, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 283.—Malaya.
batangana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 94.—Afr. trop.

PSYCHOTRIA:—
Binnendijkii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 501, nomen.—Celebes.
cardiophylla, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 321, nomen.—Afr. trop.
cataractarum, *K. Schum. l. c.*, nomen.—Afr. trop.
cauliflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 574.—N. Guin.
chaunantha, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 575.—N. Guin.
chlorocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 688.—Ins. Samoa.
cyanopharynx, *K. Schum. l. c.* xxviii. 90.—Afr. trop.
dimorphophylla, *K. Schum. l. c.* 91.—Afr. trop.
dipteropoda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 576.—N. Guin.
dolichocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 686.—Ins. Samoa.
ebensis, *K. Schum. l. c.* xxviii. 91.—Afr. trop.
ectasiphylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 576.—N. Guin.
erythropus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 92.—Afr. trop.
euchlora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
geminodens, *K. Schum. l. c.* xxv. 688.—Ins. Samoa.
gigantopus, *K. Schum. l. c.* 686.—Ins. Samoa.
globiceps, *K. Schum. l. c.* xxviii. 93.—Afr. trop.
grayana, *K. Schum. l. c.* xxv. 685.—Ins. Samoa.
hirta, *Heller, in Minnes. Bot. Stud.* i. 903 (non H. B. & K.).—Ins. Hawaii.
ischnophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 93.—Afr. trop.
leucococca, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 577.—N. Guin.
luxurians, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 50.—Bolivia.
maleolens, *Urb. Sym. Antill.* i. 444.—Ind. occ.
maricaensis, *Urb. l. c.* 447.—Ind. occ.
microthyrsus, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 321, nomen.—Afr. trop.
minimicalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 94.—Afr. trop.
myrmecophila, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 578.—N. Guin.
oligocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 95.—Afr. trop.
oncocarpa, *K. Schum. l. c.* xxv. 688.—Ins. Samoa.
ovato-oblonga, *K. Schum. l. c.* xxviii. 96.—Ins. Comor.
pacifica, *K. Schum. l. c.* xxv. 687.—Ins. Samoa.
pendula, Urb. Symb. Antill. i. 445 = parasitica.
perbrevis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 96.—Afr. trop.
piolampra, *K. Schum. l. c.* 97.—Afr. trop.
Poggei, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
potamophila, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
pseudocaronis, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 502, nomen.—Celebes.
pygmaeodendron, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 98. —Afr. trop.
refractiflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
refractiloba, *K. Schum. l. c.* 99.—Afr. trop.
Reineckei, *K. Schum. l. c.* xxv. 686.—Ins. Samoa.
sadebeckiana, *K. Schum. l. c.* xxviii. 99.—Afr. trop.
samoana, *K. Schum. l. c.* xxv. 685.—Ins. Samoa.
Schlechteri, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 321, nomen.—Afr. trop.
Sintenisii, *Urb. Sym. Antill.* i. 448.—Ind. occ.
stenocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 687.—Ins. Samoa.
stigmatophylla, *K. Schum. l. c.* xxviii. 100.—Afr. trop.
subrepanda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 579.—N. Guin.
suerrensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 337. —Am. cent.
supfiana, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 321, nomen.—Afr. trop.
tananarivana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 100. —Madag.
trivialis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 50.—Bolivia.
xanthochlora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 687.—Ins. Samoa.

PSYLLOCARPUS, Mart. (Rubiac.).
phyllocephalus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 17.—Bras.
Schwackei, *K. Schum. l. c.* 18.—Bras.

PTELEA, Linn. (Rutac.).
rhombifolia, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 313.—Am. bor.

PTELEOPSIS, Engl. (Combret.).
anisoptera, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iv. 4 (=*Combretum anisopterum*).—Afr. trop.
diptera, *Engl. & Diels, l. c.* 3 (=*Combretum dipterum*).—Afr. trop.
myrtifolia, Engl. & Diels, l. c. 4 = variifolia.
stenocarpa, *Engl. & Diels, l. c.* 5.—Afr. trop.

PTERNANDRA, Jack (Melast.).
Griffithii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 70.—Penins. Mal.

PTEROCACTUS, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1897, 6. *CACTACEAE.*
Kuntzei, *K. Schum. l. c.*—Reg. Argent.
Kurtzei, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 259.—Reg. Argent.

PTEROCARPUS, Linn. (Legum.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.
cambodianus, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 383 B.—Cochinch.
dalbergioides, *Roxb. Hort. Beng.* 53.—Ind. or.
glaucinus, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
gracilis, *Pierre, l. c.*—Cochinch.
grandiflorus, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 65.—Afr. trop.
oblongus, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
paraguayensis, *Barb. Rodr. Pl. Mattogross.* 17.—Bras.
parvifolius, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
pedatus, *Pierre, l. c.*—Cochinch.
Zenkeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 299.—Afr. trop.

PTEROCARYA, Kunth (Jugland.).
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 317.—China.
hupehensis, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 493.—China.

PTEROCAULON, Ell. (Compos.).
Bakeri, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 55 (=*Vernonia Pterocaulon*).—Bras.
cordobense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 169.—Reg. Argent.
lanatum, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
latifolium, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
Lorentzii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 55.—Bras.
purpurascens, *Malme, l. c.*—Parag.
subvirgatum, *Malme, l. c.*—Parag.

PTEROCELASTRUS, Meissn. (Celastr.).
Galpinii, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 431.—Afr. austr.

PTEROCEPHALUS, Vaill. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
grandiflorus, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxviii. 203.—Eur.
lignosus, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 625.—Persia.

PTEROCYMBIUM, R. Br. = **Sterculia**, Linn. (Stercul.).
Beccarii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. Beibl. lviii. 21.—N. Guin.
viridiflorum, Teijsm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 640.—Celebes.

PTERODISCUS, Hook. (Pedal.).
kellerianus, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 453.—Afr. trop.
Ruspolii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 31.—Afr. trop.
saccatus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 62.—Afr. trop.
undulatus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 62.—Afr. trop.

PTEROGLOSSASPIS, Reichb. f. (Orchid.).
Carsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 100.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.

PTEROLOBIUM, R. Br. (Legum.).
densiflorum, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 236.—Penins. Mal.
Rosthornii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 410.—China.

PTERONEMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1322. *SIMARUBACEAE.*
laxiflora, *Pierre, l. c.*—Burma.

PTERONIA, Linn. (Compos.).
ambrariifolia, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 198.—Afr. austr.
decumbens, *Banks, ex S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 156.—Afr. austr.

PTEROSTEMMA, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 489. *ORCHIDEAE.*
antioquiense, *Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.*—N. Granat.

PTEROSTYLIS, R. Br. (Orchid.).
papuana, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 112.—N. Guin.
subsimilis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 611.—N. Zel.
trifolia, *Colenso, l. c.* xxxi. 281.—N. Zel.
venosa, *Colenso, l. c.* xxviii. 610.—N. Zel.

PTERYGIELLA, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 2463 (1896). *SCROPHULARIACEAE.*
Duclouxii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 22.—China.
nigrescens, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2463.—China.

PTERYGODIUM, Sw. (Orchid.).
bicolorum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 851 (=*Corycium bicolorum*).—Afr. austr.
bifidum, *Schlechter, l. c.* 856 (=*Corycium bifidum*).—Afr. austr.
biflorum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 303 = Disperis crassicaulis.
cleistogamum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 816.—Afr. austr.
crispum, *Schlechter, l. c.* 849 (=*Corycium crispum*).—Afr. austr.
excisum, *Schlechter, l. c.* 852 (=*Corycium excisum*).—Afr. austr.
Flanagani, *Bolus, Orch. S. Afr.* t. 98.—Afr. austr.
microglossum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 853 (=*Corycium microglossum*).—Afr. austr.
Newdigatae, *Bolus, Orch. S. Afr.* t. 99.—Afr. austr.
nigrescens, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 847 (=*Corycium nigrescens*).—Afr. austr.
orobanchoides, *Schlechter, l. c.* 848 (=*Corycium orobanchoides*).—Afr. austr.
pentherianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 432.—Afr. austr.
tricuspidatum, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 821 (=*Corycium tricuspidatum*).—Afr. austr.
vestitum, *Schlechter, l. c.* 857 (=*Corycium vestitum*).—Afr. austr.

PTERYGOSTACHYUM, Nees = **Dimeria**, R. Br. (Gramin.).
Lehmanni, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 412 = D. Lehmanni.

PTERYGOTA, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn. (Stercul.).
macrocarpa, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 135.—Afr. trop.
trinervia, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. Beibl. lviii. 20.—Borneo.

PTERYXIA, Nutt. (Umbell.).
calcarea, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 173 = C. calcareus.
californica, Coult. & Rose, l. c. 172.—Am. bor.
petraea, Coult. & Rose, l. c. = C. petraeus.
terebinthina, Coult. & Rose, l. c. 171 = C. terebinthinus.

PTILEPIDA, Rafin. (Compos.).
grandiflora, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 570 (=*Actinella grandiflora*).—Am. bor.

PTILONEILEMA, Steud. = **Gracilea**, Koen. (Gramin.).
plumosum, Steud. Syn. Pl. Gram. 201 = G. royleana.

PTILONELLA, Nutt. = **Blepharipappus**, Hook. (Compos.).
laevis, Greene, Fl. Francisc. 433 = B. laevis.

PTILONEMA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 284 (1897), sphalm. = PTILONEILEMA, Steud. = **Gracilea**, Koen. (Gramin.).

PTILORIA, Rafin. = **Stephanomeria**, Nutt. (Compos.).
filifolia, Greene, Pittonia, iii. 311.—Am. bor.

PTILORIA :—
neo-mexicana, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 123.—Am. bor.
ramosa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 453.—Am. bor.
scabrella, Greene, Pittonia, iii. 311.—Am. bor.

PTILOTRICHUM, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
Baldaccii, Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 413.—Albania.

PTYCANTHERA, Decne. (Asclep.).
mollis, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 280 (=*Ibatia mollis*).—Ind. occ.
oblongata, *Schlechter, l. c.* (=*Orthosia oblongata*).—Ind. occ.
ovatifolia, *Schlechter, l. c.* 279 (=*Poicilla ovatifolia*).—Ind. occ.

PTYCHOPETALUM, Benth. (Olac.).
acutissimum, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 283.—Afr. trop.

PTYCHOSPERMA, Labill. (Palm.).
sanderiana, *Ridley, in Gard. Chron.* 1898, II. 330.—N. Guin.
Warleti, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1898, I. 242.—Hab. ?

PTYCHOTIS, Koch = **Carum**, Rupp. (Umbell.).
saxifraga, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 191 = C. Bunius.

PTYSSIGLOTTIS, T. Anders. (Acanth.).
anisophylla, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 289.—Borneo.
auriculata, *Hallier f. l. c.* 292.—Borneo.
dispar, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 220.—Borneo.
frutescens, *Hallier f. l. c.* 222.—Borneo.
hirsuta, *Hallier f. l. c.* 217.—Borneo.
lanceolata, *Hallier f. l. c.* 221.—Borneo.
leptoneura, *Hallier f. l. c.* 222.—Borneo.
picta, *Hallier f. l. c.* 218.—Sumatra.
procridifolia, *Hallier f. l. c.* 223.—Borneo.
sarmentosa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 662 (=*Rostellularia sarmentosa*).—Java.

PTYXOSTOMA, Vahl = **Lonchostoma**, Wikstr. (Bruniac.).
quadrifidum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 86.—Afr. austr.

PUBLICARIA, Deflers, Voy. Yemen, 151 (1889), sphalm. = **Pulicaria**, Gaertn. (Compos.).

PUCCINELLIA, Parl. (Gramin.).
Lemmoni, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 276 (=*Poa Lemmoni*).—Calif.

PUELIA, Franch. (Gramin.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 77.—Afr. trop.

PUERARIA, DC. (Legum.).
bella, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 288.—Ind. or.
Collettii, *Prain, l. c.* lxvi. 420.—Burma.
sikkimensis, *Prain, l. c.* 419.—Reg. Himal.
textilis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 368.—N. Guin. ; N. Brit.

PULICARIA, Gaertn. (Compos.).
antidysenterica, Bub. Fl. Pyren. ii. 247 = dysenterica.
areysiana, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 108 = leucophylla.
ehrenbergiana, *Schultz, in Deflers, Voy. Yemen*, 152.—Arab.
majoricensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 134.—Eur.
Phillipsiae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 157.—Afr. trop.
tanganyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.

PULMONARIA, Tourn. (Borag.).
annua, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 149.—Graecia.
tridentina, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 74.—Tyrol.

PULSATILLA, Tourn. = **Anemone**, Tourn. (Ranunc.).
Duthiei, Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 417.—Reg. Himal.

PULSATILLA :—
glauciifolia, Huth, in Engl. Jahrb. xxii. 588 = A. glaucifolia.
ludoviciana, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = A. patens.

PULTENAEA, Sm. (Legum.).
acuminata, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 439.—Austral.
Campbelli, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 144.—Austral.
Deanei, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 438.—Austral.

PUPALIA, Juss. (Amarant.).
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 892.—Afr. trop.
Robecchii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 55 ; *et in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 21.—Afr. trop.

PURPURELLA, Naud. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).
cleistopetala, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiv. 163 = *cleistoflora*.

PURPUSIA, Brandegee, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. (1899) 446. *ROSACEAE*.
saxosa, *Brandegee, l. c.* 447.—Am. bor.

PUYA, Molina (Bromel.).
Augustae, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 487 (= *Dyckia Augustae*).—Guiana.
berteroniana, *Mez, l. c.* 477.—Chili.
bicolor, *Mez, l. c.* 482.—N. Granat.
brachystachya, *Mez, l. c.* 496 (= *Pitcairnia brachystachya*).—Am. trop.
coquimbensis, *Mez, l. c.* 492.—Chili.
dyckioides, *Mez, l. c.* 486 (= *Pitcairnia dyckioides*).—Bolivia.
exigua, *Mez, l. c.* 495.—Am. trop.
flora, *Speg. Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 8.—Reg. Argent.
Gaudichaudii, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 496.—Chili.
goudotiana, *Mez, l. c.* 488.—N. Granat.
humilis, *Mez, l. c.* 493.—Bolivia.
kuntzeana, *Mez, l. c.* 490.—Bolivia.
lineata, *Mez, l. c.* 497.—N. Granat.
mollis, *Baker, ex Mez, l. c.* 488.—Bolivia.
nitida, *Mez, l. c.* 491.—N. Granat.
pastoensis, *Mez, l. c.* 483 (= *Pitcairnia pastoensis*).—N. Granat.
Pearcei, *Mez, l. c.* 480 (= *Pitcairnia Pearcei*).—Peruv.
ruiziana, *Mez, l. c.* 491 (= *Pitcairnia lanuginosa*).—Peruv.
Rusbyi, *Mez, l. c.* 482 (= *Pitcairnia Rusbyi*).—Bolivia.
spathacea, *Mez, l. c.* 481 (= *Pitcairnia spathacea*).—Reg. Argent.
stenothyrsa, *Mez, l. c.* (= *Pitcairnia stenothyrsa*).—Bolivia.
tuberosa, *Mez, l. c.* 483.—Peruv.
tunarensis, *Mez, l. c.* 498.—Bolivia.
violacea, *Mez, l. c.* 476 (= *Pitcairnia violacea*).—Chili.
weberiana, *Morr. ex Mez, l. c.* 492.—Reg. Argent.
weddelliana, *Mez, l. c.* 475 (= *Pitcairnia weddelliana*).—Bolivia.

PYCNANTHUS, Warb. (Myristic.).
Dinklagei, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxviii. 258.—Afr. trop.
Kombo, *Warb. l. c.* 252 (= *Myristica Kombo*).—Afr. trop.
Mechowii, *Warb. l. c.* 261.—Afr. trop.
Niohue, *Warb. l. c.* 259 (= *Myristica Niohue*).—Afr. trop.

PYCNARRHENA, Miers (Menisperm.).
grandis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 313.—N. Guin.

PYCNOCOMA, Benth. (Euphorb.).
dentata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 983.—Afr. trop.
Thonneri, *Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 51.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 329.—Afr. trop.

PYCNOSTACHYS, Hook. (Labiat.).
Batesii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 386.—Afr. trop.
congensis, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 819.—Afr. trop.

PYCNOSTACHYS :—
decussata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 382.—Afr. trop.
deflexifolia, *Baker, l. c.* 381.—Afr. trop.
Descampsii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 63.—Afr. trop.
Hanningtonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 384.—Afr. trop.
Kirkii, *Baker, l. c.* 381.—Afr. trop.
leptophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 161.—Afr. trop.
nepetaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 383.—Afr. trop.
oblongifolia, *Baker, l. c.* 385.—Afr. trop.
Petherickii, *Baker, l. c.* 383.—Afr. trop.
remotifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 161.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 384.—Afr. trop.
sphaerocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 162.—Afr. trop.
stenostachys, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 380.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, l. c.* 383.—Afr. trop.

PYCNOSTYLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 82. *MENISPERMACEAE*.
Sacleuxii, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

PYCREUS, Beauv. (Cyper.).
debilissimus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 224.—Afr. trop.
densus, Urb. Symb. Antill. ii. 164 = helvus.
fluminalis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 106.—Afr. trop.
helvus, *C. B. Clarke, in Urb. Sym. Antill.* ii. 19.—Ind. occ.
niederleinianus, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 6 (= *Cyperus niederleinianus*).—Bras.
oakfortensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 159.—Afr. austr.
odoratus, Urb. Symb. Antill. ii. 164 = polystachyos.
olfersianus, Urb. l. c. = propinquus.
unioloides, Urb. l. c. = angulatus.

PYGEUM, Gaertn. (Rosac.).
costatum, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 98.—N. Guin.
dolichobotrys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 340.—N. Guin.
grandiflorum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 288.—Penins. Mal.
hookerianum, *King, l. c.* 293.—Penins. Mal.
intermedium, *King, l. c.* 288.—Penins. Mal.
ovalifolium, *King, l. c.* 292.—Penins. Mal.
papuanum, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 99.—N. Guin.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 290.—Penins. Mal.
stipulaceum, *King, l. c.* 287.—Penins. Mal.

PYRENACANTHA, Wight (Olacac.).
acuminata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 483.—Afr. trop.
canaliculata, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1317.—Afr. trop.
Ruspolii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 483.—Afr. trop.

PYRETHRUM, Hall. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).
deserticola, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12, 98.—Afr. bor.

PYROLA, Tourn. (Ericac.).
montana, Bub. Fl. Pyren. ii. 3 = minor.
pallida, *Greene, Pittonia*, iv. 39.—Am. bor.

PYROSTEGIA, Presl = **Bignonia**, Tourn. (Bignon.).
tubulosa, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 231 = B. tubulosa.

PYRROCOMA, Hook. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
acuminata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 626.—Am. bor.
ciliolata, Greene, Pittonia, iii. 184.—Am. bor.
Clementis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 625.—Am. bor.
congesta, Greene, Pittonia, iii. 23.—Am. bor.
eriopoda, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 549.—Am. bor.

PYRROCOMA :—
erythropappa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 624.—Am. bor.
genuflexa, Greene, Pittonia, iii. 348.—Am. bor.
gossypina, Greene, l. c. 23.—Calif.
longifolia, Greene, l. c. 183.—Am. bor.
Lyallii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 382 = A. Lyallii.
rigida, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 624 (non Phil.).—Am. bor.
solidaginea, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 549.—Am. bor.
subviscosa, Greene, l. c.—Am. bor.
Vaseyi, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 626.—Am. bor.
villosa, Rydb. l. c. 625.—Am. bor.

PYRUS, Tourn. (Rosac.).
austriaca, *Kerner, in Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 15.—Eur.
matsumurana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1897, 71.—Japon.
Zumi, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 1.—Japon.

Q

QUAMASIA, Rafin. = **Camassia**, Lindl. (Liliac.).
azurea, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 547.—Am. bor.
Cusickii, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 64 = C. Cusickii.
esculenta, Coville, l. c. 65 = C. Fraseri.
Howellii, Coville, l. c. = C. Howellii.
hyacinthina, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 423 = C. Fraseri.
Leichtlinii, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 63 = C. Leichtlinii.
quamash, Coville, l. c. 64 = C. esculenta.

QUAMOCLIT, Tourn. = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
brevipedicellata, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vii. 416.—Am. cent.
gracilis, Hallier f. l. c.—Mexic.
indivisa, Hallier f. in Engl. Jahrb. xxv. 732 (= *Convolvulus indivisus*).—Ecuador.
Mina, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = Mina lobata.
Quamoclit, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 22 = I. Quamoclit.

QUARARIBEA, Aubl. (Malvac.).
Fieldii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 309.—Mexic.
platyphylla, *Pittier & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 239.—Am. cent.

QUASSIA, Linn. (Simarub.).
gabonensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1238.—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

QUERCUS, Tourn. (Cupulif.).
acrodonta, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 48.—China.
amygdalifolia, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 506.—China.
attenuata, *Skan, l. c.*—China.
Augustinii, *Skan, l. c.* 507.—China.
Baronii, *Skan, l. c.*—China.
Blakei, *Skan, in Hook. Ic. Pl.* t. 2662.—China.
brevicaudata, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 507.—China.
bullata, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 48.—China.
calathiformis, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 508.—China.
Carlesii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2591.—China.
clathrata, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 15.—Java.
cleistocarpa, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 52.—China.
compta, *Seemen, l. c.* 53.—Cochinch.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 158.—China.
dielsiana, *Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 291.—China.

QUERCUS:—
dolichocarpa, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 14.—Java.
durifolia, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 95.—Am. cent.
Edithae, *Skan, in Hook. Ic. Pl.* t. 2661.—China.
edulis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xi. (35).—Japon.
elaeagnifolia, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 51.—China.
ellipsoidalis, *E. J. Hill, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 204.—Am. bor.
engleriana, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 47.—China.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 158.—China.
fordiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2664.—China.
formosana, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 513.—China.
Franchetii, *Skan, l. c.*—China.
geminata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 438.—Am. bor.
glaucophylla, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 95.—Am. cent.
heliciformis, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 15.—Java.
Henryi, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 50.—China.
hypophoenicea, *Seemen, l. c.* 52.—Borneo.
ilicifolia, *Koord. & Valet. ex Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 18 (non aliorum).—Java.
imperialis, *Seemen, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 263.—N. Guin.
Koordersii, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 16.—Celebes.
Lauterbachii, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 54.—N. Guin.
Lycoperdon, *Skan, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 518.—China.
minima, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 438.—Am. bor.
neriifolia, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 51.—China.
obscura, *Seemen, l. c.* 49.—China.
oligodonta, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 96.—Am. cent.
pachyloma, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 54.—Cochinch.
pagodaefolia, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 375.—Am. bor.
poculiformis, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 13.—Java.
Pringlei, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 96.—Am. cent.
pumila, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 57 = ilicifolia.
pyriformis, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 17.—Java.
Rex, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2663.—China.
spathulata, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 49.—China.
subimbricaria, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xvii. 59.—Am. sept.
sutchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 150.—China.
Tauzini, Bub. Fl. Pyren. i. 67 = Q. Toza.
variolosa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 156.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 146.—China.

QUIINA, Aubl. (Guttif.).
Magallano-gomesii, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 6.—Bras.

QUILLAJA, Molina (Rosac.).
Poeppigii, Walp. Rep. ii. 52 = Q. Saponaria.
Smegmadermis, St. Laz. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 133 = Q. Saponaria.
Smegmadermos, DC. Prod. ii. 547 = Q. Saponaria.

QUINARIA, Rafin. = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).
anamalayana, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. 449 = V. anamalayana.
cuspidifera, Gilg, l. c. = V. cuspidifera.
himalayana, Gilg, l. c. 448 = V. himalayana.
neilgherriensis, Gilg, l. c.—Ind. or.
semicordata, Gilg, l. c. 449.—Reg. Himal.

QUINTINIA, A. DC. (Saxifr.).
acutifolia, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 137.—N. Zel.

QUISQUALIS, Linn. (Combret.).
falcata, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 355.—Afr. trop.

R

RABDOCHLOA, Beauv. (Gramin.).
Vulpiastrum, De Not. Ind. Sem. Hort. Genuens. (1852) 26 et in Ann. Sci. Nat. Sér. III. xix. 372 = Leptocarydion Vulpiastrum.

RADLKOFERA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 300. *SAPINDACEAE.*
Calodendron, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

RADLKOFERELLA, Pierre (Sapot.).
latifolia, *Fawcett, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 321.—Ind. occ.

RAINIERA, Greene, Pittonia, iii. (1898) 291. *COMPOSITAE.*
stricta, *Greene, l. c.* (= *Prenanthes stricta*).—Am. bor.

RAMIUM, Kuntze = **Boehmeria**, Jacq. (Urtic.).
edentatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 294.—Bolivia.

RAMONA, Greene = **Audibertia**, Benth. (Labiat.).
capitata, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 287 = A. capitata.
Clevelandi, Briq. l. c. = A. Clevelandi.
Dorrii, Briq. l. c. = A. Dorrii.
grandiflora, Briq. l. c. = A. grandiflora.
incana, Briq. l. c. = A. incana.
nivea, Briq. l. c. = A. nivea.
Palmeri, Briq. l. c. = A. Palmeri.
stachyoides, Briq. l. c. = A. stachyoides.
Vaseyi, Briq. l. c. = A. Vaseyi.

RANALISMA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2652 (1900). *ALISMACEAE.*
rostrata, *Stapf, l. c.*—As. trop.

RANDIA, Houst. (Rubiac.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 458.—Afr. trop.
annulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 435.—Afr. trop.
canescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 573.—Am. cent.
chloroleuca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 62.—Afr. trop.
cladantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
clathrodendron, *K. Schum. l. c.* 490.—Afr. trop.
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 28.—Afr. trop.
eetveldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 194.—Afr. trop.
engleriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 436.—Afr. trop.
erythrocarpa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 425.—Ind. occ.
Graeffei, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 683.—Ins. Samoa.
hispida, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 437.—Afr. trop.
jamaicensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 426.—Ind. occ.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 193.—Afr. trop.
longiflora, Durand & Schinz, Études Fl. Congo, i. 159 = maculata, *DC.*
lucidula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 457.—Afr. trop.
macromera, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 562.—N. Guin.
micrantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 438.—Afr. trop.
microphylla, *K. Schum. l. c.* xxviii. 64.—Afr. trop.
Monteiroae, *K. Schum. l. c.* 63.—Afr. trop.
myristicoides, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 563.—N. Guin.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 574.—Mexic.
ochroleuca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 438.—Afr. trop.
physophylla, *K. Schum. l. c.* xxviii. 64.—Afr. trop.
psychotrioides, *K. Schum. l. c.* xxiii. 439.—Afr. trop.
rhacodosepala, *K. Schum. l. c.* 440.—Afr. trop.
sericantha, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 84, nomen.—Afr. trop.
sphaerocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 564.—N. Guin.

RANDIA:—
streptocaulon, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 440.—Afr. trop.
sulphurea, *K. Schum. l. c.* 441.—Afr. trop.
terniflora, *Ficalho & Hiern, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 459.—Afr. trop.
thouarsiana, Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 43 = Ixora thouarsiana.
troposepala, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 489.—Afr. trop.
violascens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 459.—Afr. trop.

RANUNCULUS, Tourn. (Ranunc.).
aberrans, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 16 = uniflorus.
alpeophilus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 350.—Am. bor.
alpigenus, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 56.—Turkestan.
anemonerhizos, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 1.—Hispan.
apricus, *Greene, Pittonia,* iv. 145.—Am. bor.
arcuatus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 310.—Am. bor.
arnoglossus, *Greene, Pittonia,* iv. 143.—Am. bor.
aureopetalus, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 55.—Turkestan.
Berggreni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 352.—N. Zel.
Bovei, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* v. 44.—Fuegia.
Brotherusii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 885.—Turkestan.
caespitosus, *Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 185 (non aliorum).—Reg. Magell.
Cheesemannii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 17.—N. Zel.
ciliosus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 17.—Am. bor.
cuneiformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 276.—Am. bor.
doerflerianus, *Gand. in Jahresb. Kat. Wien. Tauschanst.* 1899, 133.—Eur.
Douglasii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 18.—Am. bor.
Earlei, *Greene, Pittonia,* iv. 15.—Am. bor.
eremogenes, *Greene, in Erythea,* iv. 121.—Am. bor.
flexicaulis, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 55.—Turkestan.
foliosus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 14.—N. Zel.
Francheti, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 591.—Japon.
fuegianus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* v. 43.—Fuegia.
fueginos, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* i. 17.—Fuegia.
Gormani, *Greene, Pittonia,* iii. 91.—Am. bor.
Greenii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 18.—Am. bor.
Hectori, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 16.—N. Zel.
Howellii, *Greenm. in Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 17.—Am. bor.
icelandicus, *Davis, in Minnes. Bot. Studies,* ii. 472.—Island.
inamoenus, *Greene, Pittonia,* iii. 91.—Am. bor.
intermedius, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 580 (non aliorum).—Am. bor.
Jovis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 261.—Am. bor.
kindlianus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxviii. 217.—Eur.
Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 352.—N. Zel.
Ledebouri, Lipsky, in Act. Hort. Tiflis, iv. 207 = ampelophyllus.
libanoticus, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 2.—Syria.
Lobbii, *A. Gray, in Proc. Amer. Acad.* xxi. 364.—Am. bor.
Lyallii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 166 = Greenii.
madrensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 199.—Mexic.
McCallai, *Davis, in Minnes. Bot. Studies,* ii. 482.—Am. bor.
mexicanus, Davis, l. c. 487 = geoides.
Meyeri, *Lowe, in Hook. Journ. Bot.* ix. (1857) 74 (non Harv.).—As. bor.
microlonchus, *Greene, in Erythea,* iv. 112.—Am. bor.
mississippiensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 277.—Am. bor.
montanensis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 166.—Am. bor.
nyssanus, *Leichtl. in Garden,* lv. (1899) 418.—Quid?

RANUNCULUS:—
ocreatus, *Greene, Pittonia,* iv. 15.—Am. bor.
oreganus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 19.—Am. bor.
Pamiri, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. (1898) 400.—Reg. Himal.
pauciflorus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 11 (non Spreng.).—N. Zel.
petiolaris, E. S. Marshall, in Journ. Bot. 1892, 289 = scoticus.
pimpinelloides, D. Don, in Royle, Ill. Pl. Himal. 53 = Callianthemum rutaefolium.
Rattani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 17.—Am. bor.
recens, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 13.—N. Zel.
rubrocalyx, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 62.—Turkestan.
rufus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 591.—N. Zel.
rutaefolius, Linn. Sp. Pl. 552 = Callianthemum rutaefolium.
samolifolius, *Greene, Pittonia,* iii. 13.—Calif.
saxicola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 164.—Am. bor.
scoticus, *E. S. Marshall, in Ann. Scot. Nat. Hist.* 1898, 122.—Brit.
similis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2586.—Tibet.
subaffinis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 246.—Am. bor.
subalpinus, Davis, in Minnes. Bot. Studies, ii. 474 = delphinifolius.
tenellus, Nutt. in Torr & A. Gray, Fl. N. Amer. i. 23 = Douglasii.
tenuilobus, *Regel, ex Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 59.—Turkestan.
thracicus, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 136.—Eur. or.
unguiculatus, *Greene, Pittonia,* iv. 142.—Am. bor.
uniflorus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 267 (non Phil.).—N. Zel.
uniflorus, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* i. 16.—Chili.
valdivianus, *Phil. l. c.* 18.—Chili.
verticillatus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 13.—N. Zel.
vicinalis, *Greene, Pittonia,* iv. 145.—Am. bor.
Winkleri, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 59 (non Freyn).—Turkestan.

RAOULIA, Hook. f. (Compos.).
Brownii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 307.—N. Zel.
Buchanani, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.

RAPHANISTRUM, Tourn. = **Raphanus**, Tourn. (Crucif.).
glaucum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 154.—Graecia.

RAPHIA, Beauv. (Palm.).
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 83.—Afr. trop.

RAPHIONACME, Harv. (Asclep.).
Loandae, *Schlechter & Rendle, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 679.—Afr. trop.
Welwitschii, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 97.—Afr. trop.

RAPISTRUM, Tourn. (Crucif.).
macedonicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 198.—Eur.

RAPUNCULUS, Tourn. = **Phyteuma**, Linn. (Campan.).
Caesalpini, Bub. Fl. Pyren. ii. 25 = P. Michelii.
ovatus, Bub. l. c. 26 = P. Halleri.
Scheuchzeri, Bub. l. c. 24 = P. Scheuchzeri.
sylvestris, Bub. l. c. = P. orbiculare.

RATIBIDA, Rafin. = **Lepachys**, Rafin. (Compos.).
peduncularis, Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 411 = L. peduncularis.
pinnata, Barnh. l. c. 410 = L. pinnatifida.
Tagetes, Barnh. l. c. = L. Tagetes.

RATONIA, DC. (Sapind.).
Nugentii, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 9.—Austral.

RAUTANENIA, Buchenau, in Bull. Herb. Boiss. v. 854 (1897). *ALISMACEAE.*
Schinzii, *Buchenau, l. c.* 855.—Afr. trop.

RAUWOLFIA, Plum. (Apocyn.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 204.—Afr. trop.
elliptica, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 10, 13.—Bras.
longeacuminata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 205.—Afr. trop.
spectabilis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 393 (= *Cyrtosiphonia spectabilis*).—Malaya.

RAVENIA, Vell. (Rutac.).
Urbani, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. 552.—Ind. occ.

REAUMURIA, Linn. (Tamarisc.).
sogdiana, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 159.—Turkestan.

REICHARDIA, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).
laciniata, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 475.—Afr. trop.

REINWARDTIA, Dum. (Linac.).
sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2594.—China.

REINWARDTIODENDRON, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. (1898) 389. *MELIACEAE.*
celebicum, *Koord. l. c.*—Celebes.

RELBUNIUM, Benth. & Hook. f. (Rubiac.).
patagonicum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393.—Patag.
sphagnophilum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 468.—Mexic.

RENANTHERA, Lour. (Orchid.).
alba, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 353 (= *Arachnanthe alba*).—Penins. Mal.
Maincathi, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 496, sphalm. = seq.
Maingayi, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 353 (= *Arachnanthe Maingayi*).—Penins. Mal.
ramuana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 252.—N. Guin.
Trichoglottis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 293.—Borneo.

RENANTHERELLA, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. (1896) 354. *ORCHIDEAE.*
histrionica, *Ridley, l. c.* 355 (= *Renanthera histrionica*).—Malaya.

RENEALMIA, Linn. f. (Scitamin.).
battenbergiana, *Cummins, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 313.—Afr. trop.
bracteata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 79.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* xxxviii. 145.—Afr. trop.
cincinnata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 312.—Afr. trop.
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 144.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 143.—Afr. trop.
grandiflora, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 313.—Afr. trop.

RENSCHIA, Vatke (Labiat.).
heterotypica, *Vatke, in Linnaea,* xliii. 94.—Afr. trop.

RESEDA, Tourn. (Resed.).
bastitana, *Coincy, in Journ. de Bot.* xiii. 303.—Hispan.
Carmen-sylvae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis,* 202.—Afr. trop.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 332.—Eur.
othryana, *Form. l. c.* xxxv. 190.—Eur.
somalensis, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 51.—Afr. trop.
sudanica, *A. Cheval. in Compt. Rend. Intern. Congr. Bot.* 1900, 273.—Afr. trop.

RESTIO, Linn. (Restiac.).
alboaristatus, Kunth, Enum. Pl. iii. 407 = Hypodiscus alboaristatus.
ambiguus, *Masters, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 96.—Afr. austr.
araneosus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
cirratus, *Mast. l. c.* 5.—Afr. austr.
coactilis, *Mast. l. c.* 3.—Afr. austr.

RESTIO:—
comosus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 753.—Afr. austr.
consimilis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 4.—Afr. austr.
dimorphostachyus, *Mast. l. c.* 2.—Afr. austr.
distractus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 70.—Afr. austr.
ejuncidus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 2.—Afr. austr.
exilis, *Mast. l. c.* 6.—Afr. austr.
foliosus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 753.—Afr. austr.
garnotianus, Kunth, Enum. Pl. iii. 392 = filiformis.
giganteus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 755.—Afr. austr.
gossypinus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
implexus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 90.—Afr. austr.
intricatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 1.—Afr. austr.
membranaceus, Nees, in Linnaea, v. 657 = Elegia membranacea.
multicurvus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 751.—Afr. austr.
oligostachyus, Kunth, Enum. Pl. iii. 399 = filiformis.
parviflorus, Thunb. Diss. Rest. 13 = Cannomois scirpoides.
patens, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 97.—Afr. austr.
penicillatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 5.—Afr. austr.
pondoensis, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
praeacutus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 84.—Afr. austr.
procurrens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
productus, *Mast. l. c.* 5.—Afr. austr.
protractus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 97.—Afr. austr.
scaber, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 1.—Afr. austr.
scaberulus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 751.—Afr. austr.
scoparius, Kunth, Enum. Pl. iii. 390 = venustulus.
Scopula, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 96.—Afr. austr.
sejunctus, *Mast. l. c.* 97.—Afr. austr.
sparsus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 2.—Afr. austr.
spiculatus, *Mast. l. c.* 4.—Afr. austr.
stereocaulis, *Mast. l. c.* 1.—Afr. austr.
strictus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 752.—Afr. austr.
thyrsifer, Rottb. Progr. 11 = Elegia thyrsifera.
trichocaulis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 6.—Afr. austr.
virgeus, *Mast. l. c.* 4.—Afr. austr.

RESTREPIA, H. B. & K. (Orchid.).
antennifera, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 367, t. 94.—N. Granat.
sanguinea, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 44.—N. Granat.

REUTERA, Boiss. = **Pimpinella**, Riv. (Umbell.).
caroides, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 610.—Persia.

REYNOSIA, Griseb. (Rhamn.).
Guama, *Urb. Symb. Antill.* i. 356.—Ind. occ.
Krugii, *Urb. l. c.* 354.—Ind. occ.
reticulata, *Urb. l. c.* 357 (= *Rhamnidium reticulatum*).—Ind. occ.
revoluta, *Urb. l. c.* (= *Rhamnidium revolutum*).—Ind. occ.
septentrionalis, *Urb. l. c.* 356.—Ind. occ.
uncinata, *Urb. l. c.* 355.—Ind. occ.
Wrightii, *Urb. l. c.* 357 (= *Rhamnidium retusum*).—Ind. occ.

RHABDOSTIGMA, Hook. f. (Rubiac.).
Schlechteri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 68.—Afr. austr.

RHACODISCUS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 667. *ACANTHACEAE.*
Lindmani, *Lindau, l. c.*—Bras.

RHACOMA, Linn. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).
ilicifolia, Trelease, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. I. 399 = M. ilicifolia.

RHADAMANTHUS, Salisb. (Liliac.).
cyanelloides, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 444.—Afr. austr.

RHAGODIA, R. Br. (Chenopod.).
coralliocarpa, S. Moore, in Journ. Bot. 1897, 168.—Austral.

RHAMNELLA, Miq. = **Microrhamnus**, A. Gray (Rhamn.).
berchemiaefolia, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xii. 49.—Japon.

RHAMNUS, Tourn. (Rhamn.).
adonaefolia, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 388, sphalm. = anonaefolia.
alaternoides, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 156.—Graecia.
anonaefolia, Greene, Pittonia, iii. 16.—Calif.
betulaefolia, Greene, l. c.—Am. bor.
bourgaeanus, Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 135.—Eur.
formosana, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xii. 22.—Formosa.
laetevirens, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 162.—Turkestan.
Philyca, Bub. Fl. Pyren. i. 371 = R. Alaternus.
pirifolia, Greene, Pittonia, iii. 15.—Calif.
Rosthornii, E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 459.—China.
Sagorskii, Bornm. in Bot. Centralbl. lxxii. 228 = orbiculata.
Smithii, Greene, Pittonia, iii. 17.—Am. bor.

RHAPHIDOPHORA, Hassk. (Arac.).
africana, N. E. Br. in Kew Bull. 1897, 286.—Afr. trop.
australasica, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 452.—Austral.
Dahlii, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 8.—N. Brit.
formosana, Engl. l. c. 10.—Formosa.
geniculata, Engl. l. c. 7.—N. Guin.
Graeffei, Engl. l. c. 9.—Ins. Samoa.
Koordersii, Engl. l. c. 6.—Celebes.
Lovellae, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 453.—Austral.
megasperma, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 8.—Borneo.
novo-guineensis, Engl. l. c. 6 = neo-guineensis.
peeploides, Engl. l. c. 7.—Hort.
pusilla, N. E. Br. in Kew Bull. 1897, 286.—Afr. trop.
Reineckei, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 9.—Ins. Samoa.

RHAPHIOSTYLIS, Planch. = **Apodytes**, E. Mey. (Olacac.).
fusca, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1324 (= *Chelonecarya fusca*).—Afr. trop.
jollyana, Pierre, l. c. 1325.—Afr. trop.
latifolia, Pierre, l. c.—Afr. trop.
scandens, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

RHAPHIS, Lour. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
acicularis, Desv. Opusc. 69 = A. aciculatus.
ciliolata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = A. monticola.
coerulea, Nees, l. c. 395 = A. monticola.
coerulescens, Desv. Opusc. 69 = A. micranthus.
echinulata, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 = A. Gryllus.
Gryllus, Desv. Opusc. 69 = A. Gryllus.
javanica, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = A. aciculatus.
microstachya, Nees, l. c. 397 = A. micranthus.
orientalis, Desv. Opusc. 69 = A. wightianus.
repens, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = A. micranthus.
royleana, Nees, l. c. = A. Gryllus.
stricta, Nees, in Hook. Kew Journ. Bot. ii. 99 = A. intermedius.
trivalvis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 188, sphalm. = *seq.*
trivialis, Lour. Fl. Cochinch. 553 = A. aciculatus.
villosula, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = A. micranthus.
wightiana, Nees, l. c. 395 = A. wightianus.
zeylanica, Nees, l. c. 397 = A. zeylanicus.

RHAPONTICUM, Vaill. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
nanum, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 80.—As. cent.

RHAPTOPETALUM, Oliver (Olacac.).
eetveldeanum, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 121.—Afr. trop.

RHAPTOSTYLUM, Humb. & Bonpl. = **Heisteria**, Jacq. (Olac.).
yapacaniense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 37.—Bolivia.

RHEEDIA, Linn. (Guttif.).
lanceolata, Urb. Symb. Antill. i. 369.—Ind. occ.
pendula, Urb. l. c. 368.—Ind. occ.
portoricensis, Urb. l. c. (= *Clusia acuminata*, Spreng.).—Ind. occ.
verticillata, Urb. l. c. 370.—Ind. occ.

RHEXIA, Linn. (Melast.).
filiformis, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 468.—Am. bor.

RHIGOZUM, Burch. (Bignon.).
linifolium, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 172.—Afr. trop.

RHINACANTHUS, Nees (Acanth.).
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 105 = communis.
gracilis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 218 = communis.
parviflorus, T. Anders. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 106 = communis.
rotundifolius, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 225.—Afr. trop.
subcaudatus, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.

RHINANTHUS, Linn. (Scrophul.).
Facchinii, Chab. in Bull. Herb. Boiss. vii. 506.—Eur.
goniotrichus, Borb. in Baenitz, Herb. Eur. 1896, 2.—Eur.
groenlandicus, Chab. in Bull. Herb. Boiss. vii. 515.—Gronia.
Heribaudi, Chab. l. c. 508.—Eur.
italicus, Chab. in Mém. Herb. Boiss. no. 8, 13.—Eur.
Kyrollae, Chab. in Bull. Herb. Boiss. vii. 511.—Am. bor.
ovifugus, Chab. l. c. 501.—Eur.
Perrieri, Chab. l. c. 510.—Eur.
rigidus, Chab. l. c. 516.—Am. bor.
Songeoni, Chab. l. c. 497.—Eur.

RHINOPTERYX, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 352 (1896). *MALPIGHIACEAE.*
spectabilis, Niedenzu, l. c. 353.—Afr. trop.

RHIPSALIS, Gaertn. (Cact.).
bambusoides, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 1048 = salicornioides.
carnosa, Voecht. in Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig, ix. 401.—Quid?
caripensis, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 622 = R. Cassytha.
chloroptera, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 1045.—Bras.
foveolata, A. Web. l. c. 1047.—Bras.
gracilis, A. Web. l. c. 1048 = salicornioides.
hadrosoma, Lindb. in Monatsschr. Kakt. 1896, 96.—Bras.
Lagenaria, Voecht. in Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig, ix. 422.—Quid?
leucorhaphis, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 125.—Parag.
megalantha, Loefgr. in Monatsschr. Kakt. 1899, 134.—Bras.
micrantha, Hort. ex A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 1046 = sulcata.
pendula, Voecht. in Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig, ix. 371.—Quid?
pilosa, A. Web. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. 300 = madagascariensis.
prismatica, Ruempl. in Foerst. Handb. Cact. ed. II. 884.—Bras.
pterocarpa, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 641 = gonocarpa.
radicans, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 1047 = cavernosa.
robusta, Lindb. in Monatsschr. Kakt. 1896, 53 = hadrosoma.
suarensis, A. Web. in Bois, Dict. Hortic. 1046, sphalm. = suareziana.
sulcata, A. Web. l. c.—Hab.?
Tonduzii, A. Web. l. c.—Am. cent.

RHODALSINE, J. Gay = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).
geniculata, Williams, in Bull. Herb. Boiss. vi. 7.—Eur.; Afr. bor.

RHODOCODON, Baker (Liliac.).
urgineoides, Baker, in Hook. Ic. Pl. t. 2492.—Madag.

RHODODENDRON, Linn. (Ericac.).
Annae, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 258.—China.
Bodinieri, Franch. l. c. 257.—China.
brevistylum, Franch. l. c. 261.—China.
chionophyllum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 512.—China.
coeloneurum, Diels, l. c. 513.—China.
comptum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1899, 103.—N. Guin.
coriaceum, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 258.—China.
crinigerum, Franch. l. c. 260.—China.
detersile, Franch. l. c.—China.
floccigerum, Franch. l. c. 259.—China.
fokienense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 210.—China.
kingianum, Watt, in Gard. Chron. 1899, II. 306 = arboreum.
Latoucheae, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 210.—China.
lukiangense, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 257.—China.
lussoniense, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 356.—Ins. Philipp.
mandarinorum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 510.—China.
mekongense, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 263.—China.
modestum, Hook. f. Bot. Mag. t. 7686.—Ind. or.
nipponicum, Matsum, in Bot. Mag. Tokyo, xiii. 17.—Japon.
nodosum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1899, 103.—N. Guin.
oxyphyllum, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 264.—China.
platypodum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 511.—China.
pritzelianum, Diels, l. c. 510.—China.
ramosissimum, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 264.—China.
Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 509.—China.
saluenense, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 263.—China.
sanguineum, Franch. l. c. 259.—China.
selense, Franch. l. c. 257.—China.
siderophyllum, Franch. l. c. 262.—China.
subsessile, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 357.—Ins. Philipp.
trinerve, Franch. ex Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. v. 920.—Japon.
Vanhoeffeni, Abromeit, in Bibl. Bot. xlii. 51.—Gronia.
vernicosum, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 258.—China.
Whiteheadi, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 356.—Ins. Philipp.

RHODOPIS, Urb. Symb. Antill. ii. 304 (1900). *LEGUMINOSAE.*
planisiliqua, Urb. l. c. (= *Rudolphia peltata*).—Ind. occ.

RHODOSCIADIUM, S. Wats. (Umbell.).
nudicaule, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 223 (= *Deanea nudicaulis*).—Mexic.
tuberosum, Drude, l. c. (= *Deanea tuberosa*).—Mexic.

RHODOSTACHYS, Phil. (Bromel.).
carneus, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 338 = andina.
Chamissonis, Mez, l. c. 337.—Chili.
elegans, Mez, l. c. 336 (= *Ochagavia elegans*).—Juan Fernandez.
leiboldianus, Mez, l. c. 338.—Chili.
micrantha, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. 610.—Chili.

RHOMBOCHLAMYS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 659. *ACANTHACEAE.*
elata, Lindau, l. c. 661.—N. Granat.
rosulata, Lindau, l. c. 660.—N. Granat.

RHOPALANDRIA, Stapf, in Kew Bull. 1898, 71. *GRAMINEAE.*
Cumminsii, Stapf, l. c.—Afr. trop.

RHOPALOPILIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1263. *OLACACEAE.*
pallens, Pierre, l. c.—Afr. trop.
Poggei, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 143; et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 282.—Afr. trop.

RHUS, Tourn. (Anacard.).
Anchietae, *Ficalho & Hiern, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 184.—Afr. trop.
apiculata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 502.—Afr. trop.
Engleri, *Britten, in Journ. Bot.* 1900, 316.—Afr. austr.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 432.—China.
heptaphylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 185.—Afr. trop.
huillensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 501.—Afr. trop.
incana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428 = Engleri.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 52.—Afr. austr.
perakensis, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 500.—Penins. Mal.
rupicola, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 350.—Afr. austr.
Ruspolii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 18.—Afr. trop.
Rydbergii, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 268.—Am. bor.
Schlechteri, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiv. 501.—Afr. austr.
sinica, *Diels, l. c.* xxix. 432.—China.
Steingroeveri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 500.—Afr. austr.
trifoliata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 429 (non aliorum).—Afr. trop.
villosa, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 501 = huillensis.
virgata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 184.—Afr. trop.
Wilmsii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiv. 501.—Afr. austr.

RHYNCHANTHERA, DC. (Melast.).
parvifolia, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 95 (non Naud.).—Bolivia.

RHYNCHANTHUS, Hook. f. (Scitam.).
bluthianus, *Wittm. Gartenfl.* 1899, 38.—Ind. or.

RHYNCHELYTHRUM, Nees = **Tricholaena**, Schrad. (Gramin.).
dregeanum, Nees, Fl. Afr. Austr. 64 = T. rosea.

RHYNCHOPYLE, Engl. (Arac.).
Grabowskii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 20.—Borneo.

RHYNCHOSIA, Lour. (Legum.).
Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 304.—Afr. trop.
Dielsii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 418.—China.
divaricata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 264.—Afr. trop.
Erythraeae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 258.—Afr. trop.
Fischeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 305.—Afr. trop.
floribunda, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.
glutinosa, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 305.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, l. c.* xxviii. 409.—Afr. trop.
Hauthalii, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 60.—Parag.
Holstii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 306.—Afr. trop.
imbricata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 263.—Afr. trop.
komatiensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 306.—Afr. austr.
Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 61.—Bras.
longipes, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 306.—Afr. austr.
mensensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 256.—Afr. trop.
monophylla, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 279.—Afr. austr.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 263.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
ovata, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 350.—Afr. austr.
Rivae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 258.—Afr. trop.
Schoelleri, *Schweinf. l. c.* 255.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 307.—Afr. trop.
sphaerocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 264.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 308.—Afr. trop.
teramnoides, *Harms, l. c.* 307.—Afr. trop.

RHYNCHOSTIGMA, Benth. = **Toxocarpus**, Wight & Arn. (Asclep.).
Lujaei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 208.—Afr. trop.

RHYNCHOSTYLIS, Blume (Orchid.).
gigantea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 356 (= *Vanda densiflora*).—Burma.

RHYSOPTERUS, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 185. *UMBELLIFERAE.*
corrugatus, *Coult. & Rose, l. c.* 187 (= *Cymopterus corrugatus*).—Am. bor.
Jonesii, *Coult. & Rose, l. c.* 186.—Am. bor.
plurijugus, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

RHYTACHNE, Desv. (Gramin.).
benguellensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 138.—Afr. trop.

RHYTICARPUS, Sond. (Umbell.).
swellendamensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* v. 451.—Afr. austr.

RHYTIDOCARYUM, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 415 (1900) = **Ryticaryum**, Becc. (Icacin.).

RIBES, Linn. (Saxifrag.).
acerifolium, Howell, in Erythea, iii. 34 = Howellii.
aridum, *Greene, Pittonia*, iv. 35.—Am. bor.
binominatum, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 5.—Am. bor.
Bridgesii, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7611 = villosum.
ciliosum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 208.—Am. bor.
cognatum, *Greene, Pittonia*, iii. 115.—Am. bor.
cruentum, *Greene, l. c.* iv. 35.—Am. bor.
curvatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 295.—Am. bor.
domesticum, *Jancz. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxx. 589.—Eur.
erythrocarpum, *Coville & Leiberg, in Proc. Biol. Soc. Washington*, x. 132.—Am. bor.
Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 86.—China.
Henryi, *Franch. l. c.* 87.—China.
Howellii, *Greene, in Erythea*, iv. 57.—Am. bor.
inerme, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 202.—Am. bor.
lasianthum, *Greene, Pittonia*, iii. 22.—Calif.
Lavallei, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7611 = villosum.
leucoderme, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 93.—Am. bor.
lithuanicum, *Jancz. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxx. 589.—Eur.
macrocarpum, *Jancz. l. c.*—Eur.
mariposanum, *Congd. in Erythea*, vii. 183.—Calif.
mescalerium, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 196.—Am. bor.
molle, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 209 (non Poepp.).—Am. bor.
montanum, Howell, l. c. 210 = binominatum.
montigenum, *McClatchie, in Erythea*, v. 38.—Calif.
Munroi, *Douglas, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. 120, nomen.—Am. bor.
nitidissimum, *Neger, in Engl. Jahrb.* xxviii. 253.—Am. austr.
nubigenum, McClatchie, in Erythea, ii. 80 = montigenum.
parvulum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 203.—Am. bor.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 378.—China.
saximontanum, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 119.—Am. bor.
spaethianum, *Koehne, in Gartenfl.* 1899, 338.—Am. bor.

RICHARDIA, Kunth (Arac.).
cruciata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 51.—Bolivia.
macrocarpa, W. Watson, in Gard. Chron. 1892, II. 124 = angustiloba.
Pentlandii, Whyte, ex W. Watson, l. c. = angustiloba.

RICINOCARPOS, Desf. (Euphorb.).
controversus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 290.—Bolivia.
cordobensis, Kuntze, l. c. 291 = Acalypha cordoviensis.
depressinervius, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.

RICINODENDRON, Muell. Arg. (Euphorb.).
Rautanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 744.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 532.—Afr. trop.

RIDLEYA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1900) 338, sphalm. = **Risleya**, King & Pantl. (Orchid.).

RINOREA, Aubl. = **Alsodeia**, Thou. (Violac.).
congensis, Engl. in Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 3.—Afr. trop.
Dewevrei, Engl. in Wildem. & Th. Dur. l. c. 4.—Afr. trop.
Dupuisii, Engl. in Wildem. & Th. Dur. l. c.—Afr. trop.
khutuensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 436.—Afr. trop.
Scheffleri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
viridifolia, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 5.—Bolivia.

RIOCREUXIA, Decne. (Asclep.).
longiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 459.—Afr. trop.
splendida, *K. Schum. l. c.* 460.—Afr. trop.

RISLEYA, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. (1898) 246. *ORCHIDEAE.*
atropurpurea, *King & Pantl. l. c.* 247.—Ind. or.

RITAIA, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. (1898) 156. *ORCHIDEAE.*
himalaica, *King & Pantl. l. c.* 157 (= *Ceratostylis himalaica*).—Reg. Himal.

RIVEA, Choisy (Convolv.).
glabra, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 715 (= *Argyreia glabra*).—Malaya.
luzonensis, *Hallier f. l. c.*—Ins. Philipp.
stenosiphon, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvi. 15, repr. (= *Ipomoea stenosiphon*).—Afr. trop.

RIVINA, Plum. (Phytolacc.).
densiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 268.—Bolivia.
polyandra, *Loesen. in Engl. Jahrb.* xxiii. 123.—Am. cent.

ROBINIA, Linn. (Legum.).
Boyntonii, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 51.—Am. bor.

ROBINSONELLA, Rose & Baker f. in Gard. & For. x. (1897) 244. *MALVACEAE.*
cordata, *Rose & Baker f. l. c.*—Mexic.
discolor, *Rose & Baker f. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 181.—Mexic.
divergens, *Rose & Baker f. in Gard. & For.* x. 245.—Am. cent.
lindeniana, *Rose & Baker f. l. c.* (= *Sida lindeniana*).—Mexic.

RODRIGUEZIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
juergensiana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 377.—Bras.
obscura, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 488.—N. Granat.

ROELLA, Linn. (Campan.).
arenaria, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 193.—Afr. austr.
compacta, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
lightfootioides, *Schlechter, l. c.* xxiv. 445.—Afr. austr.
nitida, *Schlechter, l. c.* 446.—Afr. austr.
psammophila, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

ROEPEROCHARIS, Reichb. f. (Orchid.).
bennettiana, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 104.—Afr. trop.
platyanthera, *Reichb. f. l. c.*—Afr. trop.

ROLFEA, Zahlbr. in Journ. Bot. 1898, 493. *ORCHIDEAE.*
elata, *Zahlbr. l. c.*—Guiana.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anonac.).
lanceolata, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 49.—Bras.
leptopetala, *R. Fries, l. c.* 50.—Bras.
Warmingii, *R. Fries, l. c.* 49.—Bras.

ROMNEYA, Harv. (Papaverac.).
trichocalyx, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 133.—Am. bor.

ROMULEA, Maratti (Irid.).
hirta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 91.—Afr. austr.
insularis, *Sommier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. v. 132.—Ital.

ROMULEA:—
longipes, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 377.—Afr. austr.
papyracea, *Wolley-Dod, in Journ. Bot.* 1900, 170.—Afr. austr.
tempskyana, *Freyn in Bull. Herb. Boiss.* v. 798.—Cyprus.
Thodei, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 318.—Afr. austr.

RONDELETIA, Linn. (Rubiac.).
Combsii, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, vii. 427.—Ind. occ.
hondurensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 335.—Am. cent.
impressa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 412.—Ind. occ.
inermis, Krug & Urb. l. c. 416 = buxifolia.
martinicensis, *Krug & Urb. l. c.* 415.—Ind. occ.
microcalyx, *Krug & Urb. l. c.* 412.—Ind. occ.
Nimanimae, *Krug & Urb. l. c.* 418.—Ind. occ.
pachyphylla, *Krug & Urb. l. c.* 419.—Ind. occ.
portoricensis, *Krug & Urb. l. c.* 414.—Ind. occ.
subglabra, *Krug & Urb. l. c.* 418.—Ind. occ.

RONNBERGIA, E. Morr. & André (Bromel.).
maidifolia, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 158.—N. Granat.

RORIPA, Scop. = **Nasturtium**, R. Br. (Crucif.).
alpina, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 176.—Am. bor.
calycina, Rydb. l. c. 175 = N. calycinum.
Columbiae, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 40 = N. Columbiae.
curvipes, Greene, Pittonia, iii. 97.—Am. bor.
multicaulis, Greene, l. c.—Am. bor.
Nuttallii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 176.—Am. bor.
occidentalis, Greene, Pittonia, iii. 97 = N. occidentale.
pacifica, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 40.—Am. bor.
polymorpha, Howell, l. c. 41 = N. curvisiliqua.
trachycarpa, Greene, Pittonia, iii. 96 = N. trachycarpum.
Walteri, Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 23 = N. tanacetifolium.

ROSA, Tourn. (Rosac.).
alpina, Pall. Fl. Ross. ii. 61 = acicularis.
amiliavensis, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 506.—Gallia.
anotricha, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
Berdaui, *Piotrowski, l. c.* p. xxix.—Eur.
Biondii, *Crépin, in Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze* (1896–7), 132; *et in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1897, 233.—China.
carelica, Fries, Summa Veg. Scand. 171 = acicularis.
coccialba, *Kmet, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 6.—Eur.
communis, Rouy, in Rouy & Camus, Fl. Fr. vi. 281 = canina, etc.
conspicua, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 302.—Austria.
Giraldii, *Crépin, in Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze* (1896–7), 131; *et in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1897, 232.—China.
Gmelini, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 228 = acicularis.
grosse-serrata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 119.—Am. bor.
Macdougali, *Holz. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 36.—Am. bor.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iv. 10.—Am. bor.
manca, *Greene, l. c.* 11.—Am. bor.
melina, *Greene, l. c.* 10.—Am. bor.
nevadensis, *Porta & Rgo. in Atti Accad. Agiati Rovereto*, Ser. III. ii. 212; fide *Just, Jahresb.* xxiv. II. 201, 389.—Hispan.
nipponensis, Crépin, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. 7 = acicularis.
osmoidea, *Oborny, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 13.—Eur.
phasianica, *Kmet, in Kerner, l. c.* 14.—Eur.
polonica, *Wolosz. in Kerner, l. c.* 13.—Eur.
pratincola, *Greene, Pittonia*, iv. 13 (non H. Braun).—Am. bor.
Richteri, *H. Braun, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 12.—Eur.
sepiodes, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 326.—Austria.
slawodolica, *Kmet, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 8.—Eur.
slopnicensis, *Wolosz. in Spraw. Kom. Fiz. Krakau*, xxxii. 42.—Eur.

ROSA:—
soulieana, *Crépin, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 21.—China.
stellata, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 152.—Am. bor.
Stohlii, *Stohl, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 9.—Eur.
suffulta, *Greene, Pittonia*, iv. 12.—Am. bor.
svanetica, *Crépin, ex Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 138.—Reg. Caucas.
turcica, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 134.—Eur.
vistulana, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxix.—Eur.
Wagae, *Piotrowski, l. c.* p. xxviii.—Eur.
znaimensis, *Oborny & H. Braun, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 11.—Eur.

ROSEANTHUS, Cogn. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. (1896) 577. *CUCURBITACEAE.*
albiflorus, *Cogn. l. c.* 578.—Mexic.

ROSTELLARIA, Nees = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
Schimperi, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 24 = J. calcarata.
sexangularis, Hochst. l. c. xxv. (1842) Beil. i. 142 = J. sexangularis, *Lindau.*

ROSTELLULARIA, Reichb. = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
abyssinica, Nees, in DC. Prod. xi. 372 = J. diffusa.
glandulosa, Nees, l. c. 373 = Monothecium glandulosum.

ROSTRARIA, Trin. (Gramin.).
pubescens, Trin. Fund. Agrost. 150 = Koeleria phleoides.

ROTALA, Linn. (Lythrac.).
dentifera, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 17 (= *Ammannia dentifera*).—Am. bor.
diglossandra, *Koehne, l. c.*—Austral.
Dinteri, *Koehne, ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 24.—Afr. trop.
Hippuris, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. 81.—Japon.

ROTHIA, Lam. (Compos.).
degenerica, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 169.—Bolivia.
intermedia, Kuntze, l. c. 170.—Bolivia.
pinnata, Kuntze, l. c. = Schkuhria abrotanoides.
pusilla, Kuntze, l. c. = Schkuhria pusilla.

ROTHIA, Schreb. = **Andryala**, Linn. (Compos.).
lanata, Bub. Fl. Pyren. ii. 80 = A. integrifolia.
lyrata, Bub. l. c. 81 = A. ragusina.

ROTTBOELLIA, Linn. f. (Gramin.).
anceps, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. no. 8871 = compressa.
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 139.—Afr. trop.
biflora, Roxb. Fl. Ind. i. 357 = Lepturus roxburghianus.
Cymbachne, Willd. Sp. Pl. i. 465 = Andropogon Cymbachne.
gibbosa, Hack. ex Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. vi. 194 = Clarkei.
gymnorrhiza, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. no. 8875 = exaltata.
Helferi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 158.—Ind. or.
hirsuta, Vahl, Symb. Bot. i. 11 = Elionurus hirsutus.
hispida, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 156 = exaltata.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 140.—Afr. trop.
khasiana, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 157 = striata.
laevis, Retz. Obs. iii. 11 = perforata.
longiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 154.—Ind. or.
merguensis, *Hook. f. l. c.* 158.—Ind. or.
muricata, Retz. Obs. iii. 12 = Eremochloa muricata.
perforata, *Roxb. Pl. Corom.* ii. 43.—As. austr.; Malaya.
pilosa, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 785 = Enteropogon melicoides.
quaterna, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. no. 8871 = compressa.
roxburghiana, Schult. Mant. ii. 430 = Lepturus roxburghianus.
sanguinea, Retz. Obs. iii. 25 = Andropogon hirtiflorus.
Talboti, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 155.—Ind. or.
Talboti, Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. vi. 195 = Clarkei.
tripsacoides, Lam. Illustr. i. 205 = Stenotaphrum glabrum.

ROTTLERA, Vahl = **Didymocarpus**, Wall. (Gesner.).
aurea, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 250.—China.

ROTTLERA:—
Fargesii, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 251.—China.
kamerunensis, Fritsch, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 300 = D. kamerunensis.
mekongensis, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 252.—China.
tibetica, Franch. l. c. 251.—China.
uniflora, Franch. l. c.—China.
yunnanensis, Franch. l. c. 250.—China.

ROULINIA, Decne. (Asclep.).
chlorantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 729.—Ecuador.

ROUREA, Aubl. (Connar.).
acropetala, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 379 D.—Cochinch.
adiantoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 213.—Afr. trop.
anomala, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 11.—Penins. Mal.
bamangensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 82.—Afr. trop.
Baumannii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 211.—Afr. trop.
cassioides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 187.—Afr. trop.
chiliantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 212.—Afr. trop.
Foenum-graecum, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 18.—Afr. trop.
Goetzei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 394.—Afr. trop.
harmandiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 379 E.—Cochinch.
inodora, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 71.—Afr. trop.
macrantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 393.—Afr. trop.
nivea, *Gilg, l. c.* 210.—Afr. trop.
pallens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 188.—Afr. trop.
quocensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 379 C.—Cochinch.
radlkoferiana, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 342.—N. Guin.
rubella, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 379 F.—Cochinch.
strigulosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 211.—Afr. trop.
suerrensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 5.—Am. cent.
venulosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 187.—Afr. trop.

ROUREOPSIS, Planch. (Connar.).
incurva, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 379 A.—Cochinch.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 16.—Penins. Mal.

ROUXIA, Husn. Gram. Fr. Belg. 76 (1899). *GRAMINEAE.*
hordeoides, *Husn. l. c.* (= *Agropyrum Rouxii*).—Eur.

ROVILLIA, Bub. Fl. Pyren. i. 182 (1897) = **Polycnemum**, Linn. (Chenopod.).
glabra, Bub. l. c. 183 = P. arvense.

ROYDSIA, Roxb. (Cappar.).
fasciculata, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 121.—Burma.

ROYENA, Linn. (Eben.).
Guerkei, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 196.—Afr. austr.
pentandra, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 61.—Afr. trop.
Simii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 196.—Afr. austr.
Wilmsii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 60.—Afr. austr.

ROYSTONEA, O. F. Cook, in Science, Ser. II. xii. (1900) 479. *PALMAE.*
regia, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.

RUBIA, Tourn. (Rubiac.).
erratica, Bub. Fl. Pyren. ii. 327 = peregrina.

RUBUS, Tourn. (Rosac.).
adenanthus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 208.—China.
alleghaniensis, *Porter, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 153.—Am. sept.
amoenus, *Portenschl. ex Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 278.—Eur.
ampelinus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 396.—China.
amphidasys, *Focke, l. c.*—China.
apenninus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 63, descr.—Italia.
arabicus, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 204.—Arab.
Aschersonii, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 216.—Eur.

RUBUS:—
biformis, *Boulay, in Rouy & Camus, Fl. Fr.* vi. 40.—Eur.
Blockii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
borbasiellus, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
brachyadenes, *Waisb. ex Baenitz, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 25.—Eur.
brentonicus, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 61.—Eur.
bruginoensis, *Evers, l. c.* 63.—Eur.
Bucknalli, *W. White, in Journ. Bot.* 1899, 389.—Brit.
chaerophylloides, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 212.—Eur.
cocullotinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 24, descr.—Eur.
cognolensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 62.—Eur.
collicola, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 87.—Eur.
erraticus, *Sudre, l. c.* 91.—Eur.
eugenius, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 393.—China.
euleucus, *Focke, l. c.* 397.—China.
euprepes, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen*, xiv. 275.—Eur.
flagelliflorus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 393.—China.
giraldianus, *Focke, l. c.* 401.—China.
Goetzenii, *Engl. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 4.—Afr. trop.
grandis, Bub. Fl. Pyren. ii. 606 = rhamnifolius.
Hassleri, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 66.—Parag.
hesperius, *Piper, in Erythea*, v. 103 (non Rogers).—Am. bor.
hesperius, *Rogers, in Journ. Bot.* 1896, 504.—Eur.
Holtenii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 78.—Bolivia.
humilis, Bub. Fl. Pyren. ii. 610 = caesius.
illecebrosus, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen*, xvi. 278.—Japon.?
innoxius, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 395.—China.
irenaeus, *Focke, l. c.* 394.—China.
iricus, *Rogers, in Journ. Bot.* 1896, 506.—Eur.
istricus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 273.—Eur.
Jastrzebowskii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
kirungensis, *Engl. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 5.—Afr. trop.
kolmarensis, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 48.—Eur.
komoriensis, *Sprib. l. c.* 53.—Eur.
lancifolia, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
lasquiensis, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 214.—Eur.
litigiosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 93.—Eur.
longepetiolatus, *Huels. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xl. p. xxxi.—Eur.
Maranzae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 59.—Eur.
Martrini, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 95.—Eur.
mesogaeus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 399.—China.
modestus, Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen, xiv. 296 = modicus.
modicus, *Focke, l. c.* xvi. 279.—China.
montanus, Porter, in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, 120 = alleghaniensis.
niveus, Thunb. Diss. Rub. 9 = euleucus.
obscurissimus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 91.—Eur.
orthoclados, *Ley, in Journ. Bot.* 1896, 159.—Brit.
ostroviensis, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 49.—Eur.
pacatus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 395.—China.
pedemontanus, *Pinkwart, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 131.—Eur.
pilifer, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 90.—Eur.
pinicola, *H. Hofm. in Abh. Isis, Dresden*, 1897, *ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. *Gen. Heft*, 29.—Eur.
posnaniensis, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 49.—Eur.
pungens, *Utsch, ex Baenitz, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 65 (non Cambess.).—Eur.
quercetorum, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 272.—Eur.

RUBUS:—
regillus, *Ley, in Journ. Bot.* 1896, 217.—Brit.
roetensis, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 6.—Eur.
rubelliflorus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 92.—Eur.
sabinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 25, descr.—Eur.
santarosensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 80.—Bolivia.
sativus, *Brain. in Rhodora*, ii. 26.—Am. bor.
saxonicus, *H. Hofm. in Abh. Isis, Dresden*, 1897, *ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. *Gen. Heft*, 28.—Eur.
seebergensis, *Pfuhl, ex Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 51.—Eur.
sepalanthus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 391.—China.
Stuhlmannii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 374.—Afr. trop.
strugensis, *Sprib. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 216.—Eur.
teledapos, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 398.—China.
tenebricosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 88.—Eur.
tenellus, *Hayek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 655 (non Lefèv.).—Eur.
thessalus, *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* i. 503.—Eur.
Timballagravii, *P. J. Muell. ex Rouy & Camus, Fl. Fr.* vi. 97.—Eur.
trifoliatus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 270 (non aliorum).—Eur.
ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 374.—Afr. trop.
vejentinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 26.—Eur.
vezzanensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 64.—Eur.
villipes, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 92.—Eur.
villosissimus, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 605 = fruticosus.
Woloszczakii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
xanthoneurus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 392.—China.

RUDBECKIA, Linn. (Compos.).
alpicola, *Piper, in Erythea*, vii. 173.—Am. bor.
amplectens, *Greene, Pittonia*, iv. 177.—Am. bor.
divergens, *Greene, l. c.*—Am. bor.
flava, *Greene, l. c.* 179.—Am. bor.
flexuosa, *Greene, l. c.* 180.—Am. bor.
floridana, *Greene, l. c.* 176.—Am. bor.
longipes, *Greene, l. c.* 178.—Am. bor.
pinnatiloba, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 277.—Am. bor.
sericea, *Greene, Pittonia*, iv. 178.—Am. bor.
truncata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 478.—Am. bor.

RUDGEA, Salisb. (Rubiac.).
valida, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 51.—Bolivia.

RUELLIA, Plum. (Acanth.).
adenocalyx, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 46.—Bras.
adenostachya, *Lindau, l. c.* 45.—Bras.
albiflora, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 92.—Mexic.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 102.—Bolivia.
batangana, J. Braun & K. Schum. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. 173 = Physacanthus inflatus.
bignoniaeflora, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 198, partim = prostrata.
Biolleyi, *Lindau, in Anal. Inst. Fis. Geog. Costa Rica*, viii. 301.—Am. cent.
costata, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 195 = acuminata.
elliptica, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 74.—Bolivia.
elongata, Beauv. Fl. Owar. i. 46 = Whitfieldia elongata.
eumorphantha, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 38.—Mexic.
eurycodon, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 47.—Bras.
exostemma, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 654.—Venez.

RUELLIA:—
genduana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 47.—Afr. trop.
goyazensis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 45.—Bras.
gracilis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 102.—Bolivia.
hapalotricha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 44.—Bras.
heterotricha, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 220.—Arab.
imbricata, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 113 = Phaylopsis parviflora.
Lechleri, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 75.—Bolivia.
leucoderma, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 318.—Afr. trop.
lindaviana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 452.—Bras.
lindmaniana, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5, 25.—Bras.
linearibracteolata, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 70.—Afr. trop.
Loefgreni, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 654.—Bras.
longicalyx, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 219.—Arab.
malacosperma, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 572.—Am. cent.
paradoxa, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 69.—Afr. trop.
Pittieri, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 655.—Am. trop.
placoidea, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 414.—Afr. trop.
prostrata, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 24.—Afr. trop.
prostrata, Poir, Encyc. vi. 349 = patula ?
radicans, Hochst. ex Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 141 = Dyschoriste radicans.
Ruspolii, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 69.—Afr. trop.
Sclerochiton, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 7 = Paulo-wilhelmia Sclerochiton.
Sprucei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 653.—Mexic.
Stuebelii, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxi. 377.—N. Granat.
subringens, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 194.—Ind. occ.
tetrastichantha, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 300.—Am. cent.
Tonduzii, *Lindau, l. c.* 302.—Am. cent.
trachyphylla, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 46.—Bras.

RUELLIOPSIS, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 59 (1899). *ACANTHACEAE.*
mutica, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
setosa, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

RULINGIA, R. Br. (Stercul.).
coacta, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 180.—Austral.
procumbens, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 18.—Austral.
prostrata, *Maiden & Betche, l. c.*—Austral.

RUMEX, Linn. (Polygon.).
algeriensis, *Barratte & Murb. ex Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3 (1899) 6.—Afr. bor.
crispissimus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 269.—Patag.
decumbens, *Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 195.—Reg. Magell.
densiflorus, *Osterh. in Erythea*, vi. 13.—Am. bor.
fueginus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 493.—Chili.
hellenicus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 160.—Eur.
Langloisii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 405.—Am. bor.
madaio, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, x. 107.—Japon.
salinus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 549.—Am. bor.
simpliciflorus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3 (1899) 11.—Afr. bor.; Ins. Mader.
tuberosus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 283 = salinus.
tunetanus, *Barratte & Murb. ex Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3 (1899) 5.—Afr. bor.
undulatus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 285 (non aliorum).—Eur.

RUNGIA, Nees (Acanth.).
congoensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 254.—Afr. trop.
paxiana, *C. B. Clarke, l. c.* 253.—Afr. trop.

RUPICOLA, Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiii. (1898) 774. *EPACRIDEAE.*
sprengelioides, *Maiden, l. c.* 775.—Austral.

RUPPIA, Linn. (Naiad.).
curvicarpa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 122.—Am. bor.
pectinata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 18. —Am. bor.

RUPRECHTIA, C. A. Mey. (Polygon.).
fusca, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 86.—Mexic.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 476.—Mexic.

RUSBYELLA, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. (1896) 122. *ORCHIDEAE.*
caespitosa, *Rolfe, l. c.*—Bolivia.

RUSPOLIA, Lindau (Acanth.).
pseuderanthemoides, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 80, descr.—Afr. trop.

RUSSELIA, Jacq. (Scrophul.).
jaliscensis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 319. —Mexic.
tepicensis, *Robinson, l. c.* 321.—Mexic.

RUTA, Tourn. (Rutac.).
congesta, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 131 = suaveolens.
flexuosa, *Engl. l. c.* (= *Aplophyllum flexuosum*).—Oriens.

RUTHEA, Bolle = **Lichtensteinia**, Cham. & Schlecht. (Umbell.).
Burchellii, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 179 = L. Burchellii.
gummifera, Drude, l. c. (= *Glia gummifera*).—Afr. austr.
interrupta, Drude, l. c. = L. pyrethrifolia.

RUTIDEA, DC. (Rubiac.).
albiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 87.—Afr. trop.
hirsuta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 491.—Afr. trop.
lasiosiphon, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 464.—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 320, nomen.—Afr. trop.
tomentosa, *K. Schum. l. c.* 321, nomen.—Afr. trop.

RUYSCHIA, Jacq. (Ternstroem.).
platyadenia, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 34. —Bras.

RYDBERGIA, Greene, Pittonia, iii. (1898) 270. *COMPOSITAE.*
glabrata, *Greene, l. c.* (= *Actinella Brandegei*).—Am. sept.
grandiflora, *Greene, l. c.* (= *Actinella grandiflora*).—Am. sept.

RYLSTONEA, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiii. (1898) 768. *MYRTACEAE.*
cernua, *R. T. Baker, l. c.*—Austral.

RYNCHOSPORA, Vahl (Cyper.).
Arechavaletae, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 24 = cyperoides.
Berterii, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 119. —Ind. occ.
costaricensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 110. —Am. cent.
durandiana, *Boeck. l. c.* 94.—Am. cent.
gracilis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 335 = tenuis.
grandifolia, *Boeck. in Engl. Jahrb.* xxv. 587.—Ins. Samoa.
heterolepis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 94.—Bras.
hispidula, Boeck. in Linnaea, xxxvii. 604 = trichodes.
juncellus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 117. —Ind. occ.
Kuntzei, *C. B. Clarke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 336.—Bolivia.

RYNCHOSPORA:—
leucostachys, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Bras.
longifolia, *Boeck. l. c.*—Bras.
monostachya, *Boeck. l. c.* 78.—Bras.
patuligluma, *C. B. Clarke, ex Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 25 (= *Mitrospora pallida*).—Bras.
perrigida, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 93.—Am. cent.
Pittieri, *Boeck. l. c.* 109.—Am. cent.
rostrata, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 27.—Bras.
seslerioides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247 = Dichromena seslerioides.
spicata, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 95 = maculata.
splendens, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 26.—Bras.
Sprucei, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Bras.
trichodes, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 116. —Ind. occ.
uleana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 110.—Bras.

RYPARIA, Blume = **Ryparosa**, Blume (Bixac.).
javanica, Kurz, in Journ. Bot. 1873, 234 = R. javanica.
longipedunculata, Boerl. Cat. Hort. Bogor. (1899) 55 = R. longipedunculata.

RYPAROSA, Blume (Bixac.).
javanica, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 11; et xl. 185.—Java.
longipedunculata, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 55; *et ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 12.—Java.

RYTICARYUM, Becc. (Icac.).
longifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 415.—N. Guin.
oncocarpum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 416.—N. Guin.
oxycarpum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

S

SABAL, Adans. (Palm.).
Etonia, *Swingle, ex Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 99.—Am. bor.

SABBATIA, Adans. (Gentian.).
arenicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 569.—Mexic.
decandra, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 432. —Am. bor.

SABIA, Colebr. (Sabiac.).
harmandiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 360 B.—Cochinch.
papuana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 425.—N. Guin.
schumanniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 451.—China.

SABICEA, Aubl. (Rubiac.).
arborea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 58, descr. —Afr. trop.
cuneata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 47.—Bolivia.
Dinklagei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 428.—Afr. trop.
floribunda, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
speciosa, *K. Schum. l. c.* 429, descr.—Afr. trop.
trigemina, *K. Schum. l. c.* xxviii. 59.—Afr. trop.

SABINEA, DC. (Legum.).
punicea, *Urb. Symb. Antill.* i. 323.—Ind. occ.

SACCELLIUM, Humb. & Bonpl. (Borag.).
Oliverii, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 147.—Am. austr.

SACCHARUM, Linn. (Gramin.).
Boga, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8854 = spontaneum.
brevifolium, Buch.-Ham. l. c. n. 3783 B = Perotis latifolia.
Casi, Buch.-Ham. l. c. n. 8854 = spontaneum.
ciliare, Anderss. in Oefvers. Vet.-Akad. Handl. Stockh. (1855) 155 = arundinaceum.
Glaza, Reinw. ex Blume, Gew. Buitenz. 38; ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 119 = spontaneum.

SACCHARUM:—
grandiflorum, Walp. Ann. iii. 792 = Tricholaena rosea.
longifolium, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 66 = Erianthus chrysothrix.
Lota, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8854 = spontaneum.
Modhara, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 120, sphalm. = *seq.*
Modhua, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 8855 C = fuscum.
Moonja, Royle, Illustr. Bot. Himal. 416 = arundinaceum.
Munja, Roxb. Fl. Ind. i. 246 = arundinaceum.
Sara, Roxb. l. c. 244 = arundinaceum.
Sarpata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8853 D = arundinaceum.
sphacelatum, Walp. Ann. iii. 793 = Tricholaena rosea.
tenuius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8854 = spontaneum.
tridentatum, Spreng. Syst. i. 283 = Lophopogon tridentatus.

SACCOLABIUM, Blume (Orchid.).
abyssinicum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. t. 81 = Eulophia guineensis.
affine, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 228.—Ind. or.
Angraecum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 214.—Malaya.
bagnoliana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vii. 350.—N. Guin.
coarctatum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 592.—Burma.
collettianum, *King & Pantl. l. c.*—Burma.
cornigerum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 361. —Penins. Mal.
cortinatum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 215.—Malaya.
crassilabre, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 593.—Ind. or.
crassum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 294.—Borneo.
fissum, *Ridley, l. c.* xxxii. 361.—Penins. Mal.
flaveolum, *Ridley, l. c.* 360.—Penins. Mal.
kerstingianum, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 251.—N. Guin.
lancifolium, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 122.—Reg. Himal.
luisifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 360.—Penins. Mal.
miserum, *Ridley, l. c.* 359.—Penins. Mal.
mombasense, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 132.—Afr. trop.
oeonioides, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 62.—Afr. trop.
pachyglossum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 132 (non Lindl.).—Afr. trop.
pubescens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 295.—Borneo.
purpureum, *J. G. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Ins. Amboin.
radicosum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 285 = Angraecum guyonianum.
secundiflorum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 215.—Malaya.
undulatum, *Ridley, l. c.* 1900, 72.—Malaya.

SACOGLOTTIS, Mart. (Humir.).
Uchi, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 489.—Bras.

SAGINA, Linn. (Caryophyll.).
normaniana, *Lagerh. in Norsk. Vidensk. Selsk.* 1898, no. 1; fide *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 345. —Hybr.

SAGITTARIA, Rupp. (Alismac.).
brevipedicellata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 327.—Bras.
Chapmani, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 20.—Am. bor.
cycloptera, *Mohr, l. c.*—Am. bor.
Eatoni, *J. G. Sm. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 150.—Am. bor.
hebetiloba, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 6.—Am. bor.
humilis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 326 (= *Echinodorus humilis*).—Afr. trop.
Mohrii, *J. G. Sm. ex Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 19.—Am. bor.
ranunculodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 326 (= *Echinodorus ranunculoides*).—Eur. et Afr. bor.
rostrata, *Kuntze, l. c.*—Am. bor.
tenella, *Kuntze, l. c.* (= *Echinodorus tenellus*).—Am. austr.
viscosa, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 19.—Am. bor.

SAGOTANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 126. *OLACACEAE.*
Kappleri, *Van Tiegh. l. c.* (=*Heisteria Kappleri*).—Guiana.

SAINTPAULIA, Wendl. (Gesner.).
goetzeana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 481.—Afr. trop.
pusilla, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

SAKERSIA, Hook. f. (Melast.).
Laurentii, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 23.—Afr. trop.
strigosa, *Cogn. l. c.*—Afr. trop.

SALACIA, Linn. (Celastr.).
Blainii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 430.—Ind. occ.
campanuloidea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 363.—Penins. Mal.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 16.—Afr. trop.
Demeusei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* Sér. II. i. II. 11.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 79.—Afr. trop.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 368.—Penins. Mal.
Lawsoni, *King, l. c.* 369.—Penins. Mal.
ovalis, Lawson, in Hook. f. Fl. Br. Ind. i. 627 = Lawsoni.
perakensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 364.—Penins. Mal.
Schlechteri, *Loesen. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 297, nomen.—Afr. trop.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 364.—Penins. Mal.
unguiculata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 80.—Afr. trop.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 367.—Penins. Mal.

SALDANHAEA, Bureau (Bignon.).
bracteata, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 253.—Bras.
heterocalyx, *Bureau & K. Schum. l. c.* 254.—Bras.
pratensis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 256 (=*Bignonia pratensis*).—Bras.

SALICORNIA, Tourn. (Chenopod.).
leptostachya, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 143.—As. Min.
rubra, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 122.—Am. bor.
subterminalis, *Parish, in Erythea*, vi. 87.—Am. bor.

SALIX, Tourn. (Salic.).
aemulans, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 28.—Am. bor.
aequitriens, *Seemen, l. c.* xxi. *Beibl.* liii. 52.—Japon.
alaxensis, *Coville, in Proc. Washington Acad.* ii. 280.—Am. bor.
altobracensis, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 511.—Hybr.
amplifolia, *Coville, in Proc. Washington Acad.* ii. 282.—Am. bor.
atra, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 272.—Am. bor.
Balansaei, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 44.—Cochinch.
basaltica, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 509.—Hybr.
bella, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 399.—Am. bor.
Bockii, *Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 278.—China.
bolanderiana, *Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 257.—Am. bor.
crateradenia, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 9.—Afr. trop.
cyclophylla, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 274.—Am. bor.
densifoliata, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 57.—China.
dictyoneura, *Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 275.—China.
dodgeana, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 277.—Am. bor.
Fargesii, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 528.—China.
floccosa, *Burkill, l. c.* 529.—China.
glandulosa, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 55.—Japon.
Henryi, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 530.—China.

SALIX:—
heterochroma, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 56.—China.
huillensis, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 45.—Afr. trop.
interior, *Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 253.—Am. bor.
labradorica, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 274.—Am. bor.
Lapczynskii, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* iii. 111.—Hybr.
lepidostachys, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 51.—Japon.
leucosericea, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyoming*, 179, nomen.—Am. bor.
Lyallii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 580.—Am. bor.
Macounii, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 269.—Am. bor.
miyabeana, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 50.—Japon.
nigritina, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 46.—Afr. trop.
niphoclada, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 272.—Am. bor.
palaeoneura, *Rydb. l. c.* 267.—Am. bor.
parishiana, *Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 249.—Am. bor.
petrophila, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 268.—Am. bor.
Pringlei, *Rowlee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 136.—Mexic.
pseudolapponum, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 28.—Am. bor.
ramiflora, *Seemen, l. c.* xxiii. *Beibl.* lvii. 45.—Afr. trop.
Rosthornii, *Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 276.—China.
rotundata, *Rydb. ex J. M. Macoun, Fur Seals N. Pacif.* iii. 571.—Am. bor.
Rydbergii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Macounii.
saximontana, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 261.—Am. bor.
Schatzii, *Sagorski, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 314.—Eur.
stricta, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 273.—Am. bor.
subcoerulea, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 400.—Am. bor.
subpycnostachya, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 532.—China.
tenerrima, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 4.—Am. bor.
Thurberi, *Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 252.—Am. bor.
tonkinensis, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 53.—Tonkin.
Waghornei, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 271.—Am. bor.
Warburgii, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 43.—Formosa.
Wilmsii, *Seemen, l. c.* xxvii. *Beibl.* lxiv. 9.—Afr. austr.
Woloszczakii, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* iii. 111.—Hybr.
Woodii, *Seemen, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liii. 53.—Afr. austr.

SALMIA, Willd. = **Carludovica**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
laucheana, Hort. in Gard. Chron. 1893, i. 442 = C. laucheana.

SALSOLA, Linn. (Chenopod.).
Autrani, *Post, Fl. Syria*, 690.—Syria.
Forskalii, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 160.—Oriens.
turcomanica, *Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross.* ii. 10.—Turkestan.

SALVIA, Tourn. (Labiat.).
adenoclada, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 155.—Peruv.
adenophora, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 538.—Mexic.
aequidistans, *Fernald, l. c.* 512.—Mexic.
amplifrons, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 863.—Bolivia.
anaglypha, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 146.—N. Granat.
antennifera, *Briq. l. c.* 168.—Mexic.
areysiana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 229.—Arab.

SALVIA:—
atriplicifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 553.—Mexic.
avicularis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 866.—Bolivia.
baldshuanica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 89.—As. cent.
Battandieri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia Battandieri.
bella, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 169.—Am. cent.
bithynica, *Briq. & Post, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 158.—Oriens.
brachyodonta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 149.—Mexic.
Bridgesii, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 124.—Bolivia.
calocalicina, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 159.—N. Granat.
caracasana, *Briq. l. c.* 147.—Venez.
Cataria, *Briq. l. c.* 142.—Am. cent.
caymanensis, *Millsp. & Uline, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 94.—Ind. occ.
chapalensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 145.—Mexic.
chariantha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 861.—Bolivia.
Chia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 503.—Mexic.
chiapensis, *Fernald, l. c.* 544.—Mexic.
chilensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia chilensis.
cladodes, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 497.—Mexic.
coahuilensis, *Fernald, l. c.* 520.—Mexic.
cochabambensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 108.—Bolivia.
confinis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 523.—Am. bor.
Conzatii, *Fernald, l. c.* 526.—Mexic.
cordobensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 140.—Mexic.
Coulteri, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 519.—Mexic.
cryptodonta, *Fernald, l. c.* 507.—Mexic.
cyclophylla, *Fernald, l. c.* 551.—Mexic.
Despreauxii. K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia Despreauxii.
disjuncta, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 533.—Mexic.
ecuadorensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 162.—Ecuador.
eichleriana, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 191.—Graecia.
erythradena, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 853.—Bolivia.
firma, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 502.—Mexic.
flaccida, *Fernald, l. c.* 509.—Am. trop.
Fleckii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 551.—Afr. austr.
fluviatilis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 516.—Mexic.
fruticosa, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia fruticosa.
Funckii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 174.—Venez.
galinsogifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 498.—Mexic.
gasterantha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 858.—Urug.
Ghiesbreghtii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 511.—Mexic.
Goldmanii, *Fernald, l. c.* 527.—Mexic.
Gonzalezii, *Fernald, l. c.* 524.—Mexic.
guadalajarensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 132.—Mexic.
heterotricha, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 500.—Mexic.
Hochstetteri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 459.—Afr. trop.
hypoglauca, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 136.—Mexic.
iodantha, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 547.—Mexic.
iodochroa, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 161.—Am. cent.
irazuensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 540.—Am. cent.
Isabellei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 153.—Bras.
jaliscana, *Briq. l. c.* 141.—Mexic.

SALVIA:—
jamaicensis, *Fawcett, in Urb. Symb. Antill.* i. 396.—Ind. occ.
Jurgensenii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 144.—Mexic.
kuntzeana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 859.—Bolivia.
Labillardieri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia Labillardieri.
lachnaiocloda, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 154.—Ind. occ.
laterifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 494. —Mexic.
leucocalyx, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 165.—N. Granat.
lindeniana, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia lindeniana.
longemarginata, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 127.—Venez.
lophanthoides, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 499.—Mexic.
lupulina, *Fernald, l. c.* 542.—Mexic.
mandarinorum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 557.—China.
Mathewsii, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia Matthewsii.
mazatlanensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 515.—Mexic.
melanocalyx, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 862.—Reg. Argent.
menthiformis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 510. —Am. cent.
micheliana, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 10.—Parag.
michoacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 548. —Mexic.
minarum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 855.—Bras.
miniata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 545.—Mexic.
monclovensis, *Fernald, l. c.* 514.—Mexic.
monochila, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
multiramea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 525. —Mexic.
muscarioides, *Fernald, l. c.* 506.—Mexic.
Nelsonii, *Fernald, l. c.* 527.—Mexic.
neo-hispanica, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 137 = hispanica.
neurepia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 535.—Mexic.
nitidula, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 152.—Bras.
oaxacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 536.—Mexic.
oreopola, *Fernald, l. c.* 517.—Mexic.
oresbia, *Fernald, l. c.* 536.—Mexic.
orizabensis, *Fernald, l. c.* 538.—Mexic.
ourophylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 126.—Am. cent.
oxyphora, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 864.—Bolivia.
pansamalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 249.—Am. cent.
pavoniana, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia pavoniana.
perlonga, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 546.—Mexic.
permixta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 129.—Am. cent.
phaenostemma, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
platyphylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 150.—Mexic.
podadena, *Briq. l. c.* 131.—Mexic.
populifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 530. —Mexic.
pruinosa, *Fernald, l. c.* 526.—Mexic.
prunifolia, *Fernald, l. c.* 518.—Mexic.
pseudoavicularis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 867.—Bolivia.
pteroura, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 139.—Am. cent.
puberula, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 539.—Mexic.
pusilla, *Fernald, l. c.* 495.—Mexic.
pygmaea, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xi. 70.—Ins. Luchu.
ramosissima, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 521.—Am. bor.
retinervia, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 857.—Bolivia.

SALVIA:—
roscida, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 517.—Mexic.
Rosei, *Fernald, l. c.* 548.—Mexic.
rypara, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 850.—Bolivia.
saltuensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 497. —Mexic.
savannarum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 164.—N. Granat.
Schaffneri, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 535. —Mexic.
schiedeana, *Stapf, in Kew Bull.* 1896, 19.—Am. austr.
Seemannii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 516. —Mexic.
serpyllifolia, *Fernald, l. c.* 521.—Mexic.
setosa, *Fernald, l. c.* 493.—Mexic.
similata, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xi. 36.—Graecia.
sinaloensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 502. —Mexic.
siphonantha, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 172.—Ecuador.
sophrona, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 854.—Bolivia.
Sprucei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 171.—Ecuador.
tartanarivensis, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 273, sphalm. = tananarivensis.
Tatei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 135.—Mexic.
taxifolia, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 389, sphalm. = Satureia taxifolia.
Teresae, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 506.—Mexic.
tiraquensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 851.—Bolivia.
Tonduzii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 157.—Am. cent.
tovariensis, *Briq. l. c.* 130.—Venez.
trichandra, *Briq. l. c.* 133.—Mexic.
truxillensis, *Briq. l. c.* 167.—Venez.
unicostata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 501.—Mexic.
urophylla, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 388, sphalm. = ourophylla.
venosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 545.—Mexic.
villosa, *Fernald, l. c.* 518.—Mexic.
Woodii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 76.—Afr. austr.
Wunschmanni, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 397.—Ind. occ.
yunnanensis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 164.—China.
zacualpanensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 166.—Mexic.

SALVIACANTHUS, Lindau = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
Preussii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 75 = J. Preussii.

SALVIASTRUM, Scheele (Labiat.).
Engelmannii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 286 (= *Salvia Engelmannii*, A. Gr.).—Am. bor.

SAMADERA, Gaertn. (Simarub.).
baileyana, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2450.—Austral.
Bidwillii, *Oliver, l. c.* t. 2449.—Austral.
Harmandii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 210.—Malaya.
mekongensis, *Engl. l. c.*—Malaya.

SAMBUCUS, Tourn. (Caprifol.).
leiosperma, *Leiberg, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xi. 40.—Am. bor.
neomexicana, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 309.—Am. bor.
oreopola, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 146.—Am. cent.
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. ii. 329 = racemosa.

SAMOLUS, Tourn. (Primul.).
cuneatus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 491.—Am. bor.

SAMYDA, Linn. (Samyd.).
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 199.—Mexic.

SANCHEZIA, Ruiz & Pav. (Acanth.).
peruviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 103.—Peruv.
Sprucei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 648.—Peruv.

SANDORICUM, Cav. (Meliac.).
Harmandii, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 353 B.—Cochinch.

SANGUISORBA, Rupp. = **Poterium**, Linn. (Rosac.).
mediterranea, Bub. Fl. Pyren. ii. 586 = P. verrucosum.

SANICULA, Tourn. (Umbell.).
arguta, *Greene, ex Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 36.—Am. bor.
floridana, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 581.—Am. bor.
rugulosa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 491.—China.
Smallii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 578.—Am. bor.

SANSEVIERIA, Thunb. (Haemodor.).
grandicuspis, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 67.—Afr. trop.
roxburghiana, Schult. f. Syst. vii. 357 = zeylanica.
Schimperi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 335.—Afr. trop.
sulcata, *Bojer, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. 549. —Afr. trop.
zeylanica, *Willd. Sp. Pl.* ii. 159.—Zeylan.

SANTIA, Savi = **Polypogon**, Desf. (Gramin.).
elongata, Parl. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 393 = P. littoralis.
littoralis, Druce, Fl. Berks, 563 = P. littoralis.

SANTIRIA, Blume (Burser.).
lineistipula, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 379.—N. Guin.

SANTIRIDIUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1282. *BURSERACEAE.*

SANTIRIOPSIS, Engl. (Burser.).
Ebo, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1281.—Afr trop.
klaineana, *Pierre, l. c.* 1282.—Afr. trop.
obovata, *Pierre, l. c.* 1281.—Afr. trop.

SAPIUM, P. Br. (Euphorb.).
africanum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 293 = Excoecaria africana.
Bodenbenderi, *Kuntze, l. c.* 292.—Reg. Argent.
cochinchinense, Kuntze, l. c. 293 = Excoecaria cochinchinensis.
guineense, Kuntze, l. c. = Excoecaria guineensis.
Jenmanni, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2649.—Guiana.
mannianum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 986 (= *Excoecaria manniana*).—Afr. trop.
paucinervium, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2648.—Guiana.
Simii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 293.—Afr. austr.
verum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2647.—N. Granat.

SAPONARIA, Linn. (Caryophyll.).
cyprica, Post, in Bull. Herb. Boiss. v. 755 = cypria.
Dalmasi, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 289.—Lycia.
dichotoma, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 120. —Turkestan.
Wiemanni, *Fritsch, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 2.—Hybr.

SAPRANTHUS, Seem. = **Porcelia**, Ruiz & Pav. (Anonac.).
microcarpus, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5, 12 = P. microcarpa.

SAPROSMA, Blume (Rubiac.).
buxifolia, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 101.—N. Guin.
nativitatis, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 180.—Ins. Christm.
novo-guineense, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 586.—N. Guin.

SARACA, Linn. (Legum.).
biglandulosa, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 387 A.—Cochinch.
bijuga, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 214.—Penins. Mal.
dives, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 386 B.—Cochinch.
griffithiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 491. —Burma.
harmandiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 387 B.—Cochinch.
Hullettii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 492.—Borneo.
Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 213.—Penins. Mal.
latistipulata, *Prain, ex King, l. c.* 217.—Penins. Mal.
thaipingensis, *Cantley, ex King, l. c.* 211.—Penins. Mal.

SARANTHE, Eichl. = **Myrosma**, Linn. f. (Scitam.).
madagascariensis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 96 = M. unilaterale.

SARCANTHUS, Lindl. (Orchid.).
bambusarum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 123.—Reg. Himal.
bracteatus, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 370.—Penins. Mal.
castaneus, *Ridley, l. c.* 369.—Penins. Mal.
halophilus, *Ridley, l. c.* 367.—Malaya.
hongkongensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 198.—China.
Kunstleri, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 594.—Penins. Mal.
pendulus, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 141.—Java.
pensilis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 369.—Penins. Mal.
rolfeanus, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 594.—Burma.
rostellatus, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 72.—Malaya.
sacculatus, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 368.—Penins. Mal.
sagittatus, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 595.—Reg. Himal.

SARCOCAULON, Sweet (Geran.).
mossamedense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 108 (= *Monsonia mossamedensis*).—Afr. trop.
spinosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 33 = Burmanni.

SARCOCEPHALUS, Afzel. (Rubiac.).
hirsutus, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 32.—Malaya.
Maingayi, *Havil. l. c.* 33 (= *Nauclea Maingayi*).—Malaya.
missionis, *Havil. l. c.* 32 (= *Nauclea missionis*).—Ind. or.
pacificus, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 684.—Ins. Samoa.
parvus, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 31.—Borneo.
richardianus, *Baill. Adansonia*, xii. 312 (= *Breonia richardiana*).—Madag.
tenuiflorus, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 32.—N. Guin.

SARCOCHILUS, R. Br. (Orchid.).
adnatus, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 373.—Penins. Mal.
bimaculatus, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 340.—Reg. Himal.
biserratus, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 73.—Malaya.
carnosum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 338.—Penins. Mal.
crepidiformis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 340.—Reg. Himal.
englerianum, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 252.—N. Guin.
hainanensis, *Rolfe, Kew Hand-List Orch.* ed. I. 201; *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7489.—China.
pygmaeum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 207.—Ind. or.
sigmoideus, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 298.—Borneo.
Vriesii, *Ridley, l. c.* 297.—Borneo.

SARCOCOLLA, Linn. (Penaeac.).
Sarcocolla, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 281 = squamosa.

SARCOGONUM, G. Don = **Muehlenbeckia**, Meissn. (Polygon.).
chilensis, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 128 = M. chilensis.
tamnifolium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 111 = M. tamnifolia.

SARCOLOBUS, R. Br. (Asclep.).
multiflorus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 509.—N. Guin.

SARCOMELICOPE, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. III. iv. 122 (1896). *RUTACEAE.*
sarcococca, *Engl. l. c.* (= *Evodia sarcococca*).—N. Caled.

SARCOMPHALUS, P. Br. (Rhamn.).
domingensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 357 (= *Cassine domingensis*).—Ind. occ.
reticulatus, *Urb. l. c.* (= *Zizyphus reticulata*).—Ind. occ

SARCOSTEMMA, R. Br. (Asclep.).
andongense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 689.—Afr. trop.
Glaziovii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 19.—Bras.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 689.—Afr. trop.

SARCOSTIGMA, Wight & Arn. (Olac.).
angustifolia, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1320.—Afr. trop.
paniculata, *Pierre, l. c.* 1319.—Afr. trop.

SARMASIKIA, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 550 = **Cynanchum**, Linn. (Asclep.).
Dondonaei, Bub. l. c. = C. acutum.
Gesneri, Bub. l. c. = C. acutum.

SATANOCRATER, Schweinf. (Acanth.).
fruticulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 305 = Phillipsia fruticulosa.
paradoxa, Lindau, l. c. = somalensis.
Ruspolii, Lindau, l. c. = fellatensis.
somalensis, *Lindau, l. c.*—Afr. trop.

SATUREIA, Linn. (Labiat.).
abyssinica, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 301 (= *Micromeria abyssinica*).—Afr. trop.
acutifolia, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia acutifolia*).—Peruv.
annua, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha annua*).—Rossia.
argentea, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia argentea*).—Peruv.
arkansana, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha Nuttallii*).—Am. bor.
atheniensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 192.—Hybr.
baborensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 301 (= *Calamintha baborensis*).—Afr. bor.
Battandieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 186 (= *Micromeria Fontanesii*).—Afr. bor.
Benthamii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (= *Micromeria Benthami*).—Ins. Canar.
betulaefolia, *Briq. l. c.* 301 (= *Calamintha betulifolia*).—Cilicia.
biflora, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria biflora*).—Ind. or.; Arab.; Afr. trop.
Boissieri, *Briq. l. c.* 302.—Hybr.
boliviana, *Briq. l. c.* 300 (= *Micromeria boliviana*).—Bolivia.
bonariensis, *Briq. l. c.* (= *Micromeria bonariensis*).—Reg. Argent.
bourgaeana, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria bourgaeana*).—Ins. Canar.
breviflora, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia breviflora*).—Peruv.
Brownii, *Briq. l. c.* (= *Micromeria Brownei*).—Am. bor. et austr.
Buchii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 186 (= *Micromeria Buchii*).—Ins. Canar.
candidissima, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 302 (= *Calamintha candidissima*).—Afr. bor.
capitellata, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria capitellata*).—Ind. or.
caroliniana, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha caroliniana*).—Am. bor.
chilensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 191 (= *Gardoquia Gilliesii*).—Chili.
chinensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 302 (= *Calamintha chinensis*).—China.
congesta, *Briq. l. c.* 301 (= *Micromeria congesta*).—As. Min.
cremnophila, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria cremnophila*).—Graecia.
cretica, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha cretica*).—Ins. Creta.
croatica, *Briq. l. c.* (= *Micromeria croatica*).—Croatia.
cymuligera, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria cymuligera*).—As. Min.
Darwinii, *Briq. l. c.* 300 (= *Micromeria Darwinii*).—Patag.
debilis, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintna debilis*).—Sibir.
densiflora, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria densiflora*).—Ins. Canar.
dentata, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha dentata*).—Am. bor.
depauperata, *Briq. l. c.* 299 (= *Calamintha depauperata*).—Persia.

SATUREIA:—
Despreauxii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 186.—Ins. Canar.
discolor, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (= *Gardoquia discolor*).—N. Granat.
Douglasii, *Briq. l. c.* 300 (= *Micromeria Douglasii*).—Am. bor.
Edmondi, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186 = longiflora.
elegans, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (= *Gardoquia elegans*).—Peruv.
elliptica, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia elliptica*).—Peruv.
elliptica, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria elliptica*).—Armenia.
fasciculata, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia fasciculata*).—N. Granat.
flagellaris, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria flagellaris*).—Madag.
florida, *Briq. l. c.* (= *Calamintha florida*).—As. Min.
foliolosa, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia foliolosa*).—N. Granat.
Fontanesii, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria inodora*).—Afr. bor.
Forbesii, *Briq. l. c.* (= *Micromeria Forbesii*).—Ins. Cap. Virid.
friwaldszkyana, *Briq. l. c.* 301.—Europ.
fruticosa, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 192 (= *Micromeria marifolia*).—Eur. austr.
Gilliesii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (= *Gardoquia Gilliesii*).—Chili.
Gilliesii, Briq. l. c. 380 = oligantha.
glabella, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha glabella*).—Am. bor.
glabrata, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia glabrata*).—Ecuador.
Haussknechtii, *Briq. l. c.* 299 (= *Calamintha Haussknechtii*).—Persia.
helianthemifolia, *Briq. l. c.* (= *Micromeria helianthemifolia*).—Ins. Canar.
herpyllimorpha, *Briq. l. c.* (= *Micromeria herpyllomorpha*).—Ins. Canar.
hispidula, *Briq. l. c.* 303 (= *Calamintha hispidula*).—Hispan.
Hydaspidis, *Briq. l. c.* 301 (= *Micromeria Hydaspidis*).—Reg. Himal.
hyssopifolia, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 186 (= *Micromeria varia*).—Ins. Canar.
imbricata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (= *Thymus imbricatus*).—Arab.
incana, *Briq. l. c.* 301 (= *Calamintha incana*).—Graecia.
Jamesoni, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia Jamesoni*).—Peruv.
julianoides, *Briq. l. c.* 299.—Ins. Canar.
Kunthii, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia grandiflora*).—Ecuador.
kuntzeana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 874.—Bolivia.
Labillardieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 187.—Syria.
lachnophylla, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (= *Micromeria lachnophylla*).—Ins. Canar.
laxifolia, Briq. l. c. 300, sphalm. = taxifolia.
lepida, *Briq. l. c.* 299 (= *Micromeria lepida*).—Ins. Canar.
libanotica, *Briq. l. c.* 301 (= *Micromeria libanotica*).—Syria.
lindeniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 191.—N. Granat.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 186.—Eur.
macrostema, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 302 (= *Calamintha macrostema*).—Mexic.
maritima, *Briq. l. c.* 303 (= *Calamintha maritima*).—Thracia.
Matthewsii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 189.—Peruv.
mexicana, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (= *Gardoquia mexicana*).—Mexic.
micromerioides, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia micromerioides*).—Mexic.
microphylla, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia microphylla*).—Ecuador.
mimuloides, *Briq. l. c.* 302 (= *Calamintha mimuloides*).—Calif.
multiflora, *Briq. l. c.* 300 (= *Gardoquia multiflora*).—Chili.
nivea, *Briq. l. c.* 299 (= *Calamintha nivea*).—As. Min.

SATUREIA:—
nubigena, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (=*Micromeria nubigena*).—Peruv.
nummularifolia, *Briq. l. c.* 301 (=*Micromeria nummularifolia*).—Syria.
obovata, *Briq. l. c.* 300 (=*Gardoquia obovata*).—Peruv.
oligantha, *Briq. l. c.* 380 (=*Micromeria Gilliesii*).—Chili.
origanifolia, *Briq. l. c.* 299 (=*Calamintha origanifolia*).—As. Min.
Palmeri, *Briq. l. c.* 303 (=*Calamintha Palmeri*).—Calif.
pamphylica, *Briq. l. c.* 301 (=*Calamintha pamphylica*).—As. Min.
pavoniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 189 (=*Gardoquia incana*).—Ecuador.
Perezii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (=*Micromeria Perezii*).—Ins. Canar.
persica, *Briq. l. c.* (=*Micromeria persica*).—Persia.
piperita, *Briq. l. c.* 302 (=*Calamintha longicaulis*).—Reg. Himal.
poliodes, *Briq. l. c.* 299 (=*Micromeria polioides*).—Ins. Canar.
Pomelii, *Briq. l. c.* 302 (=*Calamintha nervosa*).—Afr. bor.
pulchella, *Briq. l. c.* 300 (=*Gardoquia pulchella*).—Ecuador.
Pulegium, *Briq. l. c.* 301 (=*Micromeria Pulegium*).—Banat.
punctata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = Micromeria biflora.
purpurea, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (=*Micromeria purpurea*).—Calif.
revoluta, *Briq. l. c.* (=*Gardoquia revoluta*).—Peruv.
rotundifolia, *Briq. l. c.* 302 (=*Calamintha graveolens*).—Reg. Medit.
rouyana, *Briq. l. c.* 301.—Ins. Balear.
rugosa, *Briq. l. c.* 300 (=*Gardoquia rugosa*).—Peruv.
sericea, *Briq. l. c.* (=*Gardoquia sericea*).—Peruv.
serpyllifolia, *Briq. l. c.* 301 (=*Micromeria serpyllifolia*, Boiss.).—Graecia.
simensis, *Briq. l. c.* 303 (=*Calamintha simensis*).—Afr. trop.
sinaica, *Briq. l. c.* 299 (=*Micromeria sinaica*).—Arab.
Skorpili, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1899, 6.—Eur.
staminea, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (=*Calamintha staminea*).—Kurdistan.
stolonifera, *Briq. l. c.* 300 (=*Micromeria stolonifera*).—Mexic.
striata, *Briq. l. c.* (=*Gardoquia striata*).—Peruv.
taxifolia, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 192 (=*Gardoquia taxifolia*).—N. Granat.
Teneriffae, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (=*Micromeria Teneriffae*).—Ins. Teneriff.
tenuis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 185.—Eur.
teydensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 299 (=*Micromeria teydensis*).—Ins. Canar.
thymifolia, *Briq. l. c.* 302 (=*Calamintha thymifolia*).—Carniola.
thymoides, *Briq. l. c.* 300 (=*Gardoquia thymoides*).—Ecuador.
tomentosa, *Briq. l. c.* (=*Gardoquia tomentosa*).—Ecuador.
vulgaris, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 477 (=*Calamintha Clinopodium*).—Reg. bor. temp.
xalapensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 300 (=*Micromeria Brownei*).—Am. bor. et austr.

SATYRIUM, Linn. (Orchid.).
anomalum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 424.—Afr. trop.
aphyllum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
Baronii, *Schlechter, l. c.* 423.—Madag.
beyrichianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 508.—Afr. austr.
breve, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 274.—Afr. trop.
Buchanani, Rolfe, l. c. 270 = speciosum.
Buchananii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 422.—Afr. trop.
Carsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 265.—Afr. trop.
cheirophorum, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
densum, *Rolfe, l. c.* 270.—Afr. trop.
elongatum, *Rolfe, l. c.* 268.—Afr. trop.

SATYRIUM:—
fischerianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 507.—Afr. trop.
goetzenianum, *Kraenzl. l. c.* 506.—Afr. trop.
Johnsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 265.—Afr. trop.
Kirkii, *Rolfe, l. c.* 271.—Afr. trop.
Kraenzlini, *Rolfe, l. c.* 269.—Afr. trop.
longissimum, *Rolfe, l. c.* 267.—Afr. trop.
mechowianum, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xvii. 65 = Schinzii.
Mechowii, *Reichb. f. in Flora*, 1882, 531.—Afr. trop.
minax, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 268.—Afr. trop.
monopetalum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 504.—Afr. austr.
mystacinum, *Kraenzl. l. c.* 506.—Afr. trop.
nutans, *Kraenzl. l. c.* 507.—Afr. austr.
Nuttii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 273.—Afr. trop.
nyassense, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 178.—Afr. trop.
occultum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 273.—Afr. trop.
orbiculare, *Rolfe, l. c.* 266.—Afr. trop.
outeniquense, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 421.—Afr. austr.
paludicolum, *Schlechter, ex Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 669.—Afr. austr.
pentadactylum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 506.—Afr. austr.
rupestre, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 422.—Afr. austr.
sacculatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 266.—Afr. trop.
Schinzii, *Th. Dur. & Kraenzl. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 696.—Afr. trop.
setchuenicum, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 266.—China.
shirense, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 266.—Afr. trop.
speciosum, *Rolfe, l. c.* 574.—Afr. trop.
tenuifolium, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 505.—Afr. austr.
trachypetalum, *Kraenzl. l. c.*—Afr. trop.
trachyphyllum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 338, sphalm. = praec.
triphyllum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 504.—Afr. austr.
Volkensii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 425.—Afr. trop.
wilmsianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 505.—Afr. austr.
zombense, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 273.—Afr. trop.

SAULCYA, Michon = **Odontospermum**, Neck (Compos.).
hierochuntica, Michon, Voy. Relig. Or. ii. 383 = O. pygmaeum.

SAURANIA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1899) 499, sphalm. = seq.

SAURAUJA, Willd. (Ternstroem.).
andreana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 106.—Austral.
costaricensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 236.—Am. cent.
hoeveniana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 643.—Celebes.
Klinkii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 447.—N. Guin.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 643.—Celebes.
Pittieri, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 237.—Am. cent.
ramiflora, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 278.—Java.
Rodatzii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 446.—N. Guin.
rosea, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* (non Jungh.).—N. Guin.
rufa, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 97.—N. Guin.
Schwazii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 644.—Celebes.
squamulosa, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 268.—Java.
trichocalyx, *Koord. & Valet. l. c.* 262.—Java.
umbellata, *Koord. & Valet. l. c.* 256.—Java.

SAURAUJA:—
Warburgii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 644.—Celebes.
Waworoentii, *Koord. l. c.*—Celebes.
Wigmanni, *Koord. l. c.*—Celebes.
Yasicae, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxiii. 125.—Am. cent.

SAUSSUREA, DC. (Compos.).
brachycephala, *Franch. in Bull. Herb. Boiss.* v. 540.—Japon.
cinerea, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1897, 324.—Tibet.
compta, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 422.—China.
dutaillyana, *Franch. l. c.* 421.—China.
Fauriei, *Franch. in Bull. Herb. Boiss.* v. 542.—Japon.
kiusiana, Franch. l. c. = nipponica.
lingulata, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 423.—China.
masarica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 81.—As. cent.
mongolica, *Franch. in Bull. Herb. Boiss.* v. 539.—China.
oligantha, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 421.—China.
Reinii, Franch. in Bull. Herb. Boiss. v. 539 = scaposa.
Sagitta, *Franch. l. c.* 540.—Japon.
spinulifera, *Franch. l. c.* 538.—Japon.
Wellbyi, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2588.—Tibet.

SAUVAGESIA, Linn. (Violac.).
congoensis, *Engl. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.

SAVASTANA, Schrank = **Hierochloe**, S. G. Gmel. (Gramin.).
Nashii, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 104.—Am. bor.

SAXIFRAGA, Tourn. (Saxifr.).
alba, Bub. Fl. Pyren. ii. 688 = granulata.
albowiana, *Kurtz, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 370.—Fuegia.
apetala, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 393.—Am. bor.
aprica, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 25.—Am. bor.
aquatica, Bub. Fl. Pyren. ii. 679 = adscendens.
austromontana, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 389.—Am. bor.
chamaepityfolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 679 = ajugifolia.
chionophila, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 265.—China.
claytoniaefolia, *Canby, ex Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 365.—Am. bor.
cognata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 118.—Am. bor.
columbiana, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 393.—Am. bor.
Cordi, Bub. Fl. Pyren. ii. 665 = S. Aizoon.
Duthiei, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 419.—Reg. Himal.
Fagonii, Bub. Fl. Pyren. ii. 678 = mixta.
fallax, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 25.—Am. bor.
Fauriei, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 687.—Japon.
fragosa, *Suksd. ex Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 363.—Am. bor.
gemmigera, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 366.—China.
gemmipara, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 262.—China.
giraldiana, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 365.—China.
Grisebachii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Acad. Wiss. Wien*, lxiv. 721.—Eur.
Hervieri, *Debeaux, in Baenitz, Herb. Eur.* 1897, 6.—Eur.
hypericoides, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 261.—China.
idahoensis, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 394.—Am. bor.
japonica, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 687.—Japon.
Josephi, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 366.—China.
likiangensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 266.—China.
melanocentra, *Franch. l. c.* 263.—China.

SAXIFRAGA:—
montanensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 367.—Am. bor.
napensis, *Small, l. c.* 1898, 316.—Am. bor.
Nuttallii, *Small, l. c.* 1896, 368.—Am. bor.
occidentalis, Bub. Fl. Pyren. ii. 674 = S. Geum.
oreophila, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 260.—China.
parvifolia, *Greene, Pittonia,* iii. 116.—Am. bor.
phaenophylla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 261.—China.
plantaginea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 366.—Am. bor.
radulina, *Greene, Pittonia,* iii. 308.—Am. bor.
rhomboidea, *Greene, l. c.* 343.—Am. bor.
rupicola, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 264.—China.
Rydbergii, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 194.—Am. bor.
saximontana, *E. Nelson, in Erythea,* vii. 168.—Am. bor.
Sierrae, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 366 = oregana.
subapetala, *E. Nelson, in Erythea,* vii. 169.—Am. bor.
tennesseensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 364.—Am. bor.
umbellulata, Greene, Erythea, i. 222 = aprica.
Van-bruntiae, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 316.—Am. bor.

SAXIFRAGOPSIS, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 19. *SAXIFRAGACEAE.*
fragarioides, *Small, l. c.* 20 (= *Saxifraga fragarioides*).—Calif.

SCABIOSA, Tourn. (Dipsac.).
calcarea, *Tocl, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 9.—Eur.
cyprica, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 757.—Ins. Cyprus.
fruticulosa, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 136.—Eur.

SCAEVOLA, Linn. (Gooden.).
laciniata, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 910.—Austral.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 628.—Celebes.
similis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.

SCALIGERIA, DC. = **Conopodium**, Koch (Umbell.).
allioides, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 166 = C. allioides.
assyriaca, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 611.—As. Min.
multijuga, Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlviii. 592.—Syria.

SCAPHOPETALUM, Mast. (Stercul.).
monophysca, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 241.—Afr. trop.
stipulosum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. in Bull. Herb. Boiss.* v. 523.—Afr. trop.
Zenkeri, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 241.—Afr. trop.

SCAPHYGLOTTIS, Poepp. & Endl. (Orchid.).
prolifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 15 (= *Ponera prolifera*).—Bras.

SCHAUERIA, Nees (Acanth.).
populifolia, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 242.—Afr. trop.

SCHEDONORUS, Beauv. = **Festuca**, Linn. (Gramin.).
transparens, Munro, ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 355 = F. sibirica.

SCHEELEA, Karst. (Palm.).
anizitziana, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 63.—Bras.
kewensis, *Hook. f. Bot. Mag.* tt. 7552-3.—Am. trop.
quadrisperma, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 23.—Parag.

SCHEFFLERA, Forst. (Aral.).
Fargesii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 486 (= *Heptapleurum Fargesii*).—China.
Goetzenii, *Harms, in Goetzen, Durch Afr.* repr. 7.—Afr. trop.
humblotiana, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 3.—Madag.

SCHEFFLERA:—
megalobotrya, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 486.—China.
myriantha, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 3 (= *Cussonia myriantha*).—Madag.
revoluta, *Drake, l. c.* 4.—Ins. Maurit.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 243.—Afr. trop.

SCHEFFLERODENDRON, Harms, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 84, nomen. *LEGUMINOSAE.*
usambarense, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

SCHICKENDANTZIA, Speg. Pl. Nov. Argent. iii. (1897) 7. *LILIACEAE.*
trichosepala, *Speg. l. c.*—Reg. Argent.

SCHIMA, Reinw. (Ternstroem.).
argentea, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 473.—China.

SCHIMMELIA, Holmes, in Pharmac. Journ. Lond. lxii. (1899) 53. *RUTACEAE.*
oleifera, *Holmes, l. c.* (= *Amyris balsamifera*).—Ind. occ.

SCHINOCARPUS, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 360, sphalm. = **Selinocarpus**, A. Gray (Nyctag.).

SCHISMATOGLOTTIS, Zoll. & Mor. (Arac.).
celebica, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 19.—Celebes.
trivittata, *Hallier, in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 324.—Malaya.
warburgiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 20.—Ins. Philipp.
zonata, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 323.—Malaya.

SCHISMUS, Beauv. (Gramin.).
aristulatus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 695.—Afr. austr.
brevifolius, Nees, Fl. Afr. Austr. 422 = fasciculatus.
calycinus, Duval-Jouve, in Billot, Adnot. 285 = fasciculatus.
fasciculatus, *Beauv. Agrost.* 74, 177.—Afr. austr.
koelerioides, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 694.—Afr. austr.
marginatus, Beauv. Agrost. 177, t. 15 = fasciculatus.
tenuis, Steud. Syn. Pl. Gram. 295 = fasciculatus.

SCHISTOCARPHA, Less. (Compos.).
eupatorioides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 63.—Ecuador.
Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 170.—Bolivia.

SCHISTOGYNE, Hook. & Arn. (Asclep.).
attenuata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 77.—Bolivia.

SCHISTOSTEPHIUM, Less. (Compos.).
artemisiaefolium, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 270.—Afr. trop.
microcephalum, *Baker, l. c.*—Afr. trop.

SCHIZANDRA, Michx. (Magnol.).
glaucescens, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 323.—China.

SCHIZANTHUS, Ruiz & Pav. (Solan.).
San Romani, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 126.—Chili.

SCHIZOCARPUM, Schrad. (Cucurb.).
attenuatum, *Cogn. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 124.—Mexic.

SCHIZOCASIA, Schott (Arac.).
lauterbachiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 26.—N. Guin.

SCHIZODIUM, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).
antenniferum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 426.—Afr. austr.

SCHIZOGLOSSUM, E. Mey. (Asclep.).
angolense, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 98.—Afr. trop.
biflorum, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 449 = venustum.
delagoense, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 446.—Afr. austr.
exile, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 4 (= *Lagarinthus exilis*).—Afr. austr.
fusco-purpureum, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 98.—Afr. trop.

SCHIZOGLOSSUM:—
Goetzei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 455.—Afr. trop.
lividiflorum, *K. Schum. l. c.* 454.—Afr. trop.
togoense, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 308, nomen.—Afr. trop.
viridulum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 455.—Afr. trop.

SCHIZONEPETA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 235 (1896). *LABIATAE.*
botryoides, *Briq. l. c.* (= *Nepeta botryoides*).—Reg. Himal.
tenuifolia, *Briq. l. c.* (= *Nepeta tenuifolia*).—China.

SCHIZOPETALON, Sims (Crucif.).
fuegianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* v. 48.—Fuegia.

SCHIZOSTACHYUM, Nees (Gramin.).
aciculare, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 117.—Ind. or.
aviculare, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 391, sphalm. = praec.
chilianthum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 88 (= *Chloothamnus chilianthus*).—Sumatra.
Copelandi, *F. Muell. & Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 241.—N. Guin.
latifolium, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 117.—Ind. or.
tenue, *Gamble, l. c.* 114.—Ind. or.

SCHIZOTHECA, Ehrenb. = **Thalassia**, Soland. (Hydroch.).
Hemprichii, Ehrenb. in Abh. Akad. Berl. i. (1832) 429; et ex Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 194 = T. Hemprichii.

SCHLECHTERELLA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register, 462 (1899) = **Tacazzea**, Decne. (Asclep.).

SCHLECHTERIA, Bolus, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 455. *CRUCIFERAE.*
capensis, *Bolus, l. c.*—Afr. austr.

SCHMIDTIA, Steud. (Gramin.).
bulbosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 658.—Afr. austr.

SCHNIZLEINIA, Steud. ex Hochst. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).
amica, Steud. ex Hochst. in Flora, 1844, 31 = V. Schnitzleinia.

SCHOENANTHUS, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1900) 499, errore = **Ichnanthus**, Beauv. (Gramin.).

SCHOENEFELDIA, Kunth = **Chloris**, Sw. (Gramin.).
gracilis, Kunth, Rév. Gram. 283 = C. pallida.
pallida, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 183 = C. pallida.

SCHOENIDIUM, Nees = **Ficinia**, Schrad. (Cyper.).
laterale, Nees, in Linnaea, ix. 292 = F. aphylla.

SCHOENLANDIA, Cornu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 21. *PONTEDERIACEAE.*
gabonensis, *Cornu, l. c.* 24.—Afr. trop.

SCHOENOCAULON, A. Gray (Liliac.).
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 295.—Mexic.

SCHOENOCRAMBE, Greene, Pittonia, iii. (1896) 124. *CRUCIFERAE.*
linifolia, *Greene, l. c.* 127 (= *Sisymbrium linifolium*).—Am. bor.
pinnata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
pygmaea, *Greene, l. c.* 128 (= *Sisymbrium pygmaeum*).—Am. bor.

SCHOENOPLECTUS, Palla = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).
Kalmussii, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 215 = S. Kalmusii.

SCHOENORCHIS, Reinw. (Orchid.).
simmleriana, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 654.—Hort.

SCHOENOXIPHIUM, Nees (Cyper.).
Buchanani, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 676 = Carex Buchanani.

SCHOENUS, Linn. (Cyper.).
antarcticus, *Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 213.—Am. austr.
filiformis, Roem. & Schult. Syst. Mant. ii. 528 = Ficinia aphylla.
hexandrus, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 380.—Austral.
lateralis, Vahl, Enum. ii. 211 = Ficinia aphylla.
paludosus, Poir, Encyc. Suppl. ii. 251 = Costularia paludosa.
pusillus, Sw. Prod. 20 = Rynchospora Berterii.
Rottboellii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = Lepidosperma Rottboellii.

SCHOEPFIA, Schreb. (Olac.).
gibbosa, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 551.—China.
Griffithii, *Van Tiegh. l. c.* (= *griffithiana*, Valet. ?).—Ind. or.
pallida, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 146.—Ind. occ.

SCHOEPFIOPSIS, Miers = **Schoepfia**, Schreb. (Olac.).
gibbosa, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 551 = Schoepfia gibbosa.
Griffithii, Van Tiegh. l. c. = Schoepfia Griffithii.

SCHOUWIA, DC. (Crucif.).
purpurea, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 183 = arabica.

SCHRANKIA, Willd. (Legum.).
floridana, *Chapm. Fl. S. U. S.* ed. III. 127.—Am. sept.
horridula, *Chapm. l. c.*—Am. sept.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 267.—Ind. occ.

SCHREBERA, Roxb. (Oleac.).
goetzeana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 450.—Afr. trop.
platyphylla, *Gilg, l. c.* 449.—Afr. trop.

SCHRENKIA, Regel & Schmalh. (Umbell.).
insignis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 73.—As. cent.

SCHUBEA, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 22. *EUPHORBIACEAE.*
heterophylla, *Pax, l. c.* 23.—Afr. trop.

SCHULTESIA, Mart. (Gentian.).
apiculata, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 511.—Bras.

SCHUMANNIOPHYTON, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 313 (1897). *RUBIACEAE.*
magnificum, *Harms, l. c.* (= *Tetrastigma magnificum*).—Afr. trop.

SCHURMANSIA, Blume (Violac.).
Bamleri, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 448.—N. Guin.

SCHWABEA, Endl. (Acanth.).
Anisacanthus, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 346 = Ecbolium Anisacanthus.
ciliaris, Nees, in DC. Prod. xi. 384 = Monechma hispidum.
ecbolioides, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 58 = Ecbolium Anisacanthus.
revoluta, Lindau, l. c. 59 = Ecbolium revolutum.
spicigera, Nees, in DC. Prod. xi. 384 = Monechma hispidum.

SCHWARTZKOPFFIA, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 177. *ORCHIDEAE.*
buettneriana, *Kraenzl. l. c.*—Afr. trop.

SCILLA, Linn. (Liliac.).
alvesiana, *Welw. ex Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 171.—Eur.
Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
chlorantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 555.—Afr. trop.
cordifolia, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Currori, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. 249 = Eriospermum Currori.
diphylla, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 489.—Afr. austr.
Dybowskii, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 677.—Afr. trop.
edulis, *Hua, l. c.* 676 (non Engl.).—Afr. trop.
Galpini, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 487.—Afr. austr.

SCILLA:—
globosa, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
Hildebrandtii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 556, descr.—Afr. trop.
hispidula, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 248 = rigidifolia.
Holzmannia, *Heldr. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 393.—Graecia.
inandensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 483.—Afr. austr.
lachenalioides, *Baker, l. c.* 482.—Afr. austr.
Leichtlinii, *Baker, l. c.* 486.—Afr. austr.
leptophylla, *Baker, l. c.* 483.—Afr. austr.
megaphylla, *Baker, l. c.* 490.—Afr. austr.
modesta, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 554.—Afr. trop.
Nelsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 488.—Afr. austr.
oostachys, *Baker, l. c.* 487.—Afr. austr.
oubangluensis, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 677.—Afr. trop.
palustris, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 251.—Afr. austr.
persica, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 44.—Persia.
Rautanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. 857.—Afr. trop.
Rogersii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 486.—Afr. austr.
setifera, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 549.—Afr. trop.
Sickenbergeri, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 231.—Arab.
sphaerocephala, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
Tysoni, *Baker, l. c.*—Afr. austr.

SCINDAPSUS, Schott (Arac.).
grandifolius, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 13.—Hort.
sinensis, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 234.—China.
Treubii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 13.—Hort.

SCIRPUS, Tourn. (Cyper.).
aegialites, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 477.—Chili.
arenarius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 741 = Bulbostylis humilis.
atratus, *Fernald, in Rhodora*, ii. 18.—Am. bor.
atrocinctus, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 502.—Am. bor.
breviculmis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 742 = Bulbostylis breviculmis.
Burkei, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis Burkei*).—Afr. austr.
calolepis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = Fuirena calolepis.
campestris, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* i. 267 (non aliorum).—Am. bor.
camptotrichus, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 173 = Eleocharis camptotricha.
chloroticus, *R. Phil. in Anal. Chil. Univ.* xciii. 480.—Chili.
coerulescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = Fuirena coerulescens.
constitutionis, *Boeckl. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 483.—Chili.
coronatus, Steud. in Flora, 1829, 136 = Ficinia setiformis.
Desvauxi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 482.—Chili.
didymostachyus, *R. Phil. l. c.* 475.—Chili.
dregeanus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 224.—Afr. austr.
elatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 694 = Ficinia tenuifolia.
falsus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 230.—Afr. austr.
filamentosus, Vahl, Enum. ii. 262 = Bulbostylis filamentosa.
floccosus, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241 = Bulbostylis floccosa.
georgianus, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 331.—Am. bor.
junciformis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 337 (= *Bulbostylis junciformis*).—Bolivia.
Kalmusii, *Aschers., Abrom. & Graebn. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl.* 133.—Eur.
Kirkii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis Kirkii*).—Afr. austr.
libanoticus, *Post, Fl. Syria*, 833.—Syria.
macrolepis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 481 (non Boeckl.).—Chili.

SCIRPUS:—
melanocaulos, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 476.—Chili.
membranaceus, *Thunb. Prod.* 17.—Afr. austr.
microstachys, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 478 (non Boeckl.).—Chili.
mitratus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 570 = Eleocharis mitrata.
monostachyus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = Fimbristylis monostachya.
Novae-Angliae, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 509.—Am. bor.
pachystylus, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 174 = Eleocharis pachystyla.
paludosus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 5.—Am. bor.
parvinux, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis parvinux*).—Afr. austr.
pedicellatus, *Fernald, in Rhodora*, 1900, 16.—Am. bor.
pseudoschoenus, Steud. in Flora, 1829, 147 = Ficinia albicans.
Reichei, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 55; *et ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 480.—Chili.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 228.—China.
rubrotinctus, *Fernald, in Rhodora*, 1900, 20.—Am. bor.
scaber, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 337 (= *Isolepis scabra*).—Peruv.
scleropus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis scleropus*).—Afr. austr.
seoanei, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 173.—Galic.
sessiliflorus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 479.—Chili.
subtilis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Calif.
terminalis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 479.—Chili.
trachycaulos, *R. Phil. l. c.* 482.—Chili.
trichocaulos, *R. Phil. l. c.* 478.—Chili.
triflorus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = Fimbristylis tristachya.
truncatus, Sieber, ex Nees, in Endl. Prodr. Fl. Norf. 23 = Ficinia aphylla.
uleanus, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 55.—Bras.
umbellatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = Fuirena umbellata.

SCLERACHNE, R. Br. = **Polytoca**, R. Br. (Gramin.).
punctata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 15 = P. punctata.

SCLERIA, Berg. (Cyper.).
boniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 158.—Tonkin.
Buchanani, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 33.—Afr. trop.
catharinensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 158.—Bras.
Clarkei, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 32.—Bras.
costaricensis, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 157 = Liebmanni.
filiculmis, *Boeck. l. c.* 158.—Bras.
Grisebachii, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 150.—Ind. occ.
lacunosa, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 160.—Ind. occ.
nana, *Boeck. l. c.* 158.—Bras.
Pittieri, *Boeck. l. c.* 159, descr.—Am. cent.
secans, Urb. Symb. Antill. ii. 169 = S. Flagellum-nigrorum.
Tonduzi, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 160, descr.—Am. cent.
uleana, *Boeck. l. c.* 159.—Bras.

SCLEROCHITON, Harv. (Acanth.).
Boivini, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 110.—Afr. trop.
Holstii, *C. B. Clarke, l. c.* 111.—Afr. trop.
Kirkii, *C. B. Clarke, l. c.* 110.—Afr. trop.
nitidus, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
obtusisepalus, *C. B. Clarke, l. c.* 111.—Afr. trop.
Preussii, *C. B. Clarke, l. c.* 110.—Afr. trop.
scissisepalus, *C. B. Clarke, l. c.* 111.—Afr. trop.
stenostachyus, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 27 = Crossandra stenostachya.

SCLEROCHLOA, Beauv. (Gramin.).
angusta, Nees, Fl. Afr. Austr. 381 = Atropis angusta.
rigida, Panz. in Denkschr. Bot. Regensb. i. II. 180 = Scleropoa rigida.

SCLEROLOBIUM, Vog. (Legum.).
Radlkoferi, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 26.—Bolivia.

SCLEROMELUM, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 300 (1900). *SANTALACEAE.*
aurantiacum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

SCLEROPHYLLUM, Griff. Notul. iii. (1851) 8 = **Oryza**, Linn. (Gramin.).
coarctatum, Griff. l. c. = O. coarctata.

SCLEROPOA, Griseb. (Gramin.).
rigida, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 431.—Reg. Medit.; Afr. austr.

SCOLOPIA, Schreb. (Bixac.).
Germaini, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 42.—Cochinch.
trimera, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 53.—Ins. Bangka.

SCOLOSANTHUS, Vahl (Rubiac.).
acanthodes, *Urb. Symb. Antill.* i. 481 (= *Eranthemum acanthodes*).—Ind. occ.
grandifolius, *Krug & Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1897, 267, nomen; *Urb. Symb. Antill.* i. 442.—Ind. occ.
multiflorus, Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 443 = Myonima multiflora.
sagraeanus, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 102 = crucifer.

SCOLYMOCEPHALUS, Weinm. = **Protea**, Linn. (Proteac.).
lanuginosus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 279 = P. lanuginosa.

SCOLYMUS, Tourn. (Compos.).
Clusii, Bub. Fl. Pyren. ii. 117 = maculatus.
Theophrasti, Bub. l. c. 116 = hispanicus.

SCOPARIA, Linn. (Scrophul.).
grandiflora, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 105.—Am. bor.
Grisebachii, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 5, 15.—Reg. Argent.
millefoliata, *Fritsch, l. c.* 14.—Parag.

SCORPIOIDES, Bub. Fl. Pyren. ii. 560 (1900) = **Scorpiurus**, Linn. (Legum.).
elegans, Bub. l. c. = Scorpiurus subvillosa.

SCORZONERA, Tourn. (Compos.).
Doriae, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 417.—Albania.
orientalis, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 388 = Tragopogon orientale.
pulchra, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 289.—Reg. Caucas.

SCOTTELLIA, Oliver (Bixac.).
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 113.—Afr. trop.

SCROPHULARIA, Tourn. (Scrophul.).
autumnalis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 178.—Eur.
caucasica, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 204.—Reg. Caucas.
Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 15.—China.
diffusa, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 205.—Reg. Caucas.
diplodonta, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 14.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 12.—China.
glandulosissima, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 49.—As. Min.
lepetymnica, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 151.—Graecia.
leporella, *Bicken. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 317.—Am. bor.
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 152.—Graecia.
major, Bub. Fl. Pyren. i. 341 = nodosa.
Mandarinorum, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 13.—China.
methanaea, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 57.—Eur.
microdonta, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 11.—China.
mollis, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 203.—Reg. Caucas.

SCROPHULARIA:—
montana, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 308.—Am. bor.
oxyrhyncha, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 4.—Hispan.
Ruta-canina, Bub. Fl. Pyren. i. 345 = canina.
Sintenisii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 51.—As. Min.
Souliei, *Franch. in Bull Soc. Bot. Fr.* xlvii. 15.—China.
spicata, *Franch. l. c.* 14.—China.
spinulescens, *Hausskn. & Degen, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 60.—Eur.
sprengeriana, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 202.—Reg. Caucas.
tenuis, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 60.—Eur.
yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 12.—China.

SCUTELLARIA, Riv. (Labiat.).
Altamaha, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 143.—Am. bor.
amoena, *Wright, in Kew Bull.* 1896, 164.—China.
arenicola, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 143.—Am. bor.
chalicophila, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 569.—Am. cent.
cochinchinensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 103.—Cochinch.
Debeerstii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 57.—Afr. trop.
distans, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 562.—Mexic.
multiglandulosa, *Small, ex Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 339.—Am. bor.
Ocmulgee, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 142.—Am. bor.
Pedicularis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic.
polyadena, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 56.—Afr. trop.
pseudo-coerulea, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 240.—Mexic.
Rosei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic.
seleriana, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 568.—Am. cent.
venosa, *Kearn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 571.—Am. bor.
virgulata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 283.—Am. bor.
zollingeriana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 104.—Java.

SCYPHOCEPHALIUM, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 129, descr. *MYRISTICACEAE.*
chrysothrix, *Warb. l. c.* 247.—Afr. trop.
Kombo, *Warb. l. c.* 244.—Afr. trop.
Mannii, *Warb. l. c.* 249 (= *Myristica Mannii*).—Afr. trop.
Ochocoa, Warb. l. c. 244 = S. Kombo

SCYPHOSYCE, Baill. (Urtic.).
Zenkeri, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 31 = yathanthus Zenkeri.

SCYTOPETALUM, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 244 (1897). *OLACACEAE.*
klaineanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

SEBAEA, Soland. (Gentian.).
affinis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 706.—Afr. trop.
Burchellii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 89.—Afr. austr.
caladenia, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
chironioides, *Gilg, l. c.* 101.—Afr. trop.
gariepina, *Gilg, l. c.* 90.—Afr. austr.
hymenosepala, *Gilg, l. c.* 89.—Afr. austr.
Junodii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 442.—Afr. austr.
leiostyla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 97.—Afr. trop.
macrantha, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. austr.
macrophylla, *Gilg, l. c.* 96.—Afr. austr.
macrosepala, *Gilg, l. c.* 91.—Afr. austr.
macrostigma, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. austr.
mirabilis, *Gilg, l. c.* 92.—Afr. austr.

SEBAEA:—
natalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 442.—Afr. austr.
polyantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 95.—Afr. austr.
ramosissima, *Gilg, l. c.* 91.—Afr. austr.
schinziana, *Gilg, l. c.* 95.—Afr. austr.
schizostigma, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schinz, in Engl. Jahrb.* xxiv. 454.—Afr. austr.
sedoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 98.—Afr. austr.
semialata, *Gilg, l. c.* 97.—Afr. austr.
stricta, *Gilg, l. c.* 90.—Afr. austr.
thodeana, *Gilg, l. c.* 96.—Afr. austr.
Woodii, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. austr.

SEBASTIANIA, Spreng. (Euphorb.).
haploclada, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 231.—Peruv.

SECALE, Tourn. (Gramin.).
africanum, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2601.—Afr. austr.

SECAMONE, R. Br. (Asclep.).
rubiginosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 233.—Afr. trop.
schinziana, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 449.—Madag.
Whytei, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 308.—Afr. trop.

SECURIDACA, Linn. (Polygal.).
philippinensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 233.—Ins. Philipp.

SECURINEGA, Comm. (Euphorb.).
Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 18.—Afr. trop.

SEDDERA, Hochst. (Convolv.).
capensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 529 (= *Evolvulus capensis*).—Afr. austr.
hirsuta, Damm. ex Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 224.—Afr. trop.
repens, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 530.—Madag.
schizantha, Hallier f. l. c. 532.—Afr. trop.

SEDUM, Tourn. (Crassul.).
arborescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 83 = Crassula arborescens.
Blockmanae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. vi. 422.—Calif.
bonariense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 83 = Tillaea peduncularis.
brachypetalum, E. Mey. in Kuntze, l. c. = Crassula brachypetala.
bracteatum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 362 (non Viv.).—China.
caffrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 83 = Crassula fruticulosa.
campestre, Kuntze, l. c. = Crassula campestris.
canescens, Kuntze, l. c. = Crassula canescens.
centaurodes, Kuntze, l. c. = Crassula centauroides.
chilonense, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
ciliatum, Kuntze, l. c. = Crassula ciliata.
ciliosum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 214.—Am. bor.
cogmansense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 83 = Crassula cogmansensis.
Congdoni, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 135.—Am. bor.
corymbulosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 84 = Crassula corymbulosum.
crassiflorum, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
crenulatissimum, Kuntze, l. c. = Crassula crenulata.
cymosum, Kuntze, l. c. = Crassula cymosa.
decussatum, Kuntze, l. c. = Cotyledon decussata.
discolor, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 285.—China.
dregeanum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 84 = Crassula dregeana.
englerianum, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 186.—Pyren.
ericodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 84 = Crassula ericoides.
expansum, Kuntze, l. c. = Crassula expansa.
fasciculare, Kuntze, l. c. = Cotyledon fascicularis.
flavum, Kuntze, l. c. = Crassula flava.
glaciale, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 290 (non Clarion).—China.
glaucovirens, *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* i. 575.—Eur.
harveyanum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Kalanchoe paniculata.

SEDUM:—
hemisphaericum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Cotyledon hemisphaerica.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
lancerottense, *Murray, in Journ. Bot.* 1899, 201.—Ins. Canar.
leucocarpum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 288.—China.
lycopodiodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula lycopodioides.
Magnolii, Bub. Fl. Pyren. ii. 698 = caespitosum.
mexicanum, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 257.—Mexic.
muscosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula muscosa.
nobile, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 285.—China.
obtusipetalum, *Franch. l. c.* 289.—China.
orbiculatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Cotyledon orbiculata.
perfossum, Kuntze, l. c. = Crassula perfossa.
platysepalum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 289.—China.
primuloides, *Franch. l. c.* 287.—China.
propontieum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 169.—Turcia.
radicans, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = acutifolium.
ramosum, Kuntze, l. c. = Crassula ramosa.
ramuliflorum, Kuntze, l. c. = Crassula ramuliflora.
Regelii, Kuntze, l. c. = Crassula Cooperi.
rhytidocalyx, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 157.—Graecia.
Rochea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Rochea coccinea.
rosthornianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
rosulare, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula rosularis.
rotundatum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2469.—Tibet.
rubicundum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula rubicunda.
scabridum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 284.—China.
scabrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula scabra.
sinicum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
Skorpili, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1898, 4.—Bulgar.
spiciforme, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 86 = Crassula spiciformis.
Stahlii, *Solms, in Saemer. Bot. Gart. Univ. Strassb.* 1900, 4.—Mexic.
subrotundifolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Kalanchoë rotundifolia.
suffruticosum, Soland. in Lowe, Man. Fl. Madeir. 325 = nudum.
tenuifolium, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 290.—China.
tetragonum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = Crassula tetragona.
transvalense, Kuntze, l. c. = Crassula transvaalensis.
tuberculatum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.
vaginatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 86 = Crassula vaginata.
valerianoides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 360.—China.
yunnanense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 286.—China.

SEEMANNIA, Regel (Gesner.).
cuneata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 96.—Bolivia.
nematanthoides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 386.—Bolivia.
regnelliana, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxv. 13.—Bras.

SEGUIERIA, Loefl. (Phytolacc.).
Glaziovii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 214.—Bras.

SEIDLITZIA, Bunge (Chenopod.).
lanigera, *Post, Fl. Syria*, 689.—Syria.

SELAGO, Linn. (Selag.).
albanensis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 503.—Afr. austr.
amboensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 272.—Afr. trop.
angolensis, *Rolfe, l. c.* 271.—Afr. trop.

SELAGO:—
blantyrensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 268.—Afr. trop.
Buchananii, *Rolfe, l. c.* 269.—Afr. trop.
capitellata, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 345.—Afr. austr.
coerulea, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 267 (non aliorum).—Afr. trop.
Dinteri, *Rolfe, l. c.* 271.—Afr. trop.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 281.—Afr. austr.
Hoepfneri, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 271.—Afr. trop.
Holstii, *Rolfe, l. c.* 269.—Afr. trop.
Holubii, *Rolfe, l. c.* 271.—Afr. trop.
Melleri, *Rolfe, l. c.* 268.—Afr. trop.
monticola, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
namaquensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 189.—Afr. austr.
Nyasae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 270.—Afr. trop.
phyllopodioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 190.—Afr. austr.
tenuicaulis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 268.—Afr. trop.
thyrsoidea, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 159.—Afr. trop.
viscosa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 267.—Afr. trop.

SELINOCARPUS, A. Gray (Nyctag.).
lanceolatus, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 304.—Am. sept.

SELINUM, Linn. (Umbell.).
validum, *Congdon, in Erythea*, vii. 185.—Calif.

SEMECARPUS, Linn. f. (Anacard.).
caudata, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 369 B.—Cochinch.
congestiflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 412.—N. Guin.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 509.—Penins. Mal.
lucens, *King, l. c.* 510.—Penins. Mal.
Prainii, *King, l. c.* 511.—Ind. or.
subspathulata, *King, l. c.* 117.—Burma.
Thorelii, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 369 A.—Cochinch.
velutina, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 508.—Penins. Mal.

SEMPERVIVUM, Rupp. (Crassul.).
erythraeum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 111.—Bulgar.
hierrense, *R. P. Murray, in Journ. Bot.* 1899, 395.—Ins. Canar.
percarneum, *R. P. Murray, l. c.* 201.—Ins. Canar.

SENECIO, Tourn. (Compos.).
accedens, *Greene, Pittonia*, iii. 105.—Am. bor.
acutidens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 180.—Am. bor.
Adamsii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
alloeophyllus, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 105.—Reg. Magell.
alpicola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
altus, *Rydb. l. c.* 443.—Am. bor.
antenariifolius, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 478.—Am. bor.
antipodus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 341, descr.—N. Zel.
antitensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 270.—Madag.
arabidifolius, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 171.—Afr. austr.
arachnoideus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 442 (non aliorum).—Am. bor.
argentinensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 52.—Reg. Argent.
asperifolius, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 414.—China.
atratus, *Greene, Pittonia*, iii. 105.—Am. bor.
atriapiculatus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 442 = columbianus.
aurellus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 182.—Am. bor.
auriculatus, *Alboff, in Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 382 (non aliorum).—Fuegia.
barbertonicus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 840.—Afr. austr.
Beaufilsii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 171.—Patag.
bernardinus, *Greene, Pittonia*, iii. 298.—Am. bor.
Bertrami, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 95.—Syria.

SENECIO:—
biserrifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 171.—Bolivia.
blattariaefolia, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 415.—China.
blitoides, *Greene, Pittonia*, iv. 123.—Am. bor.
brittenianus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 601.—Afr. trop.
Buchwaldi, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
cacteaeformis, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 465.—Afr. austr.
camptodontus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 413.—China.
candidissimus, *Greene, Pittonia*, iv. 110.—Am. bor.
canovirens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 187.—Am. bor.
carthamoides, *Greene, Pittonia*, iv. 122.—Am. bor.
cathcartensis, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 172.—Afr. austr.
chloranthus, *Greene, Pittonia*, iv. 118.—Am. bor.
cognatus, *Greene, l. c.* 114.—Am. bor.
colensoensis, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 172.—Afr. austr.
columbianus, *Greene, Pittonia*, iii. 170.—Am. bor.
concinnus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 418.—China.
condensatus, *Greene, Pittonia*, iii. 298.—Am. bor.
corazonensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 73.—Ecuador.
Covillei, *Greene, Fl. Francisc.* 469.—Calif.
crocatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 299.—Am. bor.
curtophyllus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 466.—Afr. austr.
Deasyi, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2587.—Tibet.
densus, *Greene, Pittonia*, iv. 226.—Am. bor.
Dewevrei, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 35.—Afr. trop.
dianthus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 419.—China.
dimorphophyllus, *Greene, Pittonia*, iv. 109.—Am. bor.
disciformis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 72.—Ecuador.
discoideus, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 479 (non Franch.).—Am. bor.
dispar, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 272.—Am. bor.
drakensbergis, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 467.—Afr. austr.
Earlei, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 147.—Am. bor.
Elmeri, *Piper, in Erythea*, vii. 173.—Am. bor.
epiphyticus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 173.—Bolivia.
erythrophyllus, *Lazaro, in Anal. Soc. Espan. Hist. Nat.* xxix. 149.—Eur.
Everettii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
exsertiflorus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.
fedifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 183.—Am. bor.
fibrosus, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 174.—Afr. austr.
filiferus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 416.—China.
flavovirens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 181.—Am. bor.
flavulus, *Greene, Pittonia*, iv. 108.—Am. bor.
Fletcheri, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 212.—Tibet.
Flettii, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 137.—Am. bor.
floribundus, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 69 (= *Vernonia floribunda*).—Am. trop.
fulgens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 177 (non Nichols.).—Am. bor.
geminatus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 350 (= *Traversia baccharoides*).—N. Zel.
glaucescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 442.—Am. bor.
glauciifolius, *Rydb. l. c.* 448.—Am. bor.
glaucophylla, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
Goetzei, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 507.—Afr. trop.
Goetzenii, *O. Hoffm. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 10, descr.—Afr. trop.
goringensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 212.—Tibet.
gracilipes, Robinson & Greenm. in Amer. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 156 = polypodioides.
Greggii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 170.—Mexic.
gyrophyllus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 467.—Afr. austr.

SENECIO:—
haitiensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 469. —Ind. occ.
hanburianus, *Dinter, in Gard. Chron.* 1898, I. 354.—Afr. austr.?
hartianus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 622.—Am. bor.
Hauthalii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 174.—Patag.
hoepfnerianus, *Vatke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 841.—Afr. trop.
Holmii, *Greene, Pittonia*, iv. 120.—Am. bor.
hydrophiloides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 441.—Am. bor.
idahoensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 183. —Am. bor.
imbricatus, *Greene, Pittonia*, iv. 117 (non Gardn.).—Am. bor.
indecorus, *Greene, Fl. Francisc.* 470.—Calif.
invenustus, *Greene, Pittonia*, iv. 124.—Am. bor.
iscoensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 70.—Ecuador.
Jonesii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 179.—Am. bor.
junodianus, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 74.—Afr. austr.
kialensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 413.—China.
Kirkii, *Hook. f. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 344.—N. Zel.
Kuntzei, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 175. —Afr. austr.
Kurtzii, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 381 (non Phil.).—Fuegia.
laetiflorus, *Greene, Pittonia*, iii. 88.—Calif.
Lamberti, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 392, sphalm. = Lemberti.
laramiensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 483.—Am. bor.
latus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 444.—Am. bor.
launayaefolius, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 175.—Afr. austr.
Lemberti, *Greene, Pittonia*, iii. 89.—Calif.
leptolepis, *Greene, Fl. Francisc.* 468.—Calif.
leucanthemifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 495 = santiagoensis.
lloënsis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 71.—Ecuador.
lobatifolius, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. 80 (= *Cacalia lobatifolia*).—Japon.
longipetiolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 176.—Am. bor.
lopollensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 601.—Afr. trop.
lucorum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 415.—China.
lycopodioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 210. —Afr. austr.
lygodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 599.—Afr. trop.
MacDougalii, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 592.—Am. bor.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 169.—Am. bor.
microdontus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 479 (non Baker).—Am. bor.
microglossus, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 183 (non DC.).—Eur.
milleflorus, *Greene, Pittonia*, iv. 116.—Am. bor.
millelobatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 171.—Am. bor.
mochensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 68.—Ecuador.
mojandensis, *Hieron. l. c.* 67.—Ecuador.
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Patag.
mutabilis, *Greene, Pittonia*, iv. 113.—Am. bor.
Nelsonii, *Rydb. ex A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 483.—Am. bor.
nephrophyllus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 446.—Am. bor.
Newcombei, *Greene, Pittonia*, iii. 249.—Am. bor.
nigrocinctus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 417.—China.
Nordenskjöldii, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 107.—Reg. Magell.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
nyikensis, Baker, l. c. 1898, 154 = subpetitianus.
oblanceolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 175.—Am. bor.
obtectus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Chili.
occidentalis, *Greene, Pittonia*, iv. 122.—Am. bor.
ovinus, *Greene, l. c.* 110.—Am. bor.

SENECIO:—
pachyphyllus, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xvi. 410 = Adamsii.
Passus-Crucis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Reg. Argent.
patagonicus, Phil. in Linnaea, xxxiii. 159 = sericeo-nitens.
paucicalyculatus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 468. —Afr. austr.
pendulus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500 = Kleinia pendula.
pentactinus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 469.—Afr. austr.
pentecostus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 598.—Afr. trop.
perennans, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 549.—Am. bor.
pereziifolius, *Rydb. in Mem N. York Bot. Gard.* i. 440.—Am. bor.
pergamentaceus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.
perplexus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 271.—Am. bor.
petraeus, Klatt. in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 330 = petrocallis.
petrocallis, *Greene, Pittonia*, iv. 116.—Am. bor.
petrophilus, Greene, l. c. iii. 171 = petrocallis.
Picardae, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 469. —Ind. occ.
platylobus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 181. —Am. bor.
polypodioides, *Greene, Pittonia*, iii. 90.—Mexic.
polypodioides, Ind. Kew. Suppl. I. 393, sphalm. = *gracilipes*, Robinson & Greenm.
Porteri, *Greene, Pittonia*, iii. 186.—Am. bor.
Prattii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2491.—China.
Principis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 412.—China.
prionophyllus, *Franch. l. c.* 420.—China.
prionopterus, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49.—Mexic.
prostratus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 841.—Afr. austr.
pseudaureus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 298.—Am. bor.
psidiifolius, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 66. —Bolivia.
pudicus, *Greene, Pittonia*, iv. 118.—Am. bor.
pullus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 469 (non Klatt, 1882).—Afr. austr.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 402.—Afr. trop.
rectiramus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
renifolius, Porter, in Porter & Coulter, Fl. Colorado, 83 = Porteri.
revolutus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 348.—N. Zel.
rhizomatus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 66.—Bolivia.
robustus, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. vi. 243 = revolutus.
rosulatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 188.—Am. bor.
rubricaulis, *Greene, Pittonia*, iii. 89.—Am. bor.
rufiglandulosis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 599.—N. Zel.
sagittarioides, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 37.—Reg. Argent.
salicinus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 186. —Am. bor.
saliens, *Rydb. l. c.* 1897, 298.—Am. bor.
sanguisorboides, *Rydb. l. c.* 1900, 170.—Am. bor.
santiagoensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 177.—Chili.
saxatilis, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 287 (non Wall.).—Reg. Caucas.
scalaris, *Greene, Pittonia*, iv. 108.—Am. bor.
scaposus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 379 = perennans.
scopulinus, *Greene, Pittonia*, iv. 117.—Am. bor.
Scorzonella, *Greene, l. c.* iii. 90.—Calif.
Scribneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 441.—Am. bor.
scrophulariifolius, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
semiplexicaulis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 440.—Am. bor.
seneciodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 177 = assuayensis.
sericeo-nitens, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 537.—Patag.
sericeus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 177 = Neaei.
seridophyllus, *Greene, Pittonia*, iv. 121.—Am. bor.

SENECIO:—
shikokianus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. 80 (= *Cacalia shikokiana*).—Japon.
sinapoides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 65.—Bolivia.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 73.—Ecuador.
Solidago, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 439.—Am. bor.
solitarius, *Rydb. l. c.* 444.—Am. bor.
Sonnei, *Greene, Fl. Francisc.* 467.—Calif.
spathiphyllus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 416.—China.
spatuliformis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 552.—Am. bor.
sphaerocephalus, *Greene, Pittonia*, iii. 106.—Am. bor.
stipellatus, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 245.—Patag.
strictifolius, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 600.—Afr. trop.
subcoriaceus, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 375.—Afr. austr.
subcuneatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 179.—Am. bor.
subpanduratus, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 108.—Reg. Magell.
subpetitianus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
subrubriflorus, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 178.—Afr. austr.
subvulgaris, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
tabulicola, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
talongensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 419.—China.
taraxacoides, *Greene, Pittonia*, iv. 119.—Am. bor.
Toumeyi, *Greene, l. c.* 349.—Am. bor.
trachylepus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 470.—Afr. austr.
trachyphyllus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 211. —Afr. austr.
tricephalus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 178.—Reg. Argent.
tridenticulatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 175.—Am. bor.
trifurcatus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 842 (non Less.).—Afr. austr.
trigonophyllus, *Greene, Pittonia*, iii. 106.—Am. bor.
tripetaloides, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 272. —N. Zel.
tunicatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 179.—Patag.
uvens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 602.—Afr. trop.
Valerianella, *Greene, Pittonia*, iv. 109.—Am. bor.
variifolius, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 438 (non DC.).—Am. bor.
verruculosus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 179.—Patag.
versicolor, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 597.—Afr. trop.
viridis, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 350 (non Phil.).—N. Zel.
Wardii, *Greene, Pittonia*, iv. 116.—Am. bor.
Welwitschii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 33.—Afr. trop.
Wootoni, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 122. —Am. bor.

SENRA, Cav. (Malvac.).
Zoës, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 206.—Afr. trop.

SEQUOIA, Endl. (Conif.).
washingtoniana, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 28 = gigantea.

SERENOA, Hook. f. (Palm.).
arborescens, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 90.—Am. bor.

SERICOCOMA, Fenzl (Amarant.).
heterochiton, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 46.—Afr. trop.
leucoclada, *Lopr. l. c.* 45.—Afr. austr.
Welwitschii, Baker, in Kew Bull. 1897, 278 = Sericocomopsis Welwitschii.
Welwitschii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 30 = Marcellia mirabilis.

SERICOCOMOPSIS, Schinz (Amarant.).
quadrangula, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 42 (= *Sericocoma quadrangula*).—Afr. trop.
Welwitschii, *Lopr. l. c.*—Afr. trop.

SERICOREMA, Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 39. *AMARANTACEAE.*
remotiflora, *Lopr. l. c.* 40 (=*Sericocoma remotiflora*).—Afr. austr.
sericea, *Lopr. l. c.* (=*Sericocoma sericea*).—Afr. trop.

SERICOSTACHYS, Gilg & Lopr. ex Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 50. *AMARANTACEAE.*
scandens, *Gilg & Lopr. ex Lopr. l. c.* 51.—Afr. trop.
tomentosa, *Lopr. l. c.*—Afr. trop.

SERICOSTOMA, Stocks (Borag.).
strigosa, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 120.—Arab.

SERIS, Willd. = **Onoseris**, DC. (Compos.).
sagittatus, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 69.—Bolivia.

SERJANIA, Plum. (Sapind.).
adiantoides, *Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 403.—Mexic.
grandiceps, *Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 336.—Bolivia.
laevigata, *Radlk. in Urb. Symb. Antill.* i. 347.—Ind. occ.

SERPICULA, Linn. f. = **Hydrilla**, Rich. (Hydrochar.).
verticillata, Linn. f. Suppl. 416 = H. verticillata.

SERRAFALCUS, Parl. = **Bromus**, Linn. (Gramin.).
Cavanillesii, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 101 = B. mollis.
Thomini, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 360 = B. mollis.

SERRATULA, Dill. (Compos.).
glauca, Bub. Fl. Pyren. ii. 120 = nudicaulis.

SERRURIA, Salisb. (Proteac.).
biglandulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 451.—Afr. austr.
meisneriana, *Schlechter, l. c.* xxvii. 108.—Afr. austr.
serraria, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 280 = fasciflora.

SERSALISIA, R. Br. (Sapot.).
brevipes, Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 947 = Sideroxylon brevipes.

SERUNEUM, Kuntze = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).
glaucum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 179 = W. glauca.

SESAMOTHAMNUS, Welw. (Pedal.).
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 30.—Afr. trop.

SESAMUM, Linn. (Pedal.).
digitaloides, *Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 454.—Afr. trop.
Dinterii, *Schinz, l. c.* vii. 65.—Afr. trop.
grandiflorum, *Schinz, l. c.* iv. 453.—Afr. trop.
lepidotum, *Schinz, l. c.* 455.—Afr. trop.
mombazense, *Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol.* 36.—Afr. trop.
pedalioides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 799.—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol.* 37.—Afr. trop.

SESBANIA, Scop. (Legum.).
atropurpurea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 188.—Afr. trop.
mexicana, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 154 = longifolia.

SESELI, Linn. (Umbell.).
cinereum, Bub. Fl. Pyren. ii. 378 = Athamantha cretensis.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 497.—China.
Lehmanni, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 121.—Tauria.
massiliense, Bub. Fl. Pyren. ii. 375 = tortuosum.
ponticum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 269.—Reg. Caucas.
serbicum, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 122.—Servia.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 376 = Libanotis.

SESLERIA, Scop. (Gramin.).
budensis, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* ii. 320.—Eur.
confusa, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1896, 296.—Hispan.
lagopodioides, *Spreng. Pugill.* ii. 22 = Aeluropus villosus.

SESUVIUM, Linn. (Ficoid.).
hoepfnerianum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 75.—Afr. austr.

SETARIA, Beauv. (Gramin.).
appendiculata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 422.—Afr. austr.
aurea, *A. Braun, in Flora*, 1841, 276.—Geront. trop.; Afr. austr.
Avellae, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 393, sphalm. = seq.
Avettae, *Pir. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 159.—Afr. trop.
dasyura, Hort. Hal. ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. 463 = glauca.
depauperata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 715.—Chili.
flabellata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 425.—Afr. austr.
forbesiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 81.—Ind. or.
Gerrardii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 424.—Afr. austr.
gracillima, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 81.—Ind. or.
hirta, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = Panicum hirtum.
imberbis, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 891.—Afr. trop. et austr.; Am. trop.
intermedia, *Roem. & Schult. l. c.* 489.—Reg. temp. et trop.
lindenbergiana, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 422.—Afr. trop. et austr.
mendocina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 715.—Chili.
paniciformis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 186.—Afr. trop.
pratensis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 715.—Chili.
rhachitricha, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 188 (=*Panicum rhachitrichum*).—Afr. trop.
rigida, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 426.—Afr. austr.
rubicunda, Dum. Obs. Gram. Belg. 139 = glauca.
sciuroidea, C. Muell. in Bot. Zeit. 1861, 316 = aurea.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 185.—Afr. trop.
Woodii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 24.—Afr. austr.

SETARIOPSIS, Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. (1896) 288. *GRAMINEAE.*
auriculata, *Scribn. l. c.* 289 (=*Setaria auriculata*).—Mexic.
latiglumis, *Scribn. l. c.* (=*Setaria longiglumis*).—Mexic.

SETILOBUS, Baill. (Bignon.).
Neves-armondii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 205.—Bras.

SEUBERTIA, Kunth = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
obscura, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 18 = B. laxa.

SHOREA, Roxb. (Dipterocarp.).
javanica, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 3; *et in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 121.—Java.
Koordersii, *Brandis, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 356.—Celebes.

SHORTIA, Torr. & Gray (Diapens.).
sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2624.—China.

SHUTERIA, Wight & Arn. (Legum.).
sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2626.—China.

SIBARA, Greene, Pittonia, iii. (1896) 10. *CRUCIFERAE.*
angelorum, *Greene, l. c.* 11 (=*Cardamine angelorum*).—Calif.
brandegeana, *Greene, l. c.* (=*Sisymbrium brandegeanum*).—Calif.
filifolia, *Greene, l. c.* (=*Arabis filifolia*).—Calif.
laxa, *Greene, l. c.* (=*Nasturtium laxum*).—Calif.
Palmeri, *Greene, l. c.* 12 (=*Cardamine Palmeri*).—Mexic.
pectinata, *Greene, l. c.* 11 (=*Arabis pectinata*).—Calif.

SIBBALDIOPSIS, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. (1898) 187. *ROSACEAE.*
tridentata, *Rydb. l. c.* (=*Potentilla tridentata*).—Am. bor.

SIBTHORPIA, Linn. (Scrophul.).
pinnata, Benth. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 288 = Ellisiophyllum reptans.
repens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 239 = pichinchensis.

SICYOS, Linn. (Cucurb.).
debilis, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 104.—Bolivia.
glaber, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 310.—Am. bor.
Kuntzei, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 104.—Bolivia.

SIDA, Linn. (Malvac.).
argentea, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 78.—Austral.
bakeriana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 10, descr.—Bolivia.
brachyphylla, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 299, nomen.—Afr. trop.
denudata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 100 = Anoda denudata.
gracilipes, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 10.—Bolivia.
Holwayi, *Baker f. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 176.—Mexic.
leptophylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 468.—Am. bor.
Reichei, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 238 (=*Malva Reichei*).—Chili.
rubromarginata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 102.—Am. bor.

SIDALCEA, A. Gray (Malvac.).
asplenifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 158.—Am. bor.
favosa, *Congdon, in Erythea*, vii. 183.—Calif.
montana, *Congdon, l. c.*—Calif.
nitrophila, *Parish, in Erythea*, vii. 93.—Am. bor.
reptans, *Greene, Pittonia*, iii. 159.—Am. bor.
scabra, *Greene, l. c.* 158.—Am. bor.
valida, *Greene, l. c.* 157.—Am. bor.

SIDERANTHUS, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
australis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 621 = Eriocarpum australe.
glaberrimus, Rydb. l. c.—Am. bor.
grindelioides, Britton, ex Rydb. l. c. 620 = A. Nuttallii.
puberulus, Rydb. l. c. 622.—Am. bor.
rubiginosus, Britton, ex Rydb. l. c. 621 = A. rubiginosus.
turbinellus, Rydb. l. c. 622.—Am. bor.

SIDERITIS, Tourn. (Labiat.).
Christii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 108.—Eur.
Cypria, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 98.—Cyprus.

SIDEROXYLON, Dill. (Sapot.).
Baillonii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 277 (=*Lucuma Baillonii*).—N. Caled.
baladense, *Engl. l. c.* (=*Lucuma baladensis*).—N. Caled.
calophylloides, *Engl. l. c.* 276 (=*Platyluma calophylloides*).—Guiana.
crebrifolium, *Engl. l. c.* 277 (=*Lucuma crebrifolia*).—N. Caled.
Dugulla, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 80.—Austral.
eugeniifolium, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 276.—Guiana.
guianense, *Engl. l. c.* (=*Meioluma guianensis*).—Guiana.
jacquiniifolium, *Engl. l. c.* 277 (=*Lucuma jacquiniaefolia*).—N. Caled.
laetevirens, *Engl. l. c.* (=*Lucuma laetevirens*).—N. Caled.
novocaledonicum, *Engl. l. c.* (=*Pichonia elliptica*).—N. Caled.
pinifolium, *Engl. l. c.* (=*Peuceluma pinifolia*).—N. Caled.
pomiferum, *Engl. l. c.* (=*Lucuma pomifera*).—Bras.
ralphianum, *Engl. l. c.* (=*Achras ralphiana*).—Austral.
tahitense, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1897, 111.—Ins. Societ.

SIEGLINGIA, Bernh. (Gramin.).
argentina, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 367.—Reg. Argent.
aristulata, Kuntze, l. c. 341 = Arundinaria aristulata.
decumbens, Bernh. Syst. Verz. Erf. 20, 44 = Danthonia decumbens.
elongata, Nash, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 504 = Triodia trinerviglumis.
paraguayensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 341 = Arundinaria paraguayensis.
pilosa, Nash, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 504 = Triodia acuminata.

SIEVEKINGIA, Reichb. f. (Orchid.).
reichenbachiana, *Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7576. —Ecuador.

SIEVERSIA, Willd. = **Geum**, Linn. (Rosac.).
pentapetala, Greene, Pittonia, iv. 49 = G. anemonoides.
sericea, Greene, l. c. 50 = G. sericeum.
turbinata, Greene, l. c. = G. turbinatum.

SIGMATOSTALIX, Reichb. f. (Orchid.).
lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 480.—N. Granat.

SILENE, Linn. (Caryophyll.).
arabica, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 66.—Arab.
attica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 80.—Graecia.
Behrii, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 180 = verecunda.
bythinica, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 152.—Oriens.
capraria, *Sommier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. v. 113.—Ital.
chinensis, Hort. ex Bosse, Blumengärtn. iii. 445 = C. Fortunei.
columbiana, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 78.—Am. bor.
dilatata, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 212.—Am. bor.
fissipetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. II. 371 = Fortunei.
Gormani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 77.—Am. bor.
Greenii, *Howell, l. c.* 76.—Am. bor.
heterodonta, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 89.—Afr. bor.
heterophylla, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 585.—Persia.
ionica, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 158.—Graecia.
kumaonensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 43.—Reg. Himal.
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 155.—Graecia.
longicalycina, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 129.—Turkestan.
macrocalyx, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 78.—Am. bor.
mirabilis, *Rouy & Foucaud, Fl. Fr.* iii. 114.—Gallia.
monerantha, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 103.—Oriens.
Morganae, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 586.—Persia.
obtusidens, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 198; *et in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 196.—Eur.
opposita, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 339.—Eur.
othryana, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 198; *et in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 195.—Eur.
papillifolia, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 91.—As. Min.
papillosa, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 21 (non Boiss.).—Bulgaria.
praedichotoma. *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 155.—Graecia.
pseudo-vestita, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 236.—Afr. bor.
pteroneura, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 132.—Reg. Argent.
rectiramea, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 134. —Am. bor.
Reverchoni, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 237. —Afr. bor.
rohrbachiana, Aschers. ex F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 126 = Ungeri.
schizopetala, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 114, descr.—Oriens.
szechuensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 428.—China.
tempskyana, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 584.—Graecia.
tetonensis, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 117.—Am. bor.
tetragyna, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 212.—Am. bor.
trajectorum, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 128.—Turkestan.
tunetana, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 31.—Afr. bor.
tymphaea, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 339.—Eur.

SILENE:—
viscidula, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 129 (= Franch. ?).—Turkestan.

SILPHIUM, Linn. (Compos.).
chichamangense, *Canby, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 319. —Am. bor.
collinum, *Greene, Pittonia*, iv. 44.—Am. bor.
helianthoides, *Greene, l. c.* 43 (non Linn.).—Am. bor.
incisum, *Greene, l. c.* 45.—Am. bor.
lanceolatum, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 139 = chichamangense.
Mohrii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 493.—Am. bor.
rumicifolium, *Small, l. c.* 1898, 145.—Am. bor.
Simpsonii, *Greene, Pittonia*, iv. 44.—Am. bor.
venosum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 478. —Am. bor.

SIMLERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 196 (1900) = **Leontopodium**, R. Br. (Compos.).
alpina, Bub. l. c. 197 = L. alpinum.

SIMPLICIA, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxix. (1896) 497. *GRAMINEAE.*
laxa, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.

SINDORA, Miq. (Legum.).
coriacea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 206 (= *Afzelia coriacea*).—Penins. Mal.
Echinocalyx, *Prain, l. c.* 204.—Penins. Mal.
galedupa, *Prain, l. c.* 483.—Arch. Mal.
intermedia, *Prain, l. c.* 204.—Penins. Mal.
maritima, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 385 B.—Cochinch.
mucronata, *Pierre, l. c.* sub t. 385.—Cochinch.
Wallichii, Scortech. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 205 = intermedia.

SIPHANTHERA, Pohl (Melast.).
paraensis, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 510.—Bras.

SIPHOCAMPYLUS, Pohl (Campan.).
argutus, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 383. —Bolivia.
aureus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 72.—Bolivia.
bilabiatus, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 382.—Bolivia.
correoides, *A. Zahlbr. l. c.*—Bolivia.
discolor, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 248.—Am. cent.
dubius, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 385. —Bolivia.
flagelliformis, *A. Zahlbr. l. c.* 380.—Bolivia.
igneus, *Urb. Symb. Antill.* i. 452.—Ind. occ.
kuntzeanus, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 378.—Bolivia.
laciniatus, Urb. Symb. Antill. i. 451 = Lamarckii.
oblongifolius, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 73. —Bolivia.
radiatus, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
roseus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 249.—Am. cent.
tunarensis, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 376.—Bolivia.
tunicatus, *A. Zahlbr. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 189. —Bolivia.
vatkeanus, *A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 377.—Bolivia.

SIPHOCODON, Turcz. (Campan.).
debilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 447.—Afr. austr.

SIPHONANTHUS, Linn. = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).
assurgens, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 845 = C. carnosulum.
botryodes, Hiern, l. c. 843.—Afr. trop.
conglobata, Hiern, l. c. 840 = C. conglobatum.
costulata, Hiern, l. c. 843 = C. kentrocaule.
cuneifolia, Hiern, l. c. 841 = C. cuneifolium.
dumalis, Hiern, l. c. 846 = C. dumale.
formicarum, Hiern, l. c. 843 = C. formicarum.
glabra, Hiern, l. c. 842 = C. glabrum.
myricoides, Hiern, l. c. 844 = C. myricoides.
sanguinea, Hiern, l. c. 839 = C. megasepalum.
splendens, Hiern, l. c. 841 = C. splendens.
stricta, Hiern, l. c. 840 = C. strictum.
volubilis, Hiern, l. c. 842 = C. volubile.
Welwitschii, Hiern, l. c. 839 = C. Welwitschii.

SIPHONODON, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 500, sphalm. = **Siphocodon**, Turcz. (Campan.).

SIPHONOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).
Pringlei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 663 (= *Carlowrightia Pringlei*).—Mexic.

SIPHONYCHIA, Torr. & Gray (Illecebr.).
corymbosa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 337. —Am. bor.

SISARUM, Bub. Fl. Pyren. ii. 357 (1900) = **Sium**, Tourn. (Umbell.).
palustre, Bub. l. c. = Sium latifolium.

SISYMBRIUM, Tourn. (Crucif.).
anomalum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 137 (non Wedd.).—Eur. or.
consanguineum, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, i. 75.—Chili.
deserticola, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 594. —Patag.
ferganense, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 412.—Turkestan.
glabrescens, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 493. —Patag.
glanduliferum, *Speg. l. c.*—Patag.
halictorum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 348, errore = Sophia halictorum.
intricatissimum, Phil. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 5 = Draba intricatissima.
iscandericum, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 95.—Turkestan.
iskandericum, Kom. in Compt. Rend. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. I. 28 = praec.
japonicum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 794.—Japon.
laciniatum, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, i. 79.—Chili.
longesiliquosum, *Wenk, in Herb. Eur.* 1896, 6, nomen. —Eur.
Maximowiczi, *Palib. in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 28. —Corea.
microtites, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 59.—Mexic.
ochroleucum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 348. —Am. bor.
patagonicum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 492.—Patag.
pectinatum, *Reiche, Fl. Chile*, i. 79 (non Fisch.).—Chili.
perenne, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 14 (non Steud.).—Reg. Argent.
perplexum, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 342. —Am. bor.
sulphureum, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 410.—Turkestan.
umbrosum, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 60.—Mexic.
Wootonii, *Robinson, l. c.* 59.—Mexic.

SISYRANTHUS, E. Mey. (Asclep.).
macer, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 291 = imberbis.

SISYRINCHIUM, Linn. (Irid.).
alpestre, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 453.—Am. bor.
angustifolium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 627 (non Mill.).—Chili.
apiculatum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 300. —Am. bor.
arenicola, *Bickn. l. c.* 496.—Am. bor.
asheianum, *Bickn. l. c.* 607.—Am. bor.
atlanticum, *Bickn. l. c.* 1896, 134.—Am. bor.
campestre, *Bickn. l. c.* 1899, 341.—Am. bor.
capillare, *Bickn. l. c.* 608.—Am. bor.
carolinianum, *Bickn. l. c.* 221.—Am. bor.
corymbosum, *Bickn. l. c.* 218.—Am. bor.
cryptocarpum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 126.—Bolivia.
dichotomum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 609.—Am. bor.
Farwellii, *Bickn. l. c.* 298.—Am. bor.
flagellum, *Bickn. l. c.* 226.—Am. bor.
flaviflorum, *Bickn. l. c.* 345.—Am. bor.
flexile, *Bickn. l. c.* 613.—Am. bor.
floridianum, *Bickn. l. c.* 222.—Am. bor.
furcatum, *Bickn. l. c.* 229.—Am. bor.
fuscatum, *Bickn. l. c.* 225.—Am. bor.
graminoides, *Bickn. l. c.* 1896, 133.—Am. bor.
halophilum, *Greene, Pittonia*, iv. 34.—Am. bor.

SISYRINCHIUM:—
hastile, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 297.—Am. bor.
heterocarpum, *Bickn. l. c.* 348.—Am. bor.
idahoense, *Bickn. l. c.* 445.—Am. bor.
implicatum, *Bickn. l. c.* 228.—Am. bor.
incrustatum, *Bickn. l. c.* 606.—Am. bor.
intermedium, *Bickn. l. c.* 498.—Am. bor.
Langloisii, *Greene, Pittonia*, iv. 32.—Am. bor.
Lechleri, Steud. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. 617 = Solenomelus Lechleri.
leptocaulon, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 451.—Am. bor.
littorale, *Greene, Pittonia*, iv. 33.—Am. bor.
longifolium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 627.—Chili.
Macounii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 245.—Am. bor.
membranaceum, *Bickn. l. c.* 1899, 612.—Am. bor.
miamiense, *Bickn. l. c.* 226.—Am. bor.
montanum, *Greene, Pittonia*, iv. 33.—Am. bor.
nanum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 615.—Am. bor.
nanum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 620.—Chili.
Nashii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 223.—Am. bor.
occidentale, *Bickn. l. c.* 447.—Am. bor.
pauciflorum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 622.—Chili.
rosulatum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 228.—Am. bor.
rufipes, *Bickn. l. c.* 224.—Am. bor.
sagittiferum, *Bickn. l. c.* 230.—Am. bor.
scabrellum, *Bickn. l. c.*—Am. bor.
scoparium, *Bickn. l. c.* 227.—Am. bor.
segetum, *Bickn. l. c.* 449.—Am. bor.
septentrionale, *Bickn. l. c.* 452.—Am. bor.
solstitiale, *Bickn. l. c.* 219.—Am. bor.
strictum, *Bickn. l. c.* 299.—Am. bor.
tenellum, *Bickn. l. c.* 610.—Am. bor.
tortum, *Bickn. l. c.* 221.—Am. bor.
Tracyi, *Bickn. l. c.* 614.—Am. bor.
versicolor, *Bickn. l. c.* 606.—Am. bor.
xerophyllum, *Greene, Pittonia*, iv. 32.—Am. bor.

SITANION, Rafin. = **Elymus**, Linn. (Gramin.).
Brodei, Piper, in Erythea, vii. 100.—Am. bor.
flexuosum, Piper, l. c. 99.—Am. bor.
glaber, J. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 329.—Am. bor.
Hanseni, J. G. Sm. l. c. 328 = E. Hanseni.
latifolium, Piper, in Erythea, vii. 99.—Am. bor.
Leckenbyi, Piper, l. c. 100.—Am. bor.

SIUM, Tourn. (Umbell.).
repandum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 425.—Afr. trop.

SLOANEA, Linn. (Tiliac.).
celebica, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 642.—Celebes.
dasycarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2628.—Reg. Himal.; China.
Dussii, *Urb. Symb. Antill.* i. 361.—Ind. occ.
hanceana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2628.—China.
hongkongensis, *Hemsl. l. c.* t. 2628.—China.
sinensis, *Hemsl. l. c.* sub t. 2628.—China.

SLOETIA, Teijsm. & Binn. (Urtic.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.

SMILACINA, Desf. (Liliac.).
Fargesii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 246 (= *Tovaria Fargesii*).—China.

SMILAX, Tourn. (Liliac.).
Bockii, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 259.—China.
brevipes, *Warb. l. c.* 256.—China.
cinerea, *Warb. l. c.* 258.—China.
cinnamomifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 609.—Am. bor.
cocculoides, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 257.—China.
cyclophylla, *Warb. l. c.*—China.
discotis, *Warb. l. c.* 256.—China.
diversifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 607.—Am. bor.
Gaumerii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* 357.—Mexic.

SMILAX:—
glauco-china, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 255.—China.
longipes, *Warb. l. c.* 256.—China.
megacarpa, Morong, in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, 434 = Morongii.
Morongii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 605.—Am. bor.
polycolea, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 257.—China.
Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 174.—Ind. or.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 567.—Am. cent.
renifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 608.—Am. bor.
tenuis, *Small, l. c.* 607.—Am. bor.
trigona, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 258.—China.
utilis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2589 (non Wright).—Ind. occ.
Willkommii, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 124.—Eur.

SMITHIA, Ait. (Legum.).
congesta, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
drepanophylla, *Baker, l. c.* 260.—Afr. trop.
megalophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 292.—Afr. trop.
ochreata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 191.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
sphaerocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 260.—Afr. trop.
Welwitschii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 190, descr.—Afr. trop.

SMYRNIUM, Tourn. (Umbell.).
aeolicum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 160.—Graecia.

SMYTHEA, Seem. (Rhamn.).
reticulata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 381.—Penins. Mal.

SOBRALIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Brandtiae, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, I. 608.—Hab.?
luteola, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 199.—Am. trop.

SODIROA, André (Bromel.).
Trianae, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 888.—N. Granat.

SOLANDRA, Sw. (Solan.).
boliviana, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 199.—Am. austr.

SOLANUM, Tourn. (Solan.).
actaeabotrys, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 192.—Bolivia.
arboreum, Teijsm. & Binn. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 547 = Minahassae.
asterosetosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 224.—Bolivia.
astrochlaenoides, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 476.—Afr. trop.
aureifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 87.—Bolivia.
azureum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
bathocladon, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 476.—Afr. trop.
clavatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 87.—Bolivia.
cremastocarpum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 534.—N. Guin.
dammerianum, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 147 (non Regel).—N. Brit.
deflexum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 301.—Mexic.
dejectum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
erythrotrichum, *Fernald, l. c.* 561.—Am. cent.
Goetzei, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 473.—Afr. trop.
guanicense, *Urb. Symb. Antill.* i. 399.—Ind. occ.
Hadaq, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 122.—Arabia.
Hayesii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 560.—Am. cent.
hibiscifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 226.—Reg. Argent.

SOLANUM:—
hyoscyamifolium, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 190.—Bolivia.
jaliscanum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 571.—Am. cent.
Kaernbachii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 535.—N. Guin.
Kurzii, *Brace, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 541.—Reg. Himal.
laysanense, *Bitter, in Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xvi. 433.—Ins. Sandw.
Lechleri, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 193.—Bolivia.
lignescens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 91.—Mexic.
lilacinum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 192.—Bolivia.
Lindenii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 209.—Afr. trop.
macroscolum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
madrense, *Fernald, l. c.* 558.—Mexic.
magnusianum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 475.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 547, nomen.—Celebes.
monotanthum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 474.—Afr. trop.
myrianthum, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 191.—Bolivia.
nakurense, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 275.—Afr. trop.
nocturnum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
nummularium, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 205.—Austral.
ochraceo-ferrugineum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 560.—Mexic.
oliverianum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 535.—N. Guin.
physalifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
plumense, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
pseudolycioides, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 193.—Bolivia.
psidiifolium, *Rusby, l. c.* 194.—Bolivia.
Reineckii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 167.—Bras.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 191.—Am. austr.
sabaeorum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 122.—Arabia.
scindicum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 542.—Ind. or.
Sembarto, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 227.—Chili.
sidaefolium, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 46.—Reg. Argent.
sodomaeodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 227.—Afr. austr.
symmetricum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 89.—Bolivia.
symphyostemon, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 44.—Afr. trop.
tenuisectum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 227.—Reg. Argent.
togoense, *Damm. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 312, nomen.—Afr. trop.
tunariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 228.—Bolivia.
velutissimum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 89.—Bolivia.
volubile, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 194 (non aliorum).—Bolivia.
Worsleyi, *Hort. in Wien. Ill. Gart. Zeit.* 1900, 57.—Bras.
yapacaniense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 228.—Bolivia.

SOLDANELLA, Linn. (Primul.).
Armena, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, iv. 387.—Reg. Caucas.

SOLENANTHUS, Ledeb. (Borag.).
lanatus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. *Afd.* II. no. 7 (1898) 16 (= *Anchusa lanata*).—Afr. bor.
tubiflorus, *Murb. l. c.* 14.—Afr. bor.

SOLENOMELUS, Miers (Irid.).
Segethi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 309 = Lechleri.

SOLENOPHORA, Benth. (Gesner.).
calycosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 152.—Am. cent.

SOLENOSTEMON, Thonn. (Labiat.).
africanus, Briq. in Engl. Jahrb. xix. 181 = ocymoides.
bullatus, Briq. l. c. 180 = Coleus bullulatus.
calaminthoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 421.—Afr. trop.
cymosus, *Baker, l. c.* 422.—Afr. trop.
decumbens, *Baker, l. c.* 421.—Afr. trop.
Mannii, *Baker, l. c.* 422.—Afr. trop.
monostachyus, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 359 = ocymoides.
niveus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 864.—Afr. trop.
robustus, *Hiern, l. c.* 864.—Afr. trop.
zambesiacus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 421.—Afr. trop.

SOLIDAGO, Vaill. (Compos.).
bellidifolia, *Greene, Pittonia*, iv. 100.—Am. bor.
chrysopsis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 477.—Am. bor.
ciliosa, *Greene, Pittonia*, iii. 22.—Am. bor.
concinna, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 377.—Am. bor.
decumbens, *Greene, Pittonia*, iii. 161.—Am. bor.
delicatula, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 474.—Am. bor.
diffusa, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 378 = pulcherrima.
dilatata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 196.—Am. bor.
dispersa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 475.—Am. bor.
fasciculata, *Greene, Pittonia*, iii. 101.—Am. bor.
flaccidifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 477.—Am. bor.
Helleri, *Small, l. c.* 619.—Am. bor.
Maxoni, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 132.—Am. bor.
Nashii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 475.—Am. bor.
oreophila, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 387.—Am. bor.
pallescens, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 120.—Am. bor.
plumosa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 476.—Am. bor.
pruinosa, *Greene, Pittonia*, iv. 70.—Am. bor.
pulcherrima, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 549.—Am. bor.
racemosa, *Greene, Pittonia*, iii. 160.—Am. bor.
subviscosa, *Greene, l. c.* 348.—Am. bor.
trinervata, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.

SONCHUS, Tourn. (Compos.).
elliotianus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 623 = Lactuca nana.
macer, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 404.—Afr. trop.
repens, Bub. Fl. Pyren. ii. 110 = arvensis.

SONERILA, Roxb. (Melast.).
albiflora, *Stapf & King, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 28.—Penins. Mal.
andamanensis, *Stapf & King, l. c.* 26.—Penins. Mal.
bicolor, *Stapf & King, l. c.* 43.—Penins. Mal.
brachyantha, *Stapf & King, l. c.* 37.—Penins. Mal.
bracteata, *Stapf & King, l. c.* 35.—Penins. Mal.
caesia, *Stapf & King, l. c.* 36.—Penins. Mal.
calaminthifolia, *Stapf & King, l. c.* 23.—Penins. Mal.
calycula, *Stapf & King, l. c.* 43.—Penins. Mal.
capitata, *Stapf & King, l. c.* 35.—Penins. Mal.
congesta, *Stapf & King, l. c.* 32.—Penins. Mal.
costulata, *Stapf & King, l. c.* 39.—Penins. Mal.
Cyclaminella, *Stapf & King, l. c.* 33.—Penins. Mal.
elatostemoides, *Stapf & King, l. c.* 42.—Penins. Mal.
elliptica, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
epilobioides, *Stapf & King, l. c.* 22.—Penins. Mal.
flaccida, *Stapf & King, l. c.* 25.—Penins. Mal.
glabriflora, *Stapf & King, l. c.* 42.—Penins. Mal.
hyssopifolia, *Stapf & King, l. c.* 23.—Penins. Mal.
lasiantha, *Stapf & King, l. c.* 29.—Penins. Mal.
macrophylla, *Stapf & King, l. c.* 39.—Penins. Mal.
microcarpa, *Stapf & King, l. c.* 38.—Penins. Mal.
mollis, *Stapf & King, l. c.* 28.—Penins. Mal.
muscicola, *Stapf & King, l. c.* 31.—Penins. Mal.
Nidularia, *Stapf & King, l. c.* 37.—Penins. Mal.

SONERILA:—
pallida, *Stapf & King, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 27.—Penins. Mal.
populifolia, *Stapf & King, l. c.* 26.—Penins. Mal.
repens, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
rudis, *Stapf & King, l. c.* 27.—Penins. Mal.
saxosa, *Stapf & King, l. c.* 31.—Penins. Mal.
succulenta, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
suffruticosa, *Stapf & King, l. c.* 29.—Penins. Mal.

SOPHIA, Linn. = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).
filipes, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 311 = Sis. incisum.
gracilis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 475.—Am. bor.
Halictorum, Cock. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 460.—Am. bor.
intermedia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 184.—Am. bor.
longipedicellata, Howell, Fl. N. W. Amer. 56 = Sis. incisum.
ochroleuca, Woot. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 455.—Am. bor.
pinnata, Howell, Fl. N. W. Amer. 56 = Sis. canescens.
procera, Greene, Pittonia, iv. 199.—Am. bor.
Sonnei, Greene, l. c. iii. 95.—Am. bor.
Sophia, Britton, Fl. N. U. S. ii. 144 = Sis. Sophia.
sophioides, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Sis. Sophia.

SOPHORA, Linn. (Legum.).
Bakeri, *C. B. Clarke, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 466.—Ind. or.
Dunii, *Prain, l. c.*—Burma.
Prazeri, *Prain, l. c.*—Burma.

SOPUBIA, Buch.-Ham. (Scrophul.).
argentea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 774.—Afr. trop.
decumbens, *Hiern, l. c.* 772.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 462.—Afr. trop.
filiformis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 772 (non G. Don).—Afr. trop.
leprosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 468.—Afr. trop.

SORBARIA, A. Br. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
Aitchisoni, Hemsl. in Gard. Chron. 1900, II. 254 = Sp. Aitchisoni.

SORBUS, Tourn. (Rosac.).
californica, Greene, Pittonia, iv. 131.—Am. bor.
dumosa, Greene, l. c. 129.—Am. bor.
scopulina, Greene, l. c. 130.—Am. bor.
subvestita, Greene, l. c.—Am. bor.
umbellata, Fritsch, in Sched. Fl. Austro-Hung. vii. 18 = Crataegus umbellata.

SORGHUM, Linn. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
Arduini, Jacq. Ecl. Gram. t. 18 = A. Sorghum.
asperum, Roem. & Schult. Syst. ii. 839 = Pentaschistis aspera.
capense, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8778 C = A. halepensis.
dubium, C. Koch, in Linnaea, xxi. 443 = A. halepensis.
giganteum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 181 = A. halepensis.
halepense, Pers. Syn. i. 101 = A. halepensis.
Schreberi, Ten. Fl. Neap. Syll. App. IV. p. iv = A. halepensis.
Usorum, Nees, Fl. Afr. Austr. 87 = A. Sorghum.
vulgare, Pers. Syn. i. 101 = A. halepensis.

SOULIEA, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 69. *RANUNCULACEAE.*
vaginata, *Franch. l. c.* 70.—China.

SOUROUBEA, Aubl. = **Ruyschia**, Jacq. (Ternstroem.).
didyma, Gilg, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. 33.—Peruv.
pachyphylla, Gilg, l. c.—Peruv.
sympetala, Gilg, l. c. 32.—Am. cent.

SPARATTANTHELIUM, Mart. (Combret.).
glabrum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 35.—Bolivia.

SPARATTOSPERMA, Mart. (Bignon.).
ellipticum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 362 = psammophilum.

SPARATTOSPERMA:—
neurocalyx, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 361.—Bras.
stenocarpum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 360.—Bras.
vernicosum, Bureau & K. Schum. l. c. 359 = lithontripticum.

SPARGANIUM, Tourn. (Typhac.).
antipodum, *Graebn. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1898, 33.—N. Zel.
asiaticum, *Graebn. l. c.* 32.—Hab.?
diversifolium, *Graebn. in Schrift. Nat. Ges. Danzig*, ix. 335.—Germania.
englerianum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 287.—Hybr.
microcarpum, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 423 = ramosum.
polyedrum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 283.—Hybr.

SPARMANNIA, Linn. f. (Tiliac.).
ricinocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 26 = Urena ricinocarpa.

SPARTINA, Schreb. (Gramin.).
caespitosa, *Eaton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 338.—Am. bor.
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 260 = stricta.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 579.—Patag.

SPATHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).
albida, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 107.—N. Britt.
lauterbachiana, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 244.—N. Guin.
papuana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 159.—N. Guin.

SPATHOLIRION, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 329. *COMMELINACEAE.*
ornatum, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

SPATHOLOBUS, Hassk. (Legum.).
bracteolatus, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 76.—Penins. Mal.
dubius, *Prain, ex King, l. c.* 78.—Penins. Mal.
Listeri, *Prain, ex King, l. c.* 76, 415.—Penins. Mal.
Maingayi, *Prain, ex King, l. c.* 79.—Penins. Mal.
merguensis, *Prain, ex King, l. c.* 416.—Penins. Mal.
Pottingeri, *Prain, l. c.* lxvii. 286.—Ind. or.
Ridleyi, *Prain, ex King, l. c.* lxvi. 80.—Penins. Mal.
riparius, *Prain, ex King, l. c.* 78, 416.—Penins. Mal.
roseus, *Prain, l. c.* 415.—Ind. or.
squamiger, *Prain, l. c.* 414.—Reg. Himal.

SPECULARIA, Heist. (Campan.).
parviflora, Bub. Fl. Pyren. ii. 37 = hybrida.

SPERGULA, Linn. (Caryophyll.).
atheniensis, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxii. no. 12, 45 (= *Spergularia atheniensis*).—Graecia.
diandra, *Murb. l. c.* 44 (= *Arenaria salsuginea*).—Graecia.
marginata, *Murb. l. c.* 45 (= *Lepigonum marinum*).—Eur.
mauritanica, *Murb. l. c.* 47.—Alger.
microsperma, *Murb. l. c.* 44 (= *Lepigonum microspermum*).—Afr. trop.

SPERGULARIA, J. & C. Presl (Caryophyll.).
insularis, *Fouc. in Ann. Soc. Sci. Char.-Inf.* xxxii. 211.—Ins. Balear.

SPERMACOCE, Dill. (Rubiac.).
abyssinica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 123.—Afr. trop.
alternans, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
anthospermodes, *Kuntze, l. c.*—Am. austr.
aretiodes, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
argentea, *Kuntze, l. c.*—Bras.
arida, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
basalis, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
brachystemodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
centranthodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Chamissonis, *Kuntze, l. c.*—Bras.
cupularis, Kuntze, l. c. = pusilla.
decipiens, *Kuntze, l. c.*—Bras.
dispersa, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
divaricata, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
dregeana, Kuntze, l. c. 124 = Mitracarpum dregeanum.
equisetodes, *Kuntze, l. c.* 123.—Bras.
eritrichodes, *Kuntze, l. c.*—Cuba.

SPERMACOCE :—
eryngiodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 123 = diffusa.
eupatoriodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
falcifolia, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
fastigiata, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Hookeri, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
laxa, *Kuntze, l. c.*—Bras.
leiophylla, *Kuntze, l. c.*—Bras.
linearifolia, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
manillensis, *Kuntze, l. c.*—Ins. Philipp.
martiana, *Kuntze, l. c.*—Bras.
ovalis, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
parvifolia, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
perpusilla, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
Runkii, *Kuntze, l. c.*—Bras.
scabiosodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
spruceana, *Kuntze, l. c.*—Venez.
squamosa, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
suaveolens, Kuntze, l. c. = tenella.
suberecta, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
thalictrodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
thymifolia, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
trichantha, *Kuntze, l. c.*—Guiana.
valerianodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
verbenodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Warmingii, *Kuntze, l. c.*—Bras.
wydleriana, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
Wunschmannii, *Kuntze, l. c.*—Bras.

SPERMACOCEODES, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 123 (1898) = **Spermacoce**, Dill. (Rubiac.).
glabrum, Kuntze, l. c. = Spermacoce glabra.
tenuior, Kuntze, l. c. = Spermacoce tenuior.

SPHACELE, Benth. (Labiat.).
affinis, Auct. in Bull. Herb. Boiss. iv. 957, errore = heteromorpha.
Annae, *Taub. ex Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 4.—Bras.
chamaedryoides, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 291 = campanulata.
chilensis, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 805 = campanulata.
cochabambana, *Briq. l. c.* 807.—Bolivia.
confusa, *Briq. l. c.* 806.—Bolivia.
Gaudichaudii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 182.—Ecuador.
heteromorpha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 847.—Bolivia.
Hieronymi, *Briq. l. c.* 804.—Reg. Argent.
inflata, *Briq. l. c.* 848.—Reg. Argent.
Jamesonii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 179.—Ecuador.
kuntzeana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 805.—Bolivia.
lindeniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 180.—Venez.
mandoniana, *Briq. l. c.* 176.—Bolivia.
pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 49.—Reg. Argent.
Sprucei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 178.—Ecuador.
Urbani, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* v. 1014.—Ind. occ.

SPHACOPHYLLUM, Benth. (Compos.).
Buchwaldi, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 473.—Afr. trop.
Candelabrum, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 27.—Afr. trop.
pinnatifidum, *O. Hoffm. l. c.* 26.—Afr. trop.
pumilum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 573.—Afr. trop.
Welwitschii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 27.—Afr. trop.

SPHAERALCEA, A. St. Hil. (Malvac.).
arida, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 177.—Mexic.
cuspidata, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 519.—Am. bor.
lobata, *Woot. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 306.—Am. bor.

SPHAERANTHUS, Vaill. (Compos.).
cristatus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 470.—Afr. trop.
epigaeus, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 560.—Afr. austr.

SPHAEROCARPUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 256 (1841), sphalm. = **Sphaerocaryum**, Nees (Gramin.).

SPHAEROCARYUM, Nees (Gramin.).
elegans, *Nees, ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 620.—As. or.

SPHAEROPHYLLUM, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1899) 393, sphalm. = **Sphacophyllum**, Benth. (Compos.).

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
campestre, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 189 = O. campestris.
chamaenerioides, Small, l. c. = O. chamaenerioides.
decorticans, Small, l. c. 191 = O. gauraeflora.
divaricatum, C. Gay, Fl. Chil. ii. 328 = O. micrantha.
Hilgardi, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 188 = O. Hilgardi.
hirtellum, Small, l. c. 190 = O. hirtella.
minor, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 130.—Am. bor.
nitidum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 190 = O. nitida.
refractum, Small, l. c. 192 = O. refracta.
rutila, Parish, in Erythea, vi. 89 = O. rutila.
utahense, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 191.—Am. bor.
veitchianum, Small, l. c. = O. bistorta.

SPHAEROTHYLAX, Bisch. (Podost.).
pusilla, *Warming, in Danske Vid. Selsk.* Ser. VI. ix. 146.—Afr. trop.

SPHAGNETICOLA, O. Hoffm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 36. *COMPOSITAE.*
Ulei, *O. Hoffm. l. c.*—Bras.

SPHENANDRA, Benth. (Scrophul.).
coerulea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 239 = viscosa.

SPHENOCENTRUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 79. *MENISPERMACEAE.*
jollyanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

SPHENOPUS, Trin. (Gramin.).
Ehrenbergii, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii. 57.—Eur.

SPHENOSCIADIUM, A. Gray = **Selinum**, Linn. (Umbell.).
eryngiifolium, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 128 = Sel. eryngiifolium.

SPHENOSTYLIS, E. Mey. = **Vigna**, Savi (Legum.).
Schweinfurthii, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 309.—Afr. trop.
stenocarpa, Harms, l. c. = V. ornata.

SPHONDYLIUM, Tourn. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).
proteiforme, Bub. Fl. Pyren. ii. 394 = H. Sphondylium.

SPIGELIA, Linn. (Logan.).
Blainii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 432.—Ind. occ.
elongata, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 542.—Am. bor.
nervosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. 782 (non Steud.).—Ecuador.
sessilifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 543.—Am. bor.

SPILANTHES, Jacq. (Compos.).
americana, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 42 = Mutisii.
filipes, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 314.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 42.—Ecuador.

SPINIFEX, Linn. (Gramin.).
dioicus, Buch.-Ham. ex Pritz. Index Ic. Bot. 1058 = squarrosus.

SPIRAEA, Linn. (Rosac.).
Aitchisoni, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1900, II. 284.—Afghan.
cinerascens, *Piper, in Erythea*, vii. 171.—Am. bor.
Hendersoni, *Piper, l. c.* 172 (= *Luetkea Hendersoni*).—Calif.
Rosthornii, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 383.—China.
uniflora, *Piper, in Erythea*, vii. 172 (= *Luetkea uniflora*).—Am. bor.

SPIRANTHES, Rich. (Orchid.).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 289 = Deroemeria squamata.
constricta, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 339 (= *Gyrostachis constricta*).—Am. sept.
exigua, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
metallica, *Rolfe, l. c.* 46.—Bras.; Guiana.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 307.—Mexic.
oaxacana, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 34.—Mexic.
Reverchonii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 339 (= *Gyrostachis Reverchonii*).—Am. sept.
tenuiflora, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 308.—Mexic.
triloba, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 339 (= *Gyrostachis triloba*).—Am. sept.

SPIREA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 88. *RUBIACEAE.*
montana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

SPIRODELA, Schleid. = **Lemna**, Linn. (Lemnac.).
punctata, C. H. Thompson, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 28 = L. punctata.

SPIROPETALUM, Gilg (Connar.).
heterophyllum, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 214 (= *Rourea heterophylla*).—Afr. trop.
Solanderi, *Gilg, l. c.* (= *Rourea Solanderi*).—Afr. trop.

SPODIOPOGON, Trin. (Gramin.).
angustifolius, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. IV. ii. 300 = Ischaemum angustifolium.
Beccarii, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 228.—Sumatra.
depauperatus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 641.—Japon.
laniger, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum angustifolium.
Lehmanni, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 91 = Ischaemum petiolare.
notopogon, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ischaemum angustifolium.
pilosus, Nees, l. c. = Ischaemum pilosum.
petiolaris, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 301 = Ischaemum petiolare.

SPONDIAS, Linn. (Anacard.).
lakonensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 375 B.—Cochinch.

SPOROBOLUS, R. Br. (Gramin.).
acinifolius, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 581.—Afr. austr.
agrostoides, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 67.—Afr. trop.
andongensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 208.—Afr. trop.
arundinaceus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 369 (= *Diachyrium arundinaceum*).—Reg. Argent.
Benthami, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 16.—Austral.
blephariphyllus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 398 = discosporus.
capensis, Kunth, Enum. i. 212 = indicus.
copiapinus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 6.—Chili.
discosporus, Nees, Fl. Afr. Austr. 158 = coromandelianus.
distichophyllus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 7 (= *Agrostis distichophylla*, Phil.).—Chili.
filiformis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 173 (non Rydb.).—Am. bor.
geniculatus, Nees, ex Aitch. Cat. Punjab Pl. 165 = tremulus.
Ghikae, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis*, 199.—Afr. trop.
giganteus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 88.—Am. bor.
littoralis, Kunth, Rév. Gram. i. 68 = virginicus.
Matrella, Nees, Fl. Afr. Austr. 152 = virginicus.
natalensis, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 822 = indicus.
Palmeri, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 48.—Mexic.
podotrichus, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 168.—Afr. trop.
ruppelianus, Hochst. ex Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 586 = indicus.
sanguineus, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 209.—Afr. trop.

SPOROBOLUS:—
simplex, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 48.—Am. bor.
somalensis, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 169.—Afr. trop.
Sporobolus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 369 = Sprengelii.
tenuissimus, Kuntze, l. c. = minutiflorus.
Thurberi, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 48.—Mexic.
tremulus, *Kunth, Rév. Gram.* i. 67.—As. or.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 207.—Afr. trop.

STAAVIA, Dahl (Bruniac.).
Dodii, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 2558.—Afr. austr.

STABEROHA, Kunth = **Thamnochortus**, Berg. (Restiac.).
distachya, Kunth, Enum. Pl. iii. 444 = T. umbellatus.
imbricata, Kunth, l. c. 442 = T. imbricatus.
stenoptera, Kunth, l. c. 443 = T. imbricatus.

STACHYANTHEMUM, Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana, iii. 1097 (1848) = **Cyrilla**, Garden (Cyrill.).
Schomburgkii, Klotzsch, l. c. = C. antillana.

STACHYANTHUS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 227 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 487. *OLACACEAE.*
Zenkeri, *Engl. ll. cc.*—Afr. trop.

STACHYOTHYRSUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 198 (1897); et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 277. *LEGUMINOSAE.*
Staudtii, *Harms, ll. cc.*—Afr. trop.

STACHYS, Tourn. (Labiat.).
africana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 262 = Ballota africana.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 874.—Afr. trop.
aquatica, Bub. Fl. Pyren. i. 444 = palustris.
aragonensis, *Lazaro, in Anal. Soc. Espan. Hist. Nat.* xxix. 160.—Eur.
Bachmannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 75.—Afr. austr.
Bakeri, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 266.—Madag.
boliviana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 871.—Bolivia.
bracteata, *Greene, Pittonia,* iii. 342.—Am. bor.
chrysotrichos, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 316.—Afr. austr.
confusa, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 122.—Am. bor.
Cooleyae, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 590.—Am. bor.
debilis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. 234 = Bakeri.
dolopica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 75.—Graecia.
dubia, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 873.—Chili.
Emersoni, *Piper, in Erythea,* vi. 31.—Am. bor.
erectiuscula, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 315.—Afr. austr.
eriophylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 713.—Patag.
Fendleri, *Briq. l. c.* 115.—Venez.
flaccida, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic.
fragillima, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 118.—Oriens.
Fuchsii, Bub. Fl. Pyren. i. 440 = germanica.
Galanderi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 870.—Reg. Argent.
hians, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 116.—N. Granat.
hispida, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 263 = Thunbergii.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 875.—Afr. trop.
ingrata, *Greene, Pittonia,* iii. 341.—Am. bor.
Kuntzei, *Guerke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 262.—Afr. austr.
lanuginosa, *Greene, Pittonia,* iii. 342.—Am. bor.
lasiocalyx, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 317.—Afr. austr.
littoralis, *Greene, Pittonia,* iii. 341 (non Phil.).—Am. bor.
Lorentzii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 869.—Reg. Argent.

STACHYS:—
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 189 (non D. Don).—Eur.
macrostachya, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 261 = longifolia.
malacophylla, *Greene, Pittonia,* iii. 343.—Am. bor.
mandoniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 118.—Bolivia.
Marrubiastrum, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 266 = hirta.
micheliana, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève,* xxxii. no. 10, 7.—Parag.
minima, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 550 = spathulata.
oaxacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 564.—Mexic.
Ocymastrum, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 291 = hirta.
petiolosa, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 868.—Reg. Argent.
Pichleri, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 137.—Syria.
Pittieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 119.—Am. cent.
pseudonigricans, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 315.—Afr. trop.
pubens, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 581.—Am. bor.
pusilla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 120.—Am. trop.
recurva, Guerke, in Bull. Herb. Boiss. vi. 549 = rugosa.
rivularis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
Schlechteri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 74.—Afr. austr.
scopulorum, *Greene, Pittonia,* iii. 342.—Am. bor.
serotina, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 475 = S. Betonica.
sessilis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 74.—Afr. austr.
simplex, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 221.—Afr. austr.
Sprucei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 117.—Ecuador.
striata, *Greene, Pittonia,* iii. 341.—Am. bor.
transvaalensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 316.—Afr. austr.
tucumanensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 872.—Reg. Argent.
velutina, Greene, in Erythea, ii. 121 = malacophylla.
venezuelana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 114.—Venez.

STACHYTARPHETA, Vahl (Verben.).
boliviana, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 396.—Bolivia.

STACHYURUS, Sieb. & Zucc. (Ternstroem.).
chinensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 254.—China.
salicifolius, *Franch. l. c.* 253.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.*—China.

STACKHOUSIA, Sm. (Stackhous.).
intermedia, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.

STANHOPEA, Frost (Orchid.).
Fuerstenbergiae, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1899, II. 161.—Hort.
impressa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 196.—Reg. Andin.
intermedia, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 142.—Mexic.
madouxiana, *Cogn. in Gard. Chron.* 1898, II. 134.—N. Granat.
stenochila, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Gard. Chron.* 1900, II. 369.—N. Granat.

STANLEYA, Nutt. (Crucif.).
bipinnata, *Greene, in Erythea,* iv. 173.—Am. bor.
confertiflora, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 59.—Am. bor.

STAPELIA, Linn. (Asclep.).
anemoniflora, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 118; *et in Mém. Inst. Égypt,* iii. 276.—Arab.
chrysostephana, *Deflers, l. c.* 117; *et l. c.* 274.—Arab.
cupularis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1897, II. 45.—Afr. austr. ?
hanburyana, *Berger & Ruest, in Monatsschr. Kakt.* 1899, 6.—Hort.

STAPFIA, Davy, in Erythea, vi. (1898) 109 = **Neostapfia**, Davy (Gramin.).
colusana, Davy, l. c. = N. colusana.

STAPHYLEA, Linn. (Sapind.).
Francheti, *H. Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 221.—Japon.

STAPHYSORA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1233; et ex Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 521. *EUPHORBIACEAE.*
albida, *Pierre, ex Pax, l. c.*, nomen.—Afr. trop.
Dusenii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1233, nomen.—Afr. trop.

STATHMOSTELMA, K. Schum. (Asclep.).
bicolor, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 457.—Afr. trop.
odoratum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
pachycladum, *K. Schum. l. c.* 458.—Afr. trop.

STATICE, Tourn. (Plumbag.).
anthericoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 450.—Afr. austr.
Chazaliei, *H. Boissieu, in Journ. de Bot.* 1896, 220.—Afr. trop.
depressa, *Bub. Fl. Pyren.* i. 194.—Pyren.
Doerfleri, *Halacsy, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 1.—Graecia.
dubyeana, *Bub. Fl. Pyren.* i. 196.—Pyren.
laxissima, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 296.—Eur.
limbata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 390.—Am. bor.
Maurocordatae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis,* 208.—Afr. trop.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 548.—Patag.
setigera, Bub. Fl. Pyren. i. 197 = ferulacea.

STAUDTIA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 128. *MYRISTICACEAE.*
kamerunensis, *Warb. l. c.* 241.—Afr. trop.
pterocarpa, *Warb. l. c.* 243.—Afr. trop.

STAURANTHERA, Benth. (Gesner.).
argyrescens, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 286.—Malaya.
chiritaeflora, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2454.—China.
ionantha, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 286.—Sumatra.

STAUROCHILUS, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. (1896) 351. *ORCHIDEAE.*
fasciatus, *Ridley, l. c.* (= *Trichoglottis fasciata*).—Penins. Mal.

STAUROGYNE, Wall. = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).
diantheroides, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 645.—Bolivia.
ericoides, Lindau, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. 44.—Bras.
eustachya, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 644.—Bras.
glutinosa, Lindau, l. c.—Bras.
macrantha, Lindau, l. c. 643.—Bras.

STAUROSTIGMA, Scheidw. (Arac.).
vermicola, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires,* i. 89.—Reg. Argent.

STEGANTHERA, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 564. *MONIMIACEAE.*
fengeriana, *Perkins, l. c.* 566.—N. Guin.
hirsuta, *Perkins, l. c.* 567 (= *Kibara hirsuta*).—N. Guin.
oblongiflora, *Perkins, l. c.* 566.—N. Guin.
schumanniana, *Perkins, l. c.* 565.—N. Guin.
thyrsiflora, *Perkins, l. c.*—N. Guin.
Warburgii, *Perkins, l. c.* 564.—Celebes.

STEIRODISCUS, Less. (Compos.).
gamolepis, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 216.—Afr. austr.
Schlechteri, *Bolus, l. c.* 217.—Afr. austr.

STELECHOCARPUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
Schefferi, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 12; *et in Ic. Bogor.* t. 71 (= *Sageraea cauliflora*).—Sumatra.

STELIN, Bub. Fl. Pyren. i. 128 (1897) = **Viscum**, Tourn. (Loranth.).
album, Bub. l. c. 129 = V. album.

STELIS, Sw. (Orchid.).
furfuracea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 447.—N. Granat.
guatemalensis, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 541.—Am. cent.
lindleyana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 346.—Peruv.
micrantha, Barb. Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 93 = Rodriguesii.
pachypus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 447.—N. Granat.
popayanensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 448.—N. Granat.
rhynchanthera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 447.—N. Granat.
Rodriguesii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 360.—Bras.
suaveolens, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 448.—Ecuador.
viridi-brunnea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Ecuador.

STELLARIA, Linn. (Caryophyll.).
antillana, *Urb. Symb. Antill.* i. 303.—Ind. occ.
dichasioides, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 435.—China.
Henryi, *F. N. Williams, l. c.* 434.—China.
irazuensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 236.—Am. cent.
minuta, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 57.—N. Zel.
nutans, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.
oxyphylla, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 165.—Am. cent.
palustris, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 87 = Callitriche verna.
Souliei, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.
uda, *F. N. Williams, l. c.* 435.—China.
washingtoniana, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 166.—Am. cent.
wushanensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.

STELLARIOPSIS, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. (1898) 155. *ROSACEAE.*
santalinoides, *Rydb. l. c.* (= *Potentilla santolinoides*).—Am. bor.

STELLINA, Bub. Fl. Pyren. i. 85 (1897) = **Callitriche**, Linn. (Halorag.).
hamulata, Bub. l. c. 87 = C. hamulata.
platycarpa, Bub. l. c. 86 = C. stagnalis.
stagnalis, Bub. l. c. 85 = C. stagnalis.

STELMAGONUM, Baill. (Asclep.).
Holtonii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 424.—N. Granat.

STEMMADENIA, Benth. (Apocyn.).
macrophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 310.—Mexic.
tomentosa, *Greenm. l. c.*—Mexic.

STEMODIA, Linn. (Scrophul.).
ceratophylloides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 395.—Afr. trop.
crenatifolia, *K. Schum. l. c.*—Bolivia.
ericifolia, *K. Schum. l. c.*—Parag.
tenera, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

STEMODIACRA, P.Br. = **Stemodia**, Linn. (Scrophul.).
ceratophylloides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 759 = Stemodia ceratophylloides.
crenatifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 239 = Stemodia crenatifolia.
ericifolia, Kuntze, l. c. = Stemodia ericifolia.
sessiliflora, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 758 = Limnophila sessiliflora.
tenera, Hiern, l. c. 759 = Stemodia tenera.

STEMODIOPSIS, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 25. *SCROPHULARIACEAE.*
Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

STEMONA, Lour. (Roxburgh.).
acuta, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 493.—China.
australiana, *C. H. Wright, l. c.* 496.—Austral.

STEMONA :—
javanica, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 495.—Java et Austral.
moluccana, *C. H. Wright, l. c.* 494.—Java.
parviflora, *C. H. Wright, l. c.* 496.—China.

STEMONOPORUS, Thw. = **Vateria**, Linn. (Dipterocarp.).
lewisianus, Trim. ex Hook. f. in Trim. Fl. Ceyl. v. 383.—Zeylan.
revolutus, Trim. l. c. 384.—Zeylan.

STEMONURUS, Blume = **Gomphandra**, Wall. et **Lasianthera**, Beauv. (Olac.).
celebicus, Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 394.—Celebes.
puberulus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 414.—N. Guin.

STEMOTRIA, Wettst. & Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register, 462 (1899). *SCROPHULARIACEAE.*

STENANDRIUM, Nees (Acanth.).
Wrightii, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 208.—Ind. occ.

STENANTHELLA, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 530. *LILIACEAE.*
occidentalis, *Rydb. l. c.* 531 (= *Stenanthium occidentale*).—Am. bor.
sachalinensis, *Rydb. l. c.* 530 (= *Stenanthium sachalinense*).—Ins. Sachalin.

STENANTHERA, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 57. *ANONACEAE.*
gabonensis, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra gabonensis*).—Afr. trop.
hamata, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra hamata*).—Afr. trop.
myristicifolia, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra myristicifolia*).—Afr. trop.

STENOCORYNE, Lindl. = **Bifrenaria**, Lindl. (Orchid.).
wendlandiana, Kraenzl. in Xenia Orch. t. 289.—Bras.?

STENOGLOTTIS, Lindl. (Orchid.).
zambesiaca, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 190.—Afr. trop.

STENOLIRION, Baker, in Hook. Ic. Pl. t. 2493 (1896). *AMARYLLIDACEAE.*
Elliotii, *Baker, l. c.*—Afr. trop.

STENOLOBIUM, D. Don (Bignon.).
amoenum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 372 (= *Gelseminum amoenum*).—Bolivia.

STENOPHRAGMA, Čelak. (Crucif.).
virgatum, *Greene, Pittonia*, iii. 138 (= *Sisymbrium virgatum*).—Am. bor.

STENOPHYLLUS, Rafin. = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).
ciliatifolius, Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 22 = Sc. ciliatifolius.

STENORYNCHUS, Rich. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
comosus, Cogn. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 299.—Bolivia.

STENOSTEPHANUS, Nees (Acanth.).
puberulus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 670.—N. Granat.

STENOTOPSIS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 617. *COMPOSITAE.*
interior, *Rydb. l. c.* (= *Stenotus interior*).—Am. bor.
linearifolia, *Rydb. l. c.* (= *Stenotus linearifolius*).—Am. bor.

STENOTUS, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
Andersonii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 615.—Am. bor.
falcatus, Rydb. l. c. 616.—Am. bor.

STEPHANIA, Lour. (Menisperm.).
cyananatha, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 20,—Afr. trop.

STEPHANOLEPIS, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 153. *COMPOSITAE.*
centauroides, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

STEPHANOMERIA, Nutt. (Compos.).
lygodesmoides, *M. A. Jones, ex Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 349.—Am. bor.

STERCULIA, Linn. (Stercul.).
ambacensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 83.—Afr. trop.
cognata, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 285.—Ind. or.
Garrawayae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 463.—Austral.
gracilioides, *Boerl. & Koord. in Ic. Bogor.* t. 4.—Sumatra.
hymenocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. *Beibl.* lviii. 18.—Tonkin.
malacophylla, *K. Schum. l. c.* 15.—Malaya.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 640.—Celebes.
obscura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. *Beibl.* lviii. 15.—Borneo.
pachyclados, *K. Schum. l. c.* 17.—Borneo.
pedunculata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 180.—Afr. trop.
rhinopetala, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 102.—Afr. trop.
rhynchophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. *Beibl.* lviii. 16.—Borneo.
stapfiana, *K. Schum. l. c.* 19.—Java.
vitifolia, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 137; *et in Queensl. Agric. Journ.* iv. 464.—Austral.

STEREOCHILUS, Lindl. (Orchid.).
bicuspidatus, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 236 (= *Cleisostoma bicuspidatum*).—Reg. Himal.
Wattii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 595.—Reg. Himal.

STEREOSANTHUS, Franch. in Journ. de Bot. 1896, 384. *COMPOSITAE.*
Delavayi, *Franch. l. c.* 385.—China.
Souliei, *Franch. l. c.*—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.*—China.

STERIPHOMA, Spreng. (Cappar.).
Urbani, *Eggers, in Bot. Centralbl.* lxxiii. 67, errore 51.—Ecuador.

STERNBERGIA, Waldst. & Kit. (Amaryll.).
clusiana, Boiss. Fl. Or. v. 148 = macrantha.
grandiflora, Boiss. ex Baker, in Bot. Mag. t. 7459 = macrantha.
latifolia, Boiss. & Haussk. ex Baker, l. c. = macrantha.
macrantha, *J. Gay, in Boiss. Fl. Or.* v. 148.—Oriens.
stipitata, Boiss. & Haussk. in Boiss. l. c. = macrantha.

STEVIA, Cav. (Compos.).
achalensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 712.—Reg. Argent.
alternifolia, *Hieron. l. c.* 740.—Bras.
arachnoidea, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 326.—Mexic.
Balansae, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 739.—Parag.
brevipapposa, *Hieron. l. c.* 718.—Bolivia.
Brunetii, *Hieron. l. c.* 723.—Bras.
clinopodioides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 307.—Mexic.
cochabambensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 726.—Bolivia.
cruziana, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 33.—Bras.
decumbens, *Greene, Pittonia*, iii. 32.—Mexic.
deltoidea, *Greene, l. c.* 31.—Mexic.
dianthoidea, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 4.—Ecuador.
diffusa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 307.—Mexic.
diversipapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 708.—Reg. Argent.
effusa, *Hieron. l. c.* 710.—Reg. Argent.
entreriensis, *Hieron. l. c.* 739.—Reg. Argent.
galeopsidifolia, *Hieron. l. c.* 719.—Bolivia.
grandidentata, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 81, nomen; *et ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 55.—Bolivia.
grisebachiana, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 716.—Reg. Argent.
humilis, *Hieron. l. c.* 730.—Bolivia.
hypericifolia, *Hieron. l. c.* 732.—Bras.

STEVIA:—
Kuntzei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 733.—Bolivia.
Lechleri, *Hieron. l. c.* 727.—Peruv.
mercedensis, *Hieron. l. c.* 735.—Reg. Argent.
neurophylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
nevadensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 729.—Reg. Argent.
obovata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 55.—Bolivia.
portrerensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 715.—Reg. Argent.
procumbens, *Hieron. l. c.* 728.—Reg. Argent.
pubigera, *Hieron. l. c.* 720.—Reg. Argent.
Rosei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
saltensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 725.—Reg. Argent.
sanguinea, *Hieron. l. c.* 714.—Reg. Argent.
santacruzensis, *Hieron. l. c.* 731.—Bolivia.
Schickendantzii, *Hieron. l. c.* 717.—Reg. Argent.
Schultzii, *Hieron. l. c.* 721.—Reg. Argent.
seleriana, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
tapacariensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 734.—Bolivia.
tephra, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 328.—Mexic.
tunariensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 713.—Bolivia.
yaconensis, *Hieron. l. c.* 724.—Reg. Argent.

STIBURUS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 696 (1900). *GRAMINEAE.*
alopecuroides, *Stapf, l. c.* 697.—Afr. austr.

STICHORCHIS, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
decurrens, Pfitzer, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 103 = L. decurrens.
disticha, Pfitzer, l. c. = L. disticha.
latifolia, Pfitzer, l. c. = L. latifolia.
pendula, Pfitzer, l. c. = L. longipes.

STICTOCARDIA, Hallier f. = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
Woodii, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 548 = I. Woodii.

STIGMAPHYLLON, A. Juss. (Malpigh.).
alulatum, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1900, aest. 16.—Bras.
coloratum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 14.—Bolivia.
cordifolium, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1899, hiem 8.—Ind. occ.
grenadense, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 26.—Ind. occ.
hirsutum, *Niedenzu, l. c.* 25.—Bras.
incanum, Niedenzu, l. c. 5 = velutinum.
lanuginosum, *Niedenzu, l. c.* 1899, hiem. 9.—Peruv.
Monancistrum, *Niedenzu, l. c.* 13.—N. Granat.
ovatum, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 31 (= *Brachypterys borealis*).—Am. trop.; Ind. occ.
psilocardium, *Niedenzu, l. c.* 15.—Bras.
ruizianum, *Niedenzu, l. c.* 1899, hiem. 10.—Am. trop.
selerianum, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 7.—Mexic.
tiliifolium, *Niedenzu, l. c.* 16.—N. Granat.; Ind. occ.
tomentosum, Niedenzu, l. c. 1899, hiem. 5 = rotundifolium.

STILBE, Berg. (Verben.).
mucronata, *N. E. Brown, in Hook. Ic. Pl.* t. 2526.—Afr. austr.

STIPA, Linn. (Gramin.).
acrociliata, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiii. 167.—Austral.
amphicarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 726.—Chili.
araucana, *R. Phil. l. c.* 717.—Chili.
argentina, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 67.—Reg. Argent.
aristoides, Stapf, ex Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. vii. 358 = Aristida redacta.
barbinodis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 721.—Chili.
basi-plumosa, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 229.—Ind. or.
brevifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 724.—Chili.
capensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 371 = dregeana.
ceresiensis, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
collina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 720.—Chili.

STIPA:—
concinna, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 230.—Ind. or.
curicoana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 726.—Chili.
Duthiei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 232.—Ind. or.
elongata, Steud. Syn. Pl. Gram. 132 = dregeana.
eriocaulis, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. 401 = pennata.
formosa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 723.—Chili.
hispida, *R. Phil. l. c.* 719.—Chili.
Ibari, *R. Phil. l. c.* 716.—Chili.
Julieti, *R. Phil. l. c.* 719.—Chili.
juncoides, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 68.—Reg. Argent.
Lagascae, Guss. Pl. Rar. 48 = capillata.
Landbecki, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 718.—Chili.
latissimifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
litoralis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 717.—Chili.
longicylindrica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Urug.
longifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 725 (non Borb.).—Chili.
Luehmanni, *Reader, in Vict. Nat.* xvi. 158.—Austral.
macrathera, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 720.—Chili.
minor, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 46.—Am. bor.
montana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 723.—Chili.
Nelsoni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 46.—Am. bor.
neomexicana, *Scribn. l. c.* xvii. 132.—Am. bor.
oregonensis, *Scribn. l. c.* 130.—Am. bor.
oreophila, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 65.—Reg. Argent.
pallida, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373 (= *Piptochaetium pallidum*).—Reg. Argent.
pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 64.—Reg. Argent.
patagonica, *Speg. in Agron. La Plata,* 1897, 581.—Patag.
patulifolia, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxvii. 26.—Ecuador.
phaeocarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 721.—Chili.
quadrifaria, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
Readeri, F. Muell. ex Reader, in Vict. Nat. xiii. 168 = acrociliata.
saltensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
stricta, Vasey, in Bull. Torr. Bot. Club, 1883, 42 = oregonensis.
tandilensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373.—Reg. Argent.
tartarica, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 229 = orientalis.
thessala, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii. 41.—Eur.
tiraquensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373.—Bolivia.
trichocaulos, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 718.—Chili.
Tweedyi, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 47.—Am. bor.
Williamsii, *Scribn. l. c.* 45.—Am. bor.

STIPAGROSTIS, Nees = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
capensis, Nees, in Linnaea, vii. 291 = A. obtusa.

STIPTANTHUS, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 352 (1897). *LABIATAE.*
polystachyus, *Briq. l. c.* (= *Anisochilos polystachyum*).—Ind. or.

STIRONEURUM, Radlk. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. I. (1899) 31. *SAPOTACEAE.*
stipulatum, *Radlk. l. c.* 32.—Afr. trop.

STIZOLOBIUM, P. Br. = **Mucuna**, Adans. (Legum.).
mapirense, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 25.—Bolivia.
Poggei, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 252 = M. Poggei.

STIZOPHYLLUM, Miers = **Bignonia**, Linn. (Bignon.).
inaequilaterum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 221 = B. inaequilatera.

STOEBE, Linn. (Compos.).
cyathuloides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 201.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Schlechter, l. c.* 202.—Afr. austr.

STRAMONIUM, Tourn. = **Datura**, Linn. (Solan.).
globosum, Bub. Fl. Pyren. i. 351 = D. Metel.

STRAUSSIA, A. Gray (Rubiac.).
psychotrioides, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies,* i. 904.—Ins. Sandw.
pubiflora, *A. A. Heller, l. c.* 905.—Ins. Sandw.

STRAUSSIELLA, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. (1897) 68. *CRUCIFERAE.*
iranica, *Hausskn. l. c.* 70.—Oriens.

STREBLACANTHUS, Kuntze (Acanth.).
macrophyllus, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica,* viii. 306.—Am. cent.

STREPTANTHUS, Nutt. (Crucif.).
argutus, *Greene, Pittonia,* iii. 227.—Am. bor.
asper, *Greene, l. c.* 225.—Am. bor.
crassifolius, *Greene, l. c.* 227.—Am. bor.
foliosus, *Greene, l. c.* 226.—Am. bor.
linearis, *Greene, l. c.* 225.—Am. bor.
wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 126.—Am. bor.

STREPTIA, Rich. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 333 (1897) = **Streptogyne**, Beauv. (Gramin.).
crinita, Rich. l. c. = Streptogyne crinita.
secunda, Rich. l. c. = Streptogyne crinita.

STREPTOCARPUS, Lindl. (Gesner.).
chinensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 252.—China.
pentherianus, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 71.—Afr. austr.
Wilmsii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 363.—Afr. austr.

STREPTOGYNE, Beauv. (Gramin.).
gerontogaea, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon,* v. 301.—As. et Afr. trop.

STREPTOTRACHELUS, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. (1897) 298. *APOCYNACEAE.*
Pringlei, *Greenm. l. c.*—Mexic.

STRIGA, Lour. (Scrophul.).
Barteri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 514.—Afr. trop.
Baumannii, *Engl. l. c.* 515.—Afr. trop.
bilabiata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 240 = Thunbergii.
Burteri, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 502, sphalm. = Barteri.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 99.—Afr. trop.
glandulifera, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 514.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 62.—Afr. austr.
Passargei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 515.—Afr. trop.
Rowlandii, *Engl. l. c.* 513.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. l. c.* 514.—Afr. trop.

STRIGINA, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 516. *SCROPHULARIACEAE.*
pusilla, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

STROBILANTHES, Blume (Acanth.).
Balansae, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 652.—Tonkin.
bantonensis, *Lindau, l. c.* 650.—Tonkin.
cystolithigera, *Lindau, l. c.* 651.—Tonkin.
Everettii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 39.—Celebes.
gigantodes, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 649.—Tonkin.
isoglossoides, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 315.—Madag.
mesargyrea, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 195.—Borneo.
mucronatoproductus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 650.—Tonkin.
pateriformis, *Lindau, l. c.* 653.—Tonkin.
tonkinensis, *Lindau, l. c.* 651.—Tonkin.

STROBILANTHOPSIS, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 202. *ACANTHACEAE.*
hircina, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

STRONGYLOMOPSIS, Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires, i. (1899) 135. *COMPOSITAE.*
fuegiana, *Speg. l. c.*—Fuegia.

STROMBOSIA, Blume (Olac.).
dubia, *Vidal, Sinopsis, Atlas*, 20, t. 30.—Ins. Philipp.
klaineana, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1293 = Octoknema klaineana.
Scheffleri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

STROMBOSIOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 148 (1897). *OLACACEAE.*
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 187.—Afr. trop.
tetrandra, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 148.—Afr. trop.

STROPHANTHUS, DC. (Apocyn.).
arnoldianus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 206.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 40.—Afr. trop.
Nicholsoni, *E. M. Holmes, in Pharm. Journ.* 1897, 209.—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 308, nomen.—Afr. trop.

STROPHIOBLACHIA, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 194, 235 (1900). *EUPHORBIACEAE.*
fimbricalyx, *Boerl. l. c.* 236.—Celebes.

STROPHOSTYLES, Ell. = **Phaseolus**, Tourn. (Legum.)
umbellata, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 339 = P. helvolus.

STRUMARIA, Jacq. (Amaryll.).
bidentata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 46.—Afr. austr.

STRUTHANTHUS, Mart. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Haenkei, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 134 = L. spirostylis.
interruptus, Engl. l. c. = L. interruptus.
Lehmannii, Engl. l. c.—N. Granat.
mapirensis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 117.—Bolivia.
nudipes, Rusby, l. c. 116.—Bolivia.

STRUTHIOLA, Linn. (Thymel.).
tetralepis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 171.—Afr. austr.

STRYCHNOS, Linn. (Logan.).
acutissima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 200.—Afr. trop.
Beccarii, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 267.—Borneo.
blumenaviensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 36.—Bras.
brachyura, *Gilg, l. c.* xxviii. 119.—Afr. trop.
calophylla, *Gilg, l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 37.—Bras.
Carvalhoi, *Gilg, l. c.* xxviii. 123.—Afr. trop.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 540, 631.—Celebes.
chlorocarpa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 120.—Afr. trop.
chrysophylla, *Gilg, l. c.* 119.—Afr. trop.
ciliicalyx, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 304, nomen.—Afr. trop.
concinna, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 39.—Bras.
congolana, *Gilg, l. c.* xxviii. 120.—Afr. trop.
cordifolia, *Gilg, l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 38.—Bras.
dekindtiana, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 258.—Afr. trop.
Dewevrei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 119 (Dewewrei).—Afr. trop.
Dinklagei, *Gilg, l. c.* 121.—Afr. trop.
erythrocarpa, *Gilg, l. c.* xxiii. 199.—Afr. trop.
fulvotomentosa, *Gilg, l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 40.—Bras.
Gerrardi, *N. E. Brown, in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. austr.
Glaziovii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 36.—Bras.
Goetzei, *Gilg, l. c.* xxviii. 123.—Afr. trop.
heterodoxa, *Gilg, l. c.* 118.—Afr. trop.
Kerstingii, *Gilg & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 498.—N. Guin.
Kipapa, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 256; *et in Engl. Jahrb.* xxviii. 118.—Afr. trop.
melastomatoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 201.—Afr. trop.

STRYCHNOS:—
Niederleinii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 41.—Am. austr.
oblonga, *Gilg, l. c.* 37.—Bras.
oligoneura, *Gilg, l. c.* 41.—Bras.
pauciflora, *Gilg, l. c.* xxviii. 121.—Afr. austr.
petrophila, *Gilg, l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 39.—Bras.
pilgeriana, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 268.—Sumatra.
polytrichantha, *Gilg, l. c.* 267.—Borneo.
sansibariensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 124.—Afr. trop.
Scheffleri, *Gilg, ex Engl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
sellowiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Biebl.* lx. 41.—Bras.
Solerederi, *Gilg, l. c.* 40.—Guiana.
Staudtii, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 182.—Afr. trop.
urbaniana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 38.—Bras.
xylophylla, *Gilg, l. c.* xxviii. 122.—Afr. trop.

STRYPHNODENDRON, Mart. (Legum.).
goyazense, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 434.—Bras.

STUBENDORFFIA, Schrenk (Crucif.).
aptera, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 17.—As. cent.

STYLARTHROPUS, Baill. = **Whitfieldia**, Hook. (Acanth.).
Brazzei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 823 = W. Brazzei.
Laurentii, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 317 = W. Laurentii.
Stuhlmanni, Lindau, l. c. xx. 11 = W. Stuhlmanni.
Tholloni, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 823 = W. Brazzei.

STYLOCHITON, Lepr. (Arac.).
Zenkeri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 424.—Afr. trop.

STYLOSANTHES, Sw. (Legum.).
riparia, *Kearney, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 565.—Am. bor.

STYRAX, Tourn. (Styrac.).
hemsleyana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 530.—China.
Ramirezii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 568.—Am. cent.
shiraiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 50.—Japon.

SUAEDA, Forsk. (Chenopod.).
Maris-mortui, *Post, Fl. Syria*, 687.—Syria.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 570.—Patag.

SUCKLEYA, A. Gray (Chenopod.).
suckleyana, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 133 (= *Atriplex suckleyana*).—Am. bor.

SUTERA, Roth = **Chaenostoma**, Benth. (Scrophul.).
aurantiaca, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 757 = Lyperia multifida.
corymbosa, Hiern, l. c. = C. corymbosum.
fissifolia, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 467.—Afr. trop.
heucherifolia, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 757 = C. heucherifolium.
huillana, Hiern, l. c. = C. huillanum.

SWAINSONA, Salisb. (Legum.).
Cadelli, *F. Muell. in Moore & Betche, Handb. Fl. N. S. Wales*, 150; *et ex Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 643.—Austral.

SWERTIA, Linn. (Gentian.).
asarifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 311.—China.
calicina, *Franch. l. c.*—China.
crassiuscula, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 107.—Afr. trop.
decora, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 317.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 323.—China.
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.
filicaulis, *Gilg, l. c.* 109.—Afr. trop.
gentianoides, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 314.—China.
gracilis, *Franch. l. c.* 321 (non H. B. & K.).—China.

SWERTIA:—
kouitchensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 320.—China.
Leduci, *Franch. l. c.* 316.—China.
longipes, *Franch. l. c.* 319.—China.
membranifolia, *Franch. l. c.*—China.
minima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.
Mussoti, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 316.—China.
nummularifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 274.—Madag.
occidentalis, *Greene, Pittonia*, iv. 184.—Am. bor.
ovalifolia, *Greene, l. c.* 185.—Am. bor.
oxyphylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 473 (= *Ophelia oxyphylla*).—Java.
pleurogynoides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 158.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 109.—Afr. trop.
porphyrantha, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 159.—Afr. trop.
pubescens, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 313.—China.
scopulina, *Greene, Pittonia*, iv. 184.—Am. bor.
stricta, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 322 (non Coll. & Hemsl.).—China.
Tashiroi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1896, 57.—Japon.
umbellata, *Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 283 (= *Swertopsis umbellata*).—Japon.
Volkensii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.

SWERTOPSIS, Makino, Ill. Fl. Jap. t. 66 (1891). *GENTIANACEAE.*
umbellata, *Makino, l. c.*—Japon.

SWINTONIA, Griff. (Anacard.).
lurida, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 491.—Penins. Mal.
penangiana, *King, l. c.* 490.—Penins. Mal.

SYMBOLANTHUS, G. Don (Gentian.).
brittonianus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 342.—Bolivia.
Elisabethae, Gilg, l. c. 340 (= *Leiothamnus Elisabethae*).—Guiana.
latifolius, Gilg, l. c. 342.—Venez.
magnificus, Gilg, l. c. 343.—Am. austr.
pauciflorus, Gilg, l. c. 340.—Peruv.
pulcherrimus, Gilg, l. c. 344 = Lisianthus pulcherrimus, *Donn. Sm.*
rubroviolaceus, Gilg, l. c. 345.—Am. cent.
rusbyanus, Gilg, l. c. 344.—Bolivia.
Stuebelii, Gilg, l. c. 339, descr.—N. Granat.
tricolor, Gilg, l. c. 341.—Venez.

SYMPHIPAPPUS, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 462. *COMPOSITAE.*
dichotomus, *Klatt, l. c.*—Afr. austr.

SYMPHONIA, Linn. f. (Guttif.).
gabonensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1228.—Afr. trop.

SYMPHORICARPOS, Dill. (Caprifol.).
Parishii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 545.—Am. bor.
utahensis, *Rydb. l. c.* 544.—Am. bor.
vaccinioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 371.—Am. bor.

SYMPHOSTEMON, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 867 (1900) = **Plectranthus**, L'Hérit. (Labiat.).
insolitus, Hiern, l. c. = P. insolitus.

SYMPHYLLOPHYTON, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 283 (1897); et in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. (1898) 43. *GENTIANACEAE.*
caprifolioides, *Gilg, ll. cc.*—Bras.

SYMPHYOSTEMON, Miers (Irid.).
biflorus, Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. III. v. 203 = odoratissimus.
Lyckholmi, *Dusén, l. c.* 204.—Reg. Magell.
patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 574.—Patag.

SYMPHYTOSIPHON, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 307 (1896); et in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 165. *MELIACEAE.*
Hildebrandtii, *Harms, l. c.* 307; *l. c.* 166.—Madag.

SYMPHYTUM, Tourn. (Borag.).
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 501 = officinale.
minus, Bub. l. c. 502 = tuberosum.
sicyosmum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 150. —Graecia.

SYMPLECTOCHILUS, Lindau (Acanth.).
madagascariensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 39.—Madag.

SYMPLOCOS, Jacq. (Styrac.).
alata, *Brand, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 529.—China.
anomala, *Brand, l. c.*—China.
Brandisii, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 157.—Java.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 641. —Celebes.
Englishii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 105.—N. Guin.
Nageli, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 159.—Java.
orbicularis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 105.—N. Guin.
racemosa, Grah. Cat. Bomb. Pl. 104 = Beddomei.
reticulata, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582, errore = *racemosa*, Grah.
setchuensis, *Brand, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 528.—China.
stellaris, *Brand, l. c.*—China.

SYNADENIUM, Boiss. (Euphorb.).
Volkensii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 536.—Afr. trop.

SYNCOLOSTEMON, E. Mey. (Labiat.).
lanceolatus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 77.—Afr. austr.
macrophyllus, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 555.—Afr. austr.

SYNDYOPHYLLUM, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 403 (1900). *EUPHORBIACEAE.*
excelsum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 404.—N. Guin.
trinervium, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 405.—N. Guin.

SYNEDRELLOPSIS, Hieron. & Kuntze, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 180 (1898). *COMPOSITAE.*
Grisebachii, *Hieron. & Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.

SYNGONANTHUS, Ruhl. in Urb. Symb. Antill. i. 487 (1900). *ERIOCAULACEAE.*
androsaceus, *Ruhl. l. c.* 488 (= *Paepalanthus androsaceus*).—Ind. occ.
lagopodioides, *Ruhl. l. c.* 489 (= *Paepalanthus lagopodioides*).—Ind. occ.
Schlechteri, *Ruhl. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 272, nomen.—Afr. trop.
umbellatus, *Ruhl. in Urb. Symb. Antill.* i. 488 (= *Paepalanthus umbellatus*).—Ind. occ.; Am. austr.

SYNNEMA, Benth. (Acanth.).
brevitubum, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 30.—Afr. trop.

SYNTHERISMA, Walt. = **Digitaria**, Heist. (Gramin.).
Bakeri, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 296.—Am. bor.
barbatum, Nash, l. c. 303 = D. barbata.
ciliare, Schrad. Fl. Germ. 160 = D. sanguinalis.
fimbriatum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 302 = D. sanguinalis.
glabrum, Schrad. Fl. Germ. 163 = D. glabra.
gracillimum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 295 (= *Panicum gracillimum*, Scribn.).—Am. bor.
Helleri, Nash, in Minnes. Bot. Studies, i. 798.—Ins. Sandw.
humifusum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 469 = D. glabra.
leucocomum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 295.—Am. bor.
setosum, Nash, l. c. 300 = D. horizontalis.
Simpsoni, Nash, l. c. 297 = D. sanguinalis.
vulgare, Schrad. Fl. Germ. 161 = D. sanguinalis.

SYNTHYRIS, Benth. (Scrophul.).
laciniata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 353.—Am. bor.
reflexa, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 124.—Am. bor.
ritteriana, *Eastw. l. c.* 123.—Am. bor.

SYNTRIANDRUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 412. *MENISPERMACEAE.*
Dinklagei, *Engl. l. c.* 413.—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.* 412.—Afr. trop.

SYRINGA, Linn. (Oleac.).
japonica, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. II. ii. 44 = amurensis.
microphylla, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 531.—China.

SYRINGODEA, Hook. f. (Irid.).
longituba, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 309 = bicolor.
luteo-nigra, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 281.—Afr. austr.

SYZYGIUM, Gaertn. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).
ellipticum, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 476 (non Wall.).—N. Guin.
floribundum, K. Schum. & Lauterb. l. c. (non F. Muell.).—N. Guin.

T

TABEBUIA, Gomez (Bignon.).
lepidophylla, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, vii. 451 (= *Tecoma lepidophylla*, Griseb.). —Ind. occ.
longiflora, *Greenm. l. c.* (= *Tecoma longiflora*).—Ind. occ.
petrophila, *Greenm. l. c.*—Ind. occ.
rigida, *Urb. Symb. Antill.* i. 404.—Ind. occ.
schumanniana, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
sessilifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 156.—Am. cent.

TABERNAEMONTANA, Plum. (Apocyn.).
Alfari, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 396.—Am. cent.
brachypoda, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 223.—Afr. trop.
diclinis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 503.—N. Guin.
erythrophthalma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 224. —Afr. trop.
longipes, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 397.—Am. cent.
monopodialis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 225. —Afr. trop.
penduliflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Smithii, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 305.—Afr. trop.
Thonneri, *Th. Dur. & Wildem. ex Stapf, l. c.* 306.—Afr. trop.
utilis, Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. viii. (1830) 319 = Zschokkea utilis.

TABERNANTHE, Baill. (Apocyn.).
albiflora, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 305.—Afr. trop.
tenuiflora, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.

TACCA, Forst. (Taccac.).
abyssinica, Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 413 = pinnatifida.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 641.—Celebes.
involucrata, Schum. & Thonn. Beskr. Pl. Guin. 177 = pinnatifida.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 641.—Celebes.
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 595.—Ins. Samoa.
viridis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2515-6.—Siam.

TACHIADENUS, Griseb. (Gentian.).
elatus, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2554.—Madag.
parviflorus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 274.—Madag.

TAENIDIA, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 195 (1898). *UMBELLIFERAE.*
integerrima, *Drude, l. c.* (= *Pimpinella integerrima*). —Am. bor.

TAENIOCHLAENA, Hook. f. (Connar.).
birmanica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 285. —Burma.

TAENIOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
aphyllum, *Makino, Phan. Pter. Japon. Ic.* i. t. 11 (= *Sarchochilus aphyllus*).—Japon.
calcaratum, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Ins. Molucc.
celebicum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 131.—Celebes.
crepidiforme, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 245 (= *Sarcochilus crepidiformis*).—Reg. Himal.

TAENIOPHYLLUM:—
filiforme, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Celebes.
retrospiculatum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 244 (= *Sarcochilus retrospiculatus*).—As. trop.
rubrum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 364.—Penins. Mal.

TAFALLA, Ruiz & Pav. = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).
maxima, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 275.—Bolivia.

TAGETES, Linn. (Compos.).
Belenidium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 181 = Hymenatherum tenuifolium.
maxima, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
triradiata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 310. —Mexic.

TAINIA, Blume (Orchid.).
atropurpurea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 315. —Penins. Mal.
hongkongensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 195.—China.
hookeriana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 336.—Reg. Himal.

TAINIONEMA, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 263 (1899). *ASCLEPIADACEAE.*
occidentale, *Schlechter, l. c.* 264 (= *Secamone occidentalis*).—Ind. occ.

TALAUMA, Juss. (Magnol.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 632.—Celebes.

TALINUM, Adans. (Portul.).
Greenmanii, *Harshb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 183.—Mexic.
portulacifolium, Aschers. ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 172 = cuneifolium.
rugospermum, *Holz. in Asa Gray Bull.* vii. 115.—Am. bor.

TALISIA, Aubl. (Sapind.).
bullata, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 556.—Ecuador.
erecta, *Radlk. l. c.* 550.—N. Granat. ?
intermedia, *Radlk. l. c.* 536.—Bras. et Venez.
japurensis, *Radlk. l. c.* 560 (= *Guarea japurensis*).—Bras.
setigera, *Radlk. l. c.* 551.—Ecuador.

TAMARIX, Linn. (Tamarisc.).
montana, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 142. —Turkestan.

TANACETUM, Tourn. (Compos.).
simplex, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 484.—Am. bor.

TANAECIUM, Sw. (Bignon.).
cyrtanthum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 186 = brasiliense.
nocturnum, *Bureau & K. Schum. l. c.* (= *Osmhydrophora nocturna*).—Bras.
ovatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 187 (= *Spathodea ovata*).—Guiana.

TAPEINOCHEILOS, Miq. (Scitam.).
Beccarii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 348.—N. Guin.
Dahlii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 101.—N. Brit.
densus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 349; *et in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 235.—N. Guin.
globiceps, *K. Schum. l. c.* 349; *l. c.* 234.—N. Guin.
Lauterbachii, *K. Schum. l. c.* 348; *l. c.* 233.—N. Guin.
recurvatus, *K. Schum. l. c.* 349; *l. c.* 235.—N. Guin.
spectabilis, *K. Schum. l. c.* 348.—N. Guin.

TAPIRIRA, Aubl. (Anacard.).
Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 22.—Bolivia.

TARAXACUM, Linn. (Compos.).
eriophorum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 454. —Am. bor.

TARAXACUM:—
gracile, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 158.—Eur.
lividum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 480.—Am. bor.
salinum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 201 = officinale.
scopulorum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 455.—Am. bor.
tenuisectum, *Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 294.—Reg. Caucas.

TARAXIA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Amer. i. 506 (1840) = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
breviflora, Nutt. l. c. = O. breviflora.
heterantha, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 185 = O. heterantha.
longiflora, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Amer. i. 506 = O. Nuttallii.
ovata, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 185 = O. ovata.
Palmeri, Small, l. c. 184 = O. Palmeri.

TARDAVEL, Adans. = **Spermacoce**, Dill. (Rubiac.).
andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 506.—Afr. trop.
aprica, Hiern, l. c. 505.—Afr. trop.
arvensis, Hiern, l. c. 504.—Afr. trop.
dibrachiata, Hiern, l. c. 507 = S. dibrachiata.
huillensis, Hiern, l. c. 503.—Afr. trop.
lancea, Hiern, l. c. 506.—Afr. trop.
ocymoides, Hiern, l. c. 504 = S. ocymoides.
scabra, Hiern, l. c. = S. Ruelliae.
stricta, Hiern, l. c. 503 = S. stricta.
thymoidea, Hiern, l. c. 507.—Afr. trop.
verticillata, Hiern, l. c. 508 = S. verticillata.

TARENNA, Gaertn. (Rubiac.).
platyptera, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 319, nomen.—Afr. trop.
sambucina, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 561 (= *Stylocoryna sambucina*).—Ins. Pacif.

TASHIROEA, Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii. (1899) 489. *MELASTOMACEAE.*
okinawensis, *Matsum. l. c.* 490.—Ins. Luchu.
yoeyamensis, *Matsum. l. c.* 489.—Ins. Luchu.

TASSADIA, Decne. (Asclep.).
pilosula, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 726.—Ecuador.
Sprucei, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 498 (non Fourn.).—Bras.

TAUSCHIA, Schlecht. (Umbell.).
filiformis, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* 137 (= *Arracacia filiformis*).—Mexic.
humilis, *Coult. & Rose, l. c.* 138.—Mexic.
linearifolia, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
madrensis, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
Seatoni, *Coult. & Rose, l. c.* 136 (= *Arracacia nudicaulis*).—Am. bor.
vaginata, *Coult. & Rose, l. c.* 137 (= *Arracacia vaginata*).—Mexic.

TAXOTROPHIS, Blume (Urtic.).
macrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 359 (= *Diplocos macrophylla*).—Java.

TECLEA, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
Afzelii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 153.—Afr. trop.
Bachmannii, Engl. l. c.—Afr. trop.
grandifolia, Engl. l. c.—Afr. trop.
suaveolens, Engl. l. c. 152.—Afr. trop.

TECOMA, Juss. (Bignon.).
adenophylla, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 412.—Bras.
argentea, *Bureau & K. Schum. l. c.* 332.—Parag.
atractocarpa, *Bureau & K. Schum. l. c.* 326.—Bras.
Bernoullii, *K. Schum. & Loesen. in Engl. Jahrb.* xxiii. 131.—Am. cent.
Billbergii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 319.—Bras.
capitata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 337.—Bras.
Catinga, *Bureau & K. Schum. l. c.*—Bras.
dentata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 323.—Bras.
Ipe, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 55, nomen = Tabebuia Avellanedae.

TECOMA:—
longiflora, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 324 (non aliorum).—Bras.
nyikensis, Baker, in Kew Bull. 1898, 159 = shirensis.
odontodiscus, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 320.—Bras.
papyrophloios, *Bureau & K. Schum. l. c.* 411.—Bras.
pedicellata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 336.—Bras.
Whytei, C. H. Wright, in Kew Bull. 1897, 275 = shirensis.
Ype, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 245, sphalm. = T. Ipe, *Mart.*

TECOMANTHE, Baill. (Bignon.).
dendrophila, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 539 (= *Tecoma dendrophila*).—N. Guin.

TECOMARIA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
schirensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C. 363 = Tecoma shirensis.

TEINOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
Dullooa, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 101.—Ind. or.
Helferi, *Gamble, l. c.* 102.—Burma.
maculatum, Trim. in Journ. Bot. 1885, 273 = Ochlandra stridula.
schizostachyoides, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. 89 = Bambusa schizostachyoides.

TELANTHERA, R. Br. (Amarant.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 110.—Bolivia.
dolichocephala, *Urb. Symb. Antill.* i. 302.—Ind. occ.
flavogrisea, *Urb. l. c.* 300.—Ind. occ.
mollis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 324.—Mexic.
olivacea, *Urb. Symb. Antill.* i. 303.—Ind. occ.
Sintenisii, *Urb. l. c.* 301.—Ind. occ.

TELLIMA, R. Br. (Saxifr.).
odorata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 199.—Am. bor.

TELOPHYLLUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 558. *SANTALACEAE.*
quadriflorum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron quadriflorum*).—Reg. Magell.

TEMMINCKIA, De Vriese = **Scaevola**, Linn. (Gooden.).
microcarpa, Nad. in Journ. de Bot. 1899, 1.—Ins. Societ.
tahitensis, Nad. l. c. 1897, 107.—Ins. Societ.

TEMNOCYDIA, Mart. = **Bignonia**, Tourn. (Bignon.).
lenta, Mart. ex DC. Prod. ix. 159 = B. lenta.

TENORIA, Spreng. = **Bupleurum**, Tourn. (Umbell.).
caricifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 363 = B. ranunculoides.
divaricata, Bub. l. c. 359 = B. odontites.
falcata, Bub. l. c. 365 = B. falcatum.
glauca, Bub. l. c. 359 = B. glaucum.
juncea, Bub. l. c. 366 = B. junceum.
protracta, Bub. l. c. 360 = B. protractum.
rigida, Bub. l. c. 366 = B. rigidum.
rotundifolia, Bub. l. c. 360 = B. rotundifolium.
tenuis, Bub. l. c. 358 = B. tenuissimum.

TEPHROSIA, Pers. (Legum.).
argyrotricha, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 57.—Afr. trop.
aurantiaca, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Bachmannii, *Harms, l. c.* xxvi. 286.—Afr. trop.
brachystachya, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 353 (non aliorum).—N. Guin.
Carvalhi, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 183.—Afr. trop.
cephalophora, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 403.—Afr. trop.
decorticans, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 184.—Afr. trop.
dissitiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.
encoptosperma, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 246.—Afr. trop.
Harmsii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 101.—Afr. trop.
megalantha, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 57.—Afr. trop.
melanocalyx, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 258 (non Welw.).—Afr. trop.

TEPHROSIA:—
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.
oncotosperma, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 396, errore = encoptosperma.
periculosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 258.—Afr. trop.
Preussii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 182.—Afr. trop.
Rivaei, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 92.—Afr. trop.
Rugelii, *Shuttlew. ex Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 197.—Am. bor.
sambesiaca, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 183.—Afr. trop.
schizocalyx, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
Smallii, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 198.—Am. bor.
triphylla, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 57.—Afr. austr.
ustulata, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 93.—Afr. trop.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.

TEPHROTHAMNUS, Sweet = **Argyrolobium**, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
aequinoctialis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 204 = A. aequinoctiale.
angustifolius, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 72 = A. angustifolium.
speciosus, Kuntze, l. c. = A. speciosum.

TERMINALIA, Linn. (Combret.).
adamanensis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 11.—Afr. trop.
argyrophylla, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 291.—Ind. or.
Balansaei, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 346.—Parag.
Baumannii, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 14.—Afr. trop.
benguellensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 339.—Afr. trop.
bispinosa, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis*, 207.—Afr. trop.
brachystemma, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 340.—Afr. trop.
brosigiana, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 191.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 123.—Afr. trop.
dolichocarpa, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 35.—Afr. trop.
Elliotii, *Engl. & Diels, l. c.* 12.—Afr. trop.
hypargyrea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 467.—N. Guin.
Kelleri, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 24.—Afr. trop.
laxiflora, *Engl. l. c.* 12.—Afr. trop.
Lecardii, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 15.—Afr. trop.
Manii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 329.—Penins. Mal.
orbicularis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 26.—Afr. trop.
Passargei, *Engl. l. c.* 16.—Afr. trop.
phanerophlebia, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 19.—Afr. austr.
phellocarpa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 330.—Penins. Mal.
polycarpa, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 24.—Afr. trop.
praecox, *Engl. & Diels, l. c.* 27.—Afr. trop.
Randii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 435.—Afr. trop.
riparia, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 35.—Afr. trop.
Ruspolii, *Engl. & Diels, l. c.* 26.—Afr. trop.
Sambesiaca, *Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. trop.
schimperiana, *Hochst. ex Engl. & Diels, l. c.* 14.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Diels, l. c.* 12.—Afr. trop.
somalensis, *Engl. & Diels, l. c.* 24.—Afr. trop.
splendida, *Engl. & Diels, l. c.* 16.—Afr. trop.
stenostachya, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
subspathulata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 332.—Penins. Mal.
superba, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 26.—Afr. trop.
supitiana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
Thomasii, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 18.—Afr. trop.

TERMINALIA:—
togoensis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 13.—Afr. trop.
trinervia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 466.—N. Guin.
triptera, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 291 (non Stapf).—China.

TERNATEA, Tourn. = **Clitoria**, Linn. (Legum.).
Ternatea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 72 = C. Ternatea.

TERNSTROEMIA, Mutis (Ternstroem.).
apleura, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 523.—Ind. occ.
granulata, *Krug & Urb. l. c.* 534.—Ind. occ.
Hartii, *Krug & Urb. l. c.* 532.—Ind. occ.
heptasepala, *Krug & Urb. l. c.* 530.—Ind. occ.
Lehmannii, *Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. 42.—Hab.?
luquillensis, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 531.—Ind. occ.
Maltbya, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 78.—Mexic.
microcalyx, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 531.—Ind. occ.
oligostemon, *Krug & Urb. l. c.* 534.—Ind. occ.
pachyphylla, *Krug & Urb. l. c.* 529.—Ind. occ.
parviflora, *Krug & Urb. l. c.* 523.—Ind. occ.
rostrata, *Krug & Urb. l. c.* 533.—Ind. occ.
Stahlii, *Krug & Urb. l. c.* 527.—Ind. occ.

TERNSTROEMIOPSIS, Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiv. (1896) 49. *TERNSTROEMIACEAE.*
sandwicensis, *Urb. l. c.* (= *Eurya sandwichensis*).—Ins. Sandw.

TESSENIA, Bub. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 264 = E. alpinus.
canadensis, Bub. l. c. 267 = E. canadensis.
glabrata, Bub. l. c. 265 = E. glabratus.
linifolia, Bub. l. c. 266 = E. linifolius.
vulgaris, Bub. l. c. = E. acris.

TESTUDINARIA, Salisb. (Dioscor.).
montana, Burch. Trav. ii. 148 = T. Elephantipes.

TETRACARPIDIUM, Pax, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 329. *EUPHORBIACEAE.*
Staudtii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

TETRACERA, Linn. (Dillen.).
calophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 24.—Bras.
fragrans, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. I. 55.—Afr. trop.
hebecarpa, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 3 (= *Delima hebecarpa*).—Java.
hirsuta, *Boerl. l. c.* (= *Delima hirsuta*).—Java.
Marquesii, *Gilg, in Bol. Soc. Broter.* xvi. 60.—Afr. trop.
masuiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. I. 61.—Afr. trop.
obovata, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 3 (non aliorum).—Hort.
subcordata, *Boerl. l. c.* 4.—Hort.

TETRACHNE, Nees (Gramin.).
aristulata, Hack. & Rendle, in Journ. Bot. 1891, 72 = Entoplocamia aristulata.

TETRACMIDION, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. (1898) 421. *CRUCIFERAE.*
bucharicum, *Korsh. l. c.*—Turkestan.

TETRADYMIA, DC. (Compos.).
filifolia, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 123.—Am. bor.
multicaulis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 482.—Am. bor.

TETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. = **Halenia**, Borkh. (Gentian.).
Rothrockii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = H. Rothrockii.

TETRAGONIA, Linn. (Ficoid.).
Kuntzei, *J. Buchw. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 110.—Chili.
macrostylis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 124.—Afr. austr.
namaquensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
rosea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
virgata, *Schlechter, l. c.* 125.—Afr. austr.

TETRAITH, Bub. Fl. Pyren. i. 436 (1897) = seq.

TETRAHIT, Adans. = **Galeopsis**, Linn. (Labiat.).
pyrenaeum, Bub. Fl. Pyren. i. 438 = G. pyrenaica.
vulgare, Bub. l. c. 437 = G. Ladanum.

TETRAMERIUM, Nees (Acanth.).
costatum, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 320 (= *Henrya costata*).—Mexic.

TETRAMICRA, Lindl. (Orchid.).
Eulophiae, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 439.—Cuba.
parviflora, *Lindl. in Walp. l. c.*—Jamaic.

TETRANEURIS, Greene, Pittonia, iii (1898) 265. *COMPOSITAE.*
acaulis, *Greene, l. c.* (= *Actinella acaulis*).—Am. bor.
angustata, *Greene, l. c.* 267.—Mexic.
argentea, *Greene, l. c.* 269 (= *Actinella argentea*).—Am. bor.
arizonica, *Greene, l. c.* 266.—Am. bor.
brevifolia, *Greene, l. c.*—Am. bor.
depressa, *Greene, l. c.* (= *Actinella depressa*).—Am. bor.
fastigiata, *Greene, l. c.* 268.—Am. bor.
glabra, *Greene, l. c.* (= *Actinella glabra*).—Am. bor.
herbacea, *Greene, l. c.*—Am. bor.
incana, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 128.—Am. bor.
ivesiana, *Greene, Pittonia,* iii. 269.—Am. bor.
lanata, *Greene, l. c.* 265 (= *Actinella lanata*).—Am. bor.
leptoclada, *Greene, l. c.* 269 (= *Actinella leptoclada*).—Am. bor.
linearifolia, *Greene, l. c.* (= *Actinella linearifolia*).—Am. bor.
linearis, *Greene, l. c.* 267.—Am. bor.
mancosensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 129.—Am. bor.
oblongifolia, *Greene, Pittonia,* iii. 269.—Am. bor.
scaposa, *Greene, l. c.* 266 (= *Actinella scaposa*).—Am. bor.
simplex, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 127.—Am. bor.
torreyana, *Greene, Pittonia,* iii. 265 (= *Actinella torreyana*).—Am. bor.
trinervata, *Greene, l. c.* 267.—Am. bor.

TETRAPHIS, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1899) 396, errore = **Triraphis**, R. Br. (Gramin.).

TETRAPHYLE, Eckl. & Zeyh. = **Crassula**, Dill. (Crassul.).
quadrangula, Eckl. & Zeyh. Enum. 293 = C. pyramidalis.

TETRAPHYLLASTER, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 266 (1897). *MELASTOMACEAE.*
rosaceum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

TETRAPHYLLUM, Griff. (Gesner.).
roseum, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 524.—Siam.

TETRAPOGON, Desf. (Gramin.).
flabellatus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 810.—Afr. trop.
tetrastachys, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 292 = Chloris montana.
triangularis, Hochst. ex Hook. f. l. c. 291 = Chloris tenella.
villosus, Desf. Fl. Atlant. ii. 389 = Chloris villosa.

TETRAPTERIS, Cav. (Malpigh.).
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.

TETRARIA, Beauv. (Cyper.).
brevicaulis, C. B. Clarke, in Durand & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 659 = Costularia brevicaulis.
ferruginea, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 759.—Afr. austr.
lucida, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.

TETRASTIGMA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 444. *RUBIACEAE.*
hemsleyanum, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 463.—China.
magnificum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 445.—Afr. trop.

TETRASYNANDRA, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 568. *MONIMIACEAE.*
laxiflora, *Perkins, l. c.* (= *Kibara laxiflora*).—Austral.
longipes, *Perkins, l. c.* (= *Kibara longipes*).—Austral.
pubescens, *Perkins, l. c.* (= *Kibara pubescens*).—Austral.

TEUCRIUM, Tourn. (Labiat.).
affine, *Brandegee, in Erythea,* vii. 6.—Mexic.
Andrusi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 758.—As. Min.
chamaedryoides, Bub. Fl. Pyren. i. 464 = Botrys.
cypricum, Post, in Bull. Herb. Boiss. v. 759 = cyprium.
degenianum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 147.—Eur. or.
depressum, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 288.—Am. bor.
franchetianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 551 (non Rouy & Coincy).—China.
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 465 = flavum.
Picardae, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 396.—Ind. occ.

THALESIA, Rafin. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).
purpurea, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 313.—Am. bor.

THALICTRUM, Tourn. (Ranunc.).
akanense, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1069.—Japon.
campestre, *Greene, in Erythea,* iv. 123.—Am. bor.
caulophylloides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 136.—Am. bor.
confine, *Fernald, in Rhodora,* ii. 232.—Am. bor.
cuernavacanum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 187.—Mexic.
Francheti, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1069.—Japon.
grandiflorum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188 (non Maxim.).—Mexic.
grandifolium, Rose, l. c. 143 = grandiflorum, *Rose.*
guatemalense, *C. DC. & Rose, ex Rose, l. c.* 188.—Am. cent.
jaliscanum, *Rose, l. c.* 187.—Mexic.
kamisense, *Franch. ex Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 584.—Japon.
madrense, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188.—Mexic.
mirabile, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 277.—Am. bor.
nipponense, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1068.—Japon.
pachucense, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188.—Mexic.
papillosum, *Rose, l. c.* 189.—Mexic.
tenerum, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1068.—Japon.
trautvetterianum, *Regel, ex Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 48.—Turkestan.

THAMNOCALAMUS, Munro = **Arundinaria**, Michx. (Gramin.).
Falconeri, Hook. f. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 34 = A. Falconeri.

THAMNOCHORDUS, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 330 = seq.

THAMNOCHORTUS, Berg. (Restiac.).
Bachmanni, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 13; *et ex Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 11.—Afr. austr.
canescens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 12.—Afr. austr.
dumosus, *Mast. l. c.* 11.—Afr. austr.
giganteus, Kunth, Enum. Pl. iii. 435 = Restio giganteus.
maximus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 330.—Afr. austr.
membranaceus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 11.—Afr. austr.
occultus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 130.—Afr. austr.
paniculatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 12.—Afr. austr.
pluristachyus, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
sulcatus, *Mast. l. c.* 11.—Afr. austr.

THASPIUM, Nutt. (Umbell.)
commutatum, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1899) 396, errore = Thlaspi commutatum.

THEA, Linn. = **Camellia**, Linn. (Ternstroem.).
celebica, Warb. ex Kochs, in Engl. Jahrb. xxvii. 589.—Celebes.
cuspidata, Kochs, l. c. 586.—China.
iniquicarpa, C. B. Clarke, ex Kochs, l. c. 590.—Ind. or.
lasiostyla, Warb. ex Kochs, l. c. 582.—Celebes.
punctata, Kochs, l. c. 584.—China.
speciosa, Kochs, l. c. 597.—China.
spectabilis, Kochs, l. c. 595 = C. reticulata.

THECACORIS, A. Juss. (Euphorb.).
gymnogyne, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 20.—Afr. trop.

THECOSTELE, Reichb. f. (Orchid.).
secunda, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 299.—Malaya.

THELASIS, Blume (Orchid.).
hongkongensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 199.—Hongkong.
macrobulbon, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 393.—Penins. Mal.
platychila, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 249.—N. Guin.
samoensis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxv. 607.—Ins. Samoa.

THELEPODIUM, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 126 = **Thelypodium**, Endl. (Crucif.).

THELEPOGON, Roth (Gramin.).
sanguineus, Spreng. Syst. i. 299 = Andropogon hirtiflorus.

THELESPERMA, Less. (Compos.).
intermedium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 631.—Am. bor.
marginatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 421.—Am. bor.
tenue, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 631.—Am. bor.

THELYPODIUM, Endl. (Crucif.).
amplifolium, *Greene, in Erythea*, iv. 173.—Am. bor.
anisopetalum, *Greene, Pittonia*, iii. 247.—Mexic.
crenatum, *Greene, l. c.* iv. 20.—Am. bor.
paniculatum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 126.—Am. bor.
sagittatum, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 265 = Nuttallii.
simplex, *Greene, Pittonia*, iv. 200.—Am. bor.
torulosum, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 265 = sagittatum, *Endl.*

THEMEDA, Forsk. = **Anthistiria**, Linn. f. (Gramin.).
triandra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = A. imberbis.

THEOBROMA, Linn. (Stercul.).
Kalagua, *Wildem. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 957.—N. Granat.
simiarum, *Donn. Sm. in Pittier, Prim. Fl. Costaric.* ii. 52; *et in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 145.—Am. cent.

THERMOPSIS, R. Br. (Legum.).
annulocarpa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 239.—Am. bor.
arenosa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 276.—Am. bor.
divaricarpa, *A. Nelson, l. c.* 275.—Am. bor.
pinetorum, *Greene, Pittonia*, iv. 138.—Am. bor.

THEROFON, Rafin. = **Boykinia**, Nutt. (Saxifr.).
heucheraeforme, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 247.—Am. bor.
Jamesii, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 70 (= *Saxifraga Jamesii*).—Am. bor.
Purpusi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. Ed. II. 5 = B. Purpusi.
rotundifolium, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 70 = B. rotundifolia.

THESIUM, Linn. (Santal.).
abietinum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 282.—Afr. austr.
affine, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 115.—Afr. austr.
andongense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 937.—Afr. trop.
aristatum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 116.—Afr. austr.
bathyschistum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

THESIUM:—
brachygyne, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 117.—Afr. austr.
brachystegium, *Post, Fl. Syria*, 714.—Syria.
conostylum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 117.—Afr. austr.
dissitiflorum, *Schlechter, l. c.* 118.—Afr. austr.
equisetoides, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 937.—Afr. trop.
fallax, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 118.—Afr. austr.
foveolatum, *Schlechter, l. c.* 119.—Afr. austr.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 222.—Afr. austr.
hispidum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 452.—Afr. austr.
longirostre, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 345.—Afr. austr.
lopollense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 937.—Afr. trop.
Maximiliani, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 119.—Afr. austr.
namaquense, *Schlechter, l. c.* 120.—Afr. austr.
polyanthum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 27.—Afr. austr.
polycephalum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* 120.—Afr. austr.
pycnanthum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
rectangulum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 936.—Afr. trop.
schumannianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 452.—Afr. austr.
sonderianum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 376.—Afr. austr.
strigulosum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 936 (non A. DC.).—Afr. trop.
transvaalense, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 432.—Afr. austr.
ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 385, descr.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 938.—Afr. trop.

THESPESIA, Soland. (Malvac.).
Debeerstii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 6.—Afr. trop.
trilobata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 52.—Afr. trop.

THESPESOCARPUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1258. *MYRISTICACEAE.*
tiliaceus, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

THEVETIA, Linn. (Apocyn.).
spathulata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 383.—Mexic.
Thevetia, Millsp. l. c. ii. 83 = neriifolia.

THIBAUDIA, Ruiz & Pav. (Vaccin.).
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 376.—Ind. occ.
viridiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 385 (= *Chupalon viridiflorum*).—Bolivia.

THLADIANTHA, Bunge (Cucurb.).
glabra, *Cogn. ex Oliver, in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2223, nomen.—China.
maculata, *Cogn. l. c.*—China.
Oliveri, *Cogn. l. c.*—China.
verrucosa, *Cogn. l. c.*—China.

THLADIANTHOPSIS, Cogn. ex Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 2223 (1892) = **Thladiantha**, Bunge (Cucurb.).

THLASPI, Tourn. (Crucif.).
chionophilum, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 48.—Reg. Argent.
commutatum, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 69 (non Rochel).—Chili.
epirotum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 109.—Graecia.
glaucum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 275.—Am. bor.
Huteri, *Kerner, in Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 39.—Eur.
japonicum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 797.—Japon.
parviflorum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 265.—Am. bor.
subapterum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 583 = alpestre.

THOMANDERSIA, Baill. (Acanth.).
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 107.—Afr. trop.
Hensii, Wildem. & Th. Dur. l. c. 108 = laurifolia.

THONNINGIA, Vahl (Balanoph.).
sessilis, *Lecomte, in Journ. de Bot.* 1896, 234.—Afr. trop.

THOUINIA, Poit. (Sapind.).
paucidentata, *Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 403.—Mexic.

THRINAX, Linn. f. (Palm.).
acuminata, *Griseb. & Wendl. ex Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 89 (= *Coccothrinax* sp.).—Ind. occ.
floridana, *Sargent, l. c.* 84.—Am. bor.
keyensis, *Sargent, l. c.* 86.—Am. bor.
microcarpa, *Sargent, in Gard. & For.* ix. 162.—Am. bor.

THRIXSPERMUM, Lour. = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).
borneense, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 299 = S. borneensis.
leucorachne, Ridley, l. c. xxxii. 397.—Penins. Mal.
longicauda, Ridley, l. c. xxxi. 299.—Borneo.
subteres, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 5.—Ins. Amboin.

THRYPTOMENE, Endl. (Myrtac.).
Helmsii, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 356.—Austral.

THUNBERGIA, Retz. (Acanth.).
Bauri, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 312.—Afr. austr.
crispa, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 12.—Afr. trop.
Delamerei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 205.—Afr. trop.
elegans, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 27.—Hort.
flavohirta, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 311.—Afr. austr.
Galpini, *Lindau, l. c.* 310.—Afr. austr.
gigantea, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 68.—Afr. trop.
Hanningtonii, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 19.—Afr. trop.
hookeriana, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xvii. *Beibl.* xli. 38.—Afr. trop.
Kirkii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6677 = hookeriana.
laborans, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 507.—Afr. trop.
lamellata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 803.—Afr. trop.
lathyroides, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 24.—Afr. trop.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 132.—Afr. trop.
longisepala, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 129.—Afr. trop.
mellinocaulis, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 23.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 201.—Afr. trop.
reticulata, Nees, in DC. Prod. xi. 58 = alata.
Ruspolii, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 67.—Afr. trop.
sericea, *Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 14.—Afr. trop.
stellarioides, *Burkill, l. c.* 26.—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 41.—Afr. trop.
xanthotricha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 311.—Afr. austr.

THUNBERGIANTHUS, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 509. *SCROPHULARIACEAE.*
Quintasii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

THUNBERGIOPSIS, Engl. l. c. t. 11, errore = praec.

THUSPEINANTA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 703. *LABIATAE.*
brahuica, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 229 (= *Tapeinanthus brahuicus*).—Persia.
persica, *Briq. l. c.* (= *Tapeinanthus persicus*).—Persia.

THUYA, Linn. (Conif.).
sutchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 262.—China.

THYMELAEA, Tourn. ex Adans. = **Daphne**, Tourn. (Thymel.).
odorata, Bub. Fl. Pyren. i. 134 = D. Cneorum.

THYMELAEA, Tourn. ex Scop. (Thymel.).
sempervirens, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. No. 3 (1899) 14.—Afr. bor.

THYMUS, Tourn. (Labiat.).
agoustensis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 182.—Eur.
alsinoides, *Form. l. c.* 184.—Eur.
camaresiensis, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 508.—Gallia.
candidissimus, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 287.—Alger.
carnosulus, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 240.—Bulgar.
Clusii, Bub. Fl. Pyren. i. 399 = T. Zygis.
dolopicus, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 75.—Graecia.
pindicola, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 319.—Eur.
remotiflorus, *Form. l. c.* xxxvii. 183.—Eur.
Stribrnyi, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 237.—Bulgar.

THYRSANTHEMA, Neck. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).
ebracteata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 182.—Bolivia.

THYRSOSTACHYS, Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. (1897) 58. *GRAMINEAE.*
Oliveri, *Gamble, l. c.*—Ind. or.
siamensis, *Gamble, l. c.* 59.—Ind. or.

THYSANACHNE, Presl = **Arundinella**, Raddi (Gramin.).
scoparia, Presl, Thysan. Nov. Pl. Gen. 1829; Rel. Haenk. i. 253 = A. brasiliensis.

THYSANOCARPUS, Hook. (Crucif.).
amplectens, *Greene, Pittonia*, iii. 87.—Am. bor.
emarginatus, *Greene, l. c.* 86.—Am. bor.
filipes, *Greene, l. c.* iv. 200.—Am. bor.
hirtellus, *Greene, l. c.* iii. 86.—Calif.

TIBOUCHINA, Aubl. (Melast.).
crassiramis, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 446.—Bras.
membranifolia, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 17.—Bolivia.
tetrapetala, *Cogn. l. c.* 276.—Bolivia.

TILIA, Tourn. (Tiliac.).
baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 468.—China.
goniocarpa, *Borb. in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 24.—Eur.
kiusiana, *Makino & Shiras. ex Shiras. in Bull. Coll. Agric. Tokyo*, iv. 155.—Japon.
maximowicziana, *Shiras. l. c.* 158.—Japon.
perneckensis, *Stohl, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 25.—Eur.
rubescens, *H. Braun, in Kerner, l. c.* 27.—Eur.
Stohlii, *Stohl, in Kerner, l. c.* 26.—Eur.

TILIACORA, Colebr. (Menisperm.).
Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 402.—Afr. trop.
Lehmbachii, *Engl. l. c.* 401.—Afr. trop.
odorata, *Engl. l. c.* 400.—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.* 401.—Afr. trop.

TILLAEA, Mich. (Crassul.).
acuminata, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xv. 96.—Austral.
acutifolia, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 143.—N. Zel.
exserta, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiv. 83.—Austral.
Helmsii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 142.—N. Zel.
pusilla, *T. Kirk, l. c.* 143.—N. Zel.

TILLANDSIA, Linn. (Bromel.).
adpressiflora, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 661.—Guiana.
aeris-incola, *Mez, l. c.* 759 (= *Catopsis maculata*).—Bras.
aizoides, *Mez, l. c.* 866.—Reg. Argent.
angulosa, *Mez, l. c.* 868.—Reg. Argent.
Arequitae, *André, ex Mez, l. c.* 814.—Urug.
arhiza, *Mez, l. c.* 855.—Parag.
Bangii, *Baker, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 124.—Bolivia.
calothyrsus, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 704.—Mexic.
caricifolia, *Morr. ex Mez, l. c.* 672.—Mexic.
chaetophylla, *Mez, l. c.* 726.—Mexic.
chlorantha, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 87.—Reg. Argent.

TILLANDSIA:—
cinerea, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 679.—Mexic.
clavigera, *Mez, l. c.* 783.—Ecuador.
crispa, *Mez, l. c.* 739.—N. Granat.
dependens, *Hieron. ex Mez, l. c.* 880.—Reg. Argent.
didistichoides, *Mez, l. c.* 778.—Ind. occ.
digitata, *Mez, l. c.* 715.—Am. cent.
exaltata, *Mez, l. c.* 766.—N. Granat.
Fawcettii, *Mez, l. c.* 752.—Ind. occ.
Fendleri, Griseb. in Goett. Nachr. 1864, 17 = panniculata.
Fendleri, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 741 (= *Catopsis Fendleri*).—Venez.
flexuosa, *Mez, l. c.* 744 (= *Catopsis flexuosa*).—Bolivia.
gracilis, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. 325.—Bras.
Hahnii, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 690.—Mexic.
Hieronymi, *Mez, l. c.* 876.—Reg. Argent.
inflata, *Mez, l. c.* 701 (non Baker).—Mexic.
ingens, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 256.—Ind. occ.
insularis, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 756.—Ins. Galap.
ionochroma, *André, ex Mez, l. c.* 801.—Ecuador.
kegeliana, *Mez, l. c.* 725.—Guiana.
kuntzeana, *Mez, l. c.* 790.—Bolivia.
lilacina, *Mez, l. c.* 806.—Am. cent.
lineatifolia, *Mez, l. c.* 686.—Venez.
lineatispica, *Mez, l. c.* 699.—Ind. occ.
Mandonii, *Morr. ex Mez, l. c.* 871.—Bolivia.
Mezii, *André, ex Mez, l. c.* 738.—Ecuador.
ortgiesiana, *Morr. ex Mez, l. c.* 678.—Mexic.
Pavonii, *Mez, l. c.* 774.—Peruv.
pendulispica, *Mez, l. c.* 745.—Peruv.
platyrhachis, *Mez, l. c.* 848.—N. Granat.
pungens, *Mez, l. c.* 684.—N. Granat.
rupestris, *Mez, l. c.* 856.—Parag.
Sanctae-crucis, *S. Moore, ex Mez, l. c.* 710.—Bras.
schumanniana, *Mez, l. c.* 740 (= *Catopsis schumanniana*).—N. Granat.
Seemanni, *Mez, l. c.* 737 (= *Guzmania Seemanni*).—Ecuador.
tovarensis, Mez, l. c. 769 = spiculosa.
trapeziformis, *Mez, l. c.* 737.—N. Granat.
tripinnata, *Mez, l. c.* 745 (= *Catopsis tripinnata*).—Am. trop.
tristis, *Mez, l. c.* 762.—N. Granat.
tucumanensis, *Mez, l. c.* 853.—Reg. Argent.
Uhdei, *Mez, l. c.* 706.—Mexic.
undulifolia, *Mez, l. c.* 740.—N. Granat.
violascens, *Mez, l. c.* 797.—Bolivia.

TIMONIUS, Rumph. (Rubiac.).
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 503, nomen.—Celebes.
latifolius, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 568.—N. Guin.
pleiomera, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 152.—N. Brit.

TINNEA, Kotschy & Peyr. (Labiat.).
Barteri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 314.—Afr. trop.
filipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 497.—Afr. trop.
heterotypica, S. Moore, in Journ. Bot. 1877, 69 = Renschia heterotypica.
physaloides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 163.—Afr. trop.
vestita, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 498.—Afr. trop.
zambesiaca, *Baker, l. c.* 499.—Afr. trop.

TINNEA, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 539 = **Cyclocheilon**, Oliv. (Verben.).
erianthera, Vatke, l. c. = C. eriantherum.

TINOSPORA, Miers (Menisperm.).
Buchholzii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 403.—Afr. trop.
megalobotrys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 311.—N. Guin.
mossambicensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 404.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

TIPUANA, Benth. (Legum.).
praecox, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 72.—Bras.

TISSA, Adans. = **Spergularia**, J. & C. Presl (Caryoph.).
angolensis, Reiche & Johow, Fl. Chile, i. 202 = S. angolensis.
aprica, Reiche & Johow, l. c. 201 = S. aprica.
araucana, Reiche & Johow, l. c. 203 = S. araucana.
Borchersi, Reiche & Johow, l. c. 199 = S. Borchersi.
coquimbensis, Reiche & Johow, l. c. 198 = S. coquimbensis.
denticulata, Reiche & Johow, l. c. 199 = Arenaria denticulata.
depauperata, Reiche & Johow, l. c. 200 = Arenaria depauperata.
fasciculata, Reiche & Johow, l. c. 197.—Chili.
floribunda, Reiche & Johow, l. c. = Arenaria floribunda.
fruticosa, Reiche & Johow, l. c. 199 = S. fruticosa.
glandulosa, Reiche & Johow, l. c. 196 = S. liebmanniana.
Larranagae, Reiche & Johow, l. c. 202 = S. Larranagae.
lignosa, Reiche & Johow, l. c. 198 = Arenaria lignosa.
media, Reiche & Johow, l. c. 201 = S. remotiflora.
paradoxa, Reiche & Johow, l. c. 196 = Arenaria lanuginosa.
Pissisi, Reiche & Johow, l. c. 200 = Arenaria Pissisi.
platensis, Reiche & Johow, l. c. 203 = S. platensis.
polyantha, Reiche & Johow, l. c. 202 = S. polyantha.
polyphylla, Reiche & Johow, l. c. 197 = S. confertiflora.
stenocarpa, Reiche & Johow, l. c. 201 = Arenaria stenocarpa.
teretifolia, Reiche & Johow, l. c. 198 = Arenaria teretifolia.

TITHYMALUS, Tourn. = **Euphorbia**, Linn. (Euphorb.).
Caesalpini, Bub. Fl. Pyren. i. 112 = E. pubescens.
Clusii, Bub. l. c. 110 = E. isatidifolia.
crebrifoliatus, Bub. l. c. 97 = E. pinea.
flavicomus, Bub. l. c. 108 = E. flavicoma.
leptophyllus, Bub. l. c. 95 = E. segetalis.
longiradiatus, Bub. l. c. 106 = E. longiradiata.
Matthioli, Bub. l. c. 101 = E. nicaeensis.
mucronatus, Bub. l. c. 94 = E. falcata.
pauciflorus, Bub. l. c. 102 = E. pauciflora, *Duf.*
Pouzolzi, Bub. l. c. 109 = E. Duvalii.
pyrenaeus, Bub. l. c. 114 = E. Chamaebuxus.
serocomans, Bub. l. c. 111 = E. seracomans.
sulcatus, Bub. l. c. 92 = E. sulcata.

TOCOCA, Aubl. (Melast.).
parvifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 334.—Am. cent.

TOCOYENA, Aubl. (Rubiac.).
stipulosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 18.—Bras.

TODDALIOPSIS, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 397, errore = TECLEA, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).

TOFIELDIA, Huds. (Liliac.).
brevistyla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 223.—China.
intermedia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 528.—Am. bor.
iridacea, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 224.—China.
Okuboi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 42.—Japon.
setchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 224.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 225.—China.

TOONA, M. Roem. = **Cedrela**, P. Br. (Meliac.).
australis, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 270.—Austral.
glabra, Harms, l. c. 269.—Ind. or.
microcarpa, Harms, l. c. 270.—Ind. or.
serrulata, Harms, l. c. 269 = C. serrulata.

TOPOBEA, Aubl. (Melast.).
boliviensis, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 94.—Bolivia.

TORDYLIUM, Tourn. (Umbell.).
hirtocarpum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot.* xliv. 159.—Graecia.

TORENIA, Linn. (Scrophul.).
inaequalifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 502.—Afr. trop.
spicata, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

TORICELLIA, DC. (Cornac.).
intermedia, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 507.—China.

TORILIS, Adans. = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).
coerulescens, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 156 = C. caerulescens.
Gaillardoti, Drude, l. c. = C. Gaillardoti.
nodiflora, Bub. Fl. Pyren. ii. 406 = C. nodosa.
stocksiana, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 156 = C. stocksiana.

TORREYA, Arn. (Conif.).
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 264.—China.

TORRICELLIA, Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 507 = **Toricellia**, DC. (Cornac.).

TORULINIUM, Desv. (Cyper.).
confertum, *Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ.* 15.—Ind. occ.
Eggersii, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 56.—Ind. occ.
filiforme, *C. B. Clarke, l. c.* 57.—Ind. occ.
michauxianum, *C. B. Clarke, l. c.* 56.—Ind. occ.
Vahlii, *C. B. Clarke, l. c.*—Ind. occ.

TOULICIA, Aubl. (Sapind.).
acuminata, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 505.—Bras.
subsquamulata, *Radlk. l. c.*—Bras.

TOURNEFORTIA, Linn. (Borag.).
andina, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 148.—Bolivia.
graciliflora, *Britton, l. c.*—Bras.
macrophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 520.—N. Guin.
Nelsoni, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 10.—Am. cent.
stenophylla, *Urb. Symb. Antill.* i. 477.—Ind. occ.
subspicata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 151.—Am. cent.

TOVARIA, Neck. (Liliac.).
atropurpurea, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 45.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 47.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 45.—China.
Prattii, *Franch. l. c.* 46.—China.
Souliei, *Franch. l. c.* 45.—China.
stenoloba, *Franch. l. c.* 47.—China.
tatsienensis, *Franch. l. c.*—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 48.—China.

TOVOMITA, Aubl. (Guttif.).
alatopetiolata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 16.—Bolivia.

TOWNSENDIA, Hook. (Compos.).
alpigena, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 394.—Am. bor.
alpina, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 391.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Pittonia*, iv. 157.—Am. bor.

TOXOCARPUS, Wight & Arn. (Asclep.).
lineatus, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Secamone lineata*).—Java.

TRACHELOSPERMUM, Lem. (Apocyn.).
borneana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 400 (= *Parechites borneana*).—Borneo.
verrucosa, *Boerl. l. c.* (= *Tabernaemontana verrucosa*).—Java.

TRACHYANDRA, Kunth = **Anthericum**, Linn. (Liliac.).
humilis, Kunth, Enum. Pl. iv. 574 = A. Kunthii.
Jacquinii, Kunth, l. c. 578 = A. elongatum.

TRACHYMENE, Rudge (Umbell.).
celebica, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 37.—Celebes.
juncea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 194.—Austral.

TRACHYPHRYNIUM, Benth. (Scitam.).
braunianum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 319.—Afr. trop.
liebrechtsianum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 147.—Afr. trop.
muricatum, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1233.—Afr. trop.
spinulosum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

TRACHYPOGON, Nees (Gramin.).
avenaceus, Nees, Agrost. Bras. 354 = Andropogon halepensis.
fasciculatus, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 138 = Ischaemum spathiflorum.
Schoenanthus, Nees, in Linnaea, vii. 281 = Andropogon Nardus.

TRACHYSPERMUM, Link = **Carum**, Rupp. (Umbell.).
capense, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 189 = C. capense.
carvifolium, Drude, l. c. = C. carvifolium.
dichotomum, Drude, l. c. = C. dichotomum.
didymum, Drude, l. c. = C. didymum.

TRADESCANTIA, Rupp. (Commelin.).
acropoda, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 505, errore = macropoda.
brachyphylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 471.—Mexic.
bracteata, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 510.—Am. bor.
chidophylla, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 505, errore = orchidophylla.
comata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 234.—Am. bor.
foliosa, *Small, l. c.*—Am. bor.
gigantea, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 205.—Am. bor.
hirsuticaulis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 233.—Am. bor.
humilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 204.—Am. bor.
longifolia, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 471 = holosericea.
longifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 233.—Am. bor.
macrophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 472.—Mexic.
macropoda, *Greenm. l. c.* xxxii. 295.—Mexic.
occidentalis, *Britton, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 87.—Am. bor.
orchidophylla, *Rose & Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2522.—Mexic.
scopulorum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 205.—Am. bor.

TRAGIA, Plum. (Euphorb.).
Bolusii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 293.—Afr. austr.
durbanensis, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
Okanyua, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 735.—Afr. trop.
Schinzii, *Pax, l. c.* 734.—Afr. austr.
Schlechteri, *Pax, l. c.* 735.—Afr. austr.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 528.—Afr. trop.

TRAGOPOGON, Tourn. (Compos.).
interjectus, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 5.—Hybr.

TRAGUS, Hall. (Gramin.).
brevicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 44 = racemosus.
major, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 577.—Afr. austr.

TRECULIA, Decne. (Urtic.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 54.—Afr. trop.
parva, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 121.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

TRELEASEA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1899), 207. *COMMELINACEAE.*
brevifolia, *Rose, l. c.* (= *Tradescantia brevifolia*).—Mexic.
leiandra, *Rose, l. c.* 208 (= *Commelina leiandra*).—Mexic.
pumila, *Greene, Pittonia*, iv. 225 (= *Zebrina pumila*).—Am. bor.
tumida, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 208 (= *Tradescantia tumida*).—Am. bor.

TREMA, Lour. (Urtic.).
acuminatissima, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 358 (= *Sponia acuminatissima*).—Sumatra.

TRETOCARYA, Maxim. = **Microula**, Benth. (Borag.).
pratensis, Maxim. Mél. Biol. xi. 272 = M. tibetica.
sikkimensis, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 2255 = M. sikkimensis.

TREVOA, Miers (Rhamn.).
campanulata, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 12 (= *Colletia campanulata*).—Chili.
glauca, *Reiche, l. c.* (= *Retanilla glauca*).—Chili.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 503.—Patag.

TREVORIA, Lehm. in Gard. Chron. 1897, I. 345. *ORCHIDEAE.*
Chloris, *Lehm. l. c.* 346.—Ecuador.

TRIACHYRUM, Hochst. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).
adoense, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 398 = S. discosporus.
cordofanum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 176 = S. coromandelianus.
discosporum, Steud. l. c. = S. coromandelianus.

TRIADENUM, Rafin. = **Hypericum**, Tourn. (Hyperic.).
longifolia, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 140.—Am. bor.
petiolatum, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 437 = H. paludosum.

TRIANAEA, Planch. & Linden (Solan.).
speciosa, Soler. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1898, 254 (= *Poortmannia speciosa*).—Ecuador.

TRIANTHEMA, Sauv. (Ficoid.).
hereroensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. *App.* III. 76.—Afr. trop.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.

TRIANTHERA, Wettst. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 55 (1891) = **Stemotria**, Wettst. & Harms (Scroph.).

TRIASPIS, Burch. (Malpigh.).
acuminata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 416.—Afr. trop.
transvalica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 29.—Afr. austr.

TRIATHERA, Desv. (Gramin.).
bromoides, Roth, ex Kunth, Enum. Pl. i. 520 = Tripogon bromoides.

TRIBRACHIA, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
pendula, Lindl. Coll. Bot. sub t. 41 = B. recurvum.

TRIBULUS, Tourn. (Zygophyll.).
alacranensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 54.—Ind. occ.
brachystylis, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 354.—Am. bor.

TRICALYSIA, A. Rich. (Rubiac.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 468.—Afr. trop.
benguellensis, *Welw. ex Hiern, l. c.* 470.—Afr. trop.
cacondensis, *Hiern, l. c.* 467.—Afr. trop.
delagoensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 67.—Afr. austr.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 200.—Afr. trop.
glabra, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 445.—Afr. trop.
griseiflora, *K. Schum. l. c.* 446.—Afr. trop.
kraussiana, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 10, 67 = Kraussia floribunda.
macrophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 66.—Afr. trop.
mechowiana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 447.—Afr. trop.
oligoneura, *K. Schum. l. c.* 448.—Afr. trop.
Soyauxii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
subsessilis, *K. Schum. l. c.* xxviii. 66.—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* xxiii. 449.—Afr. trop.

TRICHILIA, P. Br. (Meliac.).
alajuelana, *C. DC. ex Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 13, nomen.—Am. cent.
alata, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 160.—Afr. austr.
angustior, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 209.—Bras.
Elliotii, *Harms, l. c.* iii. IV. 306.—Madag.
emarginata, Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. 11 = Elliotii.
gilgiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 161.—Afr. trop.

TRICHILIA:—
graciliflora, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 304, fig. 164.—Reg. Argent.
Humblotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 163.—Ins. Comor.
megalantha, *Harms, l. c.* 160.—Afr. trop.
monacantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 329.—Ind. occ.
schumanniana, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 209.—Bras.
stellatotomentosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 36.—Bolivia.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 162.—Afr. trop.
taubertiana, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 305.—Bras.
triacantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 329.—Ind. occ.
vestita, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 428.—Afr. trop.
Zenkeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 161.—Afr. trop.

TRICHINIUM, R. Br. (Amarant.).
eremita, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 218.—Austral.

TRICHOCENTRUM, Poepp. & Endl. (Orchid.).
alatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 197.—N. Granat.
Brandtiae, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 109.—Hab.?

TRICHOCHITON, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. (1896) 113. *CRUCIFERAE.*
inconspicuum, *Kom. l. c.*—Turkestan.
tuberosum, *Kom. l. c.*—Turkestan.

TRICHOCLADUS, Pers. (Hamamel.).
malosanus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 266.—Afr. trop.

TRICHOCLINE, Cass. (Compos.).
oblonga, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 370.—Peruv.
Stuebelii, *Hieron. l. c.* 369.—Peruv.

TRICHOCREPIS, Vis. = **Pterotheca**, Cass. (Compos.).
nemausensis, Bub. Fl. Pyren. ii. 71 = P. nemausensis.

TRICHODESMA, R. Br. (Borag.).
cardiosepalum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2436.—Arab.
droogmansianum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 69.—Afr. trop.
kissenioides, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 119.—Arab.

TRICHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).
calcarata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 292.—Borneo.
celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 130.—Celebes.
Koordersii, *Rolfe, l. c.*—Celebes.
oblongifolia, *Rolfe, l. c.*—Celebes.
scaphigera, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 357.—Penins. Mal.
tetraceras, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

TRICHOLAENA, Schrad. (Gramin.).
arenaria, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; *et in Linnaea*, xi. Lit. Ber. 130.—Afr. austr.
bellespicata, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 196.—Afr. trop.
capensis, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; *et in Linnaea*, xi. Lit. Ber. 130.—Afr. austr.
dregeana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 769 = rosea.
fragilis, A. Braun, in Flora, 1841, 275 = rosea.
glabra, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 446.—Afr. austr.
grandiflora, Hochst. in Flora, 1841, I. Intell. 19 = rosea.
micrantha, Schrad. in Schult. Mant. ii. 163 = Teneriffae, Wightii.
minutiflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 198.—Afr. trop.
rosea, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; *et in Linnaea*, xi. Lit. Ber. 129.—Afr. trop. et austr.
ruficoma, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 770 = rosea.
rupicola, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 197.—Afr. trop.
setifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 442.—Afr. austr.
sphacelata, Benth. in Hook. Niger Fl. 559 = rosea.
tanatricha, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 197.—Afr. trop.

TRICHOLAENA:—
Teneriffae, *Parl. in Webb & Bert. Phyt. Canar.* iii. 425.—Reg. medit.; As. austr.
tonsa, Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl. 1835; et in Linnaea, xi. Lit. Ber. 128 = rosea.
tuberculosa, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 65 = Wightii.
Wightii, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 93.—As. austr. et Ins. atlant.

TRICHONEMA, Ker-Gawl. = **Romulea**, Marat. (Irid.).
anceps, Merino, Contrib. Fl. Galic. 265.—Galic.
coronatum, Merino, l. c. 266.—Galic.
viride, Merino, l. c. 263.—Galic.

TRICHOON, Roth = **Phragmites**, Trin. (Gramin.).
Phragmites, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 218 = P. communis.

TRICHOPILIA, Lindl. (Orchid.).
multiflora, *Kraenzl. in Xenia Orch.* t. 288.—Hort.

TRICHOPTERIX, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 69, sphalm. = seq.

TRICHOPTERYX, Nees (Gramin.).
acuminata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 297.—Afr. trop.
ambiens, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 335.—Afr. trop.
annua, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. trop.
camerunensis, *Stapf, l. c.* 296.—Afr. trop.
densispica, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 214.—Afr. trop.
flavida, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. austr.
gigantea, *Stapf, l. c.* 295.—Afr. trop.
hordeiformis, *Stapf, l. c.* 297.—Afr. trop.
nigritiana, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
pennata, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 69.—Afr. trop.
ramosa, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. austr.
viridis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 216.—Afr. trop.

TRICHOSANTHES, Linn. (Cucurb.).
papuana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vii. 349.—N. Guin.
reineckeana, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxv. 691.—Ins. Samoa.

TRICHOSPORUM, D. Don (Gesner.).
breviflorum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 173.—Ins. Philipp.
Forbesii, *S. Moore, l. c.* 172.—N. Guin.
nummularium, *Burkill & S. Moore, ex S. Moore, l. c.* 173.—N. Guin.

TRICHOSTACHYS, Hook. f. (Rubiac.).
Lehmbachii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 467.—Afr. trop.
microcarpa, *K. Schum. l. c.* xxviii. 88.—Afr. trop.
Soyauxii, *K. Schum. l. c.* 89.—Afr. trop.
stenostachys, *K. Schum. l. c.* 89.—Afr. trop.

TRICLISIA, Benth. (Menisperm.).
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 17.—Afr. trop.

TRICOSTULARIA, Nees (Cyper.).
paludosa, Benth. Fl. Austral. vii. 382 = Costularia paludosa.

TRICUSPIS, Beauv. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).
Langloisii, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 293.—Am. bor.

TRICYRTIS, Wall. (Liliac.).
lasiocarpa, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1897, 79.—Formosa.
stolonifera, *Matsum. l. c.* 78.—Formosa.

TRIDAX, Linn. (Compos.).
imbricata, *Schultz Bip. ex Klatt, in Flora*, 1885, 202.—Mexic.
paraguayensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 182.—Parag.
petrophila, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 5.—Mexic.
Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.* 4.—Mexic.
rosea, *Schultz Bip. ex Robinson & Greenm. l. c.* 6.—Mexic.; Ind. occ.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 51.—Ecuador.
tuberosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 4.—Mexic.

TRIDENS, Roem. & Schult. (Gramin.).
capensis, Nees, in Linnaea, vii. 324 = Diplachne fusca.
indicus, Nees, in Wight, Cat. n. 1794 = Diplachne fusca.

TRIFOLIUM, Tourn. (Legum.).
anemophilum, *Greene, Pittonia*, iv. 139.—Am. bor.
argentinense, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 49.—Reg. Argent.
attenuatum, *Greene, Pittonia*, iv. 137.—Am. bor.
calophyllum, *Greene, l. c.* iii. 214.—Am. bor.
carteiense, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 163.—Hispan.
caurinum, *Piper, in Erythea*, vi. 29.—Am. bor.
chrysanthoides, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 161.—Graecia.
compactum, *Post, Fl. Syria*, 239.—Syria.
dianthum, *Greene, Pittonia*, iii. 217.—Am. bor.
Elmeri, *Greene, l. c.* 223.—Am. bor.
Fendleri, *Greene, l. c.* 221.—Am. bor.
geminiflorum, *Greene, l. c.* 216.—Am. bor.
Goetzenii, *Taub. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 5.—Afr. trop.
Hallii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 135.—Am. bor.
isodon, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 64.—Afr. bor.
latifolium, *Greene, Pittonia*, iii. 223.—Am. bor.
lilacinum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 547.—Am. bor.
Loiseleurii, *Rouy, Fl. Fr.* v. 111.—Gallia.
lupulinum, Bub. Fl. Pyren. ii. 503 = procumbens.
macilentum, *Greene, Pittonia*, iii. 223.—Am. bor.
majus, *Greene, l. c.* 214.—Am. bor.
Marschallii, *Rouy, Fl. Fr.* v. 114.—Reg. Cauc.
minutiflorum, *Greene, Pittonia*, iii. 215.—Am. bor.
montanense, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 236.—Am. bor.
nemorale, *Greene, Pittonia*, iv. 136.—Am. bor.
Ortegae, *Greene, l. c.* iii. 186.—Mexic.
phaeocephalum, *Greene, l. c.* 216.—Am. bor.
polyodon, *Greene, l. c.* 215.—Am. bor.
pusillum, *Greene, l. c.* 217.—Am. bor.
rodnense, *Porcius, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. xiv. 62.—Eur.
rostratum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 547.—Am. bor.
rumelicum, *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* i. 399.—Eur.
Rydbergii, *Greene, Pittonia*, iii. 222.—Am. bor.
sefinense, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 5.—Oriens.
segetum, *Greene, Pittonia*, iii. 221.—Am. bor.
somalense, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 90.—Afr. trop.
squarrosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 214 = Marschallii.
subsalinum, *Greene, Pittonia*, iii. 219.—Am. bor.
trimorphum, *Greene, l. c.* 220.—Am. bor.
truncatum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 546.—Am. bor.
tunetanum, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 65.—Afr. bor.
ultramontanum, *Greene, Pittonia*, iii. 218.—Am. bor.

TRIGLOSSUM, Fisch. = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).
arundinaceum, Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 391 = B. nana.
bambusinum, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. p. viii; et ex Roem. & Schult. Syst. ii. 846 = B. nana.

TRIGOGLOTTIS, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 505, sphalm. = **Trichoglottis**, Blume (Orchid.).

TRIGONELLA, Linn. (Legum.).
Amana, *Post, Fl. Syria*, 9.—Reg. Levant.
amandiana, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 143.—Eur.
caerulescens, Halácsy, Consp. Fl. Graec. i. 351 = azurea.

TRIGONIA, Aubl. (Vochys.).
thyrsifera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 3.—Am. cent.

TRIGONOCAPNOS, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 131. *PAPAVERACEAE.*
curvipes, *Schlechter, l. c.* 132.—Afr. austr.

TRIGONOSPERMUM, Less. (Compos.).
tomentosum, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 44.—Mexic.

TRILLIUM, Linn. (Liliac.).
crassifolium, *Piper, in Erythea*, vii. 104.—Am. bor.
Underwoodii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 172.—Am. bor.

TRIMERIA, Harv. (Bixac.).
tropica, *Burkill, in Kew Bull.* 1898, 145.—Afr. trop.

TRIODIA, R. Br. (Gramin.).
argentina, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 331 (= *Sieglingia argentina*).—Reg. Argent.
capensis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 877 = Diplachne fusca.
decumbens, Beauv. Agrost. 179 = Danthonia decumbens.
Drummondii, *Scribner & Kearney, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 37.—Am. bor.
glaberrima, *Post, Fl. Syria*, 874; *et in Bull. Herb. Boiss.* v. 760.—Syria.
livida, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 877 = Diplachne fusca.
plumosa, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 110 = Leptocarydion Vulpinastrum.
Vulpiastrum, K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. C. 113 = Leptocarydion Vulpinastrum.

TRIOSTEUM, Linn. (Caprifol.).
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 318.—China.

TRIPHLEBIA, Stapf = **Stiburus**, Stapf (Gramin.).
alopecuroides, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2612 = S. alopecuroides.

TRIPLARIS, Loefl. (Polygon.).
boliviana, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 130.—Bolivia.
corylifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 270 = Ruprechtia corylifolia.
efistulifera, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 129.—Bolivia.
estriata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 271.—Bolivia.
guanaiensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 111.—Bolivia.
hispida, *Britton, ex Rusby, l. c.*—Bolivia.
intermedia, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 364, errore = Triplasis intermedia.
polystachya, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 271 = Ruprechtia polystachya.
triflora, *Kuntze, l. c.* = Ruprechtia triflora.
weigeltiana, Kuntze, l. c. 270 = surinamensis.

TRIPLASANDRA, Seem. (Aral.).
Waimeae, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 871 = Heptapleurum Waimeae.

TRIPLASIS, Beauv. (Gramin.).
intermedia, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 564.—Am. bor.

TRIPLEUROSPERMUM, Sch. Bip. = **Matricaria**, Tourn. (Compos.).
macrocephalum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 177.—Eur.

TRIPLOCEPHALUM, O. Hoffm. (Compos.).
glabrifolium, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 832 = Geigeria pectidia.

TRIPLOCHITON, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 330. *MALVACEAE.*
scleroxylon, *K. Schum. l. c.* 331.—Afr. trop.

TRIPLOSTEGIA, Wall. (Dipsac.).
repens, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 101.—N. Guin.

TRIPOGON, Roth (Gramin.).
neesianus, Wight & Arn. ex Wight, Cat. n. 2059 = bromoides.
pauperulus, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2442.—Ind. or.
submutica, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 287 = Jacquemontii.
Wightii, *Hook. f. l. c.* 286.—Ind. or.

TRIPSACUM, Linn. (Gramin.).
avenacea, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 23 = mexicana.
laxa, *Scribn. & Merrill, l. c.* 24.—Mexic.

TRIPSACUM:—
pilosum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 6.—Mexic.
pubescens, Lichtenst. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 74 = Anthephora pubescens.
semiteres, Wall. Cat. n. 8628 = Polytoca semiteres.

TRIPTERACHAENIUM, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 182 = **Tripteris**, Less. (Compos.).
humile, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 182 = Tripteris humilis.
scariosum, Kuntze, l. c. = Tripteris flexuosa.

TRIPTERIS, Less. (Compos.).
angustissima, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 460.—Afr. trop.

TRIRAPHIS, R. Br. (Gramin.).
Fleckii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 23.—Afr. austr.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373.—Reg. Argent.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 227.—Afr. trop.

TRIRAPHIS, Nees = **Pentaschistis**, Stapf (Gramin.).
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 271 = P. capensis.

TRISETUM, Pers. (Gramin.).
airoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 666 = Avena subspicata.
andinum, Benth. Pl. Hartw. 261 = Avena subspicata.
andropogonoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = Tristachya Rehmanni.
antarcticum, Nees, in Linnaea, vii. 307 = Avenastrum antarcticum.
antarcticum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 61 = Avena subspicata.
araeanthum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 28.—Chili.
argenteum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 49 (non aliorum).—Am. bor.
aureum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 225 = Avena aenea.
balearicum, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 141.—Eur.
Brittonii, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 437.—Am. bor.
Cavanillesii, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 63 = Avena Cavanillesii.
confertum, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxv. 714.—N. Granat.
dregeanum, Steud. Syn. Pl. Gram. 227 = Avenastrum dregeanum.
erectum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 27.—Chili.
flavescens, Beauv. Agrost. 88 = Avena flavescens.
gaudinianum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 653 = Avena Cavanillesii.
groenlandicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = Avena subspicata.
imberbe, Nees, Fl. Afr. Austr. 347 = Avenastrum turgidulum.
koelerioides, *Bornm. & Hack. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 646.—Palaest.
labradoricum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = Avena subspicata.
minutiflorum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 26.—Chili.
molle, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = Avena subspicata.
nemorosum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 26.—Chili.
nudum, Pers. Syn. i. 97 = Pentaschistis Thunbergii.
paradoxum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 28.—Chili.
phleoides, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = Avena subspicata.
spiciforme, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 86 = Avena subspicata.
Steudelii, Nees, in Linnaea, vii. 308 = Avenastrum quinquesetum.
subspicatum, Beauv. Agrost. 88 = Avena subspicata.
toluccense, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = Avena subspicata.
valesiaca, Boiss. ex Nym. Consp. 814 = Avena Cavanillesii.
Vidali, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 27.—Chili.
virescens, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 226 = Avena aspera.

TRISTACHYA, Nees (Gramin.).
biseriata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 295.—Afr. austr.
bricchettiana, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 162.—Afr. trop.
glabra, Stapf, in Kew Bull. 1897, 294 = Rehmanni.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 217.—Afr. trop.
monocephala, Hochst. in Flora, 1846, 120 = leucothrix.
nodiglumis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 334.—Afr. trop.
tuberculata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 294.—Afr. trop.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 217.—Afr. trop.

TRISTAGMA, Poepp. (Liliac.).
australis, *Neger, ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 207.—Reg. Magellan.
nivale, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 9 = Brodiaea nivalis.

TRISTEMMA, Juss. (Melast.).
angolense, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 27.—Afr. trop.
Dusenii, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
fruticulosum, *Gilg, l. c.* 26.—Afr. trop.
grandifolium, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
oreophilum, *Gilg, l. c.* 25.—Afr. trop.
papillosum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
roseum, *Gilg, l. c.* 24.—Afr. trop.
Schlechteri, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 302, nomen.—Afr. trop.
vincoides, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 24.—Afr. trop.

TRISTIRA, Radlk. (Sapind.).
celebica, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 407, nomen.—Celebes.

TRITELEIA, Dougl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
Berteri, Kunth, Enum. Pl. iv. 467 = B. subbiflora.
bivalvis, Hook. in Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 = B. bivalvis.
brevipes, Kuntze, in Linnaea, xx. 9 = B. brevipes.
candida, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 139 = B. candida.
conspicua, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 43 = B. uniflora.
gaudichaudiana, Kunth, Enum. Pl. iv. 467 = B. bivalvis.
gracilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 550 = B. philippiana.
hirtella, Kunth, Enum. Pl. iv. 465 = B. hirtella.
poeppigiana, C. Gay, Fl. Chile, vi. 117 = B. poeppigiana.
sellowiana, Kunth, Enum. Pl. iv. 466 = B. sellowiana.
sessilis, Phil. in Linnaea, xxix. 72 = B. sessiliflora.
uniflora, Lindl. Bot. Reg. t. 1921 = B. uniflora.
violacea, Kunth, Enum. Pl. iv. 468 = B. violacea.

TRITHRINAX, Mart. (Palm.).
biflabellata, *Rodr. Palm. Nov. Parag.* 2.—Parag.

TRITICUM, Linn. (Gramin.).
amyleum, Ser. Mélang. Bot. i. 124 = vulgare.
capense, Spreng. Pugill. ii. 23 = Brizopyrum capense.
dicoccon, Schrank, Baier. Fl. i. 389 = vulgare.
durum, Desf. Fl. Atlant. i. 114 = vulgare.
fuegianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 99.—Fuegia.
magellanicum, *Speg. l. c.* 98.—Fuegia.
Spelta, Linn. Sp. Pl. 86 = vulgare.
striatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 346 = Agropyron striatum.
tenax, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii–xiv. 67.—Graecia.
Zea, Host, Gram. Austr. iii. 20 = vulgare.

TRIUMFETTA, Plum. (Tiliac.).
brachyceras, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 432.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 49.—Afr. austr.
nigricans, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 156.—Austral.
socorrensis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 1.—Mexic.

TRIXIS, P. Br. (Compos.).
aggregata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 71.—Bolivia.
Grisebachii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 183.—Reg. Argent.
hoffmanniana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 456.—Bras.

TROCHERA, Rich. = **Ehrharta**, Thunb. (Gramin.).
panicea, H. Baill. Hist. Pl. xii. 171 = E. erecta.

TROCHOCARPA, R. Br. (Epacrid.).
Novae-zealandiae, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 602.—N. Zel.

TROCHOCODON, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 148. *CAMPANULACEAE.*
spicatus, *Candargy, l. c.*—Graecia.

TROLLIUS, Linn. (Ranunc.).
albiflorus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 152. —Am. bor.

TROPAEOLUM, Linn. (Geran.).
cuspidatum, *Buchen. in Engl. Jahrb.* xxvi. 581.—Bolivia.
luteum, *Buchen. l. c.* 583.—Chili.
maculatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 15.—Bolivia.
patagonicum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 599.—Patag.
Warscewiczii, *Buchen. in Engl. Jahrb.* xxvi. 582.—Am. cent.

TROPHAEUM, Linn. = **Tropaeolum**, Linn. (Geran.).
argentinum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 33 = Tropaeol. argentinum.
Cochabambae, Kuntze, l. c. = Tropaeol. Cochabambae.
kuntzeanum, Kuntze, l. c. = Tropaeol. kuntzeanum.
rectangulum, Kuntze, l. c. = Tropaeol. rectangulum.

TROPIDOCARPUM, Hook. (Crucif.).
macrocarpum, *Hook. & Harv. ex Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 553.—Calif.

TRYMALIUM, Fenzl (Rhamn.).
Myrtillus, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 183. —Austral.

TRYMATOCOCCUS, Poepp. & Endl. (Urtic.).
kamerunianus, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 29 = Dorstenia kameruniana.

TRYPHOSTEMMA, Harv. (Passifl.).
pedatum, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 436.—Afr. trop.

TSUGA, Carr. (Conif.).
heterophylla, *Sargent, Silva N. Am.* xii. 73 = mertensiana, *Carr.*
mertensiana, *Sargent, l. c.* 77 = hookeriana.

TUBIFLORA, J. F. Gmel. = **Elytraria**, Michx. (Acanth.).
paucisquamosa, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 42.—Afr. trop.

TULBAGHIA, Linn. (Liliac.).
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 282.—Afr. austr.
leucantha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 404.—Afr. austr.

TULIPA, Linn. (Liliac.).
brachyanthera, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 187.—As. Min.
Callieri, *Halacsy & Levier, in Jahres.-Kat. Wien. Tauschanst.* 1897, 69.—Eur.
galatica, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 186.—As. Min.
heterochroa, *Freyn, l. c.* 184.—As. Min.
lutea, *Freyn, l. c.* 185.—As. Min.
Theophrasti, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 143.—Graecia.
Willmottae, *Freyn, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 29.—As. Min.

TUNARIA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 228 (1898). *SOLANACEAE.*
albida, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.

TUNICA, Hall. (Caryophyll.).
pinetorum, *Lara, in Soc. Espan. Hist. Nat.* xxv. 197.—Hispan.

TUPA, G. Don = **Lobelia**, Plum. (Campan.).
portoricensis, Vatke, in Linnaea, xxxviii. 727 = L. portoricensis.

TUPISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.).
Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 40.—China.
grandis, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 73.—Malaya.
lorifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 41.—China.
viridiflora, *Franch. l. c.*—China.

TURNERA, Plum. (Turnerac.).
Crulsii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 6.—Bras.
dasystyla, *Urb. l. c.* 10.—Bras.
foliosa, *Urb. l. c.* 5.—Bras.
goyazensis, *Urb. l. c.* 4.—Bras.
marmorata, *Urb. l. c.* 9.—Bras.
melanorhiza, *Urb. l. c.* 7.—Bras.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 166.—Mexic.
scabra, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 77.—Ind. occ.
subnuda, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 8.—Bras.
tenuicaulis, *Urb. l. c.* 7.—Bras.
triglandulosa, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 77.—Ind. occ.
venosa, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 3.—Bras.

TURRAEA, Linn. (Meliac.).
anomala, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 284 (= *Quivisia anomala*).—Madag.
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Sér. I. 31.—Afr. trop.
decandra, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 284 (= *Quivisia decandra*).—Ins. Mascar.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 415.—Afr. trop.
grandifolia, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 284 (= *Quivisia grandifolia*).—Madag.
heterophylla, *Harms, l. c.* (= *Quivisia heterophylla*). —Ins. Mascar.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss,* no. 10, 45.—Afr. austr.
laciniosa, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 284 (= *Quivisia laciniata*).—Ins. Rodrig.
oppositifolia, *Harms, l. c.* (= *Quivisia oppositifolia*).—Ins. Borbon.
ovata, *Harms, l. c.* (= *Quivisia ovata*).—Ins. Borbon.
Randii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 427.—Afr. trop.
Sieberi, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 284 (= *Quivisia Sieberi*).—Ins. Maurit.
trichopoda, *Harms, l. c.* (= *Quivisia trichopoda*).—Ins. Maurit.

TURRAEANTHUS, Baill. (Meliac.).
bracteolatus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 157.—Afr. trop.
Zenkeri, *Harms, l. c.* 156.—Afr. trop.

TURRAYA, Wall. Cat. no. 8637 D = **Leersia**, Soland. (Gramin.).
napalensis, Wall. l. c. = L. hexandra.

TYLECARPUS, Engl. (Olacac.).
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 650.—Ins. Samoa.

TYLOGLOSSA, Hochst. = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
acuminata, Hochst. in Flora, 1843, 73 = J. palustris.
longipes, Hochst. ex Solms-Laub. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 104 = Asystasia coromandeliana.
major, Hochst. in Flora, 1843, 73 = J. flava.
minor, Hochst. l. c. = J. flava.
Schimperi, Hochst. l. c. = J. calcarata.

TYLOPHORA, R. Br. (Asclep.).
badia, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 12 (= *Astephanus badius*).—Afr. austr.
congoensis, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 309, nomen.—Afr. trop.
dahomensis, *K. Schum. ex Schlechter, l. c.* nomen.—Afr. trop.
javanica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Hybanthera javanica*).—Java.
liukiuensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* 1898, 40.—Ins. Luchu.
Miquelii, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 438 = villosa.
orthocaulis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 235.—Afr. trop.

TYLOPHOROPSIS, N. E. Brown (Asclep.).
Fleckii, *Schlechter, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 39.—Afr. austr.

TYLOSTEMON, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 389. *LAURACEAE.*
batangensis, *Engl. l. c.* 390.—Afr. trop.
crassifolius, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Dinklagei, *Engl. l. c.* 389.—Afr. trop.

TYNANTHUS, Miers (Bignon.).
Lindmanii, *K. Schum. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 409.—Bras.
myrianthus, *Bureau & K. Schum. l. c.* 197.—Bras.

TYPHA, Linn. (Typhac.).
argoviensis, *Hausskn. ex Aschers. & Graebn. Mitteleur. Fl.* i. 273.—Hybr.
australis, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 401.—Afr. trop. et austr.

TYPHONIUM, Schott (Arac.).
inopinatum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 301. —Ind. or.
Listeri, *Prain, l. c.* 304.—Ind. or.
Pottingeri, *Prain, l. c.*—Ind. or.

TYSONIA, F. Muell. in Chem. & Drug. Austral. Oct. 1, 1896. *COMPOSITAE.*
phyllostegia, *F. Muell. l. c.*—Austral.

U

UAPACA, Baill. (Euphorb.).
Goetzei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 418.—Afr. trop.
Marquesii, *Pax, l. c.* xxiii. 522.—Afr. trop.
microphylla, *Pax, l. c.* 523.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax, l. c.* 522.—Afr. trop.

UDORA, Nutt. (Hydroch.).
cordofana, Hochst. in Flora, 1842, Beibl. i. 133 = Lagarosiphon cordofanum.

ULMUS, Tourn. (Urtic.).
serotina, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 92.—Am. bor.

UMBILICUS, DC. = **Cotyledon**, Tourn. (Crassul.).
patulus, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 157.—Graecia.
Rodriguezii, Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 133.—Eur.

UNCARIA, Schreb. (Rubiac.).
borneensis, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 84.—Borneo.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 504, nomen.—Celebes.
grandifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.
hirsuta, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 88.—China.
sinensis, *Havil. l. c.* 89 (= *Nauclea sinensis*).—China.
tonkinensis, *Havil. l. c.*—Tonkin.
trinervis, *Havil. l. c.* 80.—Penins. Mal.
velutina, *Havil. l. c.* 84.—Ins. Philipp.

UNCINIA, Pers. (Cyper.).
bracteosa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 503.—Chili.
hamata, Urb. Symb. Antill. ii. 169 = jamaicensis.
loliacea, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 503.—Chili.
Negeri, *Kuek. in Bot. Centralbl.* lxxvi. 210.—Chili.
triquetra, *Kuek. l. c.* lxxxii. 97.—Fuegia.

UNIOLA, Linn. (Gramin.).
capensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 360 = Brizopyrum capense.
indica, Spreng. Syst. i. 349 = Eragrostis amabilis.
mucronata, L. Sp. Pl. ed. II. 104 = Halopyrum mucronatum.

UNONA, Linn. f. (Anonac.).
albida, *Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 297.—Afr. trop.
chrysea, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 102 (= *Monoon chryseum*).—Sumatra.
cleistogama, *Burck, ex Boerl. l. c.* 127.—Malaya.
confinis, *Pierre, ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 55 (= *Pachypodanthum confine*). —Afr. trop.
congensis, *Engl. & Diels, l. c.* ii. 296.—Afr. trop.

UNONA:—
elegans, *Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 296 (non Thw.).—Afr. trop.
glauca, *Engl. & Diels, l. c.* (non Zipp.).—Afr. trop.
montana, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
Teysmannii, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 103.—Borneo.

UNONOPSIS, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5 (1900) 26. *ANONACEAE.*
angustifolia, *R. Fries, l. c.* (= *Trigynaea angustifolia*).—Venez.
antillana, *R. Fries, l. c.* 28 (= *Trigynaea antillana*).—Ind. occ.
boliviensis, *R. Fries, l. c.* (= *Trigynaea boliviensis*).—Bolivia.
galeottiana, *R. Fries, l. c.* (= *Trigynaea galeottiana*).—Mexic.
grandis, *R. Fries, l. c.* (= *Trigynaea grandis*).—Venez.
Lindmani, *R. Fries, l. c.* 27.—Bras.
Matthewsi, *R. Fries, l. c.* 28 (= *Trigynaea Matthewsii*).—Peruv.
Perottetii, *R. Fries, l. c.* 26 (= *Trigynaea Perrottetii*).—Guiana.
rufescens, *R. Fries, l. c.* 27 (= *Trigynaea rufescens*).—Guiana.
trunciflora, *R. Fries, l. c.* (= *Xylopia trunciflora*).—Mexic.

URACHNE, Trin. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
parviflora, Trin. Fund. Agrost. 110 = O. miliacea.

URAGOGA, Linn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).
ankafinensis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 106.—Madag.
bicoloriceps, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 584.—N. Guin.
ceratoloba, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 105.—Afr. trop.
chasaliodes, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 124.—Bolivia.
gigantocalyx, Kuntze, l. c. 125.—Bolivia.
hexamera, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 104.—Afr. trop.
lateralis, K. Schum. l. c. 105.—Afr. trop.
melanochlora, K. Schum. l. c. xxiii. 468.—Afr. trop.
scaphus, K. Schum. l. c. xxviii. 104.—Afr. trop.
sphaerocrater, K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 322, nomen.—Afr. trop.
subipecacuanha, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 106.—Afr. trop.
subsessilifolia, K. Schum. l. c. xxiii. 467.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol. 46.—Afr. trop.

URALEPSIS, Nutt. (Gramin.).
alba, Steud. Syn. Pl. Gram. 248 = Diplachne fusca.
capensis, Kunth, Enum. Pl. i. 319 = Diplachne fusca.
livida, Steud. Syn. Pl. Gram. 248 = Diplachne fusca.
pungens, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = Aeluropus villosus.

URARIA, Desv. (Legum.).
Collettii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 383.—Burma.
gracilis, *Prain, l. c.*—Burma.
latifolia, *Prain, l. c.*—Burma.

URCEOLA, Roxb. (Apocyn.).
acute-acuminata, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 19.—Borneo.
javanica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 399; *et l. c.* 18 (= *Chavannesia javanica*).—Java.
pilosa, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz.* v. 19.—Borneo.

URERA, Gaudich. (Urtic.).
arborea, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 52.—Afr. trop.
chlorocarpa, *Urb. Symb. Antill.* i. 293.—Ind. occ.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 50.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 49.—Afr. trop.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 48.—Afr. trop.
tuberculata, *Urb. Symb. Antill.* i. 294.—Ind. occ.
Tuerckheimii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 14.—Am. cent.

URGINEA, Steinh. (Liliac.).
Burkei, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 469.—Afr. austr.
capitata, *Baker, l. c.* 465.—Afr. austr.
cepaefolia, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 60.—Afr. trop.

URGINEA:—
chlorantha, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 248 = angolensis.
delagoensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 467.—Afr. austr.
Dregei, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
echinostachya, *Baker, l. c.* 468.—Afr. austr.
Forsteri, *Baker, l. c.* 469.—Afr. austr.
Johnstoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 539.—Afr. trop.
kniphofioides, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 469.—Afr. austr.
lilacina, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
mandalensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 536.—Afr. trop.
multisetosa, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 468.—Afr. austr.
natalensis, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
pauciflora, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 539.—Afr. trop.
riparia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 467.—Afr. austr.
rubella, *Baker, l. c.* 467.—Afr. austr.
rupicola, *Trim. ex Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, iv. 292.—Zeylan.
tenella, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 464.—Afr. austr.
virens, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 433.—Afr. austr.
viridula, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 538.—Afr. trop.

URICOLA, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. (1899) 399 errore = **Urceola**, Roxb. (Apocyn.).

UROCHLAENA, Nees (Gramin.).
major, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 382.—Afr. austr.

UROCHLOA, Beauv. (Gramin.).
cimicina, Kunth, Rév. Gram. i. 31 = Axonopus cimicinus.
semialata, Kunth, l. c. = Axonopus semialatus.

UROPETALON, Ker-Gawl. = **Dipcadi**, Medic. (Liliac.).
fesoghlense, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 204 = D. fesoghlense.

UROPHYLLUM, Wall. (Rubiac.).
chloranthum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 57, descr.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 30.—Afr. trop.
divaricatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 427.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 26.—Afr. trop.
liebrechtsianum, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 29.—Afr. trop.
verticillatum, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 30.—Afr. trop.
xanthorrhoeum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 58.—Afr. trop.

UROSPATHA, Schott (Arac.).
Tonduzii, *Engl. in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 364.—Am. cent.

UROSTIGMA, Gasp. = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
Kunthii, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 96 = F. laurifolia.

UROTHECA, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 263 (1897). *MELASTOMACEAE.*
hylophila, *Gilg, l. c.* 264.—Afr. trop.

URTICA, Tourn. (Urtic.).
cardiophylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 191.—Am. bor.
fissa, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 301.—China.
intermedia, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 287.—Eur.
romana, Bub. Fl. Pyren. i. 77 = pilulifera.

URTICASTRUM, O. Kuntze = **Laportea**, Gaudich. (Urtic.).
carruthersianum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 987.—Afr. trop.

URUPARIA, Rafin. = OUROUPARIA, Aubl. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiac.).
celebica, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 393 = Uncaria celebica.
multiflora, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 556.—N. Guin.
Warburgii, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

URVILLEA, H. B. & K. (Sapind.).
macrolopha, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 428 (= *Cardiospermum macrolophum*).—Venez.

UTRICULARIA, Linn. (Lentib.).
andongensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 787.—Afr. trop.
brachyceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 191.—Afr. austr.
floridana, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 105.—Am. bor.
Giletii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 40.—Afr. trop.
janthina, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7466.—Bras.
macrorhyncha, *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 515.—Am. bor.
platensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 81.—Reg. Argent.
Treubi, Kamienski, in Ann. Jard. Buitenz. Suppl. II. 143 = Sandersoni.
tricrenata, *Baker, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 785.—Afr. trop.
triphylla, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xvi. 313.—Bras.
velascoensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 240.—Bolivia.

UVARIA, Linn. (Anonac.).
angustifolia, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 295.—Afr. trop.
Baumannii, *Engl. & Diels, l. c.* 294.—Afr. trop.
bipindensis, *Engl. ex Engl. & Diels, l. c.* 292.—Afr. trop.
Buchholzii, *Engl. & Diels, l. c.* 295.—Afr. trop.
crassipetala, *Engl. ex Engl. & Diels, l. c.* 292.—Afr. trop.
denhardtiana, *Engl. & Diels, l. c.* 293.—Afr. trop.
Dinklagei, *Engl. & Diels, l. c.* 294.—Afr. trop.
gabonensis, *Engl. & Diels, l. c.* 296.—Afr. trop.
gigantea, *Engl. ex Engl. & Diels, l. c.* 292 (non Wall.).—Afr. trop.
huillensis, *Engl. & Diels, l. c.* 296.—Afr. trop.
insculpta, *Engl. & Diels, l. c.* 295.—Afr. trop.
klaineana, *Engl. & Diels, l. c.* 294.—Afr. trop.
leonensis, *Engl. & Diels, l. c.* 293.—Afr. trop.
Mocoli, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 3.—Afr. trop.
mollis, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 295 (non Wall.).—Afr. trop.
Poggei, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Diels, l. c.* 293.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. & Diels, l. c.* 292.—Afr. trop.
verrucosa, *Engl. & Diels, l. c.* 294 (non Scheff.).—Afr. trop.
virens, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 16.—Afr. austr.
Zenkeri, *Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 293.—Afr. trop.

UVARIOPSIS, Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. (1899) 298. *ANONACEAE.*
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

UVIFERA, Linn. Hort. Cliff. 487 (1737) = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).
meissneriana, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 129.—Bolivia.

V

VACCARIA, Medic. = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).
Vaccaria, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 18 = S. Vaccaria.

VACCINIUM, Linn. (Vaccin.).
antipodum, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 664.—Ins. Samoa.
caesium, *Greene, Pittonia*, iii. 249.—Am. bor.
erythrococcum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 301 = microphyllum.
globulare, *Rydb. l. c.* 300.—Am. bor.
laetum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 516.—China.
mandarinorum, *Diels, l. c.*—China.
melanocarpum, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 570.—Am. bor.

VACCINIUM:—
microphyllum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 251 (non Reinw.).—Am. bor.
mindorense, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 355.—Ins. Philipp.
oblongum, *Greene, Pittonia*, iii. 250.—Am. bor.
oblongum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 103.—N. Guin.
poasanum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 395.—Am. cent.
revolutum, *Greene, Pittonia*, iii. 250.—Am. bor.
setosum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 24.—China.

VAGNERA, Adans. = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).
liliacea, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 101 = S. stellata.
pallescens, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 551.—Am. bor.

VAILIA, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 500, 542. *ASCLEPIADACEAE.*
mucronata, *Rusby, l. c.* 542.—Am. bor.

VAILLANTIA, Tourn. (Rubiac.).
Crucialis, Bub. Fl. Pyren. ii. 304 = Galium Cruciata.

VALERANDA, Neck. = **Orphium**, E. Mey. (Gentian.).
frutescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 202 = O. frutescens.

VALERIANA, Tourn. (Valerian.).
alophis, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxvi. 432.—N. Granat.
alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 290 = tripteris.
amphilophis, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxvi. 433.—Peruv.
catharinensis, *Graebn. l. c.* 427.—Bras.
columbiana, *Piper, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 489.—Am. bor.
crassiscaposa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 125.—Patag.
domingensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 450.—Ind. occ.
eichleriana, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxvi. 434 (= *Valerianopsis eichleriana*).—Bras.
exigua, Bub. Fl. Pyren. ii. 292 = dioica.
Faberi, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxiv. *Beibl.* lix. 32.—China.
gilgiana, *Graebn. l. c.* xxvi. 435 (= *Valerianopsis foliosa*).—Bras.
gonatolophis, *Graebn. l. c.* 432.—Ecuador.
Harmsii, *Graebn. l. c.* xxiv. *Beibl.* lix. 32.—China.
Hieronymi, *Graebn. l. c.* xxvi. 431.—Ecuador.
Itatiaiae, *Graebn. l. c.* 435.—Bras.
knautioides, *Graebn. l. c.* 427.—Mexic.
leptothyrsos, *Graebn. l. c.* 425.—Bolivia.
lindaviana, *Graebn. l. c.* 426.—Chili.
micrantha, *E. Nelson, in Erythea*, vii. 166.—Am. bor.
Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 607.—Patag.
Muelleri, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxvi. 435 (= *Valerianopsis angustifolia*).—Bras.
occidentalis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 269.—Am. bor.
Sconleri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 377.—Am. bor.
septentrionalis, *Rydb. l. c.* 376.—Am. bor.
tuberifera, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxvi. 428.—Bolivia.
Ulei, *Graebn. l. c.* 436.—Bras.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 293 = officinalis.
wyomingensis, *E. Nelson, in Erythea*, vii. 167.—Am. bor.

VALERIANELLA, Tourn. (Valerian.).
Aralo-caspia, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 79.—As. cent.
ciliosa, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 548.—Am. bor.
Columnae, Bub. Fl. Pyren. ii. 298 = coronata.
magna, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 548.—Am. bor.

VALERIANOIDES, Medic. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verben.).
boliviana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 254 = S. boliviana.

VALETONIA, Th. Dur. ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. (1896) 460. *OLACACEAE.*
brasiliensis, *Th. Dur. l. c.*—Bras.

VANCLEVEA, Greene, Pittonia, iv. (1899) 50. *COMPOSITAE.*
stylosa, *Greene, l. c.* 51 (= *Grindelia stylosa*).—Am. bor.

VANDA, Jones (Orchid.).
celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 131.—Celebes.
hainanensis, *Rolfe, l. c.* 1896, 199.—China.
Thwaitesii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, iv. 193.—Zeylan.

VANGUERIA, Juss. (Rubiac.).
armata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 69.—Afr. trop.
cana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 456; xxviii. 69.—Afr. trop.
dasyothamnus, *K. Schum. l. c.* xxviii. 70.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 92.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 68.—Afr. austr.
leonensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 457.—Afr. trop.
lichenoxenos, *K. Schum. l. c.* xxviii. 70.—Afr. trop.
monantha, *K. Schum. l. c.* 493.—Afr. trop.
nodulosa, *K. Schum. l. c.* 71, descr.—Afr. trop.
obtusifolia, *K. Schum. l. c.* 493.—Afr. trop.
oxyantha, *K. Schum. l. c.* 72.—Afr. trop.
pygmaea, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 342.—Afr. austr.
rubiginosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 457; xxviii. 72.—Afr. trop.

VANHOUTTEA, Lem. = **Houttea**, Decne. (Gesner.).
calcarata, Lem. in Hortic. Univ. vi. 191, 289 = H. pardina.
Gardneri, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxv. 14 = H. Gardneri.
lanata, Fritsch, l. c. 16.—Bras.

VANILLA, Plum. (Orchid.).
acuminata, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 456.—Afr. trop.
acuta, *Rolfe, l. c.* 453.—Guiana.
aphylla, Eggers, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1889) 21 = Eggersii.
borneensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 460.—Borneo.
carinata, *Rolfe, l. c.* 468.—Bras.
columbiana, *Rolfe, l. c.*—N. Granat.
crenulata, *Rolfe, l. c.* 477.—Afr. trop.
Eggersii, *Rolfe, l. c.* 472.—Ind. occ.
fimbriata, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 133.—Guiana.
Giulianettii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vii. 350.—N. Guin.
Hartii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 133.—Ind. occ.
Hostmanni, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 462.—Guiana.
imperialis, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 155.—Afr. trop.
madagascariensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 476.—Madag.
organensis, *Rolfe, l. c.* 452.—Bras.
ovalifolia, *Rolfe, l. c.* 457.—Afr. trop.
ovata, *Rolfe, l. c.* 451.—Guiana.
philippinensis, *Rolfe, l. c.* 459.—Ins. Philipp.
ramosa, *Rolfe, l. c.* 457.—Afr. trop.
Sprucei, *Rolfe, l. c.* 461.—N. Granat.
Vellozii, *Rolfe, l. c.* 467.—Bras.

VASEYANTHUS, Cogn. (Cucurb.).
Brandegei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 119 (= *Echinocystis Brandegei*).—Calif.
insularis, *Rose, l. c.* 120 (= *Echinopepon insularis*).—Calif.

VAVAEA, Benth. (Meliac.).
papuana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 282.—N. Guin.

VELAEA, DC. (Umbell.).
cordata, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 169 (= *Museniopsis cordata*).—Mexic.
dissecta, Drude, l. c. (= *Museniopsis dissecta*).—Mexic.
peucedanoides, Drude, l. c. (= *Eulophus peucedanoides*).—Mexic.
scabrella, Drude, l. c. (= *Museniopsis scabrella*).—Mexic.
Schaffneri, Drude, l. c. (= *Museniopsis Schaffneri*).—Mexic.

VELAEA:—
serrata, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 170 (= *Museniopsis serrata*).—Mexic.
tenuifolia, Drude, l. c. 169 (= *Museniopsis tenuifolius*).—Mexic.
tenuissima, Drude, l. c. 170 (= *Museniopsis tenuissima*).—Mexic.
ternata, Drude, l. c. 169 (= *Museniopsis ternatus*).—Mexic.
texana, Drude, l. c. (= *Eulophus texanus*).—Am. bor.
tuberosa, Drude, l. c. (= *Museniopsis tuberosa*).—Calif.

VELLEIA, Sm. (Gooden.).
cusackiana, *F. Muell. in Vict. Nat.* xii. 124.—Austral.
rosea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 202.—Austral.

VELLOZIA, Vand. (Amaryll.).
boliviensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 126.—Bolivia.
clavata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 244.—Afr. austr.
equisetoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 411.—Afr. trop.
hereroensis, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Baker, l. c.* 409.—Afr. trop.
macrosiphonia, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 424.—Bras.
retinervis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 244.—Afr. austr.
scabrida, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 410.—Afr. trop.
Schnitzleinia, *Martelli, Fl. Bogos.* (1886) 82.—Afr. trop.
tomentosa, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 412 (non Pohl).—Afr. trop.

VELVITSIA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 177 (1898). *SCROPHULARIACEAE.*
calycina, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

VEPRIS, Comm. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
angolensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 178.—Afr. trop.
bilocularis, Engl. l. c. = T. bilocularis.

VERATRILLA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 310. *GENTIANACEAE.*
Bailloni, *Franch. l. c.* 311.—China.

VERATRUM, Tourn. (Liliac.).
caudatum, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 588.—Am. bor.
speciosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 531.—Am. bor.

VERBASCUM, Tourn. (Scrophul.).
acutifolium, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 136.—Graecia.
adenotrichum, *Halacsy, l. c.* 130.—Graecia.
agrimonioides, *Degen & Borb. ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 46.—Eur.
anatolicum, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 201.—Reg. Cauc.
Baldaccii, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 416.—Albania.
Boissieri, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 758.—Syria.
bracteosum, *Grecescu, Consp. Fl. Roman.* 424.—Eur.
caudatum, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. 160 = Boissieri.
Chazaliei, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 289.—Lycia.
cinereum, *Bub. Fl. Pyren.* i. 334.—Pyren.
dechyanum, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 200.—Reg. Cauc.
epirotum, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 129.—Graecia.
hadschinense, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 45.—As. Min.
hasarense, *Freyn & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 27.—Persia.
leptophyllum, Bub. Fl. Pyren. i. 340 = Blattaria.
longibracteatum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 218.—Arab.
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 332 = Thapsus.
nobile, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 209.—Bulgar.
parallelum, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 52.—Hybr.
pelium, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 131.—Graecia.
pindicolum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 792.—Graecia.

VERBASCUM:—
piscicidum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 151.—Graecia.
pseudoflagriforme, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 51.—Hybr.
Reiseri, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1898, 132.—Graecia.
Rostafinskii, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1897, 112.—Hybr.
Shepardi, *Post, Fl. Syria,* 20.—Syria.
sterile, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 57.—Hybr.
sylvestre, Bub. Fl. Pyren. i. 336 = Lychnitis.
taygeteum, *Halácsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1898, 128.—Graecia.
tempskyanum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 43.—As. Min.
tymphaeum, *Freyn & Sint. l. c.* v. 795.—Graecia.
varians, *Freyn & Sint. l. c.* iv. 44.—As. Min.
Velenovskyi, *Horák, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 208.—Eur.
viscidulum, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 792 (non Pers.).—Graecia.

VERBENA, Linn. (Verben.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 561.—Patag.
aurantiaca, *Speg. l. c.* 563.—Patag.
azorelloides, *Speg. l. c.* 562.—Patag.
confinis, *Greene, Pittonia,* iv. 152.—Am. bor.
connatibracteata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 255.—Reg. Argent.
diversifolia, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
glutinosa, *Kuntze, l. c.* 256.—Reg. Argent.
Halei, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 617.—Am. bor.
Hanseni, *Greene, Pittonia,* iii. 308.—Am. bor.
hystrix, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 15 (non Phil.).—Reg. Argent.
inconcinna, *Briq. l. c.* 19.—Reg. Argent.
intricata, *Briq. l. c.* 16.—Reg. Argent.
Isabellei, *Briq. l. c.* 234.—Bras.
juncea, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. 162 = Diostea juncea.
MacDougalii, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 588.—Am. bor.
microphylla, Phil. in Linnaea, xxix. 21 = minutiflora.
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 256.—Patag.
nubigena, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires,* i. 137.—Reg. Argent.
ochreata, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 18.—Chili.
ourostachya, *Briq. l. c.* 20.—Reg. Argent.
perennis, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 262.—Am. bor.
robusta, *Greene, Pittonia,* iii. 309.—Am. bor.
rudis, *Greene, l. c.* iv. 152.—Am. bor.
sessilis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 257.—Parag.
succulentifolia, *Kuntze, l. c.*—Patag.
tampensis, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 104.—Am. bor.
Toninii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 258.—Patag.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 378 = officinalis.
Wilczekii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1900, 18.—Reg. Argent.

VERBESINA, Linn. (Compos.).
acapulcensis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 551.—Am. cent.
caracasana, *Robinson & Greenm. l. c.* 559.—Venez.
chiapensis, *Robinson & Greenm. l. c.* 554.—Am. cent.
cinerascens, *Robinson & Greenm. l. c.* 555.—Am. cent.
cinerea, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 63.—Bolivia.
crassipes, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 555.—Am. cent.
fastigiata, *Robinson & Greenm. l. c.* 558.—Am. cent.
guatemalensis, *Robinson & Greenm. l. c.* 550.—Am. cent.
Hallii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 43.—Ecuador.
hypargyrea, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 556.—Am. cent.
hypomalaca, *Robinson & Greenm. l. c.* 545.—Am. cent.
inuloides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 45.—Ecuador.
Klattii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 538.—Am. cent.

VERBESINA:—
lanata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 558.—Am. cent.
Lindheimeri, *Robinson & Greenm. l. c.* 541.—Am. bor.
lloënsis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxix. 45.—Ecuador.
Mandonii, *Schultz Bip. ex Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 547, descr.—Bolivia.
molinaria, *Robinson & Greenm. l. c.* 553.—Am. cent.
montanoifolia, *Robinson & Greenm. l. c.* 559.—Am. cent.
nana, *Robinson & Greenm. l. c.* 543.—Am. bor.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxii. 46.—Mexic.
oreopola, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxiv. 550.—Am. cent.
paniculata, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 8 (= *Actinomeris alba*).—Am. bor.
punctata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 561.—Am. cent.
Robinsonii, *Fernald, ex Robinson & Greenm. l. c.* 554.—Am. cent.
Rosei, *Robinson & Greenm. l. c.* 539.—Am. cent.
Rothrockii, *Robinson & Greenm. l. c.* 541.—Am. cent.
rumicifolia, *Robinson & Greenm. l. c.* 560.—Am. cent.
Schaffneri, *Robinson & Greenm. l. c.* 540.—Am. cent.
semidecurrens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 183.—Bolivia.
Smithii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 46.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 44.—Ecuador.
Soratae, *Schultz Bip. ex Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 551, descr.—Bolivia.
stenophylla, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxii. 309.—Mexic.
trilobata, *Robinson & Greenm. l. c.* 46.—Mexic.
variabilis, *Robinson & Greenm. l. c.* 47.—Mexic.
xanthochlora, *Robinson & Greenm. l. c.* xxxiv. 551.—Am. cent.

VERINEA, Merino, in Anal. Soc. Espan. Hist. Nat. xxviii. (1899) 8. *GRAMINEAE.*
pterostachys, *Merino, l. c.* 9.—Eur.

VERNONIA, Schreb. (Compos.).
amblyolepis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
Antunesii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 17.—Afr. trop.
areysiana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 104.—Arab.
armerioides, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 462.—Afr. trop.
asclepiadea, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 238.—Madag.
asterifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
auriculifera, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 539.—Afr. trop.
Balansae, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 690.—Am. austr.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 52.—Bolivia.
Bellinghamii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 155.—Afr. trop.
benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 536.—Afr. trop.
Bernieri, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 238.—Madag.
betsilensis, *Drake, l. c.* 243.—Madag.
britteniana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 533.—Afr. trop.
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
Calulu, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 525.—Afr. trop.
Campenoni, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 241.—Madag.
capitata, *Drake, l. c.* 228 (= *Distephanus capitatus*).—Madag.
cardiolepis, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 12.—Afr. trop.
carnea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 526.—Afr. trop.
cataractarum, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 681.—Am. austr.
Catati, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 243.—Madag.
catumbensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 524.—Afr. trop.
caudata, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.
centauroides, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 824 (non Sch. Bip.).—Afr. austr.
Chapelieri, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 234.—Madag.

VERNONIA:—
chloropappa, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
chthonocephala, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 17.—Afr. trop.
clinopodioides, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 465.—Afr. trop.
collina, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 374.—Afr. austr.
collina, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 824.—Afr. austr.
colorata, Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 230 = senegalensis.
costata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 53.—Bolivia.
cruda, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 456.—Afr. trop.
daphnifolia, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 18.—Afr. trop.
declivium, *Malme, in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 26.—Bras.
Dekindtii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 18.—Afr. trop.
dumeta, *Klatt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 277.—Am. cent.
Dupuisii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 825; *et in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo,* i. 170.—Afr. trop.
eremanthifolia, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 15.—Afr. trop.
eriocephala, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 826.—Afr. trop.
eriophylla, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 230.—Madag.
eritreana, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 826.—Afr. trop.
exsertiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 147.—Afr. trop.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 369.—China.
filipendula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 536.—Afr. trop.
flaccidifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 144.—Am. bor.
flaviflora, Boiv. ex Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 231 = leucolepis.
Galpinii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 827.—Afr. austr.
glaberrima, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 15.—Afr. trop.
glanduloso-dentata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 701.—Am. austr.
goetzeana, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 503.—Afr. trop.
Goetzenii, *O. Hoffm. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 9, descr.—Afr. trop.
Goudotii, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 239.—Madag.
Grandidieri, *Drake, l. c.* 240.—Madag.
Grevei, *Drake, l. c.*—Madag.
hamata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 456.—Afr. trop.
Hensii, *Klatt, l. c.* 828.—Afr. trop.
Hieronymi, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 382.—Bolivia.
hispidula, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 236.—Madag.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 526.—Afr. trop.
Humbloti, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 235.—Madag.
humilis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 269.—Afr. trop.
Ikopae, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 244.—Madag.
interior, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 279.—Am. bor.
jubifera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 53.—Bolivia.
karongensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 147.—Afr. trop.
Kreismanni, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 517.—Afr. trop.
Kuntzei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 678.—Bolivia.
lampropappa, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 14.—Afr. trop.
lantziana, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 233.—Madag.
lappoides, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 19 (non Baker).—Afr. trop.
lasiolepis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 464.—Afr. trop.
Lastellii, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 232.—Madag.
lepidophylla, *Drake, l. c.* 229.—Madag.

VERNONIA:—
leptolepis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 147 (non O. Hoffm.).—Afr. trop.
lithospermifolia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 694.—Bras.
littoralis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 3.—Mexic.
Lorentzii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 674.—Reg. Argent.
loretensis, *Hieron. l. c.* 676.—Reg. Argent.
macrocyanus, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 20.—Afr. trop.
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
mattogrossensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 696.—Bras.
maxima, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 280.—Am. bor.
meiocalyx, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 155.—Afr. trop.
mumpullensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 530.—Afr. trop.
myriotricha, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
Napus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 463.—Afr. trop.
niagarensis, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 507, errore = ulugurensis.
Niederleinii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 681.—Reg. Argent.
oligocephala, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 458 (non aliorum).—Afr. austr.
orchidorrhiza, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 530.—Afr. trop.
oreophila, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 5, 26.—Bras.
papillosa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 368.—China.
Perrieri, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 229.—Madag.
Phillipsiae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 154.—Afr. trop.
phyllodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 525.—Afr. trop.
plantaginoides, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 686 (non DC.).—Urug.
platylepis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 236.—Madag.
polysphaera, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
praecox, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 382 (non Welw.).—Reg. Argent.
praecox, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 16.—Afr. trop.
pratensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 523 (non Klatt).—Afr. trop.
propinqua, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 695.—Reg. Argent.
pseudolinearifolia, *Hieron. l. c.* 679.—Urug.
pseudonudiflora, *Hieron. l. c.* 703.—Urug.
pseudosquarrosa, *Hieron. l. c.* 685.—Reg. Argent.
pulchella, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 145.—Am. bor.
quangensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 463.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 369.—Afr. trop.
rhodophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 19.—Afr. trop.
rigescens, *Malme, in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 27.—Bras.
rigidifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 535.—Afr. trop.
robusta, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 54.—Bolivia.
rufopapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 699.—Bras.
saltensis, *Hieron. l. c.* 691.—Reg. Argent.
Sanctae-Mariae, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 241.—Madag.
Sancti Pauli, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 687.—Bras.
santacruzensis, *Hieron. l. c.* 699.—Bolivia.
scabra, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 382, errore = carnea.
scabrifoliata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 677.—Bras.
scariosa, Baker, in Journ. Bot. 1882, 169 = lepidophylla.
scapiformis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 244.—Madag.
Schlechteri, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 466.—Afr. austr.
sclerophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 13.—Afr. trop.
sculptifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 523.—Afr. trop.

VERNONIA:—
sericolepis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxix. 466.—Afr. trop.
setososquamosa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 684.—Reg. Argent.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 1.—Ecuador.
sordidopapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 697.—Bolivia.
sphacelata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 828.—Afr. trop.
stipulacea, *Klatt, l. c.* 457.—Afr. austr.
Stuhlmannii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 465.—Afr. trop.
subacuminata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 691.—Bolivia.
sublanata, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.
suprafastigiata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 458.—Afr. trop.
tarijensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 682.—Bolivia.
Taylorii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 154.—Afr. trop.
temnolepis, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 11.—Afr. trop.
tenuifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 145.—Am. bor.
tigna, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 829.—Afr. trop.
trinervis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 228.—Madag.
tristis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 683.—Bolivia.
trixioides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 54.—Bolivia.
Ulei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 686.—Bras.
ulophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 13.—Afr. trop.
ulugurensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 464.—Afr. trop.
vaginata, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 14.—Afr. trop.
velutina, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 697.—Bras.
vernicosa, *Klatt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 294.—Am. cent.
Vilersii, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 229.—Madag.

VERONICA, Tourn. (Scrophul.).
Allenii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 263.—Am. bor.
azurea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 277 (non Link).—N. Zel.
balfouriana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7556.—N. Zel.
Barkerii, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 421.—N. Zel.
coxiana, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 529.—N. Zel.
dasyphylla, *T. Kirk, l. c.* 519.—N. Zel.
debilis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 56.—As. Min.
erecta, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 517.—N. Zel.
Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 21.—China.
filicaulis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 796 (non Halacsy).—Persia.
Formaneki, *Heldr. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 321.—Graecia.
Fuchsii, Bub. Fl. Pyren. i. 291 = V. Teucrium.
Gibsii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 524.—N. Zel.
gilliesiana, *T. Kirk, l. c.* 519.—N. Zel.
glareosa, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 206.—Reg. Cauc.
glaucophylla, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 422.—N. Zel.
Hillii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 606 (non T. Kirk).—N. Zel.
Hillii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 524.—N. Zel.
humifusa, *Bub. Fl. Pyren.* i. 294.—Pyren.
insularis, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 392.—N. Zel.
latisepala, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 530.—N. Zel.
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 152.—Graecia.
marginata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 608.—N. Zel.
miniana, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* 116.—Galic.
Olsenii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 607.—N. Zel.

VERONICA:—
Petriei, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 517.—N. Zel.
pirolaeformis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 20.—China.
polyphylla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 277.—N. Zel.
quadrifaria, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 521.—N. Zel.
rotundata, *T. Kirk, l. c.* 530.—N. Zel.
squalida, *T. Kirk, l. c.* 528.—N. Zel.
subalpina, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 420.—N. Zel.
subrosulata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 278.—N. Zel.
subsimilis, *Colenso, l. c.*—N. Zel.
sumilensis, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 55.—As. Min.
sutchuensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 20.—China.
thessala, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 181; et in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 197, 321 = Formaneki.
truncatula, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 276.—N. Zel.
tumida, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 521.—N. Zel.
uniflora, *T. Kirk, l. c.* 522.—N. Zel.

VERTICORDIA, DC. (Myrtac.).
darwinioides, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 17.—Austral.
Helmsii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 190.—Austral.
rennicana, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. 400, sphalm. = rennieana.

VIBURNUM, Linn. (Caprifol.).
ceanothoides, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 23.—China.
Demetrionis, *Deane & Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 167.—Am. bor.
pallidum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 308.—China.
rufotomentosum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 410.—Am. bor.
Sargenti, *Koehne, in Gartenfl.* 1899, 341.—China.
Treleasei, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 255.—Ins. Azor.

VICIA, Tourn. (Legum.).
Agerii, Bub. Fl. Pyren. ii. 541 = hybrida.
brachytropis, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1842, 347.—Sibir. altaic.
branchitropis, Kar. & Kir. l. c. 1841, 412 = praec.
caespitosa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 373.—Am. bor.
ciliata, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. 293 = ciliatula.
ciliatula, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, iv. 289.—Reg. Caucas.
communis, Rouy, Fl. Fr. v. 208 = sativa, etc.
eriocarpa, *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* i. 489.—Eur.
Hugeri, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 490.—Am. bor.
Morenonis, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 73.—Patag.
pauciflora, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 365 (non aliorum).—Eur.

VIGNA, Savi (Legum.).
Buchneri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 310.—Afr. trop.
Clarkei, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 429.—Reg. Himal.
Fischeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 310.—Afr. trop.
Holstii, *Harms, l. c.* 311.—Afr. trop.
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
mensensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* II. 261.—Afr. trop.
micrantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 311.—Afr. trop.
platyloba, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 257.—Afr. trop.
procera, *Welw. ex Hiern, l. c.* 256.—Afr. trop.
punctata, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 62.—Afr. trop.

VIGUIERA, H. B. & K. (Compos.).
chimboensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 38.—Ecuador.
drymonia, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 287.—Am. cent.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 45.—Mexic.

VILFA, Beauv. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).
capensis, Beauv. Agrost. 16 = S. indicus.
commutata, Trin. Gram.Unifl.156 = S. coromandelianus.
discospora, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 59 = S. coromandelianus.
geniculata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 156 = S. tremulus.
roxburghiana, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = S. coromandelianus.
Roxburghii, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 59 = S. coromandelianus.
ruppeliana, Steud. Syn. Pl. Gram. 162 = S. indicus.
scabrifolia, Hochst. ex Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 196 = S. glaucifolius.
setulosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 55 = Heleochloa dura.

VILLAMILLA, Ruiz & Pav. (Phytolacc.).
rosea-oenia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 110 (= *Ledenbergia roseo-aenea*).—Bolivia.

VILLARESIA, Ruiz & Pav. (Olacac.).
citrifolia, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo,* i. 44.—Hort.
engleriana, *Loesen. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 20.—Afr. trop.

VINCENTIA, Gaudich. = **Cladium**, P. Br. (Cyper.).
macrophylla, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 112.—Bras.

VINCETOXICUM, Rupp. (Asclep.).
acuminatum, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 431 (= *Gonolobus acuminatus*).—Mexic.
adriaticum, *R. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xiii. 30.—Eur.
africanum, Bolus, ex Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 457 = pilosum.
capense, Schlechter, l. c. = Cynanchum capense.
crenatum, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 429.—Mexic.
floridanum, *Vail, l. c.*—Am. bor.
Greggii, *Vail, l. c.* 430.—Mexic.
intermedium, *Taliew, in Trav. Soc. Nat. Kharkow,* xxxiv. 251.—Eur.
obtusifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 200.—Afr. austr.
productum, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 431 (= *Gonolobus productus*).—Am. bor.
umbellatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 78.—Bolivia.
unguiculatum, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 499.—Bolivia.

VIOLA, Tourn. (Violac.).
albanica, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 141.—Graecia.
albida, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 30.—Corea.
alsophila, *Greene, Pittonia,* iv. 7.—Am. bor.
amorphophylla, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 129.—Am. bor.
atlantica, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 92 (non Pomel).—Am. bor.
atriplicifolia, *Greene, Pittonia,* iii. 38.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* 307.—Am. bor.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 5.—Am. trop.
beckiana, *F. Fiala, ex Beck, in Wien. Ill. Gart. Zeit.* 1896, 197.—Bosnia.
bicolor, *Reiche & Johow, Fl. Chile,* i. 149 (non Gilib.).—Chili.
brittoniana, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 332.—Am. bor.
Cadevalli, *Pau, in Bol. Acad. Ci. Barcelona,* Ser. III. i. XIII. 62.—Eur.
carolina, *Greene, Pittonia,* iii. 259.—Am. bor.
cognata, *Greene, l. c.* 145.—Am. bor.
communis, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 336.—Am. bor.
commutata, *Waisb. in Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 3, nomen.—Eur.
conjugens, *Greene, Pittonia,* iv. 3.—Am. bor.
cuspidata, *Greene, l. c.* iii. 314.—Am. bor.
cyclophylla, *Greene, l. c.* iv. 7.—Am. bor.

VIOLA :—
dactylifera, *Greene, Pittonia,* iii. 317.—Am. bor.
deltoidea, *Greene, l. c.* 317 (non Yatabe).—Am. bor.
Dicksonii, *Greene, l. c.* iv. 65.—Am. bor.
Doerfleri, *Degen, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien,* lxiv. 710.—Eur.
domestica, *Bickn. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 519.—Am. bor.
elegantula, *Greene, Pittonia,* iv. 66.—Am. bor.
erectifolia, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxix. 143.—Am. bor.
eximia, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxviii. 221.—Eur.
falcata, *Greene, Pittonia,* iv. 3.—Am. bor.
flaccida, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* 1899 (242).—Japon.
flavovirens, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 405.—Am. bor.
Flettii, *Piper, in Erythea,* vi. 69.—Am. bor.
Hookeri, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 508, errore = Vicia Hugeri.
insignis, Pollard, in Coult. Bot. Gaz. xxvi. 334 = vicinalis.
Langloisii, *Greene, Pittonia,* iii. 87.—Am. bor.
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 154.—Graecia.
leucocentra, Pinkw. in Baenitz, Herb. Eur. 1897, 3 = sylvestris.
Macounii, *Greene, Pittonia,* iii. 335.—Am. bor.
missouriensis, *Greene, l. c.* iv. 141.—Am. bor.
mistassinica, *Greene, l. c.* 5.—Am. bor.
montanensis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 263.—Am. bor.
monticola, *Rydb. l. c.* 264 (non Jord.).—Am. bor.
Muretii, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais,* xvi. 262.—Hybr.
nephrophylla, *Greene, Pittonia,* iii. 144.—Am. bor.
nivalis, Benth. Pl. Hartw. 160 = Bangii.
occidentalis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 69.—Am. bor.
odontophora, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 264.—Am. bor.
oxyceras, *Greene, Pittonia,* iii. 255.—Am. bor.
pachyrhizonia, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais,* xxvi. 258.—Eur.
pindicola, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 334.—Eur.
populifolia, *Greene, Pittonia,* iii. 337.—Am. bor.
porteriana, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 404.—Am. bor.
pratincola, *Greene, Pittonia,* iv. 64.—Am. bor.
pruinosa, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 130.—Am. bor.
psychodes, *Greene, Pittonia,* iii. 318.—Am. bor.
puberula, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 72 (non Lange).—Am. bor.
pulchella, *Leyb. ex Reiche & Johow, Fl. Chile,* i. 153 (non Salisb.).—Chili.
Rafinesquii, *Greene, Pittonia,* iv. 9.—Am. bor.
retusa, *Greene, l. c.* 6.—Am. bor.
Reverchonii, *Wenk, in Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 6 (non Willk.).—Eur.
rhodopensis, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 21.—Bulgar.
riddensis, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais,* xxvi. 260.—Hybr.
Rosthornii, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 477.—China.
sarmentosa, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 80 = sempervirens.
sedunensis, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais,* xxvi. 261.—Hybr.
sempervirens, *Greene, Pittonia,* iv. 8.—Am. bor.
septentrionalis, *Greene, l. c.* iii. 334.—Am. bor.
sermenika, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 75.—Graecia.
Slavikii, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxviii. 220.—Eur.
subcordata, *Greene, Pittonia,* iii. 316.—Am. bor.
subsagittata, *Greene, l. c.* 315.—Am. bor.
subsinuata, *Greene, l. c.* iv. 4.—Am. bor.
subvestita, *Greene, in Erythea,* v. 39.—Am. bor.
tenella, Rafin. in Amer. Monthly Mag. 1819, 191 = Rafinesquii.
Thorii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 193.—Am. bor.
vagula, *Greene, Pittonia,* iv. 67.—Am. bor.
vallicola, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 128.—Am. bor.

VIOLA :—
venosa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 262 = aurea.
venustula, *Greene, Pittonia,* iii. 335.—Am. bor.
vicinalis, *Greene, l. c.* iv. 9.—Am. bor.
vilmoriniana, *Delacour & Mottet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 120.—Gallia.
vittata, *Greene, Pittonia,* iii. 258.—Am. bor.
Watsonii, *Greene, l. c.* iv. 5.—Am. bor.

VIRECTA, Afzel. (Rubiac.).
heteromera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 422.—Afr. trop.
salicoides, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.
suffruticosa, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 318, nomen (non Buch-Ham.).—Afr. trop.

VIROLA, Aubl. = **Myristica**, Linn. (Myristicac.).
Araujovii, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. 208.—Bras.
Bicuhyba, Warb. l. c. 194 = M. Bicuhyba.
boliviensis, Warb. l. c. 184.—Bolivia.
calophylla, Warb. l. c. 231.—Bras.
carinata, Warb. l. c. 222 = M. carinata.
cuspidata, Warb. l. c. 176 = M. cuspidata.
elongata, Warb. l. c. 178 = M. elongata.
Gardneri, Warb. l. c. 192 = M. Gardneri.
Glaziovii, Warb. l. c. 219.—Bras.
guatemalensis, Warb. l. c. 220.—Bras.
incolor, Warb. l. c. 232.—N. Granat.
Mocoa, Warb. l. c. 183 = M. Mocoa.
mollissima, Warb. l. c. 167 = M. mollissima.
officinalis, Warb. l. c. 228 = M. officinalis.
panamensis, Warb. l. c. 185 = M. panamensis.
peruviana, Warb. l. c. 188 = M. peruviana.
rufula, Warb. l. c. 181.—Bras.
rugulosa, Warb. l. c. 227.—Bras.
Schwackei, Warb. l. c. 180.—Bras.
sessilis, Warb. l. c. 190 = M. sessilis.
subsessilis, Warb. l. c. 191 = M. subsessilis.
surinamensis, Warb. l. c. 208 = M. surinamensis.
theiodora, Warb. l. c. 187 = M. theiodora.
urbaniana, Warb. l. c. 168.—Bras.
venezuelensis, Warb. l. c. 182.—Venez.
venosa, Warb. l. c. 224 = M. venosa.

VISCUM, Tourn. (Loranth.).
Aitchisoni, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 190.—Afghanistan.
Bakeri, *Van Tiegh. l. c.* 190.—Madag.
bivalve, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 140 (= *Aspidixia bivalvis*).—Afr. austr.
Boivini, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 189.—Madag.
congolense, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 44.—Afr. trop.
elegans, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 140.—Afr. trop.
Engleri, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 190.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 44.—Afr. trop.
grandifolium, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 140.—Afr. trop.
Jussodii, *Engl. l. c.*—Afr. austr.
lenticellatum, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 45.—Afr. trop.
pendulum, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies,* i. 817.—Ins. Sandw.
Staudtii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 140.—Afr. trop.
subserratum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 504.—Afr. austr.
Zenkeri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 140.—Afr. trop.

VISNAGA, Gaertn. = **Ammi**, Tourn. (Umbell.).
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 350 = A. majus.

VITEX, Tourn. (Verben.).
aesculifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 325.—Afr. trop.
andongensis, *Baker, l. c.* 329.—Afr. trop.
bantamensis, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* ii. 12.—Java.
barbata, *Planch. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 323.—Afr. trop.

VITEX:—
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 134.—Afr. trop.
cuspidata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 835.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 133.—Afr. trop.
divaricata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 327 (non Sw.).—Afr. trop.
diversifolia, *Baker, l. c.* 323 (non Kurz).—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 464.—Afr. trop.
golungensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 330.—Afr. trop.
gomphophylla, *Baker, l. c.* 319.—Afr. trop.
grisea, *Baker, l. c.* 325.—Afr. trop.
guerkeana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 835 = ferruginea.
Hemsleyi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 347.—Mexic.
holocalyx, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.
holophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.
huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 837 = grisea.
iringensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 464.—Afr. trop.
Kirkii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 321.—Afr. trop.
laevigata, *Baker, l. c.* 330 (non Herb. Madr.).—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.
oligantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 327.—Afr. trop.
oxycuspis, *Baker, l. c.* 326.—Afr. trop.
pachyphylla, *Baker, l. c.* 328.—Afr. trop.
polyantha, *Baker, l. c.* 321.—Afr. trop.
puberula, *Baker, l. c.* 330.—Afr. trop.
quadrangulus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 463.—Afr. trop.
Rehmanni, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 818.—Afr. austr.
Schweinfurthii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Guerke, in Engl. Jahrb. xviii. 170 = madiensis.
shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 326.—Afr. trop.
Sprucei, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 346.—Reg. Amazon.
sulphurea, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 317.—Afr. trop.
Vogelii, *Baker, l. c.* 319.—Afr. trop.
Wilmsii, *Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 76.—Afr. austr.
zambesiaca, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.

VITIS, Tourn. (Ampel.).
alata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 40.—Bolivia.
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 393.—Ins. Andaman.
apodophylla, Baker, in Kew Bull. 1897, 248 = zombensis.
armata, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 462.—China.
betulifolia, *Diels & Gilg, l. c.* 461.—China.
cradockensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 40.—Afr. austr.
cuneifolia, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
cussoniodes, *Kuntze, l. c.* 41.—Afr. austr.
Gardineri, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 283.—Austral.
goyazensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 443.—Bras.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 396.—Penins. Mal.
Lawsoni, *King, l. c.* 394.—Penins. Mal.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
obliqua, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 41.—Peruv.; Bolivia.
pentagona, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 460 (non aliorum).—China.
repandospinulosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 41.—Afr. austr.
Scortechini, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 392.—Penins. Mal.
strigosa, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 281.—Austral.
Treleasei, *Munson, ex Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 423.—Am. bor.
trichoclada, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 461.—China.

VITIS:—
tuberculata, Lawson, in Hook. f. Fl. Br. Ind. i. 656 = Lawsoni.
unifoliata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 41.—Afr. austr.
variifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 248.—Afr. trop.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 394.—Penins. Mal.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.

VIVIANIA, Cav. (Geran.).
elegans, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 292.—Chili.
macrophylla, *Reiche & Johow, l. c.* 293.—Chili.
microphylla, *Reiche & Johow, l. c.*—Chili.
viridis, *Phil. ex Reiche & Johow, l. c.* 292.—Chili.

VLECKIA, Rafin. = **Lophanthus**, Benth. (Labiat.).
occidentalis, Piper, in Erythea, vi. 31.—Am. bor.

VOACANGA, Thou. (Apocyn.).
angolensis, *Stapf, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 668.—Afr. trop.
papuana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 396 (= *Orchipeda papuana*).—N. Guin.

VOCHISIA, Juss. (Vochys.).
douradensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 440.—Bras.
Goeldii, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 383.—Bras.
mapirensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 7.—Bolivia.
Radlkoferi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 12.—Bolivia.

VOLKENSIOPHYTON, Lindau = **Lepidagathis**, Willd. (Acanth.).
neuracanthoides, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 27 = L. scariosa.

VOLUTARELLA, Cass. (Compos.).
albicaulis, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 109.—Arab.

VOSSIA, Wall. & Griff. (Gramin.).
cuspidata, Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 153 = procera.
speciosa, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. 70 = Rottboellia speciosa.

VRIESIA, Lindl. = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).
brassicoides, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 598 = T. brassicoides.
caldasiana, Mez, l. c. 607.—Bras.
dissitiflora, Mez, l. c. 604 = T. dissitiflora.
disticha, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 304 = T. heliconioides.
drepanocarpa, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 581 = T. drepanocarpa.
Gamba, Fr. Mueller, in Flora, 1897, 460.—Bras.
guadaloupensis, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 596 = T. guadelupensis.
hydrophora, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1899, 2.—Bras.
laxa, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 578 = T. laxa.
longibracteata, Mez, l. c. 568 = T. longibracteata, *Baker*.
longiscapa, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1900, 323.—Bras.
macrostachya, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 601 = T. platynema.
pachychlamys, Mez, l. c. 594.—Guiana.
panniculata, Mez, l. c. 614 = T. paniculata.
paradoxa, Mez, l. c. 604.—Bras.
sceptrum, Mez, l. c. 606.—Bras.
schwackeana, Mez, l. c. 590.—Bras.
siebertiana, Hort. in Journ. Soc. Hort. Fr. 1899, 665.—Hab.?
stenostachya, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 564 = T. stenostachya.
tucumanensis, Mez, l. c. 585.—Reg. Argent.
ventricosa, Mez, l. c. 583 = T. corcovadensis.

VROEDEA, Bub. Fl. Pyren. i. 230 (1897) = **Glaux**, Tourn. (Primul.).
maritima, Bub. l. c. 231 = G. maritima.

VRYDAGZYNEA, Blume (Orchid.).
lancifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 398.—Penins. Mal.
tristriata, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

VULNERARIA, Tourn. = **Anthyllis**, Riv. (Legum.).
Caesalpini, Bub. Fl. Pyren. ii. 469 = A. tetraphylla.
gracilis, Bub. l. c. 467 = A. cytisoides.

VULVARIA, Bub. Fl. Pyren. i. 174 (1897) = **Chenopodium**, Tourn. (Chenopod.).
albescens, Bub. l. c. 176 = C. album.
ambrosioides, Bub. l. c. 178 = C. ambrosioides.
Botrys, Bub. l. c. 177 = C. Botrys.
deltoidea, Bub. l. c. 176 = C. urbicum.
opulifolia, Bub. l. c. = C. opulifolium.
polysperma, Bub. l. c. 175 = C. polyspermum.
stramoniifolia, Bub. l. c. 177 = C. hybridum.
trachisperma, Bub. l. c. = C. murale.
vulgaris, Bub. l. c. 175 = C. Vulvaria.

W

WACHENDORFIA, Burm. (Haemodor.).
hirsuta, Thunb. Prod. Pl. Cap. 12 = paniculata.
tenella, Thunb. l. c. = paniculata.
villosa, Andr. Bot. Rep. t. 398 = paniculata.

WAHLENBERGIA, Schrad. (Campan.).
brachycarpa, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 429.—Afr. austr.
depressa, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
Galpiniae, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343.—Afr. austr.
hederifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 18 = hederacea.
intermedia, *A. Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1900, 518.—Bras.
luristanica, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 791 (= *Campanula luristanica*).—Persia.
polytrichifolia, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 392.—Afr. austr.
psammophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 192.—Afr. austr.
pygmaea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 273.—N. Zel.
rivularis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 111.—Afr. austr.
schwackeana, *A. Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1900, 517.—Bras.

WALDSTEINIA, Willd. (Rosac.).
parviflora, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 137.—Am. bor.

WALLACEODENDRON, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. (1898) 630. *LEGUMINOSAE*.
celebicum, *Koord. l. c.* 631.—Celebes.

WALSURA, Roxb. (Meliac.).
cochinchinensis, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 302 (= *Heynea cochinchinensis*).—Cochinch.
elata, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 355 B.—Cochinch.

WALTHERIA, Linn. (Stercul.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 184.—Mexic.
acuminata, *Rose, l. c.* 183.—Mexic.
calcicola, *Urb. Symb. Antill.* i. 475.—Ind. occ.
operculata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 183.—Mexic.
rhombifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 3.—Am. cent.

WARDENIA, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. (1898) 60. *ARALIACEAE*.
simplex, *King, l. c.*—Penins. Mal.

WAREA, Nutt. (Crucif.).
sessilifolia, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 101.—Am. bor.

WASABIA, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xiii. (1899) 71. *CRUCIFERAE*.
hederaefolia, *Matsum. l. c.* 72 (= *Eutrema hederaefolia*).—Japon.
pungens, *Matsum. l. c.* 71 (= *Eutrema Wasabi*).—Japon.

WASHINGTONIA, Rafin. in Amer. Monthly Mag. ii. (1818) 176 = **Osmorhiza**, Rafin. (Umbell.).
ambigua, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 69 (= *Glycosma ambiguum*).—Am. bor.
Bolanderi, Coult. & Rose, l. c. 68 (= *Myrrhis Bolanderi*).—Calif.

WASHINGTONIA:—
brachypoda, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = O. brachypoda.
brevipes, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 66.—Calif.
Claytoni, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 530 = O. brevistylis.
divaricata, Britton, l. c. 531 = O. nuda.
intermedia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 289.—Am. bor.
Leibergi, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 66.—Am. bor.
longistylis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 530 = O. longistylis.
nuda, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = O. nuda.
obtusa, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 64.—Am. bor.
occidentalis, Coult. & Rose, l. c. 67 (= *Myrrhis occidentalis*).—Am. bor.
purpurea, Coult. & Rose, l. c.—Am. bor.

WATSONIA, Mill. (Irid.).
Ardernei, Sand. Cat. 1899, 44 = W. Meriana.
gladioloides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 222.—Afr. austr.
longicollis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 106.—Afr. austr.
spectabilis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 14.—Afr. austr.

WEDELIA, Jacq. (Compos.).
albiflora, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 577.—Afr. trop.
diversipapposa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 401.—Afr. trop.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 576.—Afr. trop.
Stirlingi, *Tate, Rep. Horn Exped.* iii. 188, descr.—Austral.
triternata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 839.—Afr. trop.

WEIHEA, Spreng. (Rhizoph.).
Flanaganii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* v. 868.—Afr. austr.
Gerrardii, *Schinz, l. c.* 867.—Afr. austr.
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.
rotundifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 440.—Afr. trop.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 450, 640.—Celebes.

WELWITSCHIELLA, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 416 = seq.

WELWITSCHIINA, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 416. *MENISPERMACEAE.*
macrophylla, *Engl. l. c.* (= *Chondodendron macrophyllum*).—Afr. trop.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiac.).
arabica, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 104.—Arab.

WENDTIA, Meyen (Geran.).
trigyna, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 33 = poeppigiana.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.).
boraginifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 184.—Bolivia.
caulescens, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 74 (non Griseb.).—Ecuador.

WHITFIELDIA, Hook. (Acanth.).
arnoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 109.—Afr. trop.
Brazzei, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 67.—Afr. trop.
elongata, *C. B. Clarke, l. c.* 66.—Afr. trop.
elongata, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 110 = longifolia.
Laurentii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 68.—Afr. trop.
liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 111.—Afr. trop.
longiflora, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 229 = subviridis, longifolia.
perglabra, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 66.—Afr. trop.
Preussii, *C. B. Clarke, l. c.* 67.—Afr. trop.

WHITFIELDIA:—
Stuhlmanni, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 68.—Afr. trop.
subviridis, *C. B. Clarke, l. c.* 66.—Afr. trop.
tanganyikensis, *C. B. Clarke, l. c.* 67.—Afr. trop.

WIDGRENIA, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7 (1900) 69. *ASCLEPIADACEAE.*
corymbosa, *Malme, l. c.*—Bras.

WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.).
Hanalei, *Wawra, in Flora*, 1875, 185.—Ins. Hawaii.
stenophylla, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 480.—China.
trichotoma, Makino, Bot. Notes Fl. Jap. v. (1898) 5 = japonica.

WILKIEA, F. Muell. (Monim.).
Wardelli, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. 570 (= *Mollinedia Wardellii*).—Austral.

WILLDENOWIA, Thunb. (Restiac.).
decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
fraterna, *N. E. Br. l. c.* 756.—Afr. austr.
Galpinii, *N. E. Br. l. c.* 757.—Afr. austr.
peninsularis, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.
simplex, *N. E. Br. l. c.* 756.—Afr. austr.

WILLKOMMIA, Sch. Bip. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
Newtonii, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iv. 810.—Afr. trop.

WILLUGBAEYA, Neck. = **Mikania**, Willd. (Compos.).
dioscoreoides, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 58.—Bolivia.
ferruginea, Rusby, l. c.—Bolivia.
longiacuminata, Rusby, l. c.—Bolivia.
phyllopoda, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 184 = M. phyllopodon.
ranunculifolia, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 106 = M. ranunculifolia.

WILLUGHBEIA, Roxb. (Apocyn.).
Beccarii, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 55 (= *Ancylocladus Beccarii*).—Malaya.
curtisiana, *K. Schum. l. c.*—Penins. Mal.
glaucina, *K. Schum. l. c.*—Borneo.
minutiflora, *K. Schum. l. c.*—Borneo.
nodosa, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 55.—Borneo.
sarawacensis, *K. Schum. l. c.*—Borneo.
vrieseana, *K. Schum. l. c.*—Borneo.

WINDMANNIA, P. Br. = **Weinmannia**, Linn. (Saxifr.).
cochabambensis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 33.—Bolivia.
sessilifolia, Rusby, l. c.—Bolivia.

WINKLERA, Regel (Crucif.).
silaifolia, *Korsh. in Bull. Acad. Péters.* Sér. V. ix. 419 (= *Heldreichia silaifolia*).—As. cent.

WISSADULA, Medic. (Malvac.).
acuminata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 144.—Mexic.
cincta, *Rose, l. c.* 178 (= *Abutilon cinctum*).—Mexic.
hirsutiflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 79 (= *Bastardia viscosa*).—Mexic.
paniculata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 178.—Mexic.
spicata, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 236 (= *Sida spicata*, Cav.).—Ind. occ.
tricarpellata, *Robinson & Greenm. ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 179.—Mexic.
trilobata, *Rose, l. c.* 178 (= *Abutilon trilobatum*).—Mexic.
wissaduloides, *Robinson & Greenm. ex Rose, l. c.* 179 (= *Abutilon wissaduloides*).—Mexic.

WITTMACKIA, Mez (Bromel.).
Glaziovii, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 142.—Bras.

WOLFFIA, Horkel (Lemnac.).
floridana, *O. D. Smith, ex Hegelm. in Engl. Jahrb.* xxi. 305.—Am. bor.
papulifera, *C. H. Thompson, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 40.—Am. bor.

WOLFFIELLA, Hegelm. in Engl. Jahrb. xxi. (1895) 303. *LEMNACEAE.*
denticulata, *Hegelm. l. c.* 305 (= *Wolffia denticulata*).—Afr. austr.
floridana, *C. H. Thompson, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 37 (= *Wolffia floridana*).—Am. bor.
gladiata, *Hegelm. in Engl. Jahrb.* xxi. 304 (= *Wolffia gladiata*).—Mexic.
lingulata, *Hegelm. l. c.* 303 (= *Wolffia lingulata*).—Bras.
oblonga, *Hegelm. l. c.* (= *Wolffia oblonga*).—Chili.

WOODIA, Schlechter (Asclep.).
marginata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 9 = trifurcata.

WOODROWIA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2447 (1896). *GRAMINEAE.*
diandra, *Stapf, l. c.*—Ind. or.

WOOTONIA, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 121. *COMPOSITAE.*
parviflora, *Greene, l. c.* 122.—Am. bor.

WORMIA, Rottb. (Dillen.).
mollissima, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 5.—Sumatra.

WRIGHTIA, R. Br. (Apocyn.).
Afzelii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 231.—Afr. trop.

WULFENIA, Jacq. (Scrophul.).
Baldaccii, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 408.—Albania.
Bullii, *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 378 (= *Synthyris houghtoniana*).—Am. bor.
gymnocarpa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 282.—Am. bor.
major, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7, nomen.—Am. bor.
wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 281.—Am. bor.

WULFFIA, Neck. (Compos.).
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 34.—Ecuador.

WULFHORSTIA, C. DC. in Mém. Herb. Boiss. no. 10 (1900) 77. *MELIACEAE.*
spicata, *C. DC. l. c.* 78.—Afr. trop.

WYETHIA, Nutt. (Compos.).
foliosa, *Congdon, in Erythea*, vii. 186.—Calif.

WYLIA, Hoffm. = **Scandix**, Tourn. (Umbell.).
hispanica, Bub. Fl. Pyren. ii. 408 = S. macrorhyncha.
Pecten-Veneris, Bub. l. c. 407 = S. Pecten-Veneris.

WYOMINGIA, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 249. *COMPOSITAE.*
cinerea, *A. Nelson, l. c.* 250.—Am. bor.
pulcherrima, *A. Nelson, l. c.* 249 (= *Erigeron pulcherrimus*).—Am. bor.

X

XANTHIUM, Tourn. (Compos.).
acerosum, *Greene, Pittonia*, iv. 63.—Am. bor.
acutum, *Greene, l. c.* 62.—Am. bor.
affine, *Greene, l. c.* 60.—Am. bor.
californicum, *Greene, l. c.* 62.—Am. bor.
campestre, *Greene, l. c.* 61.—Am. bor.
glanduliferum, *Greene, l. c.*—Am. bor.
palustre, *Greene, l. c.* 63.—Am. bor.
silphifolium, *Greene, l. c.* 60.—Am. bor.
speciosum, *Kearney, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 574.—Am. bor.
varians, *Greene, Pittonia*, iv. 59.—Am. bor.

XANTHOPHYLLUM, Roxb. (Polygal.).
amoenum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 259.—Borneo.
beccarianum, *Chod. l. c.* 257.—Borneo.
bombayanum, *Chod. l. c.* 263.—Ind. or.
bracteatum, *Chod. l. c.* 258.—Ins. Philipp.
citrifolium, *Chod. l. c.* 255.—Borneo.
densiflorum, *Chod. l. c.* 256.—Borneo.
discolor, *Chod. l. c.* 257.—Penins. Mal.

XANTHOPHYLLUM:—
ecarinatum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 254.—Borneo.
gracile, *Chod. l. c.* 256.—Java.
Havilandii, *Chod. l. c.* 260.—Borneo.
hebecarpum, *Chod. l. c.* 263.—Ind. or.
Kingii, *Chod. l. c.* 255.—Borneo.
macrophyllum, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 21.—Borneo.
microcarpum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 263.—Penins. Mal.
ovatifolium, *Chod. l. c.* 258.—Borneo.
parvum, *Chod. l. c.* 264.—Borneo.
philippinense, *Chod. l. c.* 261.—Ins. Philipp.
robustum, *Chod. l. c.* 262.—Ind. or.
sarawakensis, *Chod. l. c.*—Borneo.
Stapfii, *Chod. l. c.* 260.—Borneo.
velutinum, *Chod. l. c.* 259.—Borneo.
verrucosum, *Chod. l. c.* 263.—Malaya.

XANTHORRHOEA, Sm. (Juncac.).
Thorntoni, *Tate, Rep. Horn Exped.* iii. 191, descr.—Austral.

XANTHOSTEMON, F. Muell. (Myrtac.).
celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 465, 637.—Celebes.

XENOCARPUS, Cass. = **Cineraria**, Linn. (Compos.).
asper, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 184 = C. aspera.
geraniifolius, Kuntze, l. c. 185 = C. geraniifolia.

XENODENDRON, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee (1900) 461. *LYTHRACEAE.*
polyanthum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

XEROPHYTA, Juss. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).
clavata, Baker, in Journ. Bot. 1875, 233 = V. clavata.
diversifolium, Auct. in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 339, errore = Xiphion diversifolium.
equisetoides, Baker, in Journ. Bot. 1875, 233 = V. equisetoides.
retinervis, Baker, l. c. = V. retinervis.
Schnitzleinia, Baker, l. c. 235 = V. Schnitzleinia.
Spekei, Baker, l. c. 234 = V. Spekei.

XEROSPERMUM, Blume (Sapind.).
Wallichii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 432.—Penins. Mal.

XYLIA, Benth. (Legum.).
Perieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1301.—Madag.

XYLINABARIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 26. *APOCYNACEAE.*
minutiflora, *Pierre, l. c.* 28.—As. or. trop.

XYLOBIUM, Lindl. (Orchid.).
longifolium, Lindl. ex Spreng. Syst. Veg. iii. 733 = Eulophia Woodfordii.

XYLOCARPUS, Koen. = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).
mekongensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 359 B.—Cochinch.

XYLON, Linn. (Malvac.).
aesculifolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 24 (= *Eriodendron aesculifolium*).—Mexic.
Glaziovi, Kuntze, l. c. 23 (= *Ceiba Glaziovii*).—Bras.
roseum, Kuntze, l. c. 24 (= *Chorisia rosea*).—N. Granat.
tunariense, Kuntze, l. c. 23 (= *Ceiba tunariensis*).—Bolivia.

XYLOPIA, Linn. (Anonac.).
altissima, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 73.—Arch. Mal.
Antunesii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 299.—Afr. trop.
aurantiiodora, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 4.—Afr. trop.
Benthami, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 35.—Venez.
Bokoli, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 2.—Afr. trop.
carminativa, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5, 32 = sericea.
Dinklagei, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 298.—Afr. trop.
glauca, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 74.—Ins. Bangka.
intermedia, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 32.—Bras.
laevigata, *R. Fries, l. c.* 37 (= *Unona laevigata*).—Ind. or.
lanceolata, *R. Fries, l. c.*—Bras.

XYLOPIA:—
longipetala, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 4.—Afr. trop.
mucronata, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 75.—Borneo.
neglecta, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 31.—Venez.
Staudtii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 298.—Afr. trop.
tenuifolia, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
Wilwerthii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 5.—Afr. trop.

XYLORHIZA, Nutt. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
frutescens, Greene, Pittonia, iii. 48 = A. frutescens.
Orcuttii, Greene, l. c. = A. Orcuttii.
Parryi, Greene, l. c. 47 = A. Parryi.
tortifolia, Greene, l. c. 48 = A. tortifolius.
Wrightii, Greene, l. c. 47 = A. Wrightii.

XYLOSMA, Forst. f. (Bixac.).
Balansae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 221.—Parag.
caledonicum, *Briq. l. c.* 220 (= *Myroxylon caledonicum*).—N. Caled.
Flanagani, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 17.—Afr. austr.
martinicense, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon martinicense*).—Ind. occ.
monospora, Harv. Thes. Cap. ii. 52 = Xymalos monospora.
oligandrum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 235.—Am. cent.
pachyphyllum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon pachyphyllum*).—Ind. occ.
Paliurus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 221 (= *Myroxylon Paliurus*).—Hab. ?
paraguayense, *Briq. l. c.* 222.—Parag.
schwaneckeanum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon schwaneckeanum*).—Ind. occ.
serratum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon serratum*).—Ind. occ.
Warburgii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 221 (= *Myroxylon Warburgii*).—Urug.

XYRIS, Gronov. (Xyrid.).
affinis, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 70.—Afr. trop.
angustifolia, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 149.—Afr. trop.
anisophylla, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 72.—Afr. trop.
borneensis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 506.—Borneo.
decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 3.—Afr. austr.
erubescens, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 73.—Afr. trop.
extensula, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 15.—Bras.
fallax, *Malme, l. c.* xxii. no. 2, 12.—Bras.
fugaciflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 71.—Afr. trop.
Gerrardi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 5.—Afr. austr.
goyazensis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 8.—Bras.
gracilescens, *Malme, l. c.* 16.—Bras.
guaranitica, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 77.—Parag.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 71.—Afr. trop.
Lobbii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 506.—Java.
marginata, *Rendle, l. c.* 503.—Austral.
neocaledonica, *Rendle, l. c.* 507.—N. Caled.
Nilssonii, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 2, 15.—Bras.
nivea, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 69.—Afr. trop.
Pancheri, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 507.—N. Caled.
platystachya, *Nilss. ex Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 17.—Bras.
pumila, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 70 (non Pohl).—Afr. trop.
radula, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 11.—Bras.
reptans, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 68.—Afr. trop.
Ridleyi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 505.—Penins. Mal.
rigidaeformis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 2, 13.—Bras.
rigidescens, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 67.—Afr. trop.
scabridula, *Rendle, l. c.* 72.—Afr. trop.

XYRIS:—
stenocephala, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii. no. 2, 18.—Bras.
straminea, Nilss. in Öfvers. Vet.-Akad. Förhandl. Stockh. 1891, 153 = filiformis.
subtenella, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 14.—Bras.
Thompsoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 508.—Madag.
vacillans, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 3, 10.—Bras.
veruina, *Malme, l. c.* 9.—Bras.
vestita, *Malme, l. c.* 12.—Bras.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 68.—Afr. trop.

XYSMALOBIUM, R. Br. (Asclep.).
andongense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 682.—Afr. trop.
dolichoglossum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 456.—Afr. trop.
obscurum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. trop.

Y

YEATESIA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 410 = **Gatesia**, A. Gray (Acanth.).
laetevirens, Small, l. c. = G. laetevirens.

YOANIA, Maxim. (Orchid.).
aberrans, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 274.—Afr. bor.
Prainii, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 175.—Ind. or.

Z

ZALUZANIA, Pers. (Compos.).
anthemidifolia, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 531.—Am. cent.
grayana, *Robinson & Greenm. l. c.* (= *Gymnolomia triloba*).—Am. bor.
nonensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 36.—Ecuador.
quitensis, *Hieron. l. c.* 37.—Ecuador.
Sodiroi, *Hieron. l. c.* 35.—Ecuador.

ZALUZIANSKYA, F. W. Schmidt (Scrophul.).
alpestris, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 480.—Afr. austr.
crocea, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 221.—Afr. austr.
diandra, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 482.—Afr. austr.
falciloba, *Diels, l. c.* 481.—Afr. austr.
gilgiana, *Diels, l. c.* 480.—Afr. austr.
gilioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 182.—Afr. austr.
goseloides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 480.—Afr. austr.
inflata, *Diels, l. c.* 481.—Afr. austr.
microsiphon, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 395 (= *Nycterinia microsiphon*).—Afr. austr.
nemesioides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 482.—Afr. austr.
violacea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 183.—Afr. austr.

ZAMIA, Linn. (Cycad.).
Allison-Armourii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 23.—Ind. occ.
portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 291.—Ind. occ.

ZANHA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 128 (1896). *BURSERACEAE.*
golungensis, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

ZANNICHELLIA, Mich. (Naiad.).
stylaris, Presl, Bot. Bemerk. 112 = palustris.

ZANONIA, Linn. (Cucurb.).
Clarkei, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 41.—Penins. Mal.

ZANTEDESCHIA, Spreng. = **Richardia**, Kunth (Arac.).
macrocarpa, Engl. Jahrb. iv. 64 = R. angustiloba.

ZANTHOXYLUM, Linn. (Rutac.).
arborescens, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 112.—Mexic.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 639.—Celebes.
citriodorum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 114.—Afr. trop.
ferrugineum, *Radlk. ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 391.—Am. cent.
foetidum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 112.—Mexic.
insularis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xxiv. 79.—Mexic.
longipes, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 163.—Mexic.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 639.—Celebes.
multifoliolatum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2595.—China.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 79.—Mexic.
nitens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 112.—Afr. trop.
occidentale, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 164.—Mexic.
procerum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 4.—Am. cent.
thomasianum, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 583 (= *Fagara thomasiana*).—Ind. occ.
trifoliatum, Krug & Urb. l. c. 584 = ternatum.
Welwitschii, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 114.—Afr. trop.

ZEHNERIA, Endl. = **Melothria**, Linn. (Cucurb.).
ejecta, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 699.—Austral.

ZENKERELLA, Taub. (Legum.).
pauciflora, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 183.—Afr. trop.

ZENKERINA, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 497. *SCROPHULARIACEAE.*
kamerunensis, *Engl. l. c.* 498.—Afr. trop.

ZEOCRITON, Beauv. = **Hordeum**, Tourn. (Gramin.).
distichum, Beauv. Agrost. 115 = H. vulgare.

ZEPHYRANTHES, Herb. (Amaryll.).
Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 473.—Mexic.
longifolia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 286 (non Hemsl.).—Urug.
longipes, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 225.—Urug.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 473.—Mexic.
stenopetala, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 226.—Urug.

ZEUGITES, P. Br. (Gramin.).
Pringlei, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 50.—Mexic.
smilacifolia, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 134.—Am. bor.

ZEUXINE, Lindl. (Orchid.).
andamanica, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 599.—Ins. Andaman.
Batesii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 182.—Afr. trop.
glandulosa, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 289.—Ind. or.
pulchra, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 127.—Reg. Himal.
pumila, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 291 (= *Odontochilus pumilus*).—Reg. Himal.
reflexa, *King & Pantl. l. c.*—Ind. or.
rolfiana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 699.—Ins. Andaman.
Whiteheadi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 358.—Ins. Philipp.

ZEXMENIA, La Llave (Compos.).
aurantiaca, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 296.—Am. cent.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 489.—Mexic.

ZEYHERIA, Mart. (Bignon.).
Kuntzei, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 246.—Bolivia.

ZILLA, Forsk. (Crucif.).
spinosa, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 148 (= *Bunias spinosa*).—Arab.; Afr. bor.

ZINGIBER, Adans. (Scitam.).
brevifolium, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 268.—N. Guin.
chrysostachys, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 129.—Penins. Mal.
citrinum, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
Kunstleri, *King, ex Ridley, l. c.* 127.—Penins. Mal.
macradenium, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 269.—Sumatra.
macrocephalum, *K. Schum. l. c.* (= *Elettaria macrocephala*).—Java.
puberulum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 130.—Penins. Mal.
striolatum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 262.—China.

ZINNIA, Linn. (Compos.).
Greggii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 16.—Mexic.
littoralis, *Robinson & Greenm. l. c.*—Mexic.

ZIZIPHORA, Linn. (Labiat.).
alpina, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 134 (non Mill.).—As. Min.

ZIZYPHUS, Tourn. (Rhamn.).
Hamur, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 19.—Afr. trop.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 373.—Penins. Mal.

ZOLLIKOFERIA, DC. = **Launaea**, Cass. (Compos.).
Foxii, Post, Fl. Syria, 19.—Syria.

ZONANTHEMIS, Greene, Fl. Francisc. 425 (1897). *COMPOSITAE.*
angustifolia, *Greene, l. c.* (= *Hemizonia angustifolia*).—Calif.
corymbosa, *Greene, l. c.* (= *Hemizonia corymbosa*).—Calif.

ZORNIA, J. F. Gmel. (Legum.).
reptans, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi i. 406.—Afr. trop.

ZOSIMA, Hoffm. (Umbell.).
suffruticosa, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 621.—Persia.

ZOYSIA, Willd. (Gramin.).
Codia, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8684 = Paspalum royleanum.
tremula, Beauv. Agrost. 148 = Sporobolus tremulus.

ZSCHOKKEA, Muell. Arg. (Apocyn.).
utilis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2637.—Guiana.

ZYGADENUS, Michx. (Liliac.).
acutus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 536.—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. l. c.* 534.—Am. bor.
falcatus, *Rydb. l. c.* 536.—Am. bor.
gramineus, *Rydb. l. c.* 535.—Am. bor.
intermedius, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

ZYGIA, P. Br. = **Pithecolobium**, Mart. (Legum.).
brevifolia, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 78 = P. brevifolium.
flexicaulis, Sudw. l. c. = Acacia flexicaulis.
guadalupensis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = P. unguis-cati.
unguis-cati, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 78 = P. unguis-cati.

ZYGIS, Desv. = **Micromeria**, Benth. (Labiat.).
frivaldszkyana, Degen, in Bull. Herb. Boiss. iv. 523.—Turcia.

ZYGOPETALUM, Hook. (Orchid.).
ovatilobum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 144.—Bras.

ZYGOPHYLLUM, Linn. (Zygophyll.).
hamiense, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* II. 277.—Arab.
Hildebrandtii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 15.—Afr. trop.
hybridum, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. 291.—Austral.
Kochii, *Tate, l. c.*—Austral.
latialatum, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 244.—Afr. austr.
Pfeilii, *Engl. l. c.*—Afr. austr.
Robecchii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 14.—Afr. trop.
teretifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 158.—Afr. austr.

ZYGOSTATES, Lindl. (Orchid.).
alleniana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 55.—Parag.

SEQUUNTUR QUAE

IN INDICE ET SUPPLEMENTIS EMENDANDA ADDENDA

HACTENUS OBSERVAVIMUS

a. = *adde*. d. = *dele*. l. = *lege*.

PAG.

ACACIA.

1^{3}. a. glaucophylla, *Lem. Hort. Univ.* ii. 234.—Austral.

2^{2}. insere ACANTHOSONCHUS, Don, ex Hoffm. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. v. 371 (1893) = **Sonchus**, Tourn. (Compos.).

ACHRAS.

2^{3}. a. ralphiana, *F. Muell. in Baill. Hist. Pl.* xi. 280. —Austral.

ACROPERA.

3^{1}. a. *luteola*, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. ii. 128, 331 (= *Gongora galeata*).—Mexic.

ADESMIA.

3^{3}. a. darapskyana, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 142. —Chili.
Vallis-pulchrae, *Phil. l. c.* 174.—Chili.

AERVA.

4^{3}. a. tomentosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. cxxii. 170; *Lam. Encyc.* i. 46.—As. et Afr. trop.

AMOMUM.

9^{2}. a. eriocarpum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 309 (= *Cardamomum eriocarpum*).—Java.
lycostomum, *Lauterb. & K. Schum. ex K. Schum. l. c.* 305 (= *Hornstedtia lycostoma*).—N. Guin.

9^{3}. l. phaeochoanum, *K. Schum.*
a. sulcatum, *Oliv. & Hanb. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 304.—Afr. trop.
tridentatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 309 (= *Cardamomum tridentatum*).—Java.

AMPHIDONAX.

9^{3}. l. *bifaria*, Nees, ex Steud. . . . 197.
tenella, Wight & Arn. ex Steud. . . . 197.

AMYRIS.

10^{1}. a. simplicifolia, *Karst. Fl. Columb.* ii. 109, t. 158. —Venez.

ANDROPOGON.

10^{2}. l. *binatus*, Retz. . . . v.
a. *caerulescens*, Kunth, Enum. Pl. i. 504 = micranthus.
d. *coerulescens*, Kunth,

10^{3}. l. *echinulatus*, Steud. . . . 397.
eriophorus, Willd. . . . iv. 910.
ischyranthus, Steud.
lanceolatus, Baker, . . . 444.

11^{1}. *lianatherus*, Steud.
linnaeanus, *Scribn. & Kearney*,
monomeros, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 219.
nigrum, Buch.-Ham. ex Hook. f. l. c. 185.

11^{2}. *serratus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 290.

ANDROSCEPIA.

11^{2}. *mutica*, Anderss. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 217.

PAG.

ANEMONE.

11^{2}. a. *Consiligo*, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 327 = Adonis vernalis.

ANGELICA.

11^{3}. a. setchuenensis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 500. —China.
l. trifoliata, *Cockayne*, . . . xxxi.

ANGRAECUM.

12^{1}. l. flabellifolium, *Rolfe*,
macrorhynchium, *Schlechter*,
rohlfsianum, *Kraenzl. in Bot. Zeit.* 1882,

12^{2}. a. xanthopollinium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 344 (= *Mystacidium xanthopollinium*). —Afr. trop.

ANHALONIUM.

12^{2}. a. *kotschoubeyanum*, Lem. Hort. Univ. vi. 63.— Mexic.

ANOGRA.

12^{2}. l. *gypsophila*, A. A. Heller,

ANTENNARIA.

12^{3}. l. Farwellii, *Greene*, . . . 347.

13^{1}. media, *Greene*, . . . 286.

ANTHEMIS.

13^{1}. l. Gaudium-solis, *Vel.* . . . 152.
rouyana, *Aznav.* . . . xliv. 171.

ANTHOLYZA.

13^{3}. a. abyssinica, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iv. 207.—Afr. trop.

ANTHURIUM.

13^{3}. a. cordifolium, *Lem. Hort. Univ.* v. 356.—Bras.

14^{1}. l. lindmanianum, *Engl.*
longicuspidatum, *Engl.* . . . 415.
theresiopolitanum, *Engl.*

ANTIRRHOEA.

14^{2}. l. radiata, *Urb.* . . . (= *Stenostomum radiatum*). —Ind. occ.

14^{2}. l. APHANAMIXIS, Blume,

APHANOPAPPUS.

14^{2}. l. *micranthus*, Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 915.

APHANOPLEURA.

14^{2}. a. *trachycarpa*, Lipsky, in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. iv. 375 = trachysperma.

AQUILEGIA.

15^{1}. l. Darwazi, *Korsh.* . . . Sér. V. ix.

ARDISIA.

16^{1}. a. *brandneriana*, L. Lind. in Sem. Hortic. 1900, 472 = Parathesis crenulata.
l. diversiflora, *Koord. & Valet.*

PAG.

AREGELIA.

16^{1}. l. *leucophoea*, Mez,

ARENARIA.

16^{1}. l. Baldacii, *Halacsy*,
Benthami, Edgew.
a. bulica, *Stapf, ex F. N. Williams in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 374.—Persia.
glandulosa, *F. N. Williams, l. c.* 431 (= *Odontostemma glandulosum*).—Reg. Himal.

16^{2}. tenella, *Duthie, ex F. N. Williams, l. c.* 356.— Ind. or.

ARGYREIA.

16^{2}. a. choisyana, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iv. 257.—Ind. or.

16^{2}. l. **ARGYROCALYMMA**, K. Schum. & Lauterb.

ARISTEA.

16^{3}. a. pauciflora, *Wolley Dod, in Journ. Bot.* 1900, 171.—Afr. austr.

ARISTIDA.

16^{3}. l. *adscendens*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 225 = setacea.
decorata, Steud. . . . 421.
dispersa, Trin. & Rupr. . . . 129.
funicularis, Edgew.
Heymanni, Regel,
Kelleri, *Hack. ex Schinz*, . . . 8.—Afr. trop.

17^{1}. l. *linearifolia*, Rottl.

ARMARINTEA.

17^{2}. l. *Morisoni*, Bub.

ARPOPHYLLUM.

17^{2}. a. laxiflorum, *Pfitzer, in Gartenwelt*, iii (1898) 138.—Hab. ?

ARTHRATHERUM.

18^{1}. l. *ciliatum*, Nees, . . . 289.

ARUNDINARIA.

18^{1}. a. anceps, *Mitford, Bamb. Gard.* 181.—Hab. ?
diversifolia, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 19, nomen.—Japon.
Kokantsik, *Kurz, l. c.*—Japon.
Kumasasa, *Kurz, l. c.*—Japon.

18^{2}. l. nobilis, *Mitford*, . . . 178.
a. pygmaea, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 19, nomen.—Japon.
siamensis, *Kurz, l. c.*—Siam.

ARUNDINELLA.

18^{2}. a. campbelliana, *Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* v. 346.—Ind. or.
Ritchei, *Munro, ex Lisboa, l. c.* 343.—Ind. or.
l. tuberculata, *Munro, ex Lisboa, l. c.* 344.—Ind. or.

PAG.
ARUNDO.
18^{2}. a. *barbata*, Burch. Trav. ii. 271 = Phragmites communis.
l. *longifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 303.
18^{3}. *reynaudiana*, Kunth, . . . 275.
tibialis, Roxb. . . . n. 5017 G.
triflora, Roxb. ex Hook. f. Brit. Fl. Ind. vii. 303.

ASARUM.
18^{3}. a. Shuttleworthii, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 98.—Am. bor.

ASCLEPIAS.
18^{3}. a. acerateoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 454 (= *Gomphocarpus acerateoides*).—Afr. austr.
adscendens, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus adscendens*).—Afr. austr.
affinis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus affinis*).—Afr. austr.
aurea, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus aureus*).—Afr. austr.
brevipes, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus brevipes*).—Afr. austr.
chloroglossa, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Xysmalobium involucratum*).—Afr. austr.
concinna, *Schlechter, l. c.* 456 (= *Gomphocarpus concinnus*).—Afr. austr.
confusa, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Xysmalobium confusum*).—Afr. austr.
cucullata, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus cucullatus*).—Afr. austr.
depressa, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus depressus*).—Afr. austr.
eminens, *Schlechter, l. c.* 453 (= *Gomphocarpus eminens*).—Afr. austr.
fallax, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus fallax*).—Afr. austr.
Flanaganii, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Gomphocarpus asclepiaceus*).—Afr. austr.
flexuosa, *Schlechter, l. c.* 453 (= *Gomphocarpus flexuosus*).—Afr. austr.
l. foliosa, *Hiern*, . . . 686.
a. Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 455 (= *Gomphocarpus Galpinii*).—Afr. austr.
geminiflora, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus geminiflorus*).—Afr. austr.
Gerrardii, *Schlechter, l. c.* 453 (= *Gomphocarpus Gerrardi*).—Afr. austr.
glaucophylla, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus glaucophyllus*).—Afr. austr.
harveyana, *Schlechter, l. c.* 456 (= *Xysmalobium pedunculatum*).—Afr. austr.
insignis, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus insignis*).—Afr. austr.
linearis, *Schlechter, l. c.* 453 (= *Gomphocarpus linearis*).—Afr. austr.
Mackenii, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Gomphocarpus M'Kenii*).—Afr. austr.
macra, *Schlechter, l. c.* 456 (= *Gomphocarpus suaveolens*).—Afr. austr.
macropus, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus macropus*).—Afr. austr.
macrosperma, *Eastw. ex Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 172.—Am. bor.
meliodora, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 455 (= *Gomphocarpus meliodorus*).—Afr. austr.
ochroleuca, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus ochroleucus*).—Afr. austr.
orbicularis, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Xysmalobium orbiculare*).—Afr. austr.
oxytropis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus oxytropis*).—Afr. austr.
pachyglossa, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus pachyglossus*).—Afr. austr.
pachystephana, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Gomphocarpus pachystephanus*).—Afr. austr.
19^{1}. rectinervis, *Schlechter, l. c.* 456 (= *Gomphocarpus rectinervis*).—Afr. austr.
rivularis, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus rivularis*).—Afr. austr.
sabulosa, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Gomphocarpus arenarius*).—Afr. austr.
scabra, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus scaber*).—Afr. austr.
scabridifolia, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus ovatus*).—Afr. austr.

PAG.
ASCLEPIAS:—
19^{1}. a. schinziana, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 455 (= *Gomphocarpus schinzianus*).—Afr. austr.
l. schumanniana, *Hiern*, . . . 686.
semiamplectens, *Hiern*, . . . 685.
a. simplex, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 455 (= *Gomphocarpus simplex*).—Afr. austr.
stockenstromensis, *Schlechter, l. c.* 454 (= *Xysmalobium stockenstromensis*).—Afr. austr.
sulphurea, *Schlechter, l. c.* (= *Xysmalobium parviflorum*).—Afr. austr.
l. tenuiflora, *Schlechter*,
a. tenuis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 454 (= *Lagarinthus tenuis*).—Afr. austr.
transvaalensis, *Schlechter, l. c.* 455 (= *Gomphocarpus transvaalensis*).—Afr. austr.
valida, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus validus*).—Afr. austr.
velutina, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus velutinus*).—Afr. austr.
Woodii, *Schlechter, l. c.* 456 (= *Gomphocarpus Woodii*).—Afr. austr.

ASPARAGUS.
19^{1}. l. *Lowei*, Kunth, . . . 73.
19^{2}. *spinescens*, Steud. . . . 334.
suaveolens, Burch. . . . ii. 226.

ASPERULA.
19^{2}. a. *Sherardia*, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 320 = Sherardia arvensis.

ASPIDIXIA.
19^{2}. l. capensis, *Van Tiegh.* . . . 193.

ASPILIA.
19^{3}. l. monocephala, *Baker*,

ASSONIA.
19^{3}. l. *huillensis*, Hiern, . . . 85.

ASTER.
19^{3}. a. anethifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 129 (= *Haplopappus anethifolius*).—Chili.
20^{1}. sandwicensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxix. 20.—Ins. Sandw.
l. staehelinodes, *Kuntze*,
subspathulatus, *Rydb.* . . . 395.
20^{2}. d. Wilsonii, *Greene*,

ASTERISCUS.
20^{2}. l. *Morisoni*, Bub.

ASTRAGALUS.
20^{2}. l. akscheherensis, *Freyn & Bornm.*
a. azureus, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 91.—Chili.
20^{3}. d. cerbicus, *Panç.*
l. exilifolius, *A. Nelson*,
21^{1}. junciformis, *A. Nelson*, . . . 9.
d. Mulkak, *Lipsky*,
l. palousensis, *Piper*, . . . xxii. 489.
21^{2}. taldicensis, *Franch.*
zebedaniensis, *Freyn & Bornm.*

21^{3}. insere ASTROTHECA, Miers, ex Planch. & Triana, Mem. Guttif. 100 (1862) = ASTHOTHECA, Miers = **Clusia**, Linn. (Guttif.).
cuspidata, Vesque, Epharm. iii. 16, t. 81 = C. axillaris.

ATAXIA.
21^{3}. l. *Ecklonis*, Nees, . . . 77.
tenuis, Trin. . . . 78.
Tongo, Nees, ex Trin. . . . 78.

21^{3}. l. **ATRACTOGYNE**, Pierre, . . . ii. (1896) 1261.

ATRIPLEX.
22^{1}. l. kochiana, *Maiden*, . . . xxi. 87.

ATTALEA.
22^{1}. d. Boehmii, *Drude*,

ATYLOSIA.
22^{1}. l. crassa, *King*, . . . 45.

22^{1}. l. **AUCOUMEA**, Pierre, . . . ii. (1896) 1241.

AVENA.
22^{2}. l. *airoides*, Koel. . . . 298.

PAG.
AVENASTRUM.
22^{2}. l. longum, *Stapf*, . . . 473.
quinquesetum, *Stapf*, . . . 474.

BACCHARIS.
23^{1}. l. macrocephala, *Sch. Bip.* . . . 575.—Mexic.

BACTRIS.
23^{1}. l. lindmaniana, *Drude*,

BAHIA.
23^{1}. l. xylopoda, *Greenm.* . . . xxxiv. 577.—Mexic.

BAISSEA.
23^{1}. l. Bailloni, *Hua*, . . . n. s. i. 8.
floribunda, *Hua*, . . . n. s. i. 12.
23^{2}. micrantha, *Hua*, . . . n. s. i. 11.

BALSAMODENDRUM.
23^{2}. a. *simplicifolium*, Auct. in Kew Bull. 1896, 91 = C. simplicifolia.

BAMBUSA.
23^{2}. l. auriculata, *Kurz*, . . . 286.

BANARA.
23^{3}. l. portoricensis, *Krug & Urb.* . . . Ind. occ.

BARLERIA.
24^{1}. l. longissima, *Lindau*, . . . 73.
24^{2}. Phillipseae, *Rendle*, . . . Afr. trop.
rotundisepala, *Rendle*, . . . Afr. trop.
a. Ruspolii, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 74.—Afr. trop.
l. Steudneri, *C. B. Clarke*, . . . 153.
waggana, *Rendle*, . . . Afr. trop.

BASEONEMA.
24^{2}. l. Gregorii, *Schlechter & Rendle*, . . . Afr. trop.

24^{3}. l. **BAUERELLA**, Borzi, . . . i. (1898) 153.

BAUHINIA.
24^{3}. a. Kurzii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 499.—Burma.
l. stenostachya, *Baker*,

24^{3}. l. **BAUMANNIA**, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 455. *RUBIACEAE.*

BECKWITHIA.
25^{1}. a. Andersonii, *Jepson, in Erythea*, vi. 99.—Calif.
l. *Austinae*, Jepson, l. c. 97 = Andersonii.

BEGONIA.
25^{1}. l. Heddei, *Warb.* . . . Afr. trop.
a. lindeniana, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iv. 42.—Mexic.
manicata, *Brongn. l. c.* 33.—Mexic.
peponifolia, *Brongn. l. c.* 42.—Mexic.
l. Weigallii, *Hemsl.* . . . 1896, 17.

BELMONTIA.
25^{2}. l. primulaeflora, *Schinz, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. 332.

BELOPERONE.
25^{2}. a. Matthewsii, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* I. 30 (= *Justicia Matthewsii*).—Parag.

BERBERIS.
25^{2}. l. haematocarpa, *Wooton*, . . . 1898, 304.

BERGIA.
25^{2}. l. pentheriana, *Keissl. ex A. Zahlbr.*

BERMUDIANA.
25^{3}. l. *humilis*, Kuntze, . . . 307.
leucantha, Kuntze, . . . 307.
rigidifolia, Kuntze, . . . 308.

BETONICA.
26^{1}. a. *recta*, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 208 = S. recta.

BIDENS.
26^{1}. l. Nashii, *Wooton*, . . . 1898, 481.

BIFARIA.
26^{1}. l. albicans, *Van Tiegh.* . . . Ins. Societ.
26^{2}. Lepini, *Van Tiegh.* . . . Ins. Societ.
multicostata, *Van Tiegh.* . . . 167.—Ins. Sandw.

PAG.

BIFARIA :—

26^{2}. a. multiramosa, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 175.—Reg. Himal.
l. platycaula, *Van Tiegh.* . . . Ins. Societ.
polystachya, *Van Tiegh.*
rubescens, *Van Tiegh.* . . . Ins. Societ.

BIGNONIA.

26^{2}. a. chrysophylla, *Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana*, iii. 969.—Guiana.
reticulata, *Poepp. ex Bur. & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 82.—Peruv.
robusta, *Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana*, iii. 969.—Guiana.
stricta, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.
surinamensis, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.
tubulosa, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.

26^{3}. insere **BLEPHARIDACHNE**, Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. ii. II. 126 (1887). *GRAMINEAE.*
Bigelovii, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. 261.—Am. bor.
Kingii, *Hack. l. c.*—Calif.

BLEPHAROCALYX.

26^{3}. l. *angustifolius*, Berg, . . . 413.

BOERHAAVIA.

27^{1}. d. rufopilosa, *Kuntze*,

BOISDUVALIA.

27^{1}. l. *parviflora*, A. A. Heller, . . . 1898, 199.

27^{2}. l. **BONNIERA**, Cordem.

BORNMUELLERA.

27^{2}. l. Tymphaea, *Hausskn.* . . . (=*Vesicaria Tymphaea*).—Graecia.

BORRERIA.

27^{3}. l. *tenella*, Cham. & Schlecht. . . . 317.

BRACHYCHITON.

28^{1}. d. *diversifolius*, Terr.

BRACHYCORYTHIS.

28^{2}. l. briartiana, *Kraenzl.*
Buchananii, *Rolfe*,

BRACHYSTELMA.

28^{2}. l. *caffrum*, Schlechter, in Engl. Jahrb. xviii. Beibl. xlv. 13 = meyerianum.

BRACHYSTELMARIA.

28^{2}. a. occidentalis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 293 (=*Brachystelma occidentale*).—Afr. austr.

BRILLANTAISIA.

28^{3}. a. anomala, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 312.—Afr. trop.

BRIZOPYRUM.

29^{1}. l. capense, *Trin. ex Nees, Fl. Afr. Austr.* 371.
mucronatum, Nees, . . . no. 8898.

BRODIAEA.

29^{1}. a. poeppigiana, *Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. 112.—Chili.
uniflora, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* ii. v. 57.—Reg. Argent.

BROMUS.

29^{2}. l. *multiflorus*, Scribn. . . . xiii. 46.
pacificus, *Shear*, . . . 38.

BRONNIA.

29^{2}. l. *Digueti*, Van Tiegh.
Thiebauti, Van Tiegh.

29^{2}. l. **BRUINSMIA**, Boerl. & Koord. . . . liii. (1893) 68, t. 1.

29^{2}. insere **BRUNFELSIOPSIS**, Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1897) 324. *SOLANACEAE.*
americana, *Urb. l. c.* 325 (=*Brunfelsia americana*).—Am. trop.

BUCKLEYA.

29^{3}. a. Joan, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xii. (401) (=*Calycopteris Joan*).—Japon.

PAG.

BUDDLEIA.

29^{3}. l. montana, *Britton*, . . . 1898, 544.

BULBINE.

30^{1}. a. flexicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 365.—Afr. austr.
l. *Zeyheri*, Baker, . . . 347.

BULBINOPSIS.

30^{1}. a. bulbosa, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 21.—Austral.

BULBOPHYLLUM.

30^{1}. a. Bakossorum, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 280, nomen.—Afr. trop.
30^{2}. l. Ridleyi, *Kraenzl.* . . . Madag.
sessiliflorum, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orch.* iii. 156, t. 290.—Afr. trop.
a. *Taylori*, F. Muell. Fragm. viii. 150 = Dendrobium hispidum, *A. Rich.*

BULBOSTYLIS.

30^{3}. a. micans, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 17.—Bras.

BUPLEURUM.

30^{3}. l. thianschanicum, *Freyn*, . . . Turkestan.

BYRSONIMA.

31^{1}. a. fagifolia, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 207.—Bras.
grisebachiana, *Niedenzu, l. c.*—Bras.
oblanceolata, *Niedenzu, l. c.*—Bras.

BYSTROPOGON.

31^{1}. a. uniflorus, *Rusby, ex Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 802.—Bolivia.

CACALIA, Linn.

31^{2}. l. *nikomontana*, Matsum. . . . 84.

CAIOPHORA.

31^{3}. a. *cymbifera*, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 281.—N. Granat.

CALAMAGROSTIS.

31^{3}. l. debilis, *Hook. f.* . . . 262.
32^{1}. a. vilfaeformis, *Kearney, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 20.—Calif.

CALAMINA.

32^{1}. l. *humilis*, Presl, Reliq. Haenk. i. 344 = A. varia.

CALAMUS.

32^{1}. l. Jaboolum, *F. M. Bailey, in Bot. Bull.*

CALANDRINIA.

32^{1}. a. columbiana, *Howell, ex A. Gray, in Proc. Amer. Acad.* xxii. 277.—Am. bor.
l. Grayi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1890, 312.—Am. bor.
Tweedyi, *A. Gray, in Proc. Amer. Acad.* xxii. 277.—Am. bor.

CALEA.

32^{2}. a. hypoleuca, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 24.—Mexic.

CALOTHECA.

32^{3}. l. *elegans*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 301, errore = Calotheria elegans.

32^{3}. insere CALOTHERIA, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 199 (1855) = **Pappophorum**, Schreb. (Gramin.).
elegans, Wight & Arn. l. c. = P. elegans.

CALPURNIA.

33^{1}. l. Woodii, *Schinz*, . . . 426.

CALYCERA.

33^{1}. a. foliosa, *Phil. ex Reiche, in Engl. Jahrb.* xxix. 117.—Reg. Andin.

CALYSTEGIA.

33^{1}. l. discolor, *Damm.* . . . *Beibl.* lvii. 42.

CAMAROTIS.

33^{2}. a. *obliquirostris*, Parish, ex King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 238 = S. obtusus.

PAG.

CAMELLIA.

33^{2}. a. Bonnardii, *Berlèse, in Lem. Hort. Univ.* iii. 161.—Hort.

CAMPYLOCENTRON.

33^{3}. a. filiforme, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 298.—Reg. Argent.

CANAVALIA.

33^{3}. a. gaudichaudiana, *Lem. Hort. Univ.* iv. 129.—Hab.?

CANDOLLINA.

33^{3}. a. *Barthei*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. 269.—Ins. Philipp.

CANTHIUM.

33^{3}. a. *anomocarpum*, DC. Prod. iv. 475 = P. anomocarpa.

CAPSICUM.

34^{1}. a. albescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 218 (=*Poecilochroma albescens*).—Bolivia.

CARAGUATA.

34^{1}. a. penduliflora, *Wittm. in Engl. Jahrb.* xi. 59 (=*Tillandsia penduliflora*).—Ind. occ.

CARALLUMA.

34^{1}. a. compta, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 479 (=*Piaranthus comptus*).—Afr. austr.
decora, *Schlechter, l. c.* 478 (=*Piaranthus decorus*).—Afr. austr.
geminata, *Schlechter, l. c.* (=*Piaranthus geminatus*).—Afr. austr.
grivana, *Schlechter, l. c.* 479 (=*Piaranthus grivanus*).—Afr. austr.
intermedia, *Schlechter, l. c.* 478 (=*Stapelia intermedia*).—Afr. austr.
punctata, *Schlechter, l. c.* (=*Piaranthus punctatus*).—Afr. austr.
serrulata, *Schlechter, l. c.* (=*Piaranthus serrulatus*).—Afr. austr.

CARDAMINE.

34^{2}. l. Enysii, *Cheesem.*

34^{2}. a. **CARDANTHERA**, Buch.-Ham. in Voigt, Hort. Sub. Calc. 482 (1845). *ACANTH.*
triflora, *Buch.-Ham. l. c.*—Ind. or.; Malaya.

CARDUUS.

34^{2}. l. leiocephalus, *A. A. Heller*,

CAREX.

34^{3}. a. arizonensis, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 549.—Am. bor.
l. Bornmuelleri, *Kuek.*
35^{1}. Nebularum, *R. Phil.*
Novae-Zelandiae, Petrie,
oreocharis, *Holm*, . . . 1900, I. 358.
35^{2}. a. Savatieri, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. III. x. 71.—Japon.
l. *Thomsoni*, Petrie,

CARICA.

35^{2}. a. tunariensis, *K. Schum, in Just, Jahresb.* xxvi. I. 345 (=*Papaya tunariensis*).—Bolivia.

CASSYTHA.

36^{2}. l. pondoensis, *Engl.* . . . Afr. austr.

CATTLEYA.

37^{1}. a. *concolor*, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. ii. 128, 197 = harrisoniana.
Grossii, *Kraenzl. in Gartenfl.* 1897, 113.—Bras.
harrisoniana, *Batem. ex Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1919.—Bras.

CAYAPONIA.

37^{1}. l. *dubia*, Rose,

CENCHRUS.

37^{2}. l. *bulbifer*, Hochst. . . . 448.
frutescens, Sieb. in Flora, 1822, 14.
37^{3}. *quinquevalvis*, Buch.-Ham. . . . 8654 C.

CENTAUREA.

37^{3}. a. laureotica, *Heldr. ex Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 590.—Eur.
l. Linaresii, *Laz.*
paucijuga, *Halacsy*,
saxifraga, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1897, 45.

PAG.

CENTAUROPSIS.

37^{3}. a. rhaponticoides, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 102 (= *Vernonia rhaponticoides*).—Madag.

CENTELLA.

38^{1}. a. *linifolia*, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 120 = H. Centella.

CERASTIUM.

38^{2}. l. sordidum, *Robinson*, . . . xxx. 58.

CEREUS.

38^{3}. a. andalgalensis, *Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 168.—Reg. Argent.
l. *Candelabrum*, Web. ex K. Schum.
a. fascicularis, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 57 (= *Cactus fascicularis*).—Peruv.
gladilger, *Lem. Hort. Univ.* vi. 60.—Hab.?
horrens, *Lem. l. c.*—Hab.?
l. maritimus, *Jones, ex Coult.*
a. *monacanthus*, Cels. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 142 = Martinii.
monacanthus, *Lem. Hort. Univ.* vi. 60.—N. Granat.
northumberlandianus, *Lambert, in Loudon, Gard. Mag.* (1841) 91; *et in Lem. Hort. Univ.* ii. 318.—Ind. occ.
Pfersdorffii, Hildm. ex K. Schum. l. c. 125 = gummosus.
l. sanborgianus, *Coult*. . . . 391.
a. Schickendantzii, *Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 238.—Reg. Argent.

39^{1}. l. thelegonus, *A. Web.*

CESTRUM.

39^{1}. l. sparsiflorum, *Britton*,

CHAENACTIS.

39^{1}. l. orcuttiana, *Parish, in Erythea*, vi. 92.

CHAENOSTOMA.

39^{2}. l. divaricatum, *Diels*, . . . Afr. austr.
gracile, *Diels*, . . . Afr. austr.

CHAETOBROMUS.

39^{2}. l. interceptus, *Nees*, . . . 342.

39^{3}. l. CHALMERSIA, F. Muell. in Melb. Chem. & Drug. June 1884; et ex S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 174.

CHAMAERAPHIS.

40^{1}. l. *rhachitricha*, Kuntze,

CHEIROSTYLIS.

40^{2}. d. heterosepala, *Rolfe*,
a. lepida, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 182.—Afr. trop.

CHISOCHETON.

40^{3}. a. macrophyllus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 295 (= *Melioschinzia macrophylla*).—N. Guin.

CHLOROPHYTUM.

41^{3}. a. Menyharthi, *Schinz, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 503.—Afr. trop.

41^{3}. l. **CHORISTIGMA**, Kurtz (Asclep.).
stuckertianum, *Kurtz*,

CHRYSASPIS.

41^{3}. a. *procumbens*, Greene, Pittonia, iii. 206 = T. procumbens.

CHRYSOPOGON.

42^{1}. l. *asper*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 189 = Andropogon asper.

CHRYSOTHAMNUS.

42^{2}. l. *affinis*, A. Nelson, . . . xxviii.
oreophilus, A. Nelson, . . . xxviii.
wyomingensis, A. Nelson, . . . xxviii.

CIRRHOPETALUM.

42^{3}. a. *griffithianum*, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. 153 (Bulbophylli §) = gamosepalum.
l. kamesinum, *Zahlbr*. . . . (1900) 192.—Madag.?
a. merguense, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. 154 (Bulbophylli §).—Burma.

PAG.

43^{1}. insere **CLADOCOLEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 166. *LORANTHACEAE.*
Andrieuxii, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Mexic.
Grahami, *Van Tiegh. l. c.* 168 (= *Loranthus Grahami*).—Mexic.
Oerstedii, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus Oerstedii*).—Am. cent.
tehuacanensis, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus tehuacanensis*).—Mexic.

43^{1}. l. **CLADOPUS**, Moeller.

CLAUSENA.

43^{2}. l. Forbesii, *Engl*. . . . 188.

CLEISOSTOMA.

43^{2}. l. micranthum, *King & Pantl*. . . . 234.

CLEOME.

43^{3}. d. *polyandra*, Rose,

CLEOMELLA.

43^{3}. l. gracilis, *Brandegee*, . . . xxvii. 444.

CLITANDRA.

44^{2}. l. kilimandjarica, *Warb.*

COCCINIA.

44^{3}. l. Dinteri, *André*, . . . 268.

COCHLIODA.

44^{3}. l. stricta, *Cogn*. . . . 1897, II. 410.

COELACHYRUM.

44^{3}. l. *poaeflorum*, Chiov.

COELOGYNE.

45^{1}. a. cinnamomea, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 306.—Borneo.
elegans, Ind. Kew. Suppl. I. 105, errore = Cypripedium elegans.
rubens, Ind. Kew. Suppl. I. 105, errore = Calanthe rubens.

45^{1}. a. **COELONEURUM**, Radlk. (Solan.).
ferrugineum, Urb. Symb. Antill. i. 380 = lineare.

COIX.

45^{1}. l. *Koenigii*, Spreng. . . . 239.
Ma-Yü'ên, Romanet, . . . Sér. III.

45^{2}. insere **COLEOBOTRYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 482. *LORANTHACEAE.*
acuminata, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.
alata, *Van Tiegh. l. c.* 542.—Sumatra.
crassisepala, *Van Tiegh. l. c.* 485 (= *Loranthus crassipetalus*).—Penins. Mal.
cylindrica, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus cylindricus*).—Sumatra.
heterantha, *Van Tiegh. l. c.* 484 (= *Loranthus heteranthus*).—Burma; Malaya.
Lobbii, Van Tiegh. l. c. 542 = rubra.
macklottiana, *Van Tiegh. l. c.* 484 (= *Loranthus macklottianus*).—Sumatra.
raphidophora, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.
rubra, *Van Tiegh. l. c.* 542.—Java.
Zollingeri, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.

COLEONEMA.

45^{2}. a. barosmoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 163, nomen.—Afr. austr.

COLEUS.

45^{3}. a. personatus, *Lem. Hort. Univ.* vi. 128, 292.—Hab.?
Schweinfurthii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 432 = C. Sodalium.

COLUMNEA.

46^{1}. a. crassifolia, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* v. 356; vi. 203.—Mexic.
Lindenii, *Brongn. l. c.* iii. 129.—Mexic.

COMBRETUM.

46^{1}. l. bongense, *Engl. ex Engl. & Diels*,
calobotrys, *Engl. & Diels*, . . . 73.

46^{2}. Goetzei, *Engl. & Diels*, . . . 97.

46^{3} a. *Teuszii*, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 60 = Theuschii.
l. verticillatum, *Engl. ex Engl. & Diels*,

PAG.

COMMIPHORA.

46^{3}. l. Antunesi, *Engl*. . . .; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 370.
a. Playfairii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 253 (= *Balsamodendrum Playfairii*).—Afr. trop.
Robecchii, *Engl. l. c.* 252.—Afr. trop.
rostrata, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Roxburghii, Engl. l. c. 253 = C. Mukul.
simplicifolia, *Schweinf. in Kew Bull.* 1896, 90.—Arab.

CONANTHUS.

47^{1}. l. *pusillus*, Lemmon, ex A. A. Heller.

CONVOLVULUS.

47^{2}. l. hirsutiflorus, *Damm*. . . . xxiii. *Beibl.* lvii. 41.
Juramenti, Kuntze, . . . 217.
phyllosepalus, *Hallier f.*
Ruspolii, *Damm*. . . . vii.
Volkensii, Kuntze, . . . 211.

COPAIBA.

47^{2}. a. *Kuntzei*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 56 = Copaifera Kuntzei.

COPAIFERA.

47^{2}. l. Demeusei, *Harms*, . . . ; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 264.

CORDIA.

47^{3}. a. pauciflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 83.—Bolivia.

CORNUS.

48^{1}. l. Bretschneideri, *L. Henry*,
quinquenervis, *Franch.*

CORREA.

48^{1}. a. longiflora, *Paxton, Mag. Bot.* vii. 195.—Hybr.

CORYDALIS.

48^{1}. a. balsamiflora, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxv. 41.—China.

COTULA.

48^{3}. a. Muelleri, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 324.—Ins. Chatham.

COUSINIA.

48^{3}. l. albescens, *Winkl. & Strauss*, . . . xiv.
a. Korowiakowi, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 226.—Persia.

CRAMBE.

49^{1}. a. darwasica, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. 423.—Turkestan.
schugnana, *Korsh. l. c.* 422.—Turkestan.

CRASSULA.

49^{1}. a. Aitoni, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 480.—Afr. austr.

49^{2}. Harveyi, *Britten & Baker f. l. c.* 479.—Afr. austr.

CRYPTOLEPIS.

51^{2}. a. oblongifolia, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 315 (= *Ectadiopsis oblongifolia*).—Afr. austr.
transvaalensis, *Schlechter, l. c.* (= *Ectadiopsis cryptolepioides*).—Afr. austr.

CYNOSURUS.

53^{2}. a. *paniculatus*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 297 = Dinebra arabica.

CYPHOCARPA, Lopr. (Amarant.).

54^{1}. a. angustifolia, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 45 (= *Sericocoma angustifolia*).—Afr. austr.
trichinoides, *Lopr. l. c.* (= *Sericocoma trichinioides*).—Afr. austr.
Zeyheri, *Lopr. l. c.* (= *Trichinium Zeyheri*).—Afr. austr.

DACTYLIS.

54^{3}. a. *cynosuroides*, Koen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 297 = Dinebra arabica.

DENDROBIUM.

57^{1}. a. speciosissimum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1895, 119, 240.—Borneo.

PAG.

DESMODIUM.

57^{3}. a. huillensis, *Welw. in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 243.—Afr. trop.

DETRIS.

57^{3}. a. *fascicularis*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 159 = F. muricata.
simulans, S. Moore, l. c. = Aster simulans.
tenella, Schlechter, in Journ. Bot. 1899, 370 = F. fragilis.

DICHAELIA.

58^{2}. a. *filiformis*, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 293 = B. filiforme.
ovata, Schlechter, l. c. = B. ovatum.

DICHOPSIS.

58^{3}. a. oblongifolia, *Burck, Rapp. Expl. Recherche Gutta-Percha*, 17.—Penins. Mal.

DIOSCOREA.

60^{1}. a. dejantiana, *Lem. Hort. Univ.* v. 355.—Bras.
60^{2}. spiralis, *Lem. l. c.*; vi. 189.—Bras.

DOMBEYA.

62^{3}. a. *arabica*, Baker, in Kew Bull. 1895, 315 = Glossostemon Bruguieri.

DRACOCEPHALUM.

63^{2}. a. louisianum, *Hort. in Lem. Hort. Univ.* iv. 298.—Hab.?

DYSCHORISTE.

64^{2}. a. heudelotiana, *Kuntze, Rev. Gen.* ii. 486.—Afr. trop.
multicaulis, *Kuntze, l. c.*—Afr. trop.
Perrottettii, *Kuntze, l. c.*—Afr. trop.
thunbergiiflora, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III B. 302.—Afr. trop.
trichocalyx, *Lindau, in Engl. Pfl. Ost-Afr. C.* 367.—Afr. trop.

ECHINOCACTUS.

65^{1}. a. teretispinus, *Lem. Hort. Univ.* vi. 60.—Mexic.

67^{3}. insere EPIDENDROIDES, Soland. in Journ. Bot. (1897) 192 = **Myrmecodia**, Jack (Rubiac.).
tetrandra, Soland. l. c. = M. Beccarii.

EPILOBIUM.

68^{1}. a. intermedium, *Bory, in Thore, Promen. Gascogne*, 24.—Gallia.

EPIPHYLLUM.

68^{2}. a. purpurascens, *Lem. Hort. Univ.* ii. 349.—Hab.?

ERANTHEMUM.

69^{1}. a. paniculatum, *Blume, Bijdr.* 791.—Java.

EREMIA.

69^{1}. a. rhodopis, *Bolus, in Journ. Bot.* 1894, 239.—Afr. austr.

69^{1}. a. EREMOCHLOE, S. Wats. = **Blepharidachne**, Hack. (Gramin.).
Bigelovii, S. Wats. in Bot. King's Exped. 382 = B. Bigelovii.
Kingii, S. Wats. l. c. t. 40 = B. Kingii.

ERIA.

69^{2}. a. *sedifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 786, errore = dasyphylla.

ERICA.

69^{3}. a. ramentacea, *Linn. Mant.* i. 65; *Syst. Nat.* ed. XII. 269.—Afr. austr.
straminea, *Wendl. Eric.* ii. fasc. XXVI–XXVII. 19.—Afr. austr.

ERIOCAULON.

70^{1}. a. Brunonis, *Britten, in Journ. Bot.* 1900, 482.—Austral.
Koernickei, *Britten, l. c.* 481.—Bras.

EUONYMUS.

73^{1}. a. *adenophorus*, Scort. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxv. 351 = Lophopetalum oblongifolium.
mammillaris, Scort. l. c. 350 = Lophopetalum Scortechinii.

PAG.

FAGELIA.

76^{1}. a. *plantaginea*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 461 = C. plantaginea.

FAGUS.

76^{1}. a. *atropunicea*, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 50 = ferruginea.
sinensis, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 1936 = sylvatica.

FELICIA.

76^{2}. a. barbata, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 375 (= *Aster barbatus*).—Afr. austr.
natalensis, *Schlechter, l. c.* 1897, 220 (= *Aster natalensis*).—Afr. austr.

FICUS.

77^{2}. a. stipulata, *Lem. Hort. Univ.* iv. 359.—China; Japon.

GALEDUPA.

78^{3}. a. *cochinchinensis*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 482 = Sindora cochinchinensis.
coriacea, Prain, l. c. 206 = Sindora coriacea.
Echinocalyx, Prain, l. c. 204 = Sindora Echinocalyx.
intermedia, Prain, l. c. 205 = Sindora intermedia.
siamensis, Prain, l. c. 481 = Sindora Wallichii.
velutina, Prain, l. c. 206 = Sindora velutina.
wallichiana, Prain, l. c. 481 = Sindora Wallichii.

GASTONIA.

79^{2}. a. neraudiana, *Rich. ex Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 62 (= *Panax neraudiana*).—Maurit.
racemosa, *Rich. ex Drake, l. c.* 63 (= *Panax racemosa*).—Maurit.

GENYORCHIS.

80^{3}. a. micropetala, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 280 (= *Bulbophyllum micropetalum*, Lindl.).—Afr. trop.

GESNERIA.

81^{1}. a. macrantha, *Lem. Hort. Univ.* vi. 127; vii. 202.—Hab.?

GIGANTOCHLOA.

81^{1}. a. aspera, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 20, nomen.—Java.
wallichiana, *Kurz, l. c.*—Burma.

GONOLOBUS.

83^{1}. a. volubilis, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 428 (= *Nematuris volubilis*).—N. Granat.

83^{2}. insere GRANDIERA, Lefeb. ex Baill. Adansonia, x. (1871) 104 = **Sindora**, Miq. (Legum.).
cochinchinensis, Lefeb. l. c. = S. cochinchinensis.

83^{3}. insere **GRIFFITHIA**, Maing. ex King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iv. (1893) 8. *ANONACEAE.*
cupularis, *King, l. c.* 9.—Penins. Mal.
fusca, *King, l. c.* 10.—Penins. Mal.
magnoliaepetala, *Maing. ex King, l. c.* 9.—Penins. Mal.

GUZMANIA.

84^{3}. a. Seemanni, *Baker, Handb. Bromel.* 153.—Ecuador.

HABENARIA.

86^{1}. a. tricruris, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. 214.—Afr. trop.

HELIOTROPIUM.

88^{2}. a. *strictum*, Ehrenb. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 115, in obs. = strigosum.

HIPPEASTRUM.

91^{1}. a. morelianum, *Lem. Hort. Univ.* iv. 37.—Bras.

HOULLETIA.

92^{3}. a. stapeliaeflora, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iii. 132.—Bras.
stapelioides, Brongn. ex Reichb. f. in Regel, Gartenfl. (1855) 2 = praec.

HYOSCYAMUS.

94^{1}. a. kurdicus, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. (1898) 611.—Syria.

PAG.

INDIGOFERA.

95^{3}. a. Dyeri, *Britten, in Journ. Bot.* 1897, 453.—Afr. trop.

INTSIA.

96^{1}. a. *coriacea*, Maing. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 206 = Sindora coriacea.

IPOMOEA.

96^{2}. a. Lorentzii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 217.—Am. austr.
96^{3}. sericophylla, *Peter, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 31.—Am. cent.
truncata, *Lem. Hort. Univ.* ii. 33, t. 49.—Mexic.

JUNCUS.

98^{2}. a. *liniger*, With. Syst. Arr. Brit. Pl. ed. IV. ii. 343 = Luzula campestris.

JUSTICIA.

99^{2}. a. sexangularis, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III B. 349.—Afr. trop.

KLEINIA.

100^{1}. a. Mandraliscae, *Tineo, in Lem. Pl. Grasses*, 72.—Eur.

LAELIA.

101^{2}. a. cattleyioides, *Rich. in Lem. Hort. Univ.* v. 206 (non Rodr.).—Bras.

LAMIUM.

101^{3}. a. Cardiaca, *H. Baill. Iconogr. Fl. Fr.* t. 270 (= *Leonurus Cardiaca*).—Reg. bor. temp.

LASIOSTELMA.

102^{3}. a. longifolium, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1899, 62 (= *Brachystelmaria longifolia*).—Afr. austr.
macropetalum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelmaria macropetala*).—Afr. austr.
ramosissimum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelmaria ramosissima*).—Afr. austr.
subaphyllum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelma subaphyllum*).—Afr. trop.

LEPIDIUM.

103^{3}. a. *riparium*, Schlechter, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6 = Nasturtium riparium.

105^{2}. a. **LIGEA**, Poit. (Podost.).
Glaziovii, *Warm. in Danske Vid. Selsk. Skrift.* iv. (1888) 465.—Bras.

MELOCACTUS.

115^{3}. a. cephalenoplus, *Lem. Hort. Univ.* ii. 128.—Venez.

MELOCANNA.

115^{3}. a. Blumei, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 20, nomen.—Java.
brachyclada, *Kurz, l. c.*—Java.
elegantissima, *Kurz, l. c.*—Java.
hasskarliana, *Kurz, l. c.*—Java.
longespiculata, *Kurz, l. c.*—Java.
serpentina, *Kurz, l. c.*—Java.
tenuispiculata, *Kurz, l. c.*—Java.

MYRMECODIA.

122^{2}. a. Beccarii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6883.—Austral.

NASTURTIUM.

123^{2}. a. calycinum, *Engelm. ex Hayden, in Trans. Amer. Phil. Soc.* xii. (1863) 184.—Am. bor.

ONCIDIUM.

126^{3}. a. celsianum, *Rich. in Lem. Hort. Univ.* vi. 113.—Hab.?
galeottianum, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. i. 198 = Odontoglossum citrosmum.
Lindeni, Hort. ex Reichb. f. in Lindl. Fol. Orch. Oncid. 39; Lodd. ex Lindl. Sert. Orch. sub t. 48, no. 101 = Lindenii, *Brongn.*
Lindeni, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iii. 372.—Mexic.
retemeyerianum, Reichb. f. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 513 = Lindenii, *Brongn.*

PAEONIA.

131^{2}. a. Smouthii, *Hort. in Lem. Hort. Univ.* iv. 274.—Hybr.

PAG.

PHILADELPHUS.

140 [2]. a. macranthus, *Jacques, in Lem. Hort. Univ.* ii. 17. —Hab. ?
nivalis, *Jacques, l. c.* 19.—Hab. ?

PHILODENDRON.

140 [3]. a. crinipes, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* v. 230.—Mexic. ; Guiana.

PITCAIRNIA.

144 [2]. a. Morelii, *Lem. Hort. Univ.* vii. 231.—Hab. ?

150 [1]. insere PONTANIA, Lem. Hort. Univ. v. (1844) 33 = **Brachysema**, R. Br. (Legum.).
celsiana, *Lem. l. c.* = B. lanceolatum.

PRIMULA.

151 [2]. a. cottia, *Widmer, in Flora*, 1889, 71.—Eur.

PRUNUS.

151 [3]. a. pendula, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1884) 98 ; *Mél. Biol.* xi. 690.—Japon.

PAG.

PTEROCARPUS.

153 [1]. a. echinatus, *Pers. Syn.* ii. 277.—As. trop.

PYRUS.

154 [3]. a. douxiana, *Hénon, in Lem. Hort. Univ.* iii. 305. —Hort.

RHODODENDRON.

157 [3]. a. morelianum, *Lem. Hort. Univ.* iv. 1.—Hybr.

158 [3]. insere ROBYNSIA, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. ii. (1841) 127, 231 = **Bravoa**, Lex. (Amaryll.).
geminiflora, Drapiez, l. c. = B. geminiflora.

RUELLIA.

160 [2]. a. Baikiei, *Woodr. Gard. India*, ed. V. 417 (= *Stephanophysum Baikiei*).—Bras.

SENECIO.

169 [3]. a. Croussei, *Lem. Hort. Univ.* v. 172.—Hybr.

PAG.

SIPHOCAMPYLUS.

172 [2]. a. rugosus, *Lem. Hort. Univ.* iii. 368.—Hab. ?

SPREKELIA.

176 [1]. a. stenopetala, *Lem. Hort. Univ.* v. 227.—Hab. ?

STANHOPEA.

176 [2]. a. *calceolata*, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. ii. 127, 264 = eburnea.
uncinata, Drapiez, l. c. iv. 65 = martiana.

TILLANDSIA.

184 [2]. a. lorifolia, *Lem. Hort. Univ.* vi. 316.—Bras.
splendens, *Brongn. in Lem. l. c.* 199.—Guiana.
zonata, *Brongn. in Lem. l. c.* 90.—Guiana.

TRADESCANTIA.

185 [2]. a. punctulata, *Lem. Hort. Univ.* vi. 125.—Hab. ?

ZICHYA.

197 [2]. a. *Baumanni*, Lem. Hort. Univ. vi. 34.—Austral.